





55331/B

Vol. 1

ZWINGER, T.

Barnal
11-3-28
200 ft

2nd

BSS



Digitized by the Internet Archive
in 2019 with funding from
Wellcome Library

https://archive.org/details/b30550075_0001

ALLA R. O. M.

ALDO R. B. C.

1907, 07 03

1907, 07 03

1907, 07 03

1907, 07 03

1907, 07 03

1907, 07 03

1907, 07 03

1907, 07 03

1907, 07 03

1907, 07 03

1907, 07 03

1907, 07 03

1907, 07 03

1907, 07 03

1907, 07 03

1907, 07 03

1907, 07 03

1907, 07 03

1907, 07 03

1907, 07 03

1907, 07 03

1907, 07 03

1907, 07 03

1907, 07 03

1907, 07 03

1907, 07 03

THEATRUM PRAXEOS MEDICÆ

QVO

ÆGRITVDINES

CORPORIS HVMANI

Tam internæ quàm externæ

Ordine alphabetico

Ita pertractantur & exponuntur, ut facili quis negotio

Non solum Naturam ipsarum cognoscere, sed &

Methodum iis medendi

Citam, tutam, atque jucundam addiscere queat.

THEODORUS ZUINGERUS,

An. & Bot. in Academ. Basil. Profefs. Sereniss. Ducis
Wurtemb. Consil. & Med. Societatum Liter. Leopoldino-Im-
per. & Prussiaco-Regiæ Membrium,

*Auxiliante Numinis Divini gratiâ in usum
Medicorum Juniorum*

Lucubrante ut plurimum calamo adornavit,

Multorumque Jatrophilorum rogatu Juris publici fecit,



BASILEÆ.

Typis & Sumpt. JOHANNIS BRANDMÜLLERI.

Anno Domini MDCCX.

THEATRE

THEATRE

THEATRE

THEATRE

THEATRE

THEATRE

THEATRE





REVERENDISSIMO atque CELSISSIMO
 S. R. IMPERII
 PRINCIPI AC DOMINO,
 DOMINO
 IOHANNI CONRADO,
 EPISCOPO BASILIENSI,
 DOMINO SVO CLEMENTISSIMO.

REVERENDISSIME PRINCEPS,
 DOMINE CLEMENTISSIME.



Vum nihil Homini gloriosius esse, nihilque
 adeo magis eum decere soleat, quàm Generi
 humano quacunque demum in Vitæ con-
 ditione utilia semper officia præstare, juncun-
 dum certè mihi est, imò jucundius quid-
 quam evenire nequit, quàm vitæ meæ dies in tam præ-
 claro

claro inserviendi munere per DEI gratiam hucusque consum-
sum fuisse. Agitur enim, PRINCEPS CELSISIME, im-
præterit jam annus trigessimus, quo ad exemplum Abav
Proaviq̃ue mei, *Theodori & Jacobi Zuingerorum, Medicorum præclarorum, & Professorum in Vniuersitate nostrâ ce-
lebrum*, Medendi Arti adhibitus, toto hoc tempore nihil
mihi antiquius, potius nihil esse passus sum, quàm
Ægrotantem sine discrimine *Proximum* qualicunq̃
consilio, ope, & auxilio pro viribus meis noctu diuq̃
sublevare, utilemq̃ue illi operam præstare. Neque de-
fuit mihi unquam in tam ardui muneris negotio poten-
DIVINI NVMINIS gratia, adeo ut ei soli omne meum
scire, velle, & posse debeam, inq̃ue acceptis devotissimo
spiritu referam, præsertim quòd simul in Professorii Mune-
ris officio S. S. Spiritûs Sui ope adeo benignè mihi assister-
voluerit, ut non facere tantùm Medicinam, sed &
eam publicè privatimq̃ue docere, subinde notatu di-
gniora in Thesaurum Observationum congerere, eaq̃ue
etiam cum Discipulis meis fideliter communicare po-
tuerim. Hac igitur quotidianâ medendi, & quidquid
in Corpore humano ad Sanitatis recuperationem præ-
stari potest vel nequit, experiundi occasione id tandem
evenit, ut rationalis admodum, & ea quidem tuta
jucundaq̃ue sanandi ratio à me scripto mandata, inq̃; hoc
ipsum *Praxeos Medica Theatrum*, quod omnium Hu-
mani Corporis Ægritudinum descriptionem atque cu-
rationem minus prolixam in sese comprehendit, con-
gesta fuerit. Opus verò hoc qualecunq̃ue, utut ἀκριβεία
& experientiâ longè majore adhuc indigens, quum Me-
dic

dici plures , ac Practici inprimis Juniores in publicam
 lucem missum exoptarent , mittendumq; sæpius roga-
 rent,prelo tandem subjectum,hisq; diebus benedicente
 DEO , ad exoptatum finem perductum fuit,ita ut nihil
 deficere videretur,quàm Patrocinium,cujus splendore
 & auctoritate in publico tutum comparere posset. Neq;
 profectò diu mecum deliberavi, aut anxius hæsi, quem-
 nam præ cœteris Patronum seligerem ; injurium enim
 statim in REVERENDISSIMAM CELSITVDINEM
 TVAM me futurum esse arbitrabar, si non hâc occasione
 CLEMENTIAM TVAM ad suscipiendam hanc Tutelam
 submissâ veneratione implorarem, atq; ita simul publi-
 cum devotissimæ meæ erga CELSITVDINEM TVAM
 observantiæ monumentum erigerem. Cùm enim Uni-
 versitas nostra, à PIO SECVNDO Pontifice Maximo ante
 ducentos quinquaginta annos Civitati Basiliensi ex singu-
 lari gratiâ concessa , amplissimisq; privilegiis, ad nor-
 mam Academia Bononiensis exornata , maximo sibi
 honori ducat, *Reverendissimum* semper *Episcopum Basi-*
liensem , atque *Celsissimum S. R. I. Principem* pro Cancel-
lario suo Gratosissimo adgnoscere , ejusq; *Auctoritate*
Principali suas tranquillè res peragere , æquum esse ju-
 dicavi, obsequiosissimi erga REVERENDISSIMAM
 CELSITVDINEM TVAM Cultûs mei testimonium
 quoddam publicum exhibere. Suscipe igitur, CLE-
 MENTISSIME PRINCEPS , Fœtum hunc qua-
 lem cunque meum serenâ fronte, dignare ipsum potenti
Tutelâ Tuâ atque *Præsidio* contra adversariorum insidias
 fortiter defendere , meque adeo, imò integram Univer-
 sitatem

fitatem nostram *Clementiâ Tuâ* protegere haud gravare. Ego interea Summum Archiatrum, DEUM Ter Cpt. Max. humillimâ prece fatigare non cessabo, ut CELSITVDINEM TVAM ad feros usque ætatis annos, ac innumerabilem dierum nunquam displiciturarum seriem sospitem & incolumem conservare insuperque Regiminis perpetim felicitis gloriâ, Pacis & Tranquillitatis nunquam turbatæ usu, ac omnigenæ tandem prosperitatis gaudio cumulativè beare dignetur. Ita vovet ex animo


REVERENDISSIME CELSISSIMEQUE PRINCEPS,

DOMINE CLEMENTISSIME,

REVERENDISSIMÆ CELSITVDINIS TVÆ

Cliens humillimus

THEODORVS ZVINGERVS.





*In Effigiem Celeberrimi ZUINGERI Epigramma.
 FORMOSUM ut Pictor ZUINGERUM pingeret en quis
 Accepit tabulas, atque peregit opus!
 DOCTUM etiam voluit ZUINGERUM pingere: erat sed
 Cingere ZUINGERUM lamina nulla capax.*

J. G. Seiller sculpsit.

p. Gotth. Heideggerus Figurin



D. O. M. B. V.
 THEATRUM
 PRAXEOS MEDICÆ
 ALPHABETICO ORDINE
 MORBOS
 CORPORIS HUMANI
 SINGULOS
 EORUMQUE
 NATURAM ET CURAM
 EXPONENS.

A.

Abdo-
 minis
 adum-
 bratio.



ABDOMINIS
 TVMORES. *Abdo-*
men, Græcis subinde
 dictum *Επιγάστριον*,
 est in genere quidem
 totus venter humani
 Corporis *infimus*, qui intus per Dia-
 phragma à Thorace separatur, & di-
 versa in sese Viscera, prout Ventricu-
 lum, Hepar, Lienem &c. complectitur,
 extus verò Cartilagine ensiformi, ossi-

bus Pubis, Coxendicis, Sacro, Verte-
 bris Lumborum, & utrinque Costis
 nothis circumscribitur; superius Hy-
 pochondrii dextri, sinistri, atque Præ-
 cordii, quæ regio est media nonnihil
 depressa vel cava; in medio Regionis um-
 bilicalis; inferius tandem Hypogastrii,
imi Ventris, vel etiam Aqualiculi, in
 partes laterales seu Ilia, ac Inguina, &
 Pubis regionem pilis obtectam distin-
 cti, nominibus insignitus. In specie au-

A

tem

tem *Abdominis* voce nonnulli Anatomici externas tantum, vestientes continentefve infimi Ventrif partes exprimere, easque dividere consueverunt in communes, five *Cuticulam*, *Cutim*, *Panniculum carnosoad ipum*, atque communem *Musculorum membranam*, & proprias, five *Musculos ac Peritonæum*.

Omnes hæ Partes variis affliguntur Morbis, quorum plerique suis hinc inde locis describuntur; aliqui verò etiam heic specialius examinandi veniunt; hos inter statim occurrit *Tumor*, quo quidem infimus Venter subinde totus præternaturalem in magnitudinem assurgit, corpus deformans, incessui molestiam pariens, &, si diutius duraverit, *Atrophiam* post se trahens. Subinde verò pars tantum *Abdominis* intumescit, & *specialem Tumorem* constituit. *Tumor* *Abdominis* totius aliquando est *mollis & asciticus*, de quo sub Titulo *Hydropis Ascitis*; aliquando *flatuosus, tensus, tympaniticus*, sub voce *Tympanitidis* descriptus; aliquando etiam *aquoso - tympaniticus*, planè monstrosus reddi solitus, quemadmodum in *Hydrope Ovarii muliebris*; aliquando denique est inter mollitiem & duritiem medius, quem in Infantibus & Pueris, *Atrophiam* laborantibus, frequenter observare contingit.

In ipsa nimirum *Pædatrophiam* *TUMOR ABDOMINIS* sæpius apparet, sed tum per se non curatur, quoniam sublatâ illâ Infantum *Tabè* ipse simul paulatim disparere creditur: contingit hoc, ut verum fatear, non rarò, sicque perfectum Sanitatis pristinae usum *Ægri* tales recuperant. Sæpius tamen

etiam sanatâ utcunque *Atrophiam* *Abdomen* Puerorum adhuc insigniter tumidum manet, plus minus tensum aut durum, non sine deformitate, atque incessis molestiâ, imò & metu ipsius recidivæ.

Si causam *Tumoris* istius desideres, proximè quidem nunc *Intestinorum* *Inflationem*, ab aucto fibrarum membranacearum elatere oriundam; nunc aliqualem adhuc *Viscerum Abdominis*, & *Glandularum mesaraicarum* infarctum, à materiâ pituitosâ viscidâ productum; nunc *Vermes Intestinalium*, suâ rosione frequenti *Tunicas* fibrarum nervosarum crispantes, & ad validam expansionem stimulant; nunc denique *involucrorum Abdominis* communium *incrassationem*, à collectâ pituitâ copiosâ proveniente, accusare possumus. Hinc fit, ut tales Pueri atque Infantes, etiamsi consumptio corporis cesset, imò hoc augeri iterum videatur, ad pristinum tamen habitum & *εὐεξίαν* minimè perveniant, donec *Abdominis* intumescencia sublata, tubulique & *Glandulæ* omnes à suâ obstructione & infarctu liberatæ fuerint. *Causas proximas* excitant variæ *Causæ antecedentes & procatacticae*; non errant heic, qui potissimam culpam imminutæ vel depravatæ etiam *Chylificationi* adscribunt, undecunque proveniente. Aëris profectò diversæ injuriæ, Ciborum eupeptorum, vel dyspeptorum, Potusque deterioris intempestiva aut immodica ingestio, Somnus prolixus nimis, Pathemata animi vehementia, Excretiones consuetæ neglectæ, & similia, liquorem debilitando

Ætiologia illius

Abdominis totius Tumor.

Asciticus.

tympaniticus.

Tumor ædæmaticus.

do gastricum, perversæ illi chylicati-
oni ansam multiplicem præbere notan-
tur. Cruditates hinc viscido-pituito-
sæ, ut plurimum acidæ, Chylum simili
charactere inficientes, oriuntur. Ver-
mes autem ex ovulis Insectorum cum
Cibo ingestis, minusque probè dissolu-
tis, enascuntur, sicque porta multiplex
gignendis obstructionibus & infarcti-
bus aperitur.

Malum hoc autopsiâ facilè dignosci-
bile, si radicum non fuerit, haud dif-
ficulter curabitur; in veteratum autem
in Atrophiam & Hæcticam subinde re-
dit, & mortem denique lentam infert.

Dissipatur ejusmodi Tumor, si à
copiosis flatibus distendentibus, vel
ab elatere membranarum nimio ortum
duxerit, per Remedia carminativa, al-
calina, acidum vitiosum absorbentia,
vel alio qualicunque modo destruen-
tia. In hunc finem obesse magis, quàm
prodesse credimus purgantia fortiora;
urgente verò alvi Constipatione coch-
learia aliquot Syrupi flor. Persicorum,
vel de Cichor. cum Rhabarb. vel flor. A-
caciæ. aut Rosar. sol. simpl. cum Aquâ
Fœniculi, Scab. permiscendo quasdam
guttulas Spiritûs, vel Olei stillatit. A-
nisi aut Cherefol. dare licebit Clysmat-
a autem magis proficua esse notavi-
mus, parata ex decocto Radic. Angelic.
Calami aromat. Alth. Ireos fl. Petasitid.
Herb. Malv. Alth. Ocym. Meliss. Puleg.
Menth. Summitat. Aneth. Abrotoni,
Flor. Chamomill. Bacc. Lauri, Juniperi,
Semin. Dauc. Fœnic. Anis. Carv. Cu-
min. Aneth. Lini. & simil. factò in Aquâ,
font. vel Urinâ Pueri, cui dein Oleum
Chamom. Anethi, Lilior. alb. Meliloti

hortens. cum tantillo Salis communis,
vel Fri vel Salis armoniaci permixtum
fuerit. Abdomini Sacculus ficcus ex
Herbis Menthæ, Melissæ, Absynth. Abro-
ton. Ocymi, Pulegii, Origani, Radici-
bus Angelic. Imperator. Galang. Zedoar.
Seminibus Anethi, Anisi, Dauci, Fœni-
culi, Carvi, Baccis Lauri, Juniperi,
aliisque carminativis paratus, calidè
applicabitur; prius Abdomen totum,
si placet, illinendo Oleis Anethi, Cha-
momill. Absynth. Rutæ, Meliloti, Anisi,
Scorpionum Matthiol. Intus dare licet,
cùm Febris nulla ad est, pulveres car-
minativos absorbentibus mistos, ex
Radic. Galang. Zedoar. Angelic. Cubeb.
Cinamom. opt. Garyophyll. arom. Semi-
nib. Anis Fœnic. Corallis alb. ppt. Ocul.
S. ppt. Unic. foss. & similibus. Sed cùm
frequenter admodum Pueri fastidio
Remediorum teneantur, omni arte,
clam etiam talia exhibebuntur, saccha-
ro ad gratiam permista: v. gr.

R. Corall. alb. vel rubr. ppt.

Ocul. S. ppt. ana. ℥iij.

Spod. ex Ebor. ppt. 3j.

Auri fulminantis ʒss.

Semin. Anis. gr. XII.

Radic. Zedoar. vel

Galang. gr. vj.

Sacch. penidior. vel rosat. tab. ʒss.

M. F. pulv. subt. d. ad ch. Quotidie
bis vel ter cuspis cultri plenus vel
ʒj. ad ʒij. exhibetur cum vehi-
culo conveniente.

Si Sal volatile oleosum, vel Spiritus Sa-
lis armoniaci anis. aut fœniculatus, vel
Essentia Zedoar. Galang. Spirit. Anisi,
Aqua Vitæ Matthiol. aut quid aliud æ-
què spirituosum & efficax dari possit,

tum præscribetur tale quid, mane ac vesperi ad 6. 8. vel plures guttulas exhibendum cum *Ptisana ordinaria*, vel *Aquâ Melissæ*, *Card. bened.* *Fenic.*

Diala.

In Diætâ calidus Aër semper admittatur, cibi eupepti, minimè flatulenti, succum exhibentes laudabilem chylosum dabuntur. Pro potu ordinario *Decoctum* concedetur *Radic. Ireos florent. Chinæ, Rasur. Lign. Guajac. Sassafr. Semin. Anis. Fenic.* Excreta alvina si non responderint quotidie, *Clysmate emolliente & detergente carminativo* sollicitabuntur: Ab Irâ præcavendi etiam Pueri, non secus atque à Vitâ sedentariâ, & Somno nimio. Denique *Balneo Aquæ dulcis*, cum incoctis Plantis carminativis Æger quotidie per horulæ spatium immittendus.

*Curatio
Tumoris
ab In-
farctu.*

Quando Tumor Abdominis originem suam debet *Infarctui Viscerum*, & *Glandularum* inprimis *mesaraicarum*, vel *Incrassationi Involutorum Ventris*, tum Purgantia præmittenda veniunt cum præparantibus; in hunc finem ter vel quater *Tincturam Martis aperitivam*, vel *Antimonii* ad decem vel plures guttulas bimulo aut trimulo cum *Aqu. Card. bened. & Syrup. violar.* vel cum Potu ordinario damus. Aut *Liquorem Terræ foliatæ Fri* ad ℥ij. vel ℥j. vel *Arcanum duplic. Myns.* ad ℥℥. sensim 30. horarum spatium in potu concedimus. Præparatione verò tali præmissâ *Purgans* dandum, quale poterunt esse *Trochisci nostri Pædo-cathartici*, quorum unum Infanti unius anni, duos vel tres bimulo, trimulo, & si parum vel nihil purgaverint, tres bimulo, quatuor trimulo, quinque quadri-

mulo exhibere solemus: purgant egregiè, ac si quid in Ventriculo cruditatis hæserit, non rarò etiam per gulam blandè evacuant. Trochiscos verò hos vel devorandos concedimus, vel in pulverem tritos cum vehiculo exhibemus. Loco tamen hujus remedii frequenter propinari solent potiunculæ, v. gr. pro Infante bimulo:

R. Diacydon. lucidi ℥iiij. plus minus.

Aqu. Borrag. q. s.

Fenic. ℥j.

M. F. potiuncula d. ad vit. pro dosi matutinâ.

vel *R. Syrup. de Cich. cum Rhab. ℥℥.*

*Aqu. Endiv. ℥vj. Cinamom. bu-
gloss. ℥℥.*

Scammon. sulphurat. gr. i℥.

*Mercur. dulc. quinquies sublim.
gr. iij.*

M. F. potiuncula, d. ad Vit. pro dosi.

Vel *Syrupus Rosar. sol. s. aut flor. Persicor. vel Acaciar. ad ℥j. plus minus cum Aquâ Scabios. & Fenicnl. bimulo aut trimulo propinari solet. Purgans verò repetendum est ter vel quater, etiam pluries intra mensis spatium, quò sic obstructionum referatio tantò efficacius præstari queat.*

Inter Purgantia ejusmodi sedulò quotidie Alterantia sunt danda, incidendi, aperiendi, resolvendi virtute gaudentia, atque insuper chylicationis actionem promoventia; huc contribuunt *Succi Plantarum antiscorbuticarum*, v. g. *Beccabungæ, Cardamines, Plantag. aquaticæ, Chelidoniæ minor. Nasturtii aquat. Cochlear. Borraginis, Trifolii fibrin. Cherefolii, Fumariæ, Sempervivi, recenter expressi, fil-*
trati,

trati, & ad ʒj. quotidie man. ac vesper. dati, cum tantillo Sacchari. Paratur ex succis iisdem *Syrupus sceletyrbicus*, celeberrimo olim *Scaphusienſium Medico*, Henrico Scretæ, dictus; cujus uncia una vel altera quotidie ſemel aut bis pro ætatis ratione propinatur. Si faſtidiant Pueri talia, ſument forſan *Aquam noſtram antihecticam*, ſatis efficacem, quotidie m. ac vesp. ad ʒʒ. vel cochlearia duo. Subinde pulverem quoque ſequentem, aperiendi atque deobſtruendi vi præſtantem, cum ſucceſſu uſurpatum novimus:

Rʒ. Pulv. radic. Ireos florent. ʒj.
Scrophular. ʒʒ.

Rutæ murar. vel
Adianti nigri, vel
Cymbalar. ʒiʒʒ.

Spodii ex Ebor. ppt.

Ocul. ʒ. ppt. ana. ʒiiij.

Specif. antihect. Poter. ʒj.

ʒis volat. C. C. à fœtore liberati,
vel Fuligin. ʒʒ.

Sacch. roſat. ʒj.

M. F. Pulv. ſubſt. det. ad Scatul. Doſis ʒj. ad ʒʒ. in Pueris duorum, trium pluriumve annorum. Loco huius magno ſæpius cum fructu dedimus *Terram bolarem rubicundam noſtratam*, cum æquali parte Oculor. ʒ ppt. tantillo Semin. Fœniculi, Violar. atque Saccharo cand. albo ad pondus omnium mixta, cujus pulveris doſis ſpatio 24. horarum ad ʒiʒ. aſſurgebat. Æſtivo tempore potus *Thermarum Fabarienſium*, vel *Lactis caprilli* cum incoctione *Florum Bellid. minor.* & *Fumar.* ad duas vel tres hebdomadas quotidie mane conſeſſus egregiè prodeſt.

In Diætâ à dyspeptis, acidis, fumo *Diætâ* induratis, ſaliſis nimium, viſcidis, crudis, Fructibus horæis, à potu acido, vel auſtero, à nimium frigidis &c. abſtinendum. Abdomen à frigore qualicumque benè muniendum. Alvus quotidie reſpondere debet. *Balnea* tandem per Æſtatem *mineralia argillaceo-nitroſa*, plus minùs *ſulphurea*; vel per alia tempora anni in hypocaustis propriarum ædium, conficienda ex *Aquâ fontan. cum incoctione Herbarum emollientium & nervinarum aperientium*, v. g. *Althææ*, *Malvæ*, *Parietariæ*, *Violaræ*, *Betonicæ*, *Scabioſæ*, *Meliſſæ*, *Salv. Chamomillæ*, flor. *Geniſtæ*, *Calendulæ*, *Chamædr.* *Sideritid.* *Primulæ Veris*, &c. maximè conducunt, ſi tenelli ægrotaſtes quotidie per horæ ſpatium iis immittantur. Hâc certè medendi methodo id ſæpè effectum eſt, ut blanda *Diarrhœa*, cum excretionem copioſæ pituitæ viſcidæ Infantes prehenderet, per aliquot dies durans, cum ſubſequentem Tumoris ſenſibili imminutionem, *εὐφορία*, & perfectæ ſanitatis viriumque reſtitutionem.

Qui Tumor Abdominis à Vermibus *Tumor à Vermibus* Intestiſtorum provenit, per anthelminthica Remedia curabitur; quemadmodum ſub Titulo de *Lumbricis* docetur.

ABDOMINIS INTVMESCEN- *Abdominis intumescencia in Adultis* TIA quandoque etiam contingit Adultis, & quidem *Fœminis*, quæ vel gravidae revera ſunt, vel ſe tales eſſe credunt, licèt minimè ſint. Tumor eſt nunc flatulentus, à collectis per Intestina aliaſve Abdominis partes flatibus oriundus, quem etiam in Viris deprehendere licet, interdum brevi tempore durans, inſen-

insensibiliter iterum disprens : nunc aquosus, ab Aquis intra cavum Uteri cumulatis, adeoque Hydrope Vteri incipiente nascens : nunc *tensivus*, à solâ elasticitate membranarum infimi Ventris, per irregulare quoddam sal acido-acriusculum, uterinos vel mesentericos plexus nervosos crispans, atque irritans, subitò ut plurimum auctâ proveniens. Malum, quod sæpè non per diem tantum, sed integras etiam hebdomadas, plures paucioresve, durat, neque molestiam aliquam notabilem procreat, nisi quando nimium distenditur Abdomen, & ita dolorem ejus tensivum excitat. Sic & Molâ in Utero crescens Abdominis quoque Tumori originem præbet. Denique & maximè dolorifica spasmodicaque Abdominis expansio in utroque sexu ab assumpto Veneno contingere solet.

Diagnosis.

Si Tumor est à Flatibus, vel ab assumpto Veneno, tum ferè subitò oritur, atque cum tensivo dolore subinde pectoris quandam anxietatem producit, præprimis si simul alvus constipetur, & menstruorum fluxus supprimatur. Si verò Tumor provenit ab Aquis in Uteri capacitate collectis, tum sensim sine molestiâ considerabili nascitur, atque Urina interim parcius excernitur. A Molâ productus Tumor nunc subitò exoritur, si quædam in nervis uterinis contigerit irritatio, elasticitatem fibrarum augens; nunc paulatim gignitur, idque sæpius cum duritie quadam & intumescentiâ mammæ, mensium itidem suppressione, ut hinc se gravidas esse autument Fœminæ.

Omnis autem Abdominis Intumescencia, etiam quæ alias satis tolerabilis est, neutiquam contemnenda venit, quoniam in Prægnantibus, si negligatur, facilè Abortum gignere, in aliis vel Hydropem Uteri, vel Tympanitem, vel soporosum etiam eumque periculi plenum Morbum, vel Convulsiones deleterias post se trahere valet, præprimis ubi Venenum assumptum sequuta fuerit.

Curationem proin Tumor hic requirit, & eam quidem circumspectam, quod si enim ipsum à Molâ contingere arguas, curam Molæ, sicuti suo loco docetur, institues. Si in Prægnante cognoscas à Flatibus eum provenire, Dietam mox institues, quâ Flatuum proventus arcebitur omnis; & interea medicaminum carminativorum usum diligentem comendabis, quem in finem quotidie bis vel ter exhibere poteris guttas sex, octo, pluresve Olei stillatitii Carvi, Cumini, Fœniculi, Anisi, Cherefolii, Corticum Aurant. &c. cum Aquâ Anisi, Fœniculi, Melissæ, Pulegii, Cardui bened. Cherefolii. Prodest etiam Aqua carminativa Dorncreilii, vel Riverii, vel Aqua physagoga Aug. quotidie ante vel post pastum ad unum vel alterum cochleare assumpta. Essentia carminativa Wedelii, Elixir Vitæ Matthioli, Balsamus Embryonum, Spiritus carminativus atque Sal volatile oleos. Sylv. Spirit. Salis armon. anisat. aut fœniculat. similiter profunt ad cochleare post pastum, vel ad guttas 25. aut plures data. Quin & Liquores spirituosus à Radice Angelicæ, Nasturtio, Apio Macedonico, vel Paludapio, Cortic. Aurantiorum,

Progn.

Curatio
Tumor
Abdominis
Gravidarum
flatulæ

rantiorum, *Seminib. Anisi, Fœniculi &c.* parati, ad cochlearia aliquot pro dosi exhiberi solent. Imò *Vinum Malvaticum*, *Frontiniacum*, *Hispanicum*, *Creticum*, aut simile, ad unciam integram, majorive etiam quantitate quotidie potum flatus discutiet. Absorbentes quoque pulveres ex *Ocul. ꝑpt. Corallis rubr. ppt. ꝑn. diaph. Diaphor. ꝑvial. Ras. Ebor. Semin. Anis. Cubeb. Cinam. &c.* parati, cum vel sine Saccharo ad ʒj. plus minus quotidie cum successe capiuntur, ex vehiculo *Aquarum Menth. Fœnic. Pulegii*, aliussve carminativæ. Extus Abdomen *Oleo Anethi, Absynth. Laurino, Chamomill. è Floribus Soloran.* calidè frequenter ungi, & *Sacculo* quodam è *carminativis herbis atque feminibus* parato calidè regi potest.

Si Tumor Abdominis in Prægnante fuerit productus ab Aquis in Utero juxta Infantem collectis, atque peculiari membranæ inclusis, in formam Hydatidum, tum blandè movenda est alvus, per *Syrupum de Cich. cum Rhabarb. ad ʒij. vel ʒiiss. cum Aquâ Gramin. vel Heder. terrestr. &c.* sumendum, desuper aliquoties hauriendo Jusculum, vel *Infusum fol. Thé. Dein* quotidie Diuretica, ac inter hæc *Tinctura ꝑnii, vel ꝑtis aperitiv. ad 20. guttulas m. ac vesp. cum Decocto leni Rasur. Ligni Sassaphr. Quajac. Radic. Chin. Filic. Vincetoxic. Ononid. Gramin. Sarsaparill. ac Semin. Anis. in Aquâ* parato dari potest. Vel Pulvis aperitivus diureticus concedetur, è *Radic. Liquirit. Ononid. Saxifragiæ, Semin. Dauci, Milii Solis, Petroselini, Anisi, Nasturt. Oculis ꝑpt. Bezoardic. mineral. Diaphoretic.*

ꝑial. Specif. stomach. Poter. Salib. Juniperi, Ononid. Fabar. Absynth. &c. compositus, & cum æquali portione Sacchari permixtus, cujus dosis esse potest ʒj. m. ac v. cum *Infuso Folior. Thé, Summit. & Radic. Virg. aur. vel Decocto Granor. Coffè* sumenda. Hoc modo fit sæpè, ut Hydatides illæ uterinæ rumpantur, & Aquæ profluant, Infante nihilominus in Utero manente vivo, & maturitatem suam adipiscente.

Extra tempus imprægnationis si Aquæ fuerint in Utero collectæ, Hydrops erit uterinus, de quo suo loco. Si verò à Flatibus, etiam subitò, intumuerit Abdomen non prægnantium Fœminarum, aut Virorum; nil melius experti fuimus esse, quàm si *Clysmata statim infudimus emollientia & carminativa*, ac simul exhibuimus *Vinum medicatum alterans & purgans, è Radic. Scrophul. Angelic. Zedoar. Cyperi, Apii, Herbis Centaurii minor. Abs. Abroton. Card. bened. Meliss. Agrimon. Flor. Salv. Calendul. Genist. Semin. Dauc. Fœnic. Aneth. Anis. Bacc Junip. Laur. Fol. Sen. opt. mund. Agaric. trochisc. Rhabarb. elect. Sale Juniper. Absynth. Spicâ. Indic. Cubeb. Cortic. Winteran. &c.* compositum, & singulis diebus mane jejunò stomacho ad tres quatuorve uncias propinatum. Præter hæc & Pulvis acidum destruens atque absorbens, cum Tragemate stomachico mixtus, frequenter ante vel post pastum assumi poterit, v. gr.

R. Specier. aromat. rosat.

diagalang. ana. ʒiiss.

Ocul. ꝑpt.

Tumor Abdominis à flatibus in Fœminis non prægnantibus.

Ra-

Rasur. Ebor. ana. ʒij.

Crystall. alb. ppt.

Flaved. cort. Aurant.

Semin. Anis. ana. ʒj.

Sacch. alb. ʒiij.

M. F. pulv. subt. d. ad Scatul. Dosis ʒj. ad ʒij.

Singulis dosibus simul duo vel tria grana *Auri fulminantis* commiscere magno cum fructu possumus, vel in hujus defectu grana tria vel quatuor *Radic. Mechoacannæ*. Denique ea singula conducunt, quæ superius in *Tumore Abdominis Gravidarum flatulento* commendavimus.

Quæ Abdominis intumescencia in utriusque sexûs Pueris vel Adultis ab assumpto Veneno suam traxit originem, sub Titulo de *Venenis* enucleabitur.

*Abdo-
minis
Tumores
Speciales.*

ABDOMINIS TVMOR SPECIALIS nobis is est, quando non totus Venter infimus, sed ejus tantum major vel minor portio magnitudinem præternaturalem adquisivit. Huc proin referimus *Scirrhus*, *Inflammationes*, *Abscessus*; *Omphalocelen*, *Enterocelen*, *Bubones* in Glandulis Inguinum enascentes, similesque alios Abdominis affectus, de quibus singulis tamen partim suo loco agetur particulariter, partim sub generali *Scirrhorum*, *Inflammationum* &c. titulo tractabitur. Notabile heic est, quod Peritonæum non in Inguinibustantum & Umbilico laxetur aut rumpatur, & sic Herniam producat: sed vidimus illud etiam aliis in locisruptum fuisse, & tumorem peculiarem excitasse; decennium enim excurrit, cum ad octuagenariam Fœminam, Senatoris cujusdam Viduam,

*Hernia
species
extraor-
dinaria.*

Febri continuâ cum Catarrho pneumonico lethali laborantem, vocarer, quæ monstravit mihi Tumorem laxum, cuti concolorem, indolentem, à lumbis sinistris versus Umbilicum, qui ab omni labe immunis conspiciebatur, tendentem, spithamæ propemodum longitudine, & brachii obesioris crassitie eminentem, in cujus cavitate Intestina manifestè decumbentia, murmuraque in iis contingentia deprehendimus. Retulit autem, sibi jam ante quinquaginta annos Tumorem istum verè herniosum in difficili partu obtigisse, neque ullum unquam incommodum se inde percepisse. Nondum quinquennium elabitur, ex quo ad Puerperam quandam, Coriarii nostratis Uxorem vocatus, eam cum Febri continuâ malignâ conflictantem offendi, dum verò in hujus curatione omne studium & operam impendebam, Morbus tandem criticè solvebatur in immanem Abdominis dolorem, quatuor transversis digitis ab Umbilico dextrorsum lævientem; producebatur hinc magis ac magis Inflammatio, asurgebat hæc in grandem Tumorem, atque imposito tandem molliente & suppurante Cataplasmate in Abscessum mutabatur, qui postea apertus exhibebat Ulcus grande, & fundebat copiam puris satis boni ac laudabilis. Dextersum fuit optimè hoc Ulcus, ac tandem feliciter consolidatum; sed remansit nihilominus Tumor, & præsens adhuc est in regione Abdominis prædictâ non longè ab Umbilico, rectè constituto, & magnitudinem dimidii Capitis puerilis exæquat, sine omni dolore, in sese

fefe partem Intestinorum atque Omenti comprehendens, argumento satis probabili, quòd in præterito Abscessu erosa atque aperta fuerit portio quædam Peritonæi. Ejusmodi Herniæ extraordinariæ, quoniam in suo perpetim statu immutatæ manent, neque ullum laborem, molestiam aut periculum post se trahunt, sine remediis relinquuntur, atque etiam aliàs infanabiles existunt. Si tamen incrementum sumere, atque dolores causari molestos inciperent, tum verò convenienti fasciâ vel subligaculo ligari, atque sic in pristino suo statu immutatæ conservari deberent.

Abdominis dolor.
 ABDOMINIS DOLOR est tritis qualiscunque sensatio in regione Abdominis sive externâ sive internâ contingens, Hominemque plus minus excrucians. Dolent subinde ventris istius infimi partes continentæ, dolent frequentius adhuc contentæ, *Ejus Causæ.* Intestina, Mesenterium, &c. Causæ verò talium Dolorum sunt, quæcunque fibrillas membranaceo-nervosas irregulari & acutâ particularum suarum figurâ pungere, rodere, lacerare, tendere, lancinare, scindere, crispare, vel aliò quocunque modo graviter lædere, ac ita motum iis, non secus atque succo, quem continent, spirituoso præternaturalem inducere valent. Tale quid præstant *exteriùs* quidem frigidus nimium aër, aut aliæ res frigidæ, Colicam v. gr. producentes, corpora dura in ventrem delapsa, aut demissa, contundentia, pungentia, lacerantia, &c. *interius* verò humores acres, plus minus acuti, acidi, falsi, corro-

dentes etiam, Tormina Ventris, Mesenterii cruciatus & lancinationes, Inflammationem, Nephralgiam &c. excitantes. Unde *species* Dolorum variæ emergunt, cum vel sine tumore, aut duritie, quæ inter sese tum affectâ parte, tum causâ efficiente, modo affligendi & tempore durationis differre observantur, diversisq; proin nominibus indigitantur. De singulis verò Dolorum talium speciebus hinc inde in Praxi hæc agitur.

ABDOMINIS DVRITIES est *Abdominis durities.* symptoma qualitatis mutatæ, quoscilicet naturalis infimi Ventris mollieties deperditur, & contraria duritieiqua-
 litas inducitur. Quandoque autem totum Abdomen, interdum una tantum vel altera illius Regio dura observatur. Adest subinde simul dolor ac tensio, quandoque etiam intumescencia & inflatio; sicque à variis causis suam originem trahere videtur. *Causæ.* Indurant enim Abdomen *nunc* tenacior Alvi obstructio, à cumulatis induratisque fœcum scybalis, Iliacâ Passione, aliisque causis oriunda; *nunc* Intestinarum canalis spasmodica tensio & contractio, à sale austero acri, nervosas fibras plus minus acriter lancinante, vel à rodentibus etiam Lumbricis proveniens; *nunc* scirrhus Glandularum Mesenterii aliarumque, vel Visceris hujus illiusve infarctus; *nunc* Flatus cellulam unam alteramve Coli, vel singula Intestina & Membranas Abdominis, pertinaciter occupantes atque tendentes, sicut in Colicâ flatulentâ & Tympanitide.

Diagno-
sis.

Neque difficile est caufarum ejusmodi varietatem dignoscere, etenim Alvi constipatio ex solâ Ægrotantis relatione facillè deprehenditur, suoque loco exponitur: spasmodicam crispationem, non secus atque Flatus tendentes prodit ferè dolor plus minus ténfivus, cum inquietudine & anxietate sæpè hominem excrucians, cujus naturam atque curationem sub Titulo *Colicæ spasmodicæ ac flatulentæ* exhibemus. Vermium præsentiam propria signa, de *Lumbricis* suo loco exposita, indicant. Scirrhus denique Glandularum infarctus, sensim *Atrophiam* corporis inducit, de quâ peculiariter alibi agitur. Si unum tantum vel alterum Viscus induratur, tum regio Abdominis, in quâ illud jacet, dura observatur, & si diutius subsistat, maciem paulatinam inducit.

Prognosis

Usque adeo ut omnis Durities Abdominis revera non sit nisi Symptoma aliorum Affectuum morbosorum, neque tamen contemnendum illud, sed quòd de vario eorundem eventu testari potest. Quotidiana enim Praxis docet, scirrhos Hepatis, Lienis, Mesenterii glandularum, Pancreatis, si præsertim inveterati fuerint, lethalem *Atrophiam* post se trahere. In Febribus acutis quoque Medici Infimum solent Ventrem tangere atque considerare, quod si enim, Alvo utcunque liberâ existente, ipsum deprehendunt continuè durum atque tensum, malè statim ominantur de Morbi eventu, eumque ferè semper lethalem experiuntur atque pronunciare audent, quoniam tum materiæ

morbificæ acrimoniam malignam, tum elateris tubulorum membranaceorum, atque humorum circulantium inordinatas sive inæquales renitencias indicant, cum quibus hinc vitalitas Actionum diu subsistere nequit.

ABORTVS, Græcis *Ἀποφθορὰ*, *Ἀμβλωσις*, est Fœtus immaturi, sive vivi sive mortui, ante terminum novimestrem, naturali partui destinatum, plerumque cum anxietatibus & doloribus per sinum Vteri exclusio. Dicitur *Abortus* vel *Aborsus*, quòd non tempestivus sit illius ortus, alias *Partus præternaturalis, intempestivus, illegitimus*, quo Fœtus non tam imperfectus, quàm immaturus, h. e. justam suam magnitudinem nondum adeptus, ex Vtero per sinum pudoris excluditur.

Afficitur autem hic principaliter *Vterus* quoad fibras suas maximè nerveas & membranas. Atque hinc Morbi hujus *Causa proxima* dicitur Fibrarum Vterini fundi tonus nimis autensus & contractus, secundinam cum Fœtu per cervicem Vteri, interea laxiorem redditam, opitulantibus simul musculis Abdominis, extrudens: aut nimis laxatus, Fœtum proin in Vteri claustro retinere impotens. Dein erosio & dilaceratio Secundinæ, atque hinc ejusdem ab Vteri substantiâ separatio, cum Hæmorrhagiâ Vteri, & Fœtus in cervicem delapsu subsequente Abortui portas aperit. Quæ autem ejusmodi causas Abortûs *proximas* in corpore excitant *Causæ antecedentes* plus minus *remotæ*, sunt ferè Pletho-

Abortus

Pars affecta principalis.

Causa proxima

Causæ antecedentes remotæ.

ra, inprimis si cum acrimoniâ sanguinis sit conjuncta, atque vasa uterina ita impleat, ut tandem nimis distenta rumpantur, ac sanguinem copiosè profundant, sicq; spem prolis adimant; Cacoehymia dein biliosa aut falso-acris, Hæmorrhagia Vteri, succus Amnii reliquusque nutritius, vel deficiens vel ineptus, teneritudo & gracilitas corporis nimia, ob quam Vterus sufficientem expansionem non tolerat; Febris acuta plus minus maligna, Deliquia Animi frequentia, copiosus & frequens Alvi fluxus, Hæmorrhagiæ qualescunque nimie, Dysenteria, Colica inprimis biliosa, Pleuritis aut Peripneumonia, Tenesmus, Dysuria, Sanguis in Vasis uterinis grumefactus, corruptus, acrisque redditus; Fœtus à quacunque causâ extincti moles Vteri fibras gravans; Vulnera, Ulcera, Apoplectici insultus; Hydrops, Erysipelas, Inflammatio, Abscessus, Scirrhus, Mola, Cancer Vteri, Sternutatio nimia, Tussis ferina, Vomitus excessivus crebrò recurrens, Vociferatio nimia, Epilepsia, Convulsiones, & si quæ sunt aliæ adhuc in corpore res, fibras Vteri sive maximè laxantes, sive ad exclusionem quocunque graviori modo stimulantes. Ex Causis præcatari-

Causæ præcatari-

æticis culpantur Aër nimis æstuans, vel frigidus, vel fumosus nimium, vel foetidus admodum & graveolens, v. g. extinctæ Lucernæ, liquefacti Sevi, Prægnanti valde adversus, aliæque peregrinæ aut venenatæ qualitate imbutus; usus Ciborum & potuum nimis spirituosorum, aromaticorum, falso-acrium, vel Medicamentorum vo-

latilium, acriū, emmenagogorum potentiorum, Fœtus expulsivorum, purgantiumque vehementiorum creber; Crapula frequens, nimia comessatio; inedia excessiva; Motus corporis nimis vehementes, v. g. in cursu, saltu, equitatione, uestione; oneris gravioris elevationes; brachiorum nimie extensiones; crurum iteratæ atque validæ divaricationes; contusio in Ventre accepta; casus ab alto; lapsus in humum; coitus nimis frequens & libidinosus; ira crebra & vehemens; terror inopinatus & magnus; tristitia pertinax; sonitus vicini admodum graves, tormentorum, bombardarum, aut etiam tonitruum inopinati; Venæsectiones crebriores, cum copiosi sanguinis effusione; Abdominis ligatura, aut constrictio nimia; usus creber Balneorum nimis calidorum, atque sulphureorum fortiorum; potus Thermarum, inprimis Fabariensium, aliarumque aquarum mineralium largior; Clysteres acriores, &c.

Quoad *Diagnosin* Abortus factus *Diagnos.* signis non eget: frequentius oriri solet circa mensem tertium, licet etiam ante & post hoc tempus æquè eveniat. Observavit *Platerus*, notârunt alii, & ego quoque vidi Partum quinque aut sex circiter à conceptu hebdomadis sub formâ alicujus globuli rejectum, in quo rudimenta partium, styli ope non nihil divulsarum, satis manifestè discernere licuit. Grandiores autem Fœtus, digiti, spithamæ, majoremque longitudinem exæquant, adeoque trimestres, pluriumve mensium, crebrius Abortu rejiciuntur. Seximestrem par-

tum masculum tridui spatio viventem, à Prægnante dysentericâ reiectum ex sacro fonte Ann. 1701. levavimus. Quòd si fortè duo pluresve Fœtus ante legitimum tempus reji-
 ciantur, & unus quidem altero duplo grandior sit; vel si unâ demum alterave hebdomadâ post priorem Fœtum, alius minor & immaturus excludatur, Abortus talis erit, quem Medici plures hæcenus. *Superfætationem* nuncupant; licèt an talis revera detur, adhuc sub iudice lis sit, nihil obstantibus variis apud *Platerum* in *Praxi* adnotatis exemplis. *Abortus* à *Molâ* differt, cum hæc moles sit carnea, fibrosa, membranacea, informis, vel utriculosa, non vivens, feri plena, Abortus verò sit Fœtus quoad sua membra cognoscibilis, vivens. *Imminere* Abortum, licèt non semper hinc subsequatur, significant præcedentia symptomata gravia, Fœtum extrudere apta, quemadmodum existunt horror aut rigor corporis inopinatus, cum subsequenti Febri acutâ, Lumborum dolor, Pleuritis, gravis Diarrhæa, Dysenteria cum tenesmo, Colica, Animi deliquia, Palpitatio Cordis, Terror subitaneus, Mœror continuus, Dolor gravativus supra pubem, sensatio ponderis in Inguinibus, Tenesmus tam Alvi quàm Vteri, Hæmorrhagia qualiscunque nimia, Fluxus mensium aut ichoris uterini acrioris nimius, vel subitaneus quoque non cessans, unde circa nonum diem Abortus plerumque sequitur, minor Veneris appetitus, frigus partium genitalium, color naturalis Faciei mutatus, Mammarum subitanea detumescen-

Signa
immi-
nentis
Abortus

tia, aut copiosi Lactis ex iisdem pro-
 fluxus, frequens abortiendi consuetudo, lassitudo corporis nimia. Indicia autem *instantis* jam Abortus sunt ventris superioris coarctatio, & hypogastrii elevatio, lumborum, coxarumque gravitas, atque dolor antrorsum versus pubem tendens, extremorum crebrum frigus, & parturiendi frequens nixus, ubi post varia tormina & dolorosos conatus primò effluit aqua saniosa, post cruenta magis, sequente tandem sanguine puro ex parte grumoso; denique Fœtus ipse, majoribus minoribusve grumis sanguinis, subinde si minor sit, involutus excluditur. Quandoque etiam ex improvviso sine præcedaneis signis Abortus contingit.

Sig
instan
Abort

Si *Prognosin* spectes, Abortus plerumque gravius affligit, quàm Partus naturalis & hinc sæpè Parturientem in magnum discrimen conjicit, Hæmorrhagias largas, Syncopen, Convulsiones, Febrim continuam, Deliria post se trahendo. Lethalis utplurimum, si Pleuritidi, Peripneumoniæ, Febri malignæ, Dysentericæ, & similibus morbis gravioribus superaccedit. Interdum etiam propter vasorum & fibrarum uterinarum violentam dilacerationem, causa existit Sterilitatis, Inflammationis, Erysipelatis, Cicatricum, Ulcerumque uterinorum, præsertim si grandiore jam existente Fœtu prægnans abortiatur, ubi talis Fœtus non nisi cum violentiâ quadam, ceu Pomum immaturum decerpitur.

Progn

Curatio Abortus non nisi præservatoria datur, hinc in *Dietâ* quidem

Curati

ad

ad eum præcavendum, Gravidis jam existentibus Fœminis, commendamus æerem temperatum, ab omnibus ingratiss ac fœtidis odoribus immunem; *Cibos* præscribimus *eupeptos*, cuicunque temperiei convenientes; inprimis leniter *adstrictivos*, prout sunt *Cydonia*, *Corna*, *Pyra*, *Baccæ Cynosbatos*, *Myrtilli*, *Amygdalæ dulces* recenter excorticate, *Pineæ nuces*, *Pistacia*, &c. *Damnianus* autem nimis *salita*, *fumo indurata*, *salsa*, & *aromatica*, excessivâ quantitate sumta. Conducunt *Somnus placidus*, *Animus tranquillus*, *corporis quies* vel *blandior motus*; omnes verò corporis agitationes vehementiores, saltationes, pandiculationes nimix, crurum divaricationes, *Rhedæ-vectiones*, ventris constrictiones atque compressiones arctæ, equitationes vehementes, ponderum denique graviorum elevationes sunt fugiendæ. Sed & sternutationes crebræ ac validæ, *Colicæ*, *Dysuriæ*, *Stranguriæ*, *Diarrhœæ* nimix, *Tusses* vehementes admodum, *Vomitus* graviores & crebriores, *Convulsiones*, similiaque mala, si fortè his *Prægnans* infestata fuerit promptè sunt curanda. Quando *Plethora* adest, vel sanguis oleoso-acris atque bilioso-falsus, tum *bis* vel *ter Venæsectionem* imprægnationis tempore ordinabis, quarto nimirum, sexto vel septimo & octavo mense. Imò novimus, quæ singulis mensibus ingravidationis *Venæsectione* opus habuit ad *Abortum* præcavendum. Si primæ viæ falsis cruditatibus scatant, vel *Clysmate* uno & altero emolliente atque detergente, vel leni purgante ex *Syrupis laxanti-*

bus, aut ex *Rhabarbaro* in substantia, ejusve *Infuso* veniunt eluendæ: v. g.

R̄. Syrup. flor. Persicor. ʒijß.

Aqu. Borrag. ʒj.

M. F. Potio d. ad. V. pro dosi.

Vel R̄. Syrup. de Cichor. cum

Rhabarb. ʒijß.

Aq. Fumar. ʒiß.

Bals. Embryon. ʒj.

M. D. ad V. pro dosi.

Vel R̄. Rhab. el. ʒj.

Crem. Fri ʒß.

Misc. F. pulv. subt. d. pro dosi.

Postea autem absorbentia, & edulcorantia in usum trahenda sunt, v. gr. sub formâ *Pulverum*, præparandorum ex *Ebore*, *Coralliis*, *Unicornu fossili*, *diaphoretico ʒiali*, *Conchis præparatis*, *Granis Kermes*, *Mastiche*, *Thure*, *Specieb. diamarg. frigid.* *Ossibus Dactylor.* *Margarit. ppt.* *Matre Perlarum ppt.* *Ossibus dactylor.* *Semine Plantag.* *Coriandr. ppt.* *Radice Tormentillæ*, *Oculis Cancror.* & *similibus*: v. g.

R̄. Ocul. ʒ. ppt.

Corall. rubr. ppt. aa. ʒij.

Matr. Perl. ppt.

Terr. sigill.

Nucis moschat. ana. ʒj.

Sacch. alb. ʒvj.

M. F. pulv. subt. d. ad scatul.

Dosis m. ac. v. ʒß. cum *Vino rubro adstring.* aut *Ovo sorbili*, aut *Pulte farinaceâ*.

Vel R̄. Unicorn. foss.

Diaph. martial.

Spod. ppt. ana. ʒj.

Rad. Tormentill. ʒß.

Nuc. moschat.

Pulv. Ros. rub. ana. ʒj.
Sacch. alb. ʒʒ.

M. F. p. s. d. ad Scatul. Dosis ut supra. Ejusmodi pulveres etiam cum Conservâ Rosarum rubrarum, flor. Tunic. Borrag. Salv. Confect. Hyac. Conditurâ carnis Cydon. Baccar. Cynosb. in formam Electuarii redacti, usurpantur quotidie ad ʒij. vel ʒiij. Vel si forma liquida magis arridet, Tinctura Antimonii, Corallorum, cum Essentia Myrrhæ, Plantaginis, Graminis Parnassii, Tinctura item antiphthysic. Essentia Catechu præscribi possunt. v. g.

R̃. Tinctur. Antim.

Corall. ana. ʒʒ.

Balsam. Embr. ʒj.

M. d. ad V. Dos. 40. gutt.

m. ac v. cum Aq. Meliss.

Vel R̃. Tinct. Hyperic. ʒj.

Essent. Myrrh. ʒij.

Catech. ʒj.

M. d. ad v. Dos. 20. gutt.

Horum remediorum usui diu satis est insistendum, donec Gravida ab omni abortiendi metu libera existat.

*In caco-
chymia
pituitoso
salsâ.*

Si Caco-chymia pituitoso-salsa & acris in culpa fuerit, suadebis Tragemata ex Aromatibus, imprimis autem cum Nuce mochatâ, Macere, Radicib. Bistortæ, Caryophyllatæ, Conchis præparatis, Sanguine Draconis vero, Lapide Hæmatite ppt. Unicornu fossili, Floribus Anthos, atque Saccharo. Vel usurpabis subinde Vinum Malvat. Hispanic. Frontiniac. Hungar. &c. Vel Balsamum Embryonum, aut Aquam vitæ Matthioli, ad cochleare unum alterumve; aut Sal volatile oleosum ad gutt. 15. dabis cum Syrupo Corallorum, de

Nymphæâ. Profunt & Electuaria, Morsuli, vel Rotulæ à Conservis Rosarum rubrarum, Conditurâ Cydoniorum atque Nucistæ, Confect. Alkerm. vel Hyacinth. incompl. Matre Perl. ppt. Bolo Armenate, C. C. ust. & similibus, quibus partim Sanguinis dyscrasia corrigitur, partim tubuli fibræque Vteri laxæ firmiores redduntur. v. g.

R̃. Spec. diatr. sant. ʒijʒ.

Nuc. mosch. ʒiijj.

Amygd. dulc. rec. exc. ʒʒ.

Conserv. Ros. rubr. ʒiij.

Conf. Hyacinth. inc. ʒjʒ.

Bol. Armen. ppt.

Corall. rubr. ppt. ana. ʒij.

Condit. Cydon. ʒijʒ.

Sacch. Aq. Borrag. solut. ʒiv.

M. F. l. a. Morsuli, d. ad scatul. de quibus subinde unus mandi potest.

R̃. C. C. ust. ppt.

Matr. Perl. ppt.

Diaph. martial. vel Jovial. ana. ʒiʒ.

Confect. Hyacinth. inc. ʒj.

Cubebæ.

Maceris ana. ʒij.

Sacch. Aq. Cinam. sol. ʒiij.

M. F. l. a. Rot. d. ad scatul. subinde lambantur aliquot.

R̃. Conserv. Ros. rubr.

Bugloss. ana. ʒvj.

Nucis Indic. condit. ʒiijj.

Cond. Cort. Citr. ʒij.

Confect. Alk. inc. ʒj.

Terr. Sigill.

Unicorn. foss. ana. ʒjʒ.

Syrup. flor. Tunic. q. s.

M. F. Electuarius d. ad Oll. Subinde Nucistæ magnitudo capiatur.

Hiscæ aut similibus, imminente
jam

jam Abortu, adjungemus simul *Anodyna*, ex *papaverinis* vel *opiatis* composita, atque externè *Lumbis* & *Pubi* *Unguentum Comitissæ*, vel aliud adstringens inungemus. In hunc finem quadrant etiam *Olea omphacinum, myrtinum mastichinum, Cydoniorum, Nucistæ express. Anethi, Absynth.* Quibus pro lubitu admisceri ad componendum Vnguentum possunt *succus Aciæ* vel *Hypocistidis, Bdellium aceto dissolut*; *Pulveres* itidem *Santal. rubr. Bol. Armen. ppt. Sanguin. Draconis, Olibani, Mastichis, Nuc. Cupress. Capul. Glandium, Flor. Rosar rubr. Balaust. Cortic. Granator. Seminum Sumach. Myrtillor. Radicum Bistort. Tormentill. Cyper. Coagulum Hædi vel Leporis. Si Ceram, Picem, Terebinth. permiscueris, formabis inde Emplastrum optimum, quale, non secus atque Emplastrum contra Rupturam, vel de Crustâ Panis cum Nuc mosch. Colophon. Macere, Thure, Succino, Myrrhâ, Mastiche, Tacamahaca mistum, ac Alutæ superextensum Lumbis atque Regioni pubis cum fructu applicare licet.*

Extra tempus graviditatis in biliosis & sanguineis inprimis proficuum judicamus *Acidularum* debito tempore institutum usum, non sine Diætæ convenientis observatione. Si magis arrideat *Serum Lactis caprilli*, concedi & id poterit. Pro secreto æstimamus potum aquæ Solani communis destillatæ, si ante tempus imprægnationis, vel etiam sub medium gestationis tempus, de eâ per integrum mensem mane ac v. quatuor uncia cum tantillo *Conserve Rosarum* hauriantur.

Pituitosæ autem *Fœminæ* extra imprægnationis tempus vel Potum *Coffeè* frequentissimè bibant, vel de *Sale volatili oleoso* quodam per plures septimanas quotidie mane ac v. 20. ad 30. guttulas cum liquore convenienti capiant. Conducunt his quoque *Balnea* vel *Thermæ sulphuræ*, item *Pilulæ hydropicæ Bontii*, sæpius exhibitæ ad feri quantitatem minuendam. Verno autem & autumnali tempore, nisi prægnantes fuerint, sequens *Vinum medicatum* bibere possunt.

℞. *Radic. Caryophyllat.*

Apii.

Calam. aromat. ana. ʒiij.

Herb. Meliss.

Agrim.

Plantag.

Hepatic. nob. ana. M. j.

Summitat. Centaurii. min. M. ʒ.

Semin. Fœnicul. ʒij.

Bacc. Junip. ʒiʒ.

Cort. Winteran.

Cubebæ. aa. ʒij.

Fol. Sen. s. slip. ʒiʒ.

Rhab. el. ʒʒ.

Salis Cichor. ʒj.

Incis. & contus. insæ nodulo ex Sindone rubr. affunde Vini albi veteris ʒbiiij. Aq. font. ʒbiiij. Hinc quotidie mane Cyathus exhauriatur.

Scorbutico-Cacochymicæ Fœminæ, dum gravidæ non sunt, remedia usurpabunt, & curam instituent talem, qualis quidem apta est ad Intemperiem ejusmodi destruendam, melioremque Sanguini diathesin conciliandam; quemadmodum sub Titulo de *Scorbuto* docetur.

In scorbutico-cacochymicis.

Quòd

In præ-
senti
Men-
sum flu-
xū.

Quòd si præsens sit fluxus Men-
sum, vel Hæmorrhagia Vteri, inde-
que Abortus metuendus veniat, *Venæ-*
sectio statim in brachio instituetur; ad
quietem plurium dierum Prægnans
quoque commonefiet, & sequentia
præscribentur.

Rx. *Conserv. Ros. rubr.* ʒiʒ.
Cond. Cynosb.
Nuc. indic. cond. aa. ʒj.
Lapid. Hæmatit. ppt.
Boli Armen. ppt.
Sang. Dracon. ver. ana. ʒij.
Terr. Catech. ʒʒ.
Syrup. myrtin. q. s.

M. F. *Elect. d. ad. Oll.* Capiatur dosi
Nucistæ singulis trihoriis. *Emulsio A-*
mygd. dulcium etiam propinetur. *Un-*
guentum Comitissæ cum Pulvere radic.
Tormentill. & *Terræ Catechu* lumbis
applicabitur. A Vini usu, à Cibus salsis,
aromaticis, Terrore, Irâ Prægnans sibi
temperabit.

In debi-
litate
tono, mi-
nutoque
elatero
Fibra-
rum Vte-
ri.

Ad firmandum tonum atque ro-
borandum elaterem fibrarum Vteri
nimis tenerarum ac laxarum, internè
quidem conducit *Essentia Betonic.* *Lig-*
norum, Succini, Bistortæ, Virgæ aureæ,
Salviæ, foliorum teneriorum Quercus,
quotidie bis ad ʒj. vel ʒʒ. cum vehi-
culo convenienti sumta. Vel capietur
Tragema, paratum ex *Speciebus dianth.*
Diatr. Santal. Diamargarit. frigid. Ra-
sur. Ebor. Unicorn. fossil. Terrâ sigill.
Nuce mosch. Floribus Ros. rubr. Salviæ,
Lilior. convall. Betonic. Anth. Granis
Kermes, Seminib. Plantag. Aquileg
Anis. Radicib. Galang. Cyper. Calam.
aromat. Bistort. Tormentill. & similibus,
cum sufficiente quantitate Sacchari in

formam subtilis pulveris mistis. Pos-
sunt ex iisdem pulveribus cum *Con-*
serv. Ros. rubr. flor. Tunic. Anth. Bor-
rag. Conf. Alkerm. Conditur. Cydon.
Cornor. Cynosb. Nucis Indic. Syrup.
de Stæchade, vel de Betonic. Electuaria
quoque parari, & quotidie ad ʒij. plu-
resve dari. *Nuces Pineæ, Amygdalæ*
dulc. rec. excort. quotidie cum tantillo
Mellis ad ʒʒ. comestæ, Gravidis ma-
ximè etiam profunt. Non gravidæ
in eundem finem *Thermarum sulphu-*
reo - aluminoso - alkalinarum balneum
æstivo tempore usurpabunt. Quæ
de *Lapidis Aetitis* gestatione sub axillâ
sinistrâ, vel *Lapidum Jaspidis, Samii,*
Lazuli, Turcici, Sapphiri, &c. utili su-
sensione ex collo traduntur, supersti-
tionem sapiunt. Melius fortè juva-
bit gestatio *Radicum Bistortæ, Tormen-*
till. Plantag. Flor. Balaustior. Nymphææ,
ac similium sub Axillis.

ABSCESSVS, APOSTEMA, Ab- sus.

Ἀπόστημα, est tumor minus durus,
cujuscunque partis, ab humoris sta-
gnantis extravasati, & sensim in pus
abeuntis coacervatione oriundus, cum
dolore pulsante, ardore, subinde
etiam rubore conjunctus.

Subjectum est pars quælibet cor- Ej-
sub-
du-
poris mollior, tam interna, quam ex-
terna, in singulis enim Apostemata gi-
gni posse experientia Practicorum
quotidiana docet.

Causa proxima ut plurimum est Causa
prox
Inflammatiô quædam præcedens, si-
ve humor lymphatico-sanguineus in
Partis affectæ tubulis sive poris sta-
gnans, eosque vel mole distendendo,
vel acrimoniâ erodendo rumpens,
licque

ficque extravasando & confluendo partem in p. n. magnitudinem attollens. Humor verò ipse pro diversâ particularum suarum figurâ & crassi, vel in pus sincerum, albicans, crassiusculum, æquale & inodorum, per accedentem quendam motum putrefactionis intestinum convertitur, si nimirum plures particulae sanguineae, si-ve balsamico-chylosae adfuerint: vel in saniem plus minus aquosam, cruentam, lividam, flavescentem, aliufve coloris mutatur, sicubi plura pauciorave salia acido-acria corrosiva, aqueo humore diluta, sulphureisque particulis solutis juncta præstò sint. Quandoque & pili, carbones, ovorum testæ officula, amurcæ, Vermes, Lacertæ, Ranæ, similiave in Abscessibus ab incantatione quâdam productis, reperi-
ta fuerunt. Subinde etiam humor extravasatus in quodam folliculo continetur, & vel *Meliceridem*, vel *Atheroma*, vel *Steatoma* constituit. Verùm hi Tumores, tanquam morbi ab ipsis Abscessibus diversi, suis quique in locis expenduntur.

Causa
antece-
dens
propior.

Remo-
tior.

Antecedens causa propior est coagulum salino-acidum in circulantibus humoribus collectum, horumque crassin & consistentiam ita inspissans, ut postmodum in his, illisve partium tubulis, fortè angustatis, obhæreant, sicque causam Abscessuum *proximam* exhibeant. *Remotior* est Chylus acido-viscido caractere in primis viis notatus. Huc refer hæreditariam dispositionem, quando Parentes fortè Cachexiâ, Scorbuto, Lue venereâ, Phthificâ diathesi, aliisque gravioribus Morbis

antea laborarunt; Crises itidem imperfectas, sinistras ægritudinum curationes, & similia. Inter causas *externas* & *procatarticas*, vel *occasionales* recensemus ante omnia contusiones, ictus, lapsus, casus ab alto, compressiones, pandiculationes nimias, adspersiones aquæ frigidae ad Corpus æstians. Deinceps verò huc contribuunt *Aër* frigido-humidus, qui reperiussâ transpiratione insensibili, & factâ constrictione vasorum aut fibrillarum in hac aut illa parte stagnationem prædispositi humoris producit. Unde etiam Infantibus aut Pueris tenerioribus, salinum plus justo sanguinem circumgestantibus, sicubi frequenter atque diu in aëre frigido obambulent, Abscessus crebriores contingunt. *Cibus* & *Potus*, salino-acidum coagulum exhibentes; *Vita* sedentaria; *Somnus* protractus, non secus, atque *Tristitia*, vel *Mœror* frequens, animumque angens suam quoq; symbolâ conferunt.

Causa
proca-
tartica,
externa
& occa-
sionales.

Abscessus hinc vel *symptomaticus* existit, per se absque præcedente morbo ex suis causis ortus; vel *criticus*, qui oritur à materiæ morbificæ in quadam partem vel glandulam præcipitatae coacervatione: quale quid observare inprimis licet in Febris continuis & malignis, in Odontalgia, similibusque aliis Affectibus.

Abscessus
sym-
ptomati-
cus, cri-
ticus.

Signa *fientis* Abscessus sunt dolor præprimis pulsatorius, calor atque ardor cum rubedine, sicubi stagnatio fuerit in cute externâ, & Febricula continua præsens. Quando autem profundius sub musculis latitat, etiam color cutis manet inmutatus, Febrisque tum

Diagne-
sis.

fortè major, dolorque varius terebrans, modò mitior, modò gravior sine ardore, rubore aut tumore extus apparente existit. Signa Apostematis jam facti, purisque maturati sunt, quando dolor pullatorius atque tensivus cum ardore & Febre plus minusve remittit: quando Tumor fastigiatus, major, atque mollis est redditus, quando in summitate ejus jam macula albicans apparet: quando sub digitis ultro citroque Tumorem adigentibus vel trudentibus fluctuatio materiæ in ipso percipitur. Unde apparet, ple-
 rorumque Abscessuum principium esse Tumorem inflammatorium.

Prognosis

Abscessus criticus cum euphoriam ægri contingens, & materiam morbificam è circulante massa omnem eliciens, salutaris est. Si verò sanguinem non depuret, neque symptomata vehementiora mitiget, deleterius audit, vel longitudinem morbi significat, Hipp. 4. Aphor. 51. Abscessus externi, in partibus cutaneis præsertim, minus periculi portendunt, modò sincerum pus minimè corrosivum stillent. Si autem saniem contineant magis liquidam & corrosivam, tum in sinuosa Ulcera, Fistulasque plus minus curabiles facile abeunt, idque tanto magis, ubi corpus simul est cacochymicum. Interni Abscessus multi immedicabiles sunt, & Hæticam post se trahunt. Ab acrimoniâ puris quandoque præter fibrillarum erosionem simul Ossa corrumpuntur, & Cariem adquirunt. Abscessus apertio quo diutius protrahitur eo pejus est, quoniam pus intus reclusum cuniculos

agendo facile Febres hæticas, Fistulas, Cariem ossium, aut etiam Gangrænam inducit.

Curatio hujus Morbi absolvitur Diætâ convenienti, Abscessus maturatione, puris maturi citâ per Apostematis apertionem extractione, Ulcerisque ex Abscessu enati deterfione, atque consolidatione. In Diætâ vite-
 tur Aër sive nimis calidus, sive nimis frigidus. Cibus sit eupeptus, ab omnibus excedentibus qualitatibus liber. Vini loco præscribatur Decoctum vel Lignorum, vel C. C. usti cum Agrimoniâ, Sâniculâ, Jujubis, atque Passulis majoribus. Infusum foliorum Thee, Betonicæ, ac aliarum Plantarum traumatico - alcalinarum simul proderit. Omnia saccharata nimis, sicut & acida nocent, Motus corporis excessivus, Vigiliæ immoderatae, Quies corporis diuturna, Animi que perturbationes intempestivæ, curationem impediunt.

Pro Abscessus maturatione Cataplasmata adhibentur anodyno-emollientia, v. g. seqq.

R̄. Farin. Rad. Alth.

Sem. Tritic. vel Lin. aa. ℥iij.

Croci. 3℔.

Mellis. ℥ij.

Cepar. numer. ij.

M. & cum s. q. Lactis calentis f.

Cataplasma, calidè bis quotidie imponendum. Vel

R̄. Micar. Pan. M. j.

Ficuum tenuiss. incisor. num. iij.

Croci pulveris. 3j.

Florum Chamom. pulveris. 3℔.

Lact. Vaccin. vel Caprill. q. s.

M. F. Cataplasma vel excrementum bubu-

Curati

Diætâ

Chirurgia.

Phar-
macia.

bubulum recens cum farinâ applicetur.
Vel *Empl. diachyl. cum Gumm. Dia-*
chyl. simpl. Stictic. Croll. aut simile, ma-
laxatum *Oleo Cerae vel Ovorum* usur-
petur. *Interne* detur sequens ad ma-
turationem *diaphoreticum*:

℞. *Aq. Card. Bened.*

Scabios. aa. ʒj.

Roob Sambuci vel Junip. ʒʒ.

Antimon. diaph. vel C. C. phil.
pp. ʒj.

M. Detur ad Vitrum. Sumatur *m.*
ac vesp. per aliquot dies, usque ad
Abscessûs maturationem & Febris im-
minutionem. Ad corrigendam insu-
per & edulcorandam Massam sanguin.
& sic perfectè sanandum tandem Ab-
scessum, indeque natum Vlcus, Deco-
ctum aliquod traumaticum, quale
apud Vulnera & Vlcera invenitur de-
scriptum, prodest. Vel ejus loco Es-
sentiam *Veronic. Bellid. min. Numular.*
Sanicul. Graminis Parnass. Virgæ aureæ,
aliusve Plantæ vulnerariæ, *m.* ac vesp.
ad 25. aut 30. guttas sumendam, pro-
pinare licet. Conducunt etiam Pul-
veres diaphoretici, parati ex *Antimon.*
diaphoret. Dente aprin. ppt. Ocul. ʒ.
ppt. Corall. rubr. ppt. Bol. Arm. ppt.
C. C. phil. ppt. Bezoard. Jovial. Spod.
ex Ebor. ppt. Unicorn. foss. ac simil. ad
ʒʒ. quotidie bis exhibiti. Si Pilularum
forma magis arrideat, tum sequentes
concedi possunt:

℞. *Extract. Veronic.*

Numular.

Virg. aureæ.

Flor. Tussilag.

Bell. min. ana, ʒj.

Diaphor. ʒvial.

Corall. rubr. ppt. ana. ʒij.

Cum Essentiâ Myrrh. vel trauma-
ticâ qualicunque f. l. a. Pilulæ numer.
300. Conspersæ pulvere Liquiritiæ den-
tur ad scatulam. Dosis num. 10. ad 15.
m. ac vesperi cum vehiculo convenienti.

Quando hinc vel sponte ruptus
vel lanceolâ cauteriove potentiali
apertus est Abscessus, tum extus qui-
dem *Cura Ulceris*, de quâ suo loco,
adhibenda est, intus verò in usu modò
laudatorum internorum pergere ad-
huc aliquandiu possumus, sed jungere
tamen subinde *Essentiam Lignorum*, ac
intermiscere etiam oportet lenia pur-
gantia, v. g. ex *Infus. Rhabarb. Syrup.*
Rosar. sol. compos. aut de Cichor. cum
Rhabarb. Terebinthinâ clarâ Vitello Ovi
solutâ, atque dosi ʒij. in Adultis, cum
Syrup. flor. Persic. aliove propinata;
v. gr.

℞. *Terebinth. clar. vitello*
ovi solut. ʒij.

Syrup. de Cich. cum Rhab. ʒj.

Aqu. Cinam. cum Vin. dest. ʒj.

Plantag. vel Ulmar. q. s.

M. F. potiuncula, detur ad Vitrum. &
propinetur una dosi.

Postea vel Pulveres aut Pilulæ prædi-
ctæ, vel seqq. Mixtura præscribetur:

℞. *Aqu. Ulmar. Veronic. ana. ʒiiij.*

Syrup. Capillor. ʒr. ʒij.

Essentiæ traumat. nostr. ʒʒ.

M. d. ad Vitrum. Singulis quadrihoriis
duo vel tria cochlearia capiantur.

Pro Potu ordinario loco Vini præ-
scribendum & usurpandum venit
seqq. Decoctum.

℞. *Radic. Caryophyllat. Filic. aa. ℥℔.*
Sarsaparill. ℥vi.
Rasur. Lign. Sassafr. ℥ij.
C. C. Ust. ℥℔.

Incisa & cont. d. ad Ch. De hac materiâ cochleare plenum semper coquatur in Mensuris duabus Aquæ fontanæ ad ovi duritiem. Colatura exhibeatur ordinariè bibenda.

*Abstemi-
etias.
quid?*

ABSTEMIETAS est naturalis aversatio Vini, quâ Homines inde ab ortu & nativitate saporem potumque Vini horrent, illudque sine maximo incommodo, & subsequenti-
bus molestis symptomatibus bibere nesciunt. *Abstemii* hinc vocantur ab abstinendo.

Affectio est non adeo infrequens, quâ ut plurimum cum Vino etiam similes alios liquores, v. g. *Acetum, succos spirituofo-acidos*, imò *spiritum Vini* aliosque arduentes liquores horrent. Sunt & inter hos, qui nec *Cerevisiam* bibere nòrunt, imò etiam à *Musto vinaceo* abstinere. Reperies dein alios, qui *Vinum* quidem averfantur, sed tamen *Cerevisiam, Mustum, Liqueoresque spirituofo-ardentes* assumere possunt. Huc refere licet & illos homines, qui peculiari aliquo fastidio sive *Idiosyncrasiâ Lac vel Butyrum, Caseum, Pisces, Cucumeres, Cucurbitas, Cepas, Allium*, aliave edulia averfantur, ita ut inter hos existant, qui etiam ad tales res tantum nominatas & auditas in Animi deliquia, vel Motus convulsivos incidunt. Taceo eos, qui nec visum ejusmodi Ciborum ferre nòrunt, instar illorum, quibus & odor, & aspectus Catorum ita adversus est, ut inde in *Lipothymiam* facile inci-

dant, nisi animal procul amoveatur. Si *Causas* hujus phænomeni inquiremus, vix aliunde illas melius derivare poterimus, quàm à peculiari quadam texturâ fibrarum nervosarum, per Linguam aut Nares disperfarum, quæ à viciniâ, vel exhalantibus particulis rerum supra nominatarum ita statim afficiuntur, ut vel elasticitas illarum sufflaminetur, ac inde spirituum animalium motus atque influxus immi-
nuatur aut prohibeatur, vel dicta elasticitas & vibrativus motus oscillatarius impetuosior reddatur, sicque occasio nunc *Lipothymiis*, nunc *spasmodicis partium motibus* præbeatur. Quin & textura, vel crasis spirituum animalium subinde in talibus casibus culpâ minimè vacat, dum illi quoque nunc per Auditûs, nunc per Visûs organum ad similia pathemata incitantur. Hinc peculiarem istam sive Spirituum facile irritabilium, sive fibrillarum nervosarum dispositionem, proprio *Idiosyncrasiæ* nomine exprimere Docti voluerunt; nec ita malè, quoniam ejusmodi constitutio minimè communis est, sed nonnullis tantum hominibus propria. Retulit nobis Vir egregius, qui ad senectutem usque mansit *Abstemi-
us*, se ex unius tantum guttulæ Vini degustatione igneum velut ardorem in Linguâ percepisse. Alii perhibent, inde suas valdè exasperari, vel etiam stupefieri Linguas.

Quamquam autem Oeconomia corporis humani sub tali *Idiosyncrasiâ* benè habere, sanaque existere queat, quoniam tamen Homines illâ laborantes subinde facilius quàm alii in Morbos

*Causa
ejus.*

*Idiosyn-
crasia.*

*Ad m-
bos di-
sponit.*

Morbos incidere solent, hinc etiam plures illorum sibi vellent remedia exhiberi, quorum ope ab illâ dispositione peculiari, sive ex parte sive ex toto liberari possent.

facilis tu. Sed hoc opus hic labor, naturalem velle corrigere vel invertere dispositionem, quicquid enim tentatur, vix ac ne vix quidem ullum præstare effectum solet. Attamen faciendum periculum, eoque adnitendum, ut natura sensim assuefiat, quod obtinetur interdum, si tantilla primum granula ciborum, vel paucas solum guttulas liquoris adversi exhibeas, ac eas dein quotidie augeas, donec assuefacti nervosis fibrillis, ipsisque animalibus Spiritibus res postliminiò tales facilius tolerari queant. Ita novimus Medicum olim Scaphusiensem maximè celebrem, ab ineunte-abstemium, tandem sensim Vini potui egregiè adfuevisse.

Quòd si verò usque adeo adversa sint ejusmodi objecta, ut etiam ad levissimum eorum occursum Homines in symptomata maxima, imò morbos conjiciant, tum adfuefactio talis sine discrimine tentari nequit, nisi ex uno levissimo incommodo deleterium morbum excitare velis.

achores &c ACHORES, FAVI, CRUSTA LACTEA, LACTVMEN, SAHAFATI, *Α' χαγες*, sunt Pustulæ vel Vlcuscula crustosa, in Capitibus Infantum efflorescentia, ichoroso salinum, plus minus glutinosum & acrem humorem è porulis cutaneis fundentia. Hinc & *Ulceræ manantia*, vel *ulcerosa Tubercula capitis* vocantur. Aliis quo-

que *Scabies crustosa & aspera Puerorum* audit.

Afficitur hic maximè *Cutis Capitis capillata*, subinde & *Facies* ipsa, in quarum partium glandulis ac tubulis excretoriis causa morbifica deponitur, cumlatur, atque glutinositate suâ obhærescit.

Pars affecta.

Proximè Malum hoc producitur à sero Laticis arteriosi glutinoso acri acido-salfo, ad glandulas porosque cutis Capitis præcipitato, quod cum propter particularum suarum crassitiem subsistat (dum nec circulatorio motu ultra progredi, neque transpirare, nec etiam ob acorem præternaturalem in substantiam Cutis faceffere potest) inibi morâ coacervatum, primò quidem tubercula pruriginosa, hinc acrius redditum corodendo cutim multis foraminibus angustis ad calvariam ferè perforat, atque sic Vlcuscula manantia & crustosa producit, è quibus humor effluens nunc salino-aquosus ac limpidus, nunc flavus, crassus & glutinosus mellis instar existit, unde *Favorum* nomen est exortum. Si Cuticula hinc inde erodatur, atque frustillatim abscedat, tum squamulæ lacteo-crustosæ ex affluente succo producantur. Suggestit tale serum Chylus crudus acido-pituitosus, propter stomachi Liquorem nimis falsum, assumptorum Ciborum particulas salinas valdè exaltans; idque tanto magis, quando simul Alimenta salita Infantibus maturè admodum exhibentur, aut talia à Nutricibus copiosè comeduntur, indeque Lac facile acescens, mucosum & acriusculum sugendum præ-

Causa proxima

Antecedens.

præbetur, quod ubi mali causa evasit, *Crustæ lacteæ* vel *Lactuminis* appellationi fortè occasionem dedit. Imò & vitiosum nutrimentum, Fœtui in Vtero materno adhuc existenti concessum, remota causa esse potest: non secus atque si Nutrix vino plus nimis indulget, idemque liquor tenellis Infantibus atque jam factis Pueris crebrò bibendus offertur. In Facie quoque hoc malum sæpè erumpit, quando nimirum Infantes frequentibus admodum osculis Ancillarum lambuntur, atque harum salivâ subinde madent; vel quando ipsa salia sanguinis in cutaneis Faciei tubulis atque glandulis obhærentia sensim cumulantur, & pruritus tandem excitant, cujus occasione Pueri dein Faciei cutim ad molestiam depellendam crebrò fricant, hacque ratione Cuticulam exoriando Vlcuscula manantia producant.

Diagnosis.

Quod *Diagnosis* morbi attinet, ante eruptionem quidem Achorum plerumque malè habent Infantes, tantillum febricitant, inquieti sunt, quandoque frigent parum aut horrent, sed mox iterum caloribus volaticis corripiuntur, nec cibos probè appetunt. Apparent etiam subinde antequam Favi compareant, Tumores Glandularum, in Collo & circa Caput densè consitarum, adeoque & ipsarum Parotidum; qui Tumores duri, cuti concolores, etiam indolentes, aliquando simul comitantur Crustam lacteam, rarò autem hanc declinantem subsequuntur. Vt plurimum numero plures observantur, Scrophulas imitan-

tes; imò tales revera essent, si duriores existerent atque scirrhosæ, nec ita facilè iterum dissiparentur. Quando serofus Achorum humor effluit, Tubercula ferè dissipari incipiunt; paucis autem post eorundem apparentiam diebus per poros Capitis cutaneos sanies seroso-aut ichoroso-salsa, albumini ovorum, mellive ut plurimum similis, sæpè cum pruriente dolore exsudat, quæ plus minus existens acris interdum Pustulas in Epidermide rubentes excitat, Cutim erodit & exulcerat, hincque non rarò crustas vel squamas furfuraceas producit. Quando autem serum illud effluens, subtilioribus particulis auras petentibus, in gelatinam abit viscidam, subinde mellis instar flavescens, atque Capitis pilos conglutinantem, tum nostrates dicunt, es klebt und pacht alles zusammen. Interdum nil olet sanies effluens, sæpius autem foetidum spirat odorem: aliquando etiam materia ita acris existit, ut Infantes fortiter fricando, cutim dilacerent, & sanguinis è ruptis vasculis fluxum proritent. Affectus proin hic, quia magnam habet cum Adultorum scabie affinitatem, *Scabies particularis Capitis* non malè appellabitur.

Si *Prognosis* spectes, Morbus hic purgamen est sanguinis, intemperie salino-serosâ laborantis, adeoque per se minus periculosus; per accidens tamen, si fortè præpediatur, vel repellatur effluens humor falsus, aut sponte cesset fluere, sicque in Massam humoralem regurgitet, in eâ certè mox turbationem instituere, Febrim catarrhalem,

lem, vel malignam, quoque, cum Asthmate & anxietatibus præcordiorum excitare, imò & Convulsiones, Epilepsiam, Paralyfin, Cardialgiam aliæque mala periculosissima producere solet. Vel etiam in Ophthalmiam, Epiphoram, Otagiam & Aurium fluxum mutatur, à quibus aliis Affectibus singulis Infantes per fluxum Achorum præservantur. Si malum negligatur, facile materia acrior circum, circa rodere, substantiam cutis exedere, imò ipsum quoque pericranium & cranium corumpere, ac ita in Tineam converti posset: malignam proin hanc crustam meritò voces.

^{110.} Curatio ita est instituenda, ut in lactentibus quidem Infantibus Nutrix leniter purgetur per *Rhabarbarum*, *Mannam*, *Diacydon*. *Syrup. Rosar. solutiv. simpl.* vel *compositum* aut similia. Ablactatis autem ipsis dabitur semel vel aliquoties laxans v. gr. è *Trochisc. pædocat. Syrup. Flor. Persicor. de Mannâ laxativa, Rosar. solut. simpl. Infuso Foliorum Sennæ & Rhabarb.* Purgato sic corpore mox sanguinem purificantia in usum trahenda sunt, quem in finem profunt *Tinctura Corallorum* vel *Antim.* ad guttas 10. 15. quotidie bis cum *Syrupo* vel *Aquâ Fumar.* aliquandiu data. Commendant alii quoque *Salia volatilia alcalia, Viperarum; Eboris, Fuliginis, vel Liquorem C. C. succinatum, Spiritum Salis armoniaci urinof. anisatum.* Verùm hæc acris nimis apud teneros Infantes, ac eapropter semper deteriora ipsis *alcalinis fixis* notavimus: hinc placet magis Pulvis absorbens & edulcorans è *Pulvere Ser-*

pentum aut *Viperar. ppt. Coralliis, Antim. diaphor. Ebor. ppt. Terr. sigill. Unicorn. fossil. C. C. philos. præpar. Ocul. 30. ppt. Bezoard miner. Diaphor. mart. vel Jovial. Fol. Saniculæ aut Lichen. petr. cum æquali pondere Sacchari compositus, & quotidie mane ac vespere in Jussculo cum Syrupo flor. Tunic. aut Bellid. minor. exhibitus. Ut verò lac Nutricis emendetur, ipsa quoque hujus Pulveris drachmam quotidie cum haustu *Aquæ Fumar.* aut *Scabiosæ* sumat; ac Vini loco *Decoctû Ligni Sassafras & Sem. Anisi* bibat. Externè non statim sistendus fluxus, sed potius imponenda sunt *Folia recentia Betæ, vel Plantag. Alth. Malv. Lapathi acuti, Brassicæ, Heder. arbor. Vitium. Butyro,* inuncta, ut humor magis eliciatur. Sunt qui curationem Naturæ totam committunt, si malum non adeo notabiles molestias Infantibus procreet. Ab adstringentibus & refrigerantibus maximè abstinendum. Alias etiam applicantur partim ad educationem humoris, partim ad sanationem sequentia: v. gr. *Radix Althææ in Urina Pueri decocta, Succus Fumar. Scabios. Enul. Heder. terrest. Brass. cum Lithargyrio; Oleum Nucum, Lilior. alb. Ros. violar. Meliloti hortens. cum Axungia Porci.* Si diu manaverint Vlcuscula & sanare velis, tum prius *Aquâ Spermatidis Ranarum, vel Decocto Cicerum, Oxylapathi, Radic. Aristoloch. Imperat. Helen. Folior. Nicotian. Salviæ, Solani &c. in Urina, vel Vinò & Aquâ facto, Achores elues; atque pulverem antacidum ex Cretâ, Lactæ lunæ, Tutia ppt. Lapid. calam. ppt. Succino, Myrrha, Lithar-**

gyrio,

gyrio, Antim. diaphor. Ceruss. Flor. sulphur. Pulv. Rad. Liquirit. Aristoloch. rot. &c. inspergatur, vel sequens inungatur:

℞. Terebinth. Aquâ font. ad albed. lot. ʒij.

Butyr. rec. q. s. Misce.

Forestsus habet tale:

℞. Vitell. Ovor. ad durit. coct. no. XVI.

Myrrh. ʒj.

Rad. Aron. ʒß.

Helleb. nigr. gr. IV.

M. & coque in ferrea sartagine absque flammâ, donec spumam emittant, tum exprimatur Oleum, totiesque coque & exprime, donec spumam non amplius emittat, abjectis hinc facibus Oleum in vase clauso servetur ad usum.

Efficax remediû est, si vel Lixivium commune, cui Oxylapathum, Rad. Helen. Folia Rutæ & Parietariæ sint incocta, vel Spiritus Vini qualiscunque simplex, aut cum Essentiâ Myrrhæ & Aloës permixtus applicetur. Commendant & Pulverem Radic. Bryon. Folior. Sanicul. Pyrol. Nicotian. Flor. Ros. rubr. Fimum columbinum, Calcem vivam, Alumen, Sal tartar. Mercurium dulcem vel præcipitatum album, cum Oleo laurino & Nucum vel Aceto acerrimo permixtum atque inungendum.

Vel ℞. Butyr. salit.

Axung. porcin. ana. ʒj.

Flor. sulphur. ʒß.

Argent. viv. salivâ extincti. ʒj.

Vitriol. crud. ʒj.

Butyrum, Axung. Sulphuris flores seorsim in mortario liquentur, addantur postmodum reliqua.

Nasturtium frixum vel tritum

cum Axungia Porci ab aliis imponitur. Optimum ego notavi, si citò tutoque sanare cupias, ut capilli abscindantur ac dein Achores diligenter, quotidie bis vel ter Urinâ Pueri vel Aqua muraticâ, vel Decocto Fumar. Lapath. acut. Chelidon. Scabios. Nicotian. in mediâ parte Vini & Aquæ facta, calidè abluantur, hinc linteo siccati, Oleo Nucum, vel Ovorum simplici, aut cum tantillo Olei Ceræ permixto inungantur. Sed semel aut bis tamen corpus prius est purgandum, atque simul dein absorbentia Diaphoretica intus sunt exhibenda.

In Dietâ nocent omnes Cibi saliti, fumo indurati; nocent fructus horæi, nocet Vinum: hinc qui Infantes post secundum demum aut tertium ætatis annum, Cibis modicè salitis assuefunt, qui ab omni excessu inordinati victûs prohibentur, quibus subinde Caput linteis calidis fricatur, & ab omnibus pinguibus sordibus immune præstatur, quibus Capilli pectine Spiritui Vini intincto subinde pectinantur, plerumque ab Achoribus immunes subsistunt. Potus sit Decoctum Chin. Sarsaparill. vel Sassaphr. & C. C. rasp. cum Liquirit. & Passulis. Balneis Aquæ dulcis quandoque immergantur Infantes, & ad præservationem quotannis ter vel quater leniter purgentur. Nutrix ipsa similiter optimam Victûs rationem observet, à Vini potu largo non secus atque à Cibis dyspeptis, viscidis, salis & acidis abstineat, sordietiei omni tandem valedicat.

ÆGILOPS, ÆGILOPION, ab *αἴζ*, capra, & *ὤψ*, oculus compositâ voce,

voce, quod Capræ hoc malo sæpe laborent, est Carunculæ lacrymalis, frequentius loci inter canthum Oculi & Nasi radicem exulceratio simplex, cum puris nunc sinceri, nunc aquoso-serosi profluvio, ab Inflammatione vel erosionem præcedaneâ ortum ducens. Dicitur exulceratio *simplex*, ut distinguatur à Fistulâ, tanquam Ulcere sinuoso.

Anchilops. ANCHILOPS, ab *ἀνχί*, *juxta*, *prope*, & *ὤψ*, *oculus*, derivato nomine, est Tuberculum in Carunculâ lachrymali, frequentius in angulo inter Canthum Oculi majorem & Nasi radicem elevatum, atque nunc inflammatorium, rubens sæpè, & ardenti dolore molestum, à Sanguinis & Lymphæ stagnantis, inque pus abeuntis collectione proveniens; nunc minùs inflammatorium, ac indolens, ut plurimum à lenti cujusdam & crassi, subinde mellei humoris intra peculiarem vesiculam sive membranam coacervatione oriundum, & sic exiguum *Steatoma*, *Atheroma*, aut *Meliceridem* referens. FISTULA denique LACRYMALIS, quæ huc à Medicis referri quamplurimis solet, est Ulceris dictarum partium sive Ægilopis simplicis in sinuosum atque callosum paulatim facta mutatio, cum ichoris vel saniei aquosæ indefinente profluvio, plerunque & Ossis maxillaris carie conjunctum. *Fistula* dicitur hic Morbus à cavitatibus Instrumentorum musicalium instar oblongis & sinuosis: *lacrymalis* verò simul audit, quòd Carunculam lacrymalem interdum simul affligat & exedat, quodque lacrymas profluere faciat.

Afficitur hic *modò* Caruncula illa *Pars afflicta.* spongiosa, mollis, rubicunda, lacrymalis dicta, in cantho Oculi majore recumbens, quæ meatum subjecti ossis, ad nares pertingentem, operiens superfluum humorem lacrymalem imbibit, ac eundem postmodum per duo foramina tenuia, sive *Puncta* sic dicta *lacrymalia*, in extremis Palpebrarum limbis ad latera ipsius Carunculæ conspicua, in peculiarem ductum lacrymalem, qui usque ad Narium extremitates pergit, transmittit, tandemque foras excernit. *Modò* etiam cum vel sine dictâ Carunculâ affligitur Cutis, vel subjecta huic membrana fibroso-adiposa Palpebræ inferioris inter Canthum majorem & Nasi radicem, orbitæ Oculi portionem integens. In Fistulâ quoque lacrymali plerunque dictæ orbitæ vel Maxillæ Officulum unum alterumve simul læditur & corrumpitur.

Anchilops cum Inflammatione *Causa Anchilopis cum Inflammatione.* producitur & formatur proximè à Sanguine & Lymphâ in loco affecto nonnihil extravasatis, vel etiam intra vascula obstructa subsistentibus, stagnantibus, atque sensim in pus abeuntibus, unde Abscessus & ex Abscessu Ulcus enascitur sive Ægilops. *Ægilops.* Quanquam hoc Ulcus etiam sine Inflammatione præcedaneâ à falsis acribus & corrodentibus humoribus in Carunculâ lacrymali, aut viciniâ collectis, vascula lymphatica aperientibus, ac inde postmodum continuè exsudantibus, oboriri queat. Occasionem hisce Affectibus præbet angustatio vel obstructio tubulorum, in quibus hu-
mores

mores circulantes decurrunt, vel lacrymæ ad Nares depluunt: angustant & constringunt frequentissimè Aër frigidus, rigidis particulis admodum referus: contribuere etiam valet crebra & fortis quidem illa compressio, fricatione loci affecti, quando à salinis forsan aliquibus lacrymarum corpusculis pruritum adeptus fuerit; accepta quin & forsan contusio, ictus, allisio. Multum quoque facere possunt halitus ardentium Candelarum sulphureo-acres, in lucubrationibus nocturnis fibrillas Carunculæ lacrymalis, vicinarumque partium continuè lambentes, lancinantes, & ad fricationem, compressionem vestimulantes.

Causa
Anchilops folliculosa.

Anchilopen folliculosam, sive sine Inflammatione, parit effusio & collectio humoris pituitosi, crassi, subinde pinguis, caseosi, aut mellaginei inter membranulas loci affecti paulatim facta, quando videlicet occasione qualiscunque adstrictionis particulæ tales, in sanguine circulante ex pravâ diætâ prius congregatæ exsudent, vesiculam membranofam circa se formant, & sensim majori quantitate collectæ Tuberculum producant.

Fistula lacrymalis.

Fistulam lacrymalem efficit continuum ichoris sive humoris falso-acris profluvium: à quo prius per occasionem hinc inde datam sinus fuerint effigiati, horumque latera circumquaque & extremitates ab exsudente & concreto humore nutritio callosæ redditæ. Ægilops proin nisi promptè curetur, facillè cuniculos agere, & Fistulam post se trahere potest. Liquor autem ejusmodi Ulceris, si

occultâ suâ acrimoniâ membranofas fibras penetravit, atque ossa orbitæ Oculi vel Maxillæ superioris attigit, eadem statim arrodere, corrumpere & carie afficere solet, sensim vim suam exedentem ultra expansurus, ni convenientibus id remediis præcaueretur.

Quod *Diagnosin* concernit, *Anchilops* quidem cum *Inflammatione* affligens, Furunculo penè simile Tuberculum est, atque adeo facillè cognoscitur ex præsentī tumore nonnihil duro & immobili, cum dolore lancinante aut pulsante, rubedine tantillâ in principio, aliquali ardore & lacrymarum crebro fluxu conjuncto. *Anchilops sine Inflammatione*, folliculosa, digito prementi sub cute hinc inde cedit, in Carunculâ lacrymali nunquam existit, indolens ut plurimum est, nisi fortè pruritum quandoque excitat, cuti concolor, & ad suppurationem per se minimè tendit. Si Tuberculum durum est valde, tum exiguum Scirrhum repræsentat: si verò minus durum evaserit, tum pro materiæ contentæ varietate nunc Meliceris, nunc Steatoma aut Atheroma exiguum erit. Si Caruncula lacrymalis afflicta sit, ex autopsiâ cuilibet patebit. *Ægilops* sive *Ulcus* simplex harum partium cognoscitur è pure qualicunque effluente, sive sincero, sive sanioso: pus autem hoc vel è Carunculâ prodit lacrymali, quæ hinc paulatim exeditur ac imminuitur; vel sub eadem & palpebrâ inferiore prodit, si præprimis angulum oculi premas, adeoque tum *Ulcus* subter cutim

tim versus angulum fuit apertum. Aliquando è Cute extrorsum ruptâ promanat, si videlicet cutis texturam fibrosam perrodere potuit; Ichor, qui profluit, nullo modo foetet, atque labia Vlcusculi callosa minimè deprehenduntur. Quod si autem Ichor fuerit aquosus, foetens, plus minus crassus, plerumque flavescens, vel sponte sub palpebra inferiore versus canthum majorem profluens, vel compressâ eâdem juxta nasum prodiens, & insolitam cavitatem, vel hiatum subter Cutim, tanquam exesæ substantiæ signum, monstrans, è cujus sinibus quandoque pus cum aliquali sibilo profilit, callositas porrò atque durities circa sinum adsit, tum *Fistula* dicitur, quæ ut plurimû sub Cute palpebræ cuniculos agit & aperitur, rariùs verò nisi arte sit factum, ex ipsa cute extrorsum visibiliter patetur. Hisce *pathognomonicis* Fistulæ signis jungim⁹ communia alia, etenim in hoc Morbo simul Visus si non læsus, tamen ab effluxu saniei super Oculi bulbum quandoque obscuratus est, aut turbatus, pruritus etiam & dolor interdum accedit, atque non rarò palpebrarum extrema ab ichore promanante & lentescente in somno quasi conglutinantur: ichor ipse purulentus modò parciùs, modò copiosius variæ consistentiæ effluit, absterfionem frequenter urgens: accedit aliquando rubor. Quando materiam saniosam per nares profluere deprehendimus, id signum penè est Fistulæ ad Nasi os pertingentis. Afficitur nunc sola Caruncula lacrymalis cum suo ductu, nunc partes quoque vici-

næ simul, aut solæ etiam affliguntur. Denique *Fistula* alia est recens ex parte tantum callosa, intra carnem desinens, nec dum ossa corrumpens; alia inveterata, tota callosa, & ad officulum cariosum penetrans, vel cartilaginem corruptam terminans.

In *Prognosi* hoc quidem tenendum, nullum talium affectuum per se & naturâ suâ esse deleterium. Fiens morbus si pruritu ac dolore molestus fuerit, ad remediorum usum instigat, & ita facile dissipatur nisi cacochymiam sanguinis pro fonte habet, quam natura per hæc loca depurare nititur. Si autem sine dolore ullo tubercula talia formari incipiant, & paulatinum incrementum capiant, tum in principio negliguntur, & ita factus sensim morbus facile quidem cognoscitur, sed propter Oculi viciniam difficulter curantur: quin si cacochymicus fuerit sanguinis status, facile ex Anchilope Ægilops & Vlcus simplex, atque si hoc non promptè atque funditus extergatur & consolidetur, *Fistula* inde nascitur, dum materia saniosa vicinas partes molles, & spongiosam cartilaginum ossiumque texturam facile erodit. Si adhuc acrior fuerit sanguinis diathesis, in Vlcus tandem cancrum & exedens, nullo modo curabile, degenerare potest. Difficilius etiam curatur, si Abscessus ad nares rumpatur, & pus per illas effluat. Dicere tamen etiam possumus, Vlcus tale simplex minimè exedens, Fonticulum esse velut spontaneum, per quem natura sese à superfluis humoribus ferroso-salsis liberat. Anchilops sine in-

Prognosi

flammatione, si nimium non excre-
scat, linqui potest, nec nisi Tumore
structuram faciei defœdante molestum
erit. Si autem in Cancrum mutatur,
ferè lentam eamque molestissimam
partium exesionem dolorificam post
se trahere solet, sine ullâ medicationis
efficaciâ. Vlcus recens, Fistulaque in
principio adhuc existens curationem
haud difficilem admittit. Inveterata
autem, profunda, quæque ad Nasi ossa
penetravit, chronicum est malum,
rarò perfectè sanabile, sed palliativè
tantùm curabile.

Curatio
Anchi-
lopsis
cum
Inflam-
matio-
ne.

Curatio pro Affectûs diversitate
vario modo est instituenda, quòd si
enim Tuberculum fuerit Anchilops
cum Inflammatione, tum statim hu-
morum stagnantium discussio tenta-
bitur, sicque Tumor dissipabitur. In
hunc finem proin ante omnia crudi-
tates primarum viarum per Clyisma
emolliens atque detergens, vel etiam
per lene aliquod purgans evacuabun-
tur: v. gr.

R̄. Radic. Lil. albor.

Chelidon. maj.

Malv. ana. ʒß.

Herb. ʒ. emoll.

Agrimon.

Anserin.

Flor. Chamomill. ana. Mj.

Sem. Lini. ʒvi.

Fenic. ʒij.

Bacc. Junip. ʒj.

Incis. & contus. coqu. in s. q. Aqu. font.

Colatur. ʒßj. in adultis adde

Olei Olivar. ʒjß.

Elect. lenitiv. ʒvj.

⊖ is Gemm. ʒß.

M. F. Clyster tepidè injiciendus & una
vel alterâ vice reiterandus. Juvant Epi-
themata sive Collyria, in hunc proin
finem omnia contra Ophthalmiam
suo loco commendata, vel sequens
certè proderit:

R̄. Aqu. Chelid. major. ʒij.

Euphras.

Hierac. ana. ʒj.

Spirit. Vin. camphorat. ʒij.

Essent. Croc. ʒß.

Magist. ʒ n. diaphoret.

Lapid. Calam. ppt. ana. ʒj.

Misce detur ad Vitr. & pluries calidè
noctu diuque cum linteolis mollibus Pal-
pebris Oculi clausis admovebitur.

Alii Spiritum Panis siliginei cum
Aquâ Reginâ Hungar. atque Essentiâ
Myrrh. pro Epithemate externo non sine
successu in usum trahunt. Euporiston
nonnullis est Cataplasma è Pomis putri-
dis dulcibus, Tutia ppt. Lapid. Calam.
ppt. Camphorâ & Croco concinna-
tum, tepidèque sæpius applicatum.

Quando Inflammatio discuti intra
spatium aliquot dierum nequit, si-
gnum est, eam in Abscessum atque
Vlcus declinare, quamobrem tum
emollientia ac maturantia statim in
usum trahentur, qualia v. gr. sunt Ca-
taplasma è Micâ Panis siliginei, vel Fa-
rinâ Tritici, Siliginis, Fabarum, Radic.
Alth. Sem. Lin. Croco, Lactè, Melle,
Aquâ rosac. aut Succo Hieracii vel
Chelidon maj. expresso compositum, &
calidè bis quotidie ita applicatum, ne
Oculi bulbus valde prematur, à quâ
pressione novum Oculo malum ac-
cerferetur. Maturationem quoque,
sed tardius & majore cum dolore pro-

movent

movent Emplastra *Diachylum simpl.* five cum *Gumm. Stict. Croll. Norimbergense Gruberianum*, *Colleti Francofurt.*

Vfus horum remediorum exteriorum continuabitur, ac simul quotidie dosis *pulveris diaphoretici* uti supra cum *Aquâ Fumar.* propinabitur, donec Abscessus tuberculi fuerit maturatus, quem dein, si sponte extra versus non rumpatur, lanceolâ perundes, pusque effluere permittes, imò etiam quantum licebit, exprimes. Vlcus autem sic factum, si sufficienter apertum non videatur, ulteriore incisione à perito circumspectoque Chirurgo, antequam cuniculos agat, & in Fistulam mutetur, dilatabitur, sicque fundum ejus detegatur, in quo dein, si vel Caro spongiosa aut putrida, vel Officuli caries deprehendatur. *Canterio actuali* semel vel bis, si opus videbitur, exuretur; ac deinceps officulo quidem nudo fila carpra linea, desuper autem alia *digestivo Unguento*, quod è *Tereb. vitell. ovi solut. Melle. rosac. Lapid. Calam. ppt. Bezoard. minor. ac Essent. Myrrh. Aloes*; compositum proflare debet, bis quotidie imponetur; ac denique *Emplastrum Diapalmæ*, vel *Stict. Croll.* similive aliud ad arcendas qualescunque Aeris externi injurias, Vlcerisque acidum absorbendum applicabitur. Apertum servabitur Vlcus, usque dum vel putrida Caro destructa, vel foliola Ossis cariota, si quæ insunt, separata & excussa sint, minutoque puris qualiscunque proventu Vlcus novâ eaque bonâ carne impleri, sicque ad Cicatricem tendere incipiat; quam certè

multum promovere potest usus sequentis Collyrii:

R̄. *Aqu. Rosar. alb.*

Ulmar.

Plantag. ana. ʒj.

Thuris mascul.

Aloes.

Myrrh. ana. subtiliss. pulver. ʒj.

ʒn *diaph. ʒij.*

Misc. detur ad Vitr. Calidè cum linteolo bis quotidie admoveatur, atque desuper Emplastrum Diapalmæ imponatur.

Vsurpato hoc per aliquot dies remedio tandem siccè deligandum est Vlcus, usque dum Cicatrice obductum fuerit & probè sine fædo callosanatum. Ligatura per totum Curationis tempus ita est instituenda, ut infra Oculum Cutis leniter compressa existat, quò sic materia purulenta deorsum penetrare, sinuososque cuniculos aut Fistulam producere nequeat.

Quòd si *Tuberculum* evasit *cysticum*, atque ab humore lento, crasso folliculo incluso provenerit, tum lanceolâ cutis est aperienda, folliculusque integer eximendus, ac dein *adstringens, consolidansque pulvis*, è *Myrrhâ, Aloë, Sanguine Draconis vero, Lapid. Hæmat. ppt. Thure, Mastiche, Capulis Glandium, Ichtyocollâ Aquâ Chelidonie nutritâ*, similibusque paratus, atque albumine Ovi exceptus calidiusculè est applicandus, imposito desuper *Emplastro Diachalciteos*, vel *Diapalmæ*, vel *Diasulph. Ryland.*

Quando autem *Tuberculum* excindi nequit, tum causticum imponatur

tur remedium, hincque producta eschara Butyro recenti non salito emolliri debet; emollita si sponte non abscedat, scalpello est abscindenda, factumque Ulcusculum Melle rosaceo, cum Essentiâ Aloës, Myrrh. Thuris, Pulvere Radic. Rhabarb. Chelidon. Sang. Dracon. Bol. armen. ꝑn. diaphor. Mercur. præcipit. alb. &c. permisto, sensim extergendum, ac denique modo supra dicto ad Cicatricem promovendum est.

In Fistulâ lacrymali & Ulcere sinuoso Corpus subinde est purgandum, sequentibus. v. g. Pilulis in Adultis:

℞. Mass. Pilul. è Succin. Crat. ʒß.
Extract. Rhab.
Helleb. nigr. ana. gr. vj.
Cinnab. ꝑn. corr. gr. viij.
Resin. Jalapp. gr. ij.
Ol. stillatit. Rorism. q. s.

M. F. l. a. Pilulæ no. xv. Inauratæ sumantur mane pro dosi cum regimine diætæ.

Vel ℞. Radic. Jalapp. ʒj.
Crem. Fri.
Merc. dulc. opt. ana. ʒß.
Scamm. Crat. gr. iij.
Ol. stillat. Mac. gutt. j.

M. F. pulv. subt. d. ad ch. Sumatur mane jejuno stomacho pro dosi.

Vel exhiberi potest Infusum Fol. Senn. & Rhebarb. aut Vinum medicatum ex alterantibus & traumaticis amaris atque purgantibus compositum. Placent aliis Extracta v. gr. panchymag Croll. Cathol. Pilular. Coch. Massa Pilular. Aloeticar. vel Marocostin. Pilulæ Emanuelis, alia. A Vomitoriis sibi maximopere cavendum; si Ven-

tricus tamen scateat Viscidis cruditatibus, digestiva remedia purgantibus præmittenda, qualia possunt esse Frius Glatus, ꝑn. diaphor. Cremor Fri. Arcanum duplicat. Myns. Tinct. ꝑnii, Corallor. Purgante præmisso danda sunt statim traumatica, & absorbentia, Decocta, Essentiæ, Tincturæ vulnerariæ, ꝑnium diaphoret. C. C. vel Ebur sine igne parat. Diaphor. ʒvial. ʒial. Terr. sigillat. Essentia lignorum, Trifol. fibrin. Decoctum vel Infus. Lignorum um herbis Thee & traumaticis. Pilulæ ex Extract. Numular. Veronic. Plantag. Folior. teneriorum Quercus, & Pulveribus absorbentibus paratæ. Æstivo tempore Potus Acidularum, Thermarum Fabariens. Rhætiæ, Plumbariarum Lotharingiæ, aliarumque pro varietate complexionum convenit.

Extus Capilli capitis statim veniunt abscondendi, Emplastrum de Betonicâ & Tacamahacâ. Vertici Capitis imponendum, vel Cucupha è Cephalicis parata, si ferre queat Æger, imponenda, Capillitium portandum. Setaceum in Nuchâ excitandum, & si Cacochymicus fuerit Æger, simul Fonticulus in pede ejus lateris, in quo Oculi canthus est afflicus, producendus. Frictiones dorsi cum linteis calentibus quotidie ferè & blandè instituendæ; hisque omnibus remediis humores sensim à loco affecto sunt divertendi. Quando itaque benè jam fluit Setaceum, topica quoque auxilia veniunt præstanda, ubi Callositas Ulceris vel incisione venit discindenda usque ad radicem mali, vel quod Fabricius ab Aquapendente melius esse deprehendit perfo-

perforatio Ossis Narium Terebræ ope facienda, quò sic Ichori via & effluxus per Nasum pateat. Dein ustio fistulosi sinûs instrumento per cannulam, quâ vicinus munitur Oculus, instituenda, vel hujus loco Cathæreticis, quantum licebit remediis fundum Ulceris paulatim est detegendum, quemadmodum id vel Ungt. *Ægyptiaco*, vel *Mercurio præcipitato rubro subtiliss. trito*, *Alumine usto*, aut simili leniori obtineri potest. Sumunt alii ad consumendam callositatem modò *Butyrum* $\frac{1}{2}$ *nii*, modò *viride Aeris cum melle rosaceo*, modò *Aquam phagædenicam*.

Quando orificium Fistulæ angustum est, solent Chirurghi illud *turundâ* è radice *Gentianæ*, vel *Consolidæ majoris*, aut *Bryoniæ* dilatare. Aliis in hunc finem ceu minus dolorifica sufficit *Medulla Sambuci*, aut *Ebuli*, vel præparata *Spongia*. Si incisio fit, cavendum ne musculi orbicularis tendo, qui ibi utramque palpebram conectit, cum maximâ Oculi difformitate dissecetur. Ad extergendum interea mundificandumque Vlcus usurpant *Decoctum Radicum Asphodeli*, *Serpentariæ*, *Bryoniæ*, *Rhabarb.* *Hellebor. nigr.* *Aristol.* *Gentian.* *Herb. Absynth.* *Agrim.* *Millefol.* *Geran. robert.* *Centaur. min.* *Sabinæ*, *Rutæ*, *Virgæ aur.* *Hyperici*, *Gallii lutei*, in *Aquâ communi*, vel *aluminosâ*, *muriaticâ*, vel *Calcis vivæ*, vel *Urinâ hominis sani factâ*; cui ulterius *Tincturam ex Aloë*, *Myrrhâ*, *Thure*, *Mastiche*, *Asâ fætid.* *Garyophyll. arom.* *Radic. Hellebor. nigr.* *Gentian.* &c. cum *Spiritu Vini* extractum permiscere possumus. Omnibus palmam præripit pul-

vis ex *Euphorbio*, *Myrrhâ*, *Aloë*, *Mercur. præcipit. rubr. subtiliss. trito* compositus, quo Fistulæ sinus quotidie impleri possunt, superaffundendo adhuc *Tincturam modò dictam*, vel *Aquam illam Boylei ex Olo albo*, *Bolo Armenate*, *Camphorâ*, interdum *Alumine simul paratam*, cujus descriptionem habet *de Utilitat Philos. Experim. 5. cap. 1.*

Si dilatata ad fundum usque fuerit Fistula, hincque cariosum patuerit Os, vel Scalpro id abradi, vel *Canterio actuali* omnium citissimè exuri potest. Sæpius hæc cauterisatio est repetenda, bis vel ter de die, per aliquot etiam hebdomadas, si opus videbitur, donec squammulæ cariosæ probè separatæ fuerint. Hæc tamen operatio in Osse Maxillæ & Nasi tutò, in Ossiculis orbitæ autem non nisi temerè, & cum Oculi magnâ noxâ instituitur. Escharæ casus Unguento digestivo promovendus, Vlcusque more solito deligandum.

AFFECTIO PASSIO vel MELANCHOLIA HYPOCHONDRIACA, MALVM HYPOCHONDRIACVM, AFFECTVS HYPOCHONDRIACVS, nomen suum ab ὑπὸ sub, & χόνδρον, *Cartilago*, adeoque à regione pectoris subcartilagineâ, sub cartilaginosis costis, Diaphragma, Ventriculûm, Intestina, Mesenterium, Hepar, Splenem, Omentum, Pancreas, ceu Mali scaturigines focosque comprehendente, deducit, totque symptomatibus Hominem affligit, ut adcuratè definiri nequeat. Dicere tamen liceat, quòd sit molesta vel tristis quædam, eaque frequens & obstinata

Ossis cariosi separatio.

Hypochondriaca passio.

Descriptio.

stinata mentis sensatio, cum inquietudine ut plurimum & anxietate pectoris aut præcordiorum, variaque symptomatum plurium aut pauciorum complexione hominem plus minus excrucians, atque à diversâ fibrarum in Hypochondriacis partibus membranaceo - nervosarum vellicatione & crispatione sive contractione spasmodicâ, per humores pituitoso-acido-acres factâ, originem trahens.

Pars Affecta.

Pro Parte primariò affectâ eam procul dubio adgnoscerere debemus, cui causa morbi primariò inhæret, vel in quo fomes aut focus mali hæret, & unde per consensum sive secundariò plures aliæ partes afficiuntur. Veteres tantum non omnes, *Lienem* pro principali hujus Affectûs scaturigine adgnoverunt, indeque Germani appellare consueverunt, die Miltze Kranckheit, die Miltze-fucht; sed perperam, cum in Hypochondriacorum plerorumque Cadaveribus insons planè Lienis viscus, atque ab omni labe immune deprehensum; ac vicissim in aliis qui nunquam Hypochondriaci fuerunt. Lien morbosum inventum fuerit. Alii culpam modò in Ventriculum, modò in Hepar, Pancreas, Intestina, Mesenterium, Diaphragma conjiciunt. Verùm adcuratius rem ponderantes deprehendunt, propriè fibras nervoso-membranaceas Partium in hypochondriacâ Regione sitarum affligi, & sympathicè dein partes corporis alias per communionem nervorum afficere.

Diagnos.

Signa *diagnostico-pathognomonica* hujus Affectûs, si nondum firmas egit radices, difficulter dari possunt. Diffe-

rentias enim admittit non contemnendas, etsi à multis parum distinctè observatas: & enim *alius* quidem mitiore gradu Hominem sine ullo delirio affligit, & simpliciter *Passio hypochondriaca*, vel *Affectus hypochondriacus* vocari debet: *alius* majore eundem gradu, & cum vehementioribus symptomatibus, cum deliriis modò interruptis, modò continuis, cumque timore & tristitiâ sine furore excruciat, & *Melancholia hypochondriaca* dici potest. Prior mitiorque gradus pro signis pathognomonicis sequentia ferè adgnoscat: nimirum tales Ægroti frequenter gravitatem stomachi & phlogoses à pastu, cum extraordinario faciei rubore, inflationes Abdominis, nonnunquam lancinationes, tensiones vel crispationes colicas, præprimis in sinistro hypochondrio, ubi intestinum Colon recurvatum & angustatum vicinis partibus membranâ quadam cohæret, persentiunt; dum interea appetitu quidem optimo semper gaudent, sed depravatam simul chylicationem habent. His accedit quoque crebra pectoris anxietas, cum aliquali dyspnœâ, murmuribus, & rugitibus vel borborygmis Hypochondriorum, nec non Alvi segnities, & frequens constipatio, post quam dein scybala ut plurimum dura & globosa non sine labore excernuntur, unde propter retentos diu flatibus, juxta anxietatem, vel etiam inquietudinem in somno, lassitudines, formicationes, tremores leves atque stupores membrorum quandoque persentiunt. Cum his tamen Judicium acutum atque Phantasia sana sine ullo delirio

Diagnos.

Signa affectus.

delirio manet. Hisce verò pathognominicis signis adhuc communia alia plura veniunt addenda, de quibus variè conqueruntur; nimirum Hypochondriaci alii quidem crebrius salivant & os pituitâ madens ferè semper habent; saliva ipforum nonnunquam aquosior, nonnunquam viscidior pro assamtorum diversitate existit. Jejunantes ferè debiles existunt, & quandoque etiam tantùm non planè linquuntur animo, donec alimentum assumerunt. Alii siccum os habent, & salivæ acriusculæ paucitatem. Ructus ipsis quandoque acidi sunt, saporque oris subsalsus, aut vitriolicus. Nauseant atque vomunt pituitam variam, interdum penè viridem, vitriolicam, tenacem. Ructibus subinde acidis torquentur; pulsationes in Hypochondriis, frigus extremorum, nonnunquam cum sudore frigido acidum spirante, dolores etiam atque lancinationes dorsi vel lumborum persentiunt, ac si fustibus cæsi fuissent. Pulsus varius est, Cordis palpitatio cum vehementi Arteriarum pulsatione quandoque accedit. Vrina quandoque limpida, aquosa, quandoque crassa est, atque sedimentum modò copiosum, modò paucum plus minus salinum viscidum deponunt, cum corpusculis salinis fundo & parietibus matulæ accrescentibus. Interdum vertigine, & obtuso Capitis dolore simul vexantur. Maximum hujus simplicis Affectûs hypochondriaci gradum denique *Ettmyllerus* credidit esse *Scorbutum*, de cujus naturâ atque curâ suo loco tractatur.

Quòd si superioribus signis præterea accedant tristitia crebra ac pertinax, animus suspicax, varia corporis animique perturbatio & intemperies, gracilitas, oculi interdum fixi ac leviter torvi, solitudinis amor, morositas, irritabilitas facilis ad iram, terrorem; quandoque motus membrorum spasmodici, debilitates velut paralyticæ transeuntes, timor atque metus sine ullâ causâ, etiam sine febre ac furore, præconceptæ ac deliræ imaginationes, mentisque alienationes; tum verò non simplicem *Passionem* sed *Melancholiam hypochondriacam* nuncupamus, nomine composito ex *μελας*, *niger*, *ater*, & *χολη*, *bilis*; quoniam veteres hunc Affectum ab atrâ bile provenire crediderunt. Hâc verò detenti Homines meticulosi, suspiciosi, ex variis quæ patiuntur symptomatibus falsas sibi fingere solent opiniones, taliaque imaginari, quæ ludicra subinde existunt atque ridicula; neque etiam opiniones ejusmodi perversas, nisi ægerrimè deponere possunt. Sunt inter hos, qui putant se vitreos esse totos, vel vitrum intra corpus habere veneno repletum, hincque vehementes motus evitant. Alii utut maximè pii & religiosi, se Deo exosos, adeoque damnatos, æterno supplicio destinatos esse sibi persuadent, summeque proin tristes, quæ certè species *Melancholiæ* horrenda, & ad desperationem non rarò invitans est, ita ut, sicut *Platerus in Praxi* scitè monuit, se ad blasphemias erga Deum, ad multa horrenda perpetranda, ad manus violentas sibi inferendas, maritum, uxorem, liberos, vicinos, Principem, interficiendos,

Signa pathognominica Melancholiæ hypochondriacæ

nullâ Zelotypiâ, nullâ invidiâ erga illos, quos potius intimè amant, commotos, contra voluntatem velut cogi, talesque cogitationes invitis etiam sibi obrepere dicant; cum interea Deum, ut se ab impiis illis cogitationibus liberare velit, instanter precari haud desinant. Alii magis terrore mortis anguntur, seque ob scelera perpetrata, qualia tamen nulla nisi imaginaria sciunt, ad supplicium postulari conqueruntur, sicque mortem, quam sibi mox imminere credunt, summoperè expavescunt.

Alii ridicula animo phantasmata concipiunt, diutissimèque retinent; ut quando se in bruta conversos opinantur; quando se Papas, Imperatores, Reges, Principes, Belliduces, factos credunt, & continuè varia mandant; quando se caput magnitudinis stupendæ, nasum longissimum habere opinantur, quando se ranas, serpentes, lapides, adamantes, aliaque devorasse, & adhuc in corpore circumgestare somniant. Vixit apud nos, qui se militem cum hastâ excubias agentem deglutiisse, eumque in faucibus adhuc obhærentem habere, sibi per plurimos annos fuit imaginatus, usque dum amicus consilium dedisset, ut sibi Clysterem ex pulvere pyrio confici curaret, illiusque accensione militem è faucibus expelleret, quo audito, & ad animum revocato consilio, delirium illud amisit, & alia postmodum agitavit. Alii in spe & silentio suos consumunt dies, segnes sunt, taciturni, ad interrogata ægrè respondent, solitudines quærunt & amant, sylvas petunt, in latebras se abscondunt, hominum consortia vitantes, ac velut

horrentes, *Misanthropi* eapropter verè dicti. Atque talia phantasmata modò brevius, modò diutius hominis animum pervertunt; intermittunt sæpè, ut homo aliquandiu rectè ratiocinetur, donec cogitationes deliræ redeant. Habent proin sæpè dilucida quædam in hoc morbo intervalla homines, remissionesque; redeunt dein per vices deliria consueta, aliave. Nonnulli etiam per certas anni tempestates, Lunæque phases ita divexantur. Paucis, Melancholici, uti *Fernelius* describere amavit, *vel cogitant vel loquuntur, vel efficiunt absurda, longe à ratione & consilio abhorrentia, eaque omnia cum metu & tristitiâ. Incipientes quidem melancholici abjecto, demisso, & hebetiore sunt animo, se suaque negligunt, vitam sibi acerbam putant & amarissimam, etiamsi ex eâ migrare pertimescant. Quæ verò jam malum invaluit, multa animo & cogitatione fingunt, & obloquuntur aliena perturbatè atque confuse.*

Quando igitur Affectio hypochondriaca in partibus tam solidis quàm fluidis, si modò ad diversissima sua symptomata attendere velimus, radicata deprehenditur; à diversis hinc causis illam produci existimandum erit; in harum autem expositione plus subinde confusionis quàm perspicuitatis notavimus, ut proin operæ pretium nos facturos arbitrati fuerimus, si totum hoc ætiologiæ negotium ab ipso generationis principio deduceremus. Dicimus ergo, primam hujus Mali originem in nonnullis quidem hæreditariæ sanguinis ac Spirituum dispositioni, deinceps verò in omnibus depravatæ stoma-

stomachi Chylificationi aliquamdiu continuatæ adscribendam esse, dum Cibi boni malive succi propter liquoris gastrici acorem quendam præternaturalem, & activitatem blandè volatilem, ab Animi passionibus vehementibus & crebris, mœrore inprimis diuturno, frequentique irâ aut terrore imminutam, non in chylum bonum ac laudabilem, sed in massam subacidam plus minus acrem, dissoluti convertuntur, in quâ salia acida plus justo exaltata prædominantur. Quando igitur talis chylus plus minus crudus ac viscidus crebro in circulantem Humorū laticem transmittitur, tum hic sensim à dulci suâ benignâve temperie & crassi degenerat, ac in sanguinem ut plurimum acidum, vel salsum magis minusve lentum mutatur. A tali sanguine porro & ipsis spiritibus animalibus sive fluidis Nervorum incolis labe quædam atque intemperies, quam alii peregrinum characterem vel ætherem vocant, communicatur. Præternaturaliter verò constitutæ sic Partes corporis fluidæ, tonum quoque solidarum partium, fibrarum inprimis nervosarum in membranis aut tubulis fluida vehentibus, lædunt, & vel laxitudinem vel crispationem conciliant, quatenus occasione qualicunque datâ, angustatis, compressis, constrictisve harum aut illarum partium tubulis falsæ vel acidæ particulæ humorum obhærent, subsistunt; vellicant hinc, fibrillas sensibiles diversimodè rodunt, sicque obstructions, dolores, tensiones, & similia producant, imò hâc ratione omnia symptomata, de quibus ægri

conqueruntur, excitant. Ita quidem ut pro diversâ configuratione, magnitudine, acrimoniâ, copiâ & motu talium corpusculorum salinorum, & particularum heterogenearum fibræ nervosæ harum aut illarum partium fortius aut mitius percussæ, symptomata nunc vehementiora nunc leniora, diuturniora vel breviora producant.

In *Prognosi* hoc tenendum, Affectionem hypochondriacam in principio adhuc curabilem esse, sed in progressu, ubi jam firmiores egit radices, curatu difficilem, imò propemodum insanabilem esse. Vnde *Opprobrium Medicorum* fuit appellata, quod Ægri semper habeant, de quo conquerantur, atque ob metum vel mortis vel graviorum morborum, etiam levissima symptomata quibus affliguntur, pertimescant, & eorum ratione medelam exposcant: cumque postea vident & experiuntur, mitigato vel ablato uno symptomate jugiter alia atque iterum alia in his illisve partibus subnasci, impatientes evadunt, ipsimet suorum malorum originem perscrutari incipiunt, atque sepositâ in Medicum ordinariū fiduciâ, ad Agyrta, Ciniflones, Circumforaneos, Carnifices, similisque farinæ alios homines confugiunt, ut ab illis remedia efficaciora, dicam an pejora, obtineant; à quibus dein si vel pejus habent, vel certè in melius non proficiunt, jam multa sibi imaginari perverse, tristes evadere, deliria agitare, ac sensim sensimque melancholici reddi solent. Ut verò tum nondum continua, sed interrupta existant ejusmodi deliria, in ulteriore tamen pro-

Prognosis

gressu Morbi ex Melancholiâ interpolatâ Delirium continuum & habituale, ex Hypochondriaco Cephalicum & radicale fieri potest, atque per totam vitam durabile. Interim lethalis per se non est hic Affectus, potest tamen, si Æger ad iram vehementem frequenter procitetur, in Maniam converti.

Curatio

Curatio ex nostrâ sententiâ omnium optimè perfici potest correctione Massæ sanguineæ, tam per debitum Vitæ regimen, quàm etiam per medicamenta generosiora, largisque dosibus hausta; & quidem primæ viæ pro circumstantiarum ratione nunc *emeti-
cis blandis*, nunc *purgantibus mediocri-
bus*, subinde eluentur, quibus elotis, nulla credimus meliora Remedia, quàm potum, vel *Seri Lactis Caprilli*, cum *Tinctur.* $\frac{1}{2}$ ii, *Corallor.* aut *Mart.* *aperitivo.* bis quotannis hausti: vel *Aquarum Mineralium*, sive *Fabariensis calidarum* in Helvetiâ, sive *Acidularum* quarumcunque. Quibus ego substituere frequenter soleo *Aquas* è *Plantis spleneticis & antiscorbuticis destillatas*, quarum potu credimus sal-
sam acidamve sanguinis *Caco-
chymiam* quam optimè elui & emendari posse. His adde usum *Spirit. Cochlear.* *Essent. Trifol. fibrin. Extract. Mart.* ac *Trif. fibr. Corall. rubr. ppt. Ocul. ☉ ppt.* omniumque absorbentium. In potu ordinario crebrò infusæ sint *Plantæ antiscorbuticæ & spleneticæ*. Alii commendant potum *Decocti Ligno-
rum* blandioris cum Vino; nec non *Elixir propr. Claud.* vel *sine acido*, *Tin-
ctur. Mart. cæruleam Etneri*, *Essentiam*

Martis helleboratam. Symptomati-
bus interim subinde urgentibus occur-
rendum est iis Remediis, quæ suis hinc
inde locis commendantur, semper ra-
tionem habendo *Dyscrasiæ Humo-
rum* in hoc malo prædominantis, ne
Symptomatis mitigatione Morbum
principalem augeamus.

In *Diætâ* probamus Aerem tempe- *Diætâ*
raturum, serenum, subtilem magis quàm
crassum, ac subinde ratione loci muta-
tum; mirum enim, quantum hæc loci
ac aëris mutatio ad chronici hujus
morbi mitigationem facit. Cibi sunt
eupepti ac laudabilis succi, non visci-
di, non flatulenti, non terrestres, nec ni-
mis saliti aut fumo indurati; Oleribus
& Plantis antiscorbuticis multum in-
dulgeat. Vinum aut Cerevisia biban-
tur probè defœcata ac optima, minimè
acescens; omnia usurpentur mode-
ratè; Exercitia corporis tempe-
stiva sint, ante pastum magis quàm pleno
ventriculo instituta; Somnus vitetur
meridianus; Vigiliis non nimis indul-
geatur: Lucubrationes nocturnæ cre-
briores aut diuturniores fugiantur; ut-
pote per quas Literati non secus ac per
meditationes post pastum profundio-
res in hunc Affectum magis proclives
redduntur, hincq; morbus ipse Littera-
torum morbus audit. Animi in pri-
mis pathemata enormia vitentur at-
que in moderamine justo teneantur,
neque tristitiæ, mœrori, & gravibus Cu-
ris liberaliter indulgeantur. In primis
exulet hic impatientsia mentis, & diffi-
dencia cum fortibus imaginationibus
perverfis. Societas autem piorum ho-
minum hilari lætaque mente prædito-
rum.

rum continuè frequentetur; atque solitudo cane pejus & anguè fugiatur, talisque homo continuè quærat, quod agat.

AGONIA, vide *Sterilitas*.

ALARVM FOETOR, vide *Fœtor Alarum*.

ALBARÆ, vide *Vitiligo*.

ugo.

ALBUGO, LEVCOMA, est macula quædam albuginea, in corneâ oculi tunicâ enascens, atque vel à coagulatione humoris pituitosi, vel à cicatrice Vulneris aut Viceris, aliâve causâ originem ducens, ipsamque visionem plus minusve interceptiens.

af-

Pars affecta tunica est Cornea, anteriori sui parte, quâ pupillæ foramen in choroide extat, pellucida.

causa
ima

Producitur hoc malum, quando à nimia contusione & ictu crystallinus aut vitreus humor in foramen pupillæ prolabitur, atque nonnihil durior redditur, quemadmodum hoc contingit facile, si in contusione vel pupilla dilaceratur, vel Tunicæ humorum diffiliunt, vel si in Cataractæ depositione acus nimis profundè infigitur, aut pupillæ fibrillæ dilacerantur. Producitur itidem, quando viscida quædam pituita, omni acrimoniâ carens, in partis affectæ tubulis stagnat & induratur; aut ubi cicatrix post Vultus vel Vlcus gignitur, tum macula quædam albuginea inde fit & nascitur, quæ tanto crassior, quanto humor stagnans copiosior vel densior fuerit; subinde & latior aut major aut minor evadit, quando plures paucioresve tubuli à stagnante humore sunt infarcti. An

exiccatio Corneæ heic à nonnullis accusata admitti possit, dubitamus! nisi in Senibus totam siccare & incrassari dicamus cum visionis obscuritate, sed tum non Albugo vocari meretur. Occasio hinc Affectui huic frequentior præbetur ab humore viscido per arteriolas appulso, item à pustulis, variolis, ulcusculis. Quando igitur vel Ophthalmiæ ulcerosæ, vel Variolæ, in bulbis oculorum enatæ, imperitè vel negligenter tractantur, plerumque in *Leucoma* tale facessunt, dum pustula videlicet sponte aut per medicamenta rumpit, atque hinc ulcusculum detersum & consolidatum cicatricem ejusmodi albam, atque crassitiem corneæ minus transparentem post se relinquit. Dumque callus ille Cicatriculæ modò altior modò profundior & densior est, ita maculam nunc amplam & visum planè interceptientem, nunc exiguam, & visionem ex parte solum tollentem, nunc oblongam, qui visionem in pupillâ dividit, atque propriè Cicatrix dicitur, producit.

*Causa
antece-
dentes,
remota.*

Affectus unicuique per se patet, modò patientis oculum intueri & examinare dignabitur, videbit enim eâ parte, quâ oculi bulbus niger, coeruleus, aut glaucus esse solet, maculam quandam plus minusve albugineam & crassam, instar tunicæ cujusdam, indolentem, seseque nunc latius nunc brevius supra pupillam extendentem: quando autem pupilla ex parte est oblecta, visio imminuitur, si prorsus oblecta, visio etiam totaliter aufertur, aut si *Leucoma* tenuius fuerit, & adhuc

*Diagno-
sis.*

leviter transparens, tum visus obscuratur.

Prognosis

Prognosis. Affectus si à callo vel cicatrice vel humoris crystallini aut vitrei procidentia, vel acu nimis profundè adactâ, originem trahat, est immedicabilis, proin temerè nil promittas; si verò à viscido pituitoso humore provenerit, curari adhuc, licet maximâ cum difficultate, potest. Quæ Albugo pupillam non attingit, similiter linquitur, utpote visionem minimè lædens.

Curatio.

Curatio. Albugo à stagnatione humoris pituitosi proveniens, desiderat remedia tam interna quàm externa sequenti modo administranda. Ante omnia *purgans Mercuriale*, non autem *emeticum* exhibeatur; Profunt hic *Pilulæ de succino Crat. Pilulæ Lucis majores*, *Extractum catholicum*, *Extract. pilular. cochiar. vel angelicar. cum Oleo destill. Fœnicul. & Mercur. dulc.* *Purganti* succedet usus *Remediorum Stomachico-Cephalicorum*, sub formâ *Infusorum*, *Vinorum medicamentorum*, *Tragematum*, *Essentiarum*, *Tinctur.* aut *Spirituum volatil.* cujusmodi sunt v. g. pro adultis.

Rx. Mass. pilul. è Succ. Crat. ʒj.

Mercur. dulc. opt. gr. XII.

Resin. Jalapp. gr. ij.

Cremor. Fri. gr. j.

Ol. stillat. fœnicul. q. s.

M. F. Pilulæ no. XV. Inaur. d. ad ch.
pro dosi matutin.

Vel. Rx. Extr. pilul. Angel.

Cathol. ana. ʒß.

Cinnab. ʒii opt. gr. viij.

Resin. Scammon. gr. iij.

Ol. still. anis. q. s.

M. F. l. a. Pilul. no. XII. prodosi.

Rx. Rad. Angelic.

Chelidon. maj.

Calam. arom. ana. ʒij.

Lign. Guajac.

Sassaphr. ana. ʒiij.

Herb. Euphras.

Ocym.

Card. bened. ana. Mj.

Summit. Lavend.

Thym. ana. Mß.

Semin. fœnicul. ʒij.

Incisis & contusis affunde Vini albi Veteris Mß. singulis hinc partibus unciaë quatuor hauriantur.

Rx. Spirit. Sal. ammon. fœnicul.

Liqu. C. C. succin. ana. ʒiß.

Misc. Dos. m. ac vesp. XX. gutt. cum
Aqu. Chelid.

Vel. Rx. Essent. Betonic.

Euphras.

Hyperic.

Spirit. Cochlear. ana. ʒj.

Misc. Dos. XX. ad XXX. gutt. cum potu
ord. vel Aqu. Euphras. m. ac v.

Rx. Rad. Chelidon. maj. ʒij.

Valerian.

Herb. Euphras.

Semin. Fœnicul. ana. ʒj.

Rutæ ʒß.

Ebor. ppt. ʒß.

⊖is volat. C. C. pur. ʒß.

Ocul. ♂. ppt. ʒij.

Sacch. cand. alb. ʒiß.

M. F. pulv. subt. d. ad scat. Dosis quo-
tidie ʒj. vel ʒiß. Externe conveniunt,
quæ stagnantem pituitam volatilifare
& discutere poterunt, coagulum ni-
mirum acidum resolvendo & edulco-
rando:

rando : Quæ inter referimus *Aquam destillatam ex succo Rutæ, Anagallid. Euphr. Scabios. aut Chelid. maj. Oli albi vel Ois vol. C. C. tantillo acuatam.* Subinde quadrant *Balsama Ophthalmica ex Axungia leporina, felle Lucii piscis, Pinguedine serpentum, cum Saccharo candido, Tutiâ, Succino, Lapide calaminari, & Zio præcipitato albo vel rubro. Pulveres itidem ophthalmici, ex Saccharo saturni, Tutiâ, Succino, Lapid. calam. Sacch. cand. alb. Olo albo & similibus, oculo inspergendi.* Pro re natâ & vesicatorium nuchæ applicabitur, & capilli nimis densi capitis abscindantur. Cicatricem in oculo enatam tutius linques quàm verò tanges. In Diætâ ab *Aëre crasso frigido-humido, & acri rigido, vel etiam nimis æstuante, & acribus halitibus inquinato* : à *Cibis flatulentis, crassis, viscidis, ut & à Vini vel acescentis Liquoris nimio potu, à lucubrationibus frequentibus & diuturnis, ab immoderato Corporis motu* sibi studiose *Ægri* cavebunt.

ALCOLA, vide *Aphthæ.*

ALOPECIA, vide *Capillorum Defluvium.*

ALPHI, vid. *Vitiligo.*

ALVI FLVXVS sive DIARRHOEA, est symptoma excretorum, quo variæ cruditates liquidæ biliofo-aquosæ frequenter in copiâ per alvum excernuntur.

Afficiuntur heic maximè Intestina cum plexibus glandulosis, è quibus potissima fluxus alvini materia in canalem intestinorum destillat, & fibrillis eorundem musculosis, quæ simul crebrò irritantur, & multiplici actu

hinc crispatæ excretionem frequentem instituunt. Atque hæc ipsamet irritatio, crispatioque fibrarum frequens, proximè Alvinos ejusmodi Fluxus producit, quatenus ita non solum motus intestinorum peristalticus augetur, cumque eo fluida materia ad alvum præcipitatur, sed & Abdominis Diaphragmatisque muscoli simul stimulati excretionem crebram promovent. Irritantur autem illæ fibræ ab acrimoniâ humorum, in canalem Intestinalem copiosè jugiterque confluentium, salforum aut simul biliosorum & serosorum; sive dein ex Ventriculo sub formâ Chyli salstioris & serosioris, sive è Massâ sanguineâ per plexus glandulosos intestinales, vel etiam Ductum pancreaticum atque biliarium fuerint transmissi. Occasionem hinc multiplicem huic symptomati præbent, Cibi admodum saliti, fumo indurati, Olera Hortorum laxantia, Fructus horæi, inprimis poma, pruna, mala Persica & Armeniaca, Cerasa, Baccæ Rubi idæi, Ribes, Vvæ, Mustum vinaceum, Cerevisia recens vel acida è nitrosis valde aquis cocta, Vina novella & nondum defœcata, vel aliàs acidiuscula, similiaque copiosius ingesta.

Quandoque etiam vel Ira immoderata, vel Terror inopinatus, per Bilis aut succi pancreatici effusionem, ad hunc affectum confert. Contribuit huc quoque, apud mollioris inprimis texturæ homines, ipse aër externus frigidus, hincque verbi gratia obambulatio per pavimentum lapideum nudis pedibus, poros cutaneos constringens atque

Causa proxima

Causa antecedentes.

Causa provocatæ.

atque Insensilem transpirationem impediendo serositates ad intestinorum glandulas repellens. Reverà enim ab omnibus hisce causis externis & pro-catarcticis, seroso salis biliosive humores in sanguine, inque Intestinis gigni, cumulari atque confluere possunt.

Diagnosis.

Affectus ipse, si quis *Diagnosis* quærat, ex Ægrorum relatione dignoscitur: Affligit autem quandoque cum torminibus Ventris & Colicâ, quandoque sine iisdem: plerumque Appetitus est imminutus, atque stomachus emittit frequenter molestos ructus: adsunt præterea non rarò Inquietudines, flatus atque strepitus Ventris, Murmura hypochondriorum, ob fluctuantem per intestinum Colon materiam; sitis subinde jungitur intensa, dejectio creberrima adest; Excrementa autem sunt vel flavescentia sive biliosa, vel nigra id est acida, vel pituitoso-viscida, vel serosa & aquea, vel stercorea ac foetida, vel cineritia, alba, cretacea, pingua, sebacea, prout nunc hæ nunc illæ particulæ salinæ terrestres aut sulphureæ cum aquosis fuerint permixtæ. Aliquando etiam fluxus hic contingit cum Tenesmo & Ani ardore, ob acrimoniam salis & pungentem excrementitiæ materiæ.

Prognosis.

In *Prognosi* tenendum Diarrhœam aliam esse *criticam*, adeoque Febri continuæ junctam, qua homo vel salutem suam recuperat, vel mortem subit; aliam esse *symptomaticam*, per se sine alio præcedaneo morbo ortam, quæ ad tertium usque diem absque ulu remediorum tolerari potest,

sed ulterius durans sistenda venit; ne quod aliàs facile contingit, in Dysenteriam, Coeliacam passionem, Lienteriam, aut alium deteriorem Affectum mutetur. In Phthisi aut Hecticâ Diarrhœæ solent esse Mortis prodromi. In prægnantibus Diarrhœæ diutius perseverantes Abortum minantur, inprimis si Mensium simul fluxus accedat, aut Tormina frequentia, graviorque non sine Tenesmo jungantur. A nimia Ciborum ingestorum copiâ, vel à Hæcibus aliisve falsis piscibus ac cibis, vel etiam potu qualicunque, assumptis, provenientes Diarrhœæ ut plurimum discrimine vacant. Bonum est si excrementa prius liquida, deinceps spissiora evadere, flatus gigni ac erumpere, incipiant: Pejus autem ubi excrementa redduntur deteriora, viridia, cineritia, nigra, acrida, pingua, graveolentia, cum singultu aliisque signis pessimis, continuè cum virium lapsu apparentia. Lethalis quoque Diarrhœa, si Febribus malignis, pestilentialibus, Pestique ipsi, ut & Pleuritidi, Peripneumoniæ superaccedat, & hinc statim maximum virium lapsum cum aliis symptomatibus gravibus post se trahat.

Curatio hinc pro causarum diversitate instituenda venit. Quod si à cruditatibus pituitosis vel serosis plus minus falsis & acridis proveniat, ante omnia *purgans* lenius est exhibendum, idque vel ex *Rhabarbaro* ad ʒj. cum *Cremoris Fri* ʒß. *Velex Infuso foliorum Sennæ & Rhabbarari*, vel ex *Syrupo aliquo purgante cum Aquâ Cinnam.* & alia convenienti permixto: v. gr.

℞. Rhab. el. ʒj.
 Crem. Fri ʒʒ.
 Ol. Still. mac. gtt. ij.
 M. F. pulv. subt. pro dosi.
 Vel ℞. Syrup. de Cichor. cum Rhab.
 Flor. Persicor. ana. ʒiʒ.
 Aq. Plantag.
 Borrage. ana. ʒʒ.
 Cinnam. ʒij.
 Elect. è succo Rosar. ʒiʒ.
 M. F. potio. detur ad Vitr. pro dosi.
 Vel ℞. Fol. Senn. opt. mund. ʒʒ.
 Rad. Rhab. el.
 Scorzon.
 Apii.
 Caryophyll. ana. ʒj.
 Sem. Anisi.
 Cinnam. el.
 Cremor. Fri. ana. ʒiʒ.
 Incisis contusis & in nodulo ligatis as-
 funde Aquæ font. q. s. stent per no-
 ctem, sequenti manè bulliant parùm,
 hinc colaturæ expressæ ʒiʒiʒ. adde Sy-
 rup. Violar. purp. ʒʒ. d. ad Vitr. pro dosi.
 Delicatiores verò non nisi Clysmata to-
 lerant emollientia & eluentia. v. gr.
 ℞. Rad. Alth.
 Lilior. alb.
 Scorzon. ana. ʒiij.
 Herb. Malv.
 Meliss.
 Parietariæ.
 Flor. Chamomill.
 Melilot. ana. Mj.
 Summit. Cent. min. Mʒ.
 Semin. Cum. ʒij.
 Lini ʒʒ.
 Incisa & contusa eoque in s. q. Aqu.
 communis vel Seri lactis, Colaturæ ʒxj.
 adde.

Ol. rosacei ʒiʒ.
 Mell. Violac. ʒʒ.
 M. F. Clyster tepidè injiciendus. Post
 hæc profunt ea, quæ tonum fibrarum
 Ventriculi & Intestinorum irritatum
 demulcent, atque labefactatum resti-
 tuunt, quæque simul & eâdem operâ
 acres particulas absorbent, cujusmo-
 di sunt Theriaca Androm. Mithridat.
 Damocratis, atque Orvietanum ad ʒj.
 adulto exhibita, vel Theriac. cœlest. ad
 gr. v. in Pilulis pro dosi data:
 ℞. Extr. Tormentill.
 Ther. cœl. ana. gr. v.
 Ol. Still. mac. q. s.
 M. F. l. a. Pilulæ no. vi. d. pro dosi.
 Pro pluribus dosibus seqq. valent.
 ℞. Extr. Consol. maj.
 Tormentill.
 Succi catechu.
 Sang. Dracon. ver. ana. ʒj.
 Cum oleo Stillat. Mac. f. l. a. Pilulæ
 no. XL. Manè ac Vesp. decem suman-
 tur pro dosi.
 Quod si copia seri acris continuè
 in Intestina stillet, conducunt & pul-
 veres diaphoretico-absorbentes ex Terrâ
 sigill. Bolo. arm. Antim. diaph. Smaragd.
 ppt. Corall. Unicorn. foss. C. C. ust. Sang.
 drac. ppt. Diaph. mart. Quibus pro
 re natâ addere licet adstringentia ex
 Succo catechu. Flor. Balaust. pulv. Rad.
 Tormentill. & similibus: Valent & Nux
 moschata, tam simplex quàm condita,
 Macis, Cinam. aliaque aromatica.
 v. gr.
 ℞. Unicorn. foss. ʒiʒ.
 Bol. armen. ppt.
 Terr. sigill. ana. ʒij.
 Smaragd. ppt.

Corall. rubr. ppt.
C. C. ust. ppt. ana. ʒß.
Nuc. mosch. ʒj.
Laud. opiat. gr. IV.
Sacch. ros. ʒij.

M. F. pulv. in viij. part. æq. div. ad ch. m. ac v. dosis capiatur.

Vel R̃. Spod. ppt.

Ocul. ʒ. ppt.
Rad. Termentill.
Succ. Catech.
Nuc. mosch.
Mac. ana. ʒj.
Laud. op. gr. iij.
Sacch. ros. ʒß.

M. F. pulv. subt. in 6 doses æq. ad ch. div. m. ac. v. dosis fumatur. A quibus si speratus effectus non sequitur, protinus ad anodyna simul deveniendum est, qualia sunt Laud. opiat. Essent. opii, Semen Hyoscyam. & Pap. alb. Singula verò hæc vel sub formâ pulverum per se, vel sub formâ Electuarior. cum Conserv. rosar. atque plantag. permista, & Syrupo Corallorum nonnihil emollita. v. gr.

R̃. Conserv. Ros. rubr. ʒj.
Plantag. ʒß.
Condit. Nuc. ind. ʒj.
Rad. Cal. arom. ʒß.
Cynosbat. ʒiß.
Confect. Hyacinth.
Bol. Armen. ppt.
Unicorn. foss. ana. ʒij.
Syrup. Flor. Tunic. q. s.

M. F. Electuar. d. ad Oll. subinde cuspis cultri capiatur. Vel sub formâ pilularum cum extractis Consolidæ majoris atque Betonic. combinata. Sociantur hisce dein subinde Conditura

Cynosbatos, Cydoniorum, Cornorum, Myrtillorum, Nuc. mosch. Nuc. Indic. Rad. Symphit. ut & Confect. catechu. Si vires labascant, Mixtura parabitur cardiaca ex Aquis plantag. Equiset. Agrimon. Bursæ past. Borrag. Bugloss. Meliss. Fœnic. Chamom. Cinam. cydoniat. cum Syrupo Myrtino, Cydonior. Corall. Papav. Rhead. Anodyn. Confect. Alkerm. Vel. Hyacinth. Matr. perl. ppt. Corall. ppt. ʒio diaph. atque Theriacâ celest. v. gr.

R̃. Aqu. Borrag. ʒij.
Burs. past. ʒj.
Cinam. cydon. ʒß.

Syrup. Cydonior.

Flor. Tun. ana. ʒiij.

Confect. Hyacinth. ʒj.

Matr. perl. ppt.

Unicorn. foss. ana. ʒß.

M. d. ad Vit. usurpetur cochleatim. Euporiston est, si Pulvis Nuc. mosch. vel subinde in Ovo sorbili capiatur, vel in Vino rubro bono per se, aut cum saccharo simul sorbilletur. Haustulus Vini Malvatici aut Frontiniaci aut Hispanici, absente febris, vel per se, vel cum frustulo panis tosto, Nuce moschatâ, Cinamomo, Bol. armen. Corall. & Saccharo, aliquoties sumtus non rarò egregiè juvit.

Externè Ventri inungatur Balsamus ex Axung. Capr. Ol. Cydon. Mastich. Nucist. Absynth. Cumin. Anis. Carv. Menth. & similibus: vel imponatur simul Emplastrum de Crustâ panis, aut Crustâ sola panis tosta, Nucis moschatæ pulvere conspersa, & Spir. juniperi vel Anth. vel Aqu. Cinnam. irrorata: Emplastrum item vel Cataplasma

ex

ex Cydoniis in Vini rubro coctis, cum pulvere panis tostis, Succolat. Mastich. Menth. Thur. Nuc. mosch. atque Cinam. quibus etiam Theriacam cum fructu plures addere solent. Aliquando Empl. tenax è Mastich. Tacamah. Ol. nucist. Bol. armen. Cerâ atque Terebinth. componitur & non sine successu applicatur.

*Alvi
refe* ALVI SVPPRESSIO, AD-
STRICTIO vel CONSTIPATIO est affectio corporis præternaturalis, quâ excrementa alvina præternaturaliter in corpore retinentur, & varias homini molestias procreant.

*ars
eta.* Vitium maximè in Intestinis crassis & Alvo, rarò in Intestinis tenuibus hæret, quanquam & obstructio qualiscunque tenuium huic malo ansam præbeant.

*usa
ima* Causa proxima est partim fibrarum Intestinalium musculosarum motus peristalticus imminutus, abolitus, aut etiam impeditus vel inversus: partim fibrarum Musculi sphincteris adstrictio nimia. Nisi enim fibræ intestinorum carneæ suo constrictivo motu excrementitiâ materiam ad Alvum continuè propellant, & adjuvantibus musculis Abdominis similiter contractis, è corpore tandem eliminant, suppressio alvina necessariò contingit. Imminuitur vel aboletur illa actio, quando stimulatio fibrarum deficit, nihilque adest, quod stimulum sufficientem præbeat. Hinc defectus sive Bilis, sive Succus glanduloso-lymphatici aliàs irritantis huc contribuit, si scilicet sanguinea massa spissior & viscidior est, quàm ut vel Bilem satis

acrem, vel succum Pancreaticum, Glandulosumve intestinale sufficientem præbeat, quod in Febribus ut plurimum evenit. Idem defectus notatur quoque, quando vel Glandulæ Intestinales, vel Pancreas, vel Hepar, est obstructum ab humore crasso, acido, sicut in Melancholicis & Hypochondriacis vel in Hydropicis contingit. Deficit tandem si nunc per Cutis, nunc per Renum glandulas sanguineum serum frequenter & copiosè diffuit. Impeditur Actio fibrarum subinde à flatibus nimium distendentibus; subinde à scybalis siccioribus ac durioribus redditis; subinde à Volvulo aut Prolapsu Intestinorum, à quibus causis, non secus atque ab Inflammatione, Subinflatione, Ulcere, Coalescentiâ, Calculis, similibusque Actio eadem invertitur & Ileum excitat. Si denique excrementa alvina pauciora & illa minus acria congeruntur, propter succulentam materiam ferè omnem per Lactea vasa abripi consuevit, tum segnior quoque Alvus redditur, frequenter etiam planè supprimitur.

Procatartica verò Causæ huic malo occasionem præbentes sunt Aër nimis æstuans atque Sudores largos eliciens, Vita multum sedentaria, Negligentia in fœcum depositione, usus Ciborum lentorum, viscidorum & adstringentium, Cerasorum cum ossiculis comestorum: Inedia diuturna, potus Vinorum rubrorum adstringentium, vel Decoctorum maximè siccantium è lignis: Somnus largus, Tristitia & Mœror frequens.

*Causa
proca-
tartica.*

*Diagno-
sis.*

Affectus hic est, in quem Medici Practici apud Aegrotos ferè primò inquirere debent, patescit autem ex simplici relatione Aegrorum. Etenim frequenter subsequi illum solent Colica flatulenta aut biliosa, imò hæc mala sibi invicem subinde ita juncta sunt, ut scire vix liceat, uter alterutrius præcedens causa existat. Comitantur etiam quandoque Cephalalgia, Anxietas pectoris cum inquietudine, tristitiâ, & somno perturbato; Hinc in Passione hypochondriacâ Affectus hic non infrequens. Præterea Morbis à lentore humorum oriundis valde jungitur. Familiaris etiam est pluribus Fœminis, quæ quandoque octidui intervallo alvum vix semel deponunt, atque hinc obnoxie existunt variis Catarrhis, ad dentes vel in pectus aut colum depositis, ut & Cephalalgia, Palpitationi cordis, aliisque jam supra dictis symptomatibus.

*Pregno-
sis.*

Quoad *Pregno-
sis* Affectus hic, si duos tresve solum duret dies, incommodi tantum non parit, diutius autem protractus, symptomatum prædictorum unum alterumve producet. Imò si validè adstricta maneat Alvus, sensim Intestinorum convulsivam Contracti-
nem aut Inflationem, tandemque & Iliacam passionem inducet; Vnde Herniosipost Alvi contumacem suppressio-
nem plerumque Iliaco morbo inte-
reunt. Quæ autem Adstrictio Inflam-
mationem Intestinorum subsequitur, similiter lethalis existit, propter Gan-
grænam & Sphacelum simul acceden-
tem. Suppressio à Calculis Intestino-
rum, his excretis per se curatur; à Coa-

lescentiâ ipsorum autem proveniens, lethalem Ileum post se trahit.

In *Curatione* ad causas attenden-
dam, quod si enim à duritie fœcum & coacervatione excrementorum crasso-
rum atq; durorum oriatur, tum statim *Clyf-mata emollientia* aliquot per vices sunt injicienda. v. gr.

Rx. Rad. Lilior. alb.

Alth. ana. ʒß.

Herb. ʒ. emoll. ana. Mj.

Semin. Anis.

Cumin. ana. ʒij.

Incis. & contus. coque in q. s. Aqu. font. Colatur. ʒbj. adde

Ol. Olivar. ʒij.

⊖is Gemm. ʒij.

M. F. Clyster.

Vel Rx. Decoct. Herb. ʒ. emoll. cum

Betâ & Sem. Cumin, ʒbj.

Ol. Lilior. alb. ʒiijß.

⊖is comm. ʒj.

M. F. Clyster.

Postea autem *Infusum* prodest *Folio-
rum sennæ cum Rhabarbaro, Cremore
Tartari, Radice Cichor. Cinnam. & Pru-
nis.*

Rx. Rad. Liquir. ʒj.

Rhabarb. ʒij.

Fol. Senn. s. stip. ʒß.

Crem. ʒri.

Semin. Fœnicul. ana. ʒj.

Incis. & contus. affunde, Aq. font. q. s. adde

Prun. damasc. no. VI.

Stent per noct. in loco tepid. seq. manè post levem ebullitionem Colaturæ ʒiijß. adde

Syrup. Viol. purp. ʒß.

Fiat potio detur ad Vitr.

Vel.

Vel R̄. *Tamarindorum pulp.* ʒj.
Fol. Senn. opt. mund. ʒv.
Semin. Anis.
Cinam. opt. ana. ʒj.
Coq. invicem in Aq. font. q. s. Co-
latur. ʒiiij. adde
Syrup. Flor. Persicor. ʒvj.
F. pot. d. ad Vitr.

In cibis quoque utilia sunt ea, quæ plurimò gaudent *succo nitroso*, v. gr. *Serum Lactis*, *Beta*, *Brassica*, *Malva*, *Blitum*, potus itidem *aquæ copiosus*, quibus aliquandò substitui poterunt *pinguia* affatim hausta. Nonnunquam in hoc casu alvum laxat potenter, si homo nudis pedibus in pavimento lapideo centum vel plures passus obambulet, vel *lucubrationi nocturnæ* uni & alteri indulgeat.

Si malum provenit à lentore humorum, similiter *Clysmata* injici possunt, ex *Decocto plantarum emollientium*, cum *Electuario lenitivo*, *Melle mercurial.* aut *violac.* atque *Oleo Lilior. alb.*

R̄. *Decoct. Herb. emoll.* ℥j.
Elect. lenitiv.
Ol. Olivar. ana. ʒj.
Θis Gemm. ʒj.

M. F. *Clyster statim injiciend.*

Postmodum intus exhibebitur vel *Infusum folior. Senn.* uti supra, vel *Syrupus aliquis laxativ.* v. gr. *Rosar. solut. s.* vel *compos. Syrup. Flor. Persic. aut Flor. Acaciar. Syrupus de Cichorio cum Rhabarb.* ad ʒij. aut iij. vel *Spirit.* sequens laxativus absente Febri exhibendus.

R̄. *Spirit. Anis.*
Ceras. nigr. ana. ʒʒ.
Magist. Jalapp.

Resin. Scamm. ana gr. iiij.

Solve lento igne & adde, vel Syrup. Violar. vel Julep. rosacei ʒij. M. pro dosi. Aliis arridet fortè magis *Sal. polychr.* ad ʒʒ. vel ʒvj. pro dosi, cum *Ptisanâ* aut *Jusculo* hauriendum; In hoc casu quoque alii *Fumum Tabaci* subinde suctum, non sine successu commendant; Interdum etiam *Butyrum* vel *Oleum Olivar.* optimum jejuno stomacho ingestum conducunt.

Commendamus hic quoque si Alvus segnis sit, & frequenter adstricta, *Anisum laxativum* ad ʒj. *Passulas* aut *Pruna laxativa* ad ʒvj. *Electuar. de Tamarind.* ad ʒj. *Vini* nondum defæcati vel *Cerevisiæ* haustum inconsuetum: *Pilulas Francofurtens.* no. 13. horâ ante cœnam, vel usuales nostras aliasve: *Descriptio* nostrarum sequens est:

R̄. *Mass. pilul. Eman.* ʒj.
Extr. Liquir. ʒj.
Resin. Jalapp. ʒʒ.
Elix. propr. q. s.

M. F. *pilul. gr. ij. magnitud.*

Capiantur octo usque ad decem pro dosi ante cœnam; *Serum lactis* quandoque hauriendum, inprimis *tamarindinatum*; *Balnea aquæ dulcis* æstivo tempore; frequentia *Clysmata emollientia*, *Olei*, *Butyri*, *Acetariorum*, *Passularum minor.* *Acidularum*, *fumi Tabaci* aut *similium* usum, prout Homo nunc in hoc, nunc in illud magis propensus est. *Pulvis* sequens ad ʒj. subinde sumtus multos juvat.

R̄. *Pulv. fol. Mercurial.* ʒʒ.
Senn. ʒij.
Gemmar. Sambuc. ʒj.
Crem. Fri ʒʒ.

Cinam. ʒij.

Sem. Anis. ʒj.

Sacch. alb. ʒß.

M. F. pulv. subt. d. ad. Scat.

Quandoque unicus *Pulvis Mercurialis* ad ʒj. cum jusculo datus juvat. Nonnunquam solus *Crem. Fri* ad ʒij. vel ʒj. sumtus alvum laxat. Sunt qui eum in finem quotidie vel *Mannæ* frustum, vel ʒj. *Rhabarbari* manducant. Verno & autumnali tempore autem *Vinum medicatum laxans* bibere cum fructu solent, v. gr.

R. Radic. Apii. ʒj.

Liquir. ʒij.

Herb. Agrim. Miß.

Fragar.

Violar.

Meliss. ana. Mj.

Rec. Nasturt. Mß.

Sem. Anis.

Cinnam. el. ana. ʒiß.

Folior. Senn. opt. mund. ʒj.

Agaric. trochisc. ʒvj.

Sal. polychr. ʒij.

Incis. contus. & sacculo illigatis affunde

Vin. alb. Veter. Mj.

Aq. font. Mß.

Stent prima nocte in loco tepido, postea singulis manè *Cyathus ʒiiij.* exhauriatur.

Quod si in aliis Morbis *Constipatio alvi* simul adsit, occurremus eo modo, qui suis locis peculiaribus est indigitatus. *Alvi obstructio* apud *Infantes lactentes* curatur, exhibendo *Nutrici Infusum folior. Senn.* aliudve *purgans mitius*, *Infanti* autem injiciendo *Clysmata emollientia*, aut indendo

Suppositoria varii generis, è *Melle tantillum salito & cocto*, *Butyro cum saccharo & Croco*, *Nodulo ex sindone*, cui *Crocus & Saccharum cum Albumine ovi* inest, *Sevo Cervino*, *Axungia bubulâ*, nonnihil *salitâ*, *Radice Petroselini*, & similibus *Oleo* probè inunctis. Intus autem simul propinabitur *Manna*, subinde in *Jusculo* vel *Lacte soluta* ad ʒß. vel ʒj. aut *Syrup. Flor. Acac. Flor. Persicor. Rosar. solutiv. simplex*, *Mel roseum* à ʒij. ad ʒj. vel ʒiß. In *Pulmentis* semper aliquid *Butyri* cum *Pulvere Radic. Ireos Flor. & Sem. Anis.* datur.

Externè in *Alvi Suppressionibus* prodest *inunctio* totius *Abdominis* cum *Oleo Chamomillæ*, *Butyro recenti*, *Axungia* qualicunque, inprimis *bubulâ*. *Umbilicus* verò inungi poterit *Unguento de Arthanitâ* cum *Oleo Colocynthidos*, *Pinguedine anserinâ* vel *gallinaceâ*, *felli Tauri inspissato* & similibus. Sæpius *Balneum Aquæ dulcis* cum *incoctione Herbarum emollientium* citò juvat. *Æstivo tempore Aquæ minerales* *salsulæ* vel *Acidulæ*, vel *Serum Lactis Caprilli* cum *regimine diætæ* assumi potest, non secus atque *Balneum* ali-quod usurpari.

In *Diætâ Olera hortensia*, oleosa, *Butyraceâ*, subinde *salita* amentur. In potu, *Vinum album* concedatur mediocre.

AMAVROSIS, vide *Gutta Serena.*

AMBLYOPIA, vide *Visus Hebetudo.*

AMBVSTIO, COMBVSTIO, VSTIO, est solutio continui in partibus solidis quibuscunque cum inflammatione,

tione, dolore ardente, atque crustâ aut vesiculis nunc majoribus nunc minoribus, & inde subsequente exulceratione, à rebus urentibus ignitis, producta.

Itaque *Subiectum* hujus mali præbent, tam partes externæ & solidæ, molles atque duræ, in quas quidem res urentes incidere possunt; quàm etiam nonnunquam palatum atque gula, quæ non rarò à deglutitis rebus valde calidis similiter comburuntur.

Differentiæ Ambustionis sunt variorum, & quidem 1. Ratione graduum, alia extimam solum cutim occupat, & primi gradus Ambustio vocatur; Alia cutim atque panniculum carnosum simul affligit, & secundi gradus; Alia tandem ad substratos usque musculos penetrat, & tertii gradus Ambustio nuncupatur; 2. Respectu symptomatum alia Ambustio vesiculas majores aut minores excitat; alia nullas, sed cutim tantum exsiccat, & si gravior evaserit, crustam vel escharam producit nigricantem.

Causa proxima hujus Affectûs, sunt particulæ quorumcunque corporum ardentium igneæ, pyramidales, pungentes, atque scindentes, in rapidissimo motu existentes, corpori diutius breviusque applicatæ, ejusque tubulos ac fibrillas dilacerantes, discindentes aut crispantes, & hinc vel statim exsiccantes citra vesiculas, vel crustam quoque duram excitantes, vel lympham è dilaceratis vasculis eliciendo atque coacervando pustulas excitantes. Ita ferrum, lapides, ligna, aqua, metalla, cera, aliaque corpora inanimata & ar-

dentia igneis suis moleculis noxam hanc inferre solent. Quo pertinent & Cauteria potentialia, sive Vesicatoria atque Corrosiva, nec non Calx viva aquæ affusione æstuans, fulmen, & combustio à globulis sclopetariis facta.

Non parum in hoc situm est, ut Combustionis scias, dignoscasque gradum. Et quidem primus illius gradus cognoscitur, partim ex rubedine simplici, ac tantillâ intumescentiâ cutis, cum dolore acerbo & pungitivo, partim ex instrumenti sive rei urentis lenitate, partim è breviori applicationis tempore; Contingit autem ferè hic Ambustionis gradus ab Aquâ fervente, vel à Pulvere pyrio accenso, vel à scintillâ ignis, vel à Lino, stupâ, stramine, Cannabi, similibusque accensis, ac obiter duntaxat cutim ferientibus. Secundi gradus autem symptomata sunt vehementiora, ignita enim materia corpori Patientis applicata, diutius tenetur, vel crassa, tenaxque existit, ut inde pars in Vesicas attollatur, maximè doleat, ardeat, & rubescat; etiam Cutis vel simul Panniculus carnosus affligitur: prout hoc faciunt superius recensita, sed diutius cutim ferientia, item Oleum, oleosa omnia ac resinosa accensa, Phosphorus in flammam suscitatus, cera qualiscunque ardens.

In tertio Ambustionis gradu Cutis, Panniculus carnosus, atque substrati Musculi, Venæ, Arteriæ, Nervi, alique gravius læduntur, incrustantur, atque exsiccantur, non sine sensationis ablatione, aut etiam Gangrænâ & Sphacelo. Quale quid contingere observatur à Metallis fuis, Chalybe, Auro,

Diagnosis.

Auro, stanno, lignis, aliisque duris rebus ignitis, ac corpori diutius applicatis.

Prognosis

Si spectemus *Prognosin*, levis Combustio facile sanatur, nulla etiam remanente Cicatrice. Maxima verò, quæ nimis profundè membranas, vasa, musculos, fibras, ac tendines combussit, periculi plena est, atque non raro Sphacelum, mortemque post se trahit. Periculosa etiam Combustio habetur partium sic dictorum nobilium, prout Intestinorum, Oculorum, Fau-cium, Temporum &c. Omnium verè periculosissima à fulmine oboritur, utpote quæ difficilius extingui potest. Sed & malam quoque eam judicant, quæ ab Aquâ falsâ fervidâ, aut ab Alumine, Sapone, Oleo, aut etiam ab haustu Aquæ corrosivæ fuit inducta. In corpore cacochymico haud difficulter Ambustio mutatur in Vlcus malignum atque phagedænicum. Combustio nervos & tendines crispans, facile convulsiones post se trahit, & in Sphacelum crebrò mutatur lethalem. A Fulmine excitatæ combustiones, non rarò perfectè curantur, & sanantur. Vidimus sic Rusticam, cui cutis dextri brachii ab axillâ usque ad extremos manus digitos, & cutis sinistri pedis usque ad digitorum extremitates, penitus exusta, atque unico temporis momento ita consumpta fuit, ut nudi comparerent, rubentes & succulenti muscoli: & hæc tamen foemina perfectè restituta fuit.

Curatio.

In *Curatione*, quod ad *Diatam* spectat, Aër externus, imprimis frigidior, à parte affectâ arceatur, hincque

Æger in temperato sit conclavi. In *viciis* exulent omnia acida, salsa, atque nimis acria & aromatizata, Somnus & Vigiliæ, Motus & Quies non præternaturaliter sint constituta, imprimis autem moderationem *Animi pathematum* valdopere suademus.

Ipsam quòd attinet partem, ante omnia requiritur, ut fibrillæ dilaceratæ à nimia cincinnatione & crispatione dolorificæ immunes præstentur, atque humorum circulatio, quamprimùm suæ integritati per *volatilia spirituosæ & sulphurea, alcalina, absorbentia*, quæ particularum ignearum spicula absument, restituatur. Veteres dixerunt Empyreuma sive atomos igneas statim esse evocandas. Quòd si ergo levis sit combustio, res non erit tanti momenti, quin brevi non per *Albumen ovi*, tanquam volatile blandum remedium, vel per *Balsama* aut *Olea* convenientia eidem mederi queamus: In hoc autem casu nonnulli statim, non sine ratione, partem combustam ad educendum Empyreuma igni propius admove-re, vel *Aquæ Vinoque calidis* aut *Aqu. Calcis vivæ, spiritui Vini camphorato* permistæ & calefactæ, immergere, vel *cepas* in mortario *tusas* cum *Sale*, aut etiam *lintea muriaticæ* cui-dam *aquæ* vel *succo Betæ, Sempervivi, Cochlearum*, vel *Astacorum* calenti immer-sa, applicare solent. Alii currunt statim ad sua *Unguenta* contra *ambus-siones*, qualia quidem à diversis cum successu in usum vocantur. In quibus præferimus *Oleum Lil. alb. Rosarum*, vel *Hyperici*, vel etiam *Butyrum* aut *Axungiam Caninam*, cui folia *He-deræ*

deræ arboreæ aut Card. bened. aut Sem-
pervivi, aut Rutæ recentia & succulen-
ta fuerint incocta, cum Calce vivâ, Tu-
tiâ, aut Lapide calamin. permista. v. gr.

R̄. Olei Lini.

Rosar. ana. ʒj.

Unguent. Popul. ʒij.

Mucilag. Semin. Cydon. Aqu.

Chelidon. extr. ʒiʒ.

Vitell. ovor. no. ij.

Spirit. Vin. Camphor. ʒʒ.

Ceruss.

Tut. ppt. ana. ʒiʒ.

Sach. Saturn. ʒj.

M. F. Unguent &c.

Vel R̄. Pingued. Cervin. ʒij.

Axung. Porc. ʒj.

Olei Ovor. ʒiʒ.

Hypericon.

Rosar. ana. ʒvj.

Calc. viv. pulv.

Tut. ppt. ana. ʒʒ.

Camph. ʒiʒ.

M. F. Unguentum.

Vel R̄. Ungt. alb. campb. ʒj.

Olei Ovor. ʒvj.

Bol. armen.

Minii.

Lapid. Calam. ppt. ana. ʒiʒ.

M. d. ad Ollam.

Vel R̄. Butyr. rec. n. salit. ʒij.

Vitell. Ovor. no. ij.

Ol. Hyperic. ʒj.

Calc. viv. ʒʒ.

M. d. ad Ollam.

R̄. Fol. rec. Semperv.

Heder. terr.

Rutæ.

Quercus. ana, Mj.

Radic. Cepar. ʒʒ.

Incis. & contus. coq. in s. q. Butyr.
rec. non saliti, trajice hinc per colum,
agita, donec consistentiam Unguenti
acquisiverit. Præstat etiam Oleum
lucernarum antiquum cum liquore
Lardi liquefacti; Imò vix citius est
præstantiusque remedium, quam sta-
tim Spiritum Vini calefactum, vel Spi-
ritum Vini camphoratum, vel Spirit.
Anthos, Lilior. convall. aut similem fre-
quenter applicare.

Combustio secundi gradus requi-
rit primò applicationem spirituosorum
ad empyreuma evocandum, quemad-
modum est Spirit. vini camphoratus,
Creta vel Calx viva cum Spiritu Vini
mista, Aqua ad ambustionem Querceta-
ni, Aqu. Anhaltin. Aqu. Calc. viv. cum
Alb. ovi. permista; Deinceps Vesiculæ
nisi majores sint, relinquuntur, si verò
majores extiterint, forfice aperiantur,
sed cuticula non auferatur, hinc Un-
guento diligenter Vlcus inungatur ex
Oleo Lini, Ovor. Rapar. Rosar. Nucum,
Hyperici, Lil. alborum, Violar. cum
Mucilagine Sem. Cydon. aut Psyllii Aqu.
ros. fact. Calce item vivâ, Mino, Ce-
russâ, Lithargyr. atque Camphorâ. v. gr.

R̄. Axung. Murium alpin. Vel
Porci ʒij.

Olei Lin.

Rapar.

Ovor.

Mucilag. Sem. Cyd. Aq. ros.
fact. ana. ʒj.

Ceruss.

Lytharg. ana. ʒʒ.

Camph. Spir. Vini solut. ʒiʒ.

M. F. Unguent. d. ad Ollam.

Hinc etiam inunctæ Parti pro lubitu
simul

simul applicabitur *Epithema* aut *Fomentum* ex *Decocto Herb. traumatic.* ac *cephalicar.* in *Vino albo* factò, cum *Spirit. Vini camphorat. Tinctur. Galb. Spirit. Matricali, Anthos, Meliss. Ceras. nigr. Lilior. convall.* adpersi. Placet heic aliis *Cataplasma* magis ex *stercore Bubulo* vel *Fimo columbino, Gallinac. Anserino, aut Equino, vel Pomis putridis, cum Oleo Ranarum, Bolo armen. Cortex medianus, Sambuci, Momordica, Cepæ, Allia, Fol. Heder. arb. Scordii, Alliar. Salvæ, Plantag. Semperviv. Teleph. Rutæ, Flores Sambuci, Rapistr. Malv. & similia* in *Butyro* aut *Oleis cocta* atque *colata*, egregium *Balsamum* exhibent *antipyreticum*, cum *pulveribus* supradictis commodè miscendum.

Si *Crustæ* vel *escharæ* adsint, tum *emollientiâ* statim applicentur, v. gr. *poma putrida* cum *butyro* aut *lardo* mista; *Cepæ* vel *Allia contusa* cum *Butyro, Folia Malvæ, Parietar. Verbasc. Sempervivi, Plantag. & simil. conquassata* itidem & *Cataplasmatibus* vice applicata. Vel *avenacea farina* cum *Succo Betæ, Cepar. &c. Butyro*, incoquatur, & imponatur. Addere licet *Pulverem fuliginis, Stercus gallinaceum, Saponem venetum.* Si *eschara* crassior ac profundior existat, *scarificare* eam poteris pri⁹, antequam modò dicta applicabis. Separatâ *escharâ* *Vlcus* solito more curabis: inprimis heic *Unguentum Basiliconis* confert. *Combustio* in partibus *tendinosi* & *nervosi* omnium optimè *Epithematibus* superius jam allegatis curatur. Vbi ossa simul sunt ulsa, vel eximantur forcipe, vel paulatim eorundem separatio expectetur

medelâ convenienti, per siccorum impositionem sub titulo de *Carie* indigatatam, citra oleosorum usum adhibita. *Combustio* à pulvere pyrio nihil peculiare præter hætenus dicta desiderat, neque opus est grana ejusdem pulveris cuti infixâ instrumentis cum magno dolore & *Inflammationis* ulterio-
ris periculo eximere, quin eadem vel per se ab ipsâ Naturâ foras extruduntur, modò pars nonnihil exulcerata imposito *Unguento digestivo*, cum *Gummi Elemi & Galban.* retineatur, ut fibrillæ nimis crispatæ iterum emollian-
tur, sicque natura sponte illa granula propellere & excutere queat. Tandem & à fulmine induc-
ta *Combustio* iisdem *externis* curari solet *topicis*, internè saltem exhibendo *antifebrilia*, atque *diaphoretica*, ad sanguinis circulationem tutam præstandam.

Oculorum *combustio* eadem requirit medicamina, quæ in *Ophthalmiâ* conveniunt, inprimis è *Mucilag. Sem. Psyll. ac Cydonior.* parat.

Tertius *Ambustionis* gradus eodem modo ac secundus tractatur; per *externas inunctiones, fomentationes*, atque interna *diaphoretica, antifebrilia.* Omni modo præsertim *Gangræna* ac *Sphacelus* præcaveantur per *Spirit. matricalis, Vini camphor. Tinctur. Castor. Tinct. Galb. Balsam. nervin.* applicationem, & alia suo loco ad *Gangrænam* commendata.

AMYGDALARVM Affectus.

Vide *Tonsillarum Morbi.*

ANASARCA. Vide *Hydrops.*

ANÆMIA est defectus sive penuria sanguinis per universum corpus, debitæ

debitæ nutritioni, sanitati ac robori ejusdem conservando insufficiens.

Peccat itaque heic Massa sanguinea intra arteriarum venarumque canales contenta, & quidem quantitate deficiente.

Affectus crebrior quam ut à Medicis probè semper observetur, à variis admodum Causis produci solitus. Etenim deficit primò sanguis, quando non sufficiens chylus, tanquam proxima sanguinis materia, è primis viis transmittitur. Per Chylum insufficientem heic intelligimus non vitiosum aut cacochymicum humorem, sed succum laudabilem in Ventriculo probè elaboratum, minori quantitate sanguinis latici exhibitum, quàm quidem alias ad debitam fibrarum elasticitatem, & copiam sufficientem Spirituum animalium, pro actionum corporis omnium conservatione, producendam fieri deberet. Secundò deficit sanguis, quando sub Hæmorrhagiâ aliquâ nimîâ per Nares, Pulmones, Alvum, Hæmorrhoides, Vterum, Renes, vel etiam è Vulneribus largiùs effluxit. Accedit huc etiam subinde debiti nutrimenti defectus, ob ciborum sufficientium inopiam. Imò potest simul per nimios Sudores, Diarrhœam, Dysenteriam, Fluxum Hepaticum, Diabetem, sanguis imminui.

Signa diagnostica Anæmiæ sunt, Hæmorrhagia quædam insignis prægressa, virium defectus sine ullo alio præsentem morbo, pallor faciei, ad motum ineptitudo vel segnities, somnolentia, alimenti penuria ob paupertatem, curtamque domi suppellectilem.

Quod *Prognosis* concernit, etsi Affectus hic apud Præcticos hætenus non magnæ fuerit considerationis, atque hinc à paucissimis vel nullis fuerit adnotatus, publicisque scriptis explicatus, frequenter tamen apud homines, sive alias sanos sive ægrotantes, occurrere solet, hincque medelam requirere, ne in pejus Ægri dispositio mutetur. Etenim sanguinis defectum subsequi solent ut plurimum Cachexia, Caco-chymia, Apepsia, Hydrops, aliive morbi non contemnendi.

Curatio proin aliqua venit instituenda, eaque ferè unicè eo dirigenda, ut Sanguinis floridi sufficiens copia restitatur, quod quidem fit & præstat non Venæsectionibus aut purgantibus, non sudoriferis aut diureticis, sed solis analepticis atque multum nutritivis Cibis cum addito potu spirituofo convenienti, eoque moderato. Commendamus proin è culinis non tam Olera varia, quàm verò imprimis carnes teneriores *Animalium* tam *volutium* quàm *quadrupedum*, Panem triticeum benè fermentatum & coctum, Juscula hordeacea, farinacea, avenacea. Quibus adde potum moderatum Vini generosi, tenuis, digestionem Ventriculi optimè juvantis. Placet & usus Gelatarum expedibus vitulinis, Gallinis, Gallis gallinaceis, Caponibus factarum, vel Juscula consumata &c.

Si frequens adsit Hæmorrhagia, è Remediorum adstringentium Classe usurpanda erunt, quæ sanguinem non nihil incrassare solent, v. gr. Conservæ Rosar. Plantag. Bellid. Violar. flor. Tunic. cum Bolo armen. Terr. sigill. Corall.

Matr. perl. ppt. Margaritis ipsis, Unicornu foss. Confect. Alkerm. & Hyacinth. &c. Pro potu autem inserviet Emulsio Amygdal. cum Aquâ Tormentill.

Angina.

ANGINA est Inflammatio musculorum palatinorum partiumque adjacentium, cum magno ardore, respirandi & deglutendi difficultate, Colli constrictione quasi laqueo factâ, febre aliisque gravibus symptomatibus Hominem periculosè affligens.

Parti affecta.

Afficiuntur heic graviter Fauces, & quidem nunc Larynx cum suis musculis tam communibus quàm propriis, nunc Musculi Linguae, Pharyngis atque Ossis Hyoidis. Hinc *Differentias* Mali hujus constituunt Auctores varias, sed non nisi à musculorum diversitate oriundas. Etenim *Cynanchen* vocant, quando muscoli interni Faucium & Laryngis sine tumore sunt inflammati: *Paracynanchen*, quando Inflammatio hæret in externis Colli musculis: *Synanchen*, quando interni Musculi simul cum Inflammatione tument: & *Parasynanchen*, quando externi Musculi inflammati sunt atque tument. Hæ autem distinctiones in Praxi medicâ tantæ non amplius sunt sive æstimationis sive usus; *Anginæ* enim aut *Cynanches* vocabula, citra curiosiorem hujus aut illius musculi indagationem solùm usurpari solent.

Causa.

Causa hujus Mali *proxima* ferè est stagnatio lymphæ & sanguinis in tubulis Partis affectæ contingens, dum v. gr. lymphæ acrior justo & acido-salina, plus minus glutinosa, poros istorum tubulorum transire & penetrare nequit, proin hinc subsistens, inque motum intestinum rapidiorem à tran-

seunte cum impetu materiâ subtili adacta, membranulas à se invicem distendit, spiculisque insuper suis pungendo, dolorem ardoremque, nunc sine tumore, nunc etiam cum tumore producit, quando scilicet vascula sanguinea arteriosa simul crispata & contracta sanguini circulanti transitum denegant, & sic eundem noviter continuè appulsum accumulunt. *Antecedenter* ad Anginæ productionem contribuunt 1. *Cacochymia* acida, salino-pituitosa, sive salia austera in sanguineo latice coacervata, atque lympham determinatè sic inviscantia, ut occasione datâ in tubulis musculorum affectorum magis quàm aliarum partium obhæreant. Hinc Arthritici & Podagrîci huic Mali quoque præ aliis obnoxii sunt. 2. Febres continuæ, in primis ardentes aut malignæ, in quibus non raro ob Lymphæ acris visciditatem faucium muscoli inflammantur. 3. Saliva acris & salso-acidiuscula; 4. Bilis aut Succus pancreaticus; vel 5. etiam Chylus ipse acrimoniæ ejusmodi acidæ caractere maligno notatus. 6. Dispositio vasculorum in dictis musculis ad facilem constrictionem inclinantium, imò eandem promptè à turgescentiâ quâdam sanguinis, aut à transeunte forsan potu gelido, acidove austero, acquirentium; quod frequentius tamen evenit illis qui obesiorem colli structuram obtinuerunt. *Causæ externæ* sunt Cibi multum saliti, acidi, austeri, vel etiam fumo indurati, fructus horæi multum sæpiusque comesti, Vina generosa largius hausta, in primis ea, quæ multis gaudent fixis sulphureisque partibus: Aër vel æstuans,

fluans, & sanguinis turgescientiam produ-
cens, vel etiam frigidus & particu-
lis rigidis multum imprægnatus, æ-
stuante præprimis corpore inspiratus.

Signa *diagnostica imminentis* An-
ginæ sunt incipiens Difficultas respi-
randi ac deglutiendi, cum Dolore acu-
to, præcipuè circa fauces molesto, Ar-
dore palati, ipsiusque Colli mobilitate
difficili, Cephalalgia, Maxillarum in-
tumescentiâ, Genarum rubore, Salivâ
viscidiorè & pauciorè, atque stertore
aliquo in imis faucibus apparente;
Præsentis verò Anginæ indicia sunt
deglutiendi maxima Difficultas, at-
que hinc potulentorum per nares fre-
quens rejectio, Salivæ visciditas ma-
gna, Respiratio ferè abolita cum Colli
constrictione ceu laqueo factâ, suffoca-
tionisq; metu; Ægrotus simul excreare
citra intensissimû dolorè nequit, insigni
quin & anxietate præcordiorum ac in-
quietudine torquetur; Tument in fa-
cie & Capite aliquantillum Venæ cum
Genarum magno rubore, ardor in fau-
cibus & collo magnus adest; Livet aut
nigricat Lingua, simulque viscidâ sa-
livæ falsæ amaræve copia oblinitur;
Febris jungitur plus minus acuta, con-
tinua, exacerbationibus quandoque
molestis stipata, cum siti inextingui-
bili, delirio non infrequenti, vigiliis
perpetuis, oculorum prominentiâ, pul-
su parvo, debili, ac subinde inæquali
aut inordinato.

In *Prognosi* Affectus hic periculi
habendus est plenus, subinde celeriter
& intra 12. ferè horarum spatium, ho-
minem interimens: Tumores faucium
in Anginâ sine evidenti ratione eva-
nescentes, mortis certissimi sunt præ-
nuntii.

Quo Febris malignior jungitur &
ardentior, eo etiam discrimen majus,
quo autem illa remissior, quoque mi-
nor adest tumor, respirandi que diffi-
cultas levior, eo etiam periculum mi-
nus existit. Angina procedente, sym-
ptomatumque vehementiâ auctâ, si
spuma circa os apparet, lethale signum
pronunciabitur. Angina in absces-
sum mutata suffocat brevi Hominem,
nisi pus copiosè excreetur: Tumor ru-
borque à Collo abscedens, & in pectus
aut aliò proficiscens cum remittenti-
bus symptomatibus salutem promittit.
Tripliciter ergo finiuntur Anginæ, vel
enim citò evanescunt, restitutâ circu-
latione, vel paulatim discutuntur, vel
suppurantur, & interdum in Ulcera
diuturna mutantur, vel denique Ho-
minem veluti strangulando interi-
munt; Anginosi enim non nisi suffo-
cantur, & quidem, si morbus gravissi-
mus, intra diei unius vel alterius spa-
tium jugulantur. Qui semel Angi-
nam pallus est, facilè in eandem occa-
sione datâ recidit, ob dispositionem fi-
brillarum & tubulorum, deinceps faci-
lius acriores humorum particulas ad-
mittentem.

Curatio absolvetur stagnantis & *Curatio.*
Inflammantis humoris citâ tutâque
resolutione & discussione, quod obti-
neri non melius potest, quàm statim Ve-
nam in brachio, hinc & Raninas sub
linguâ secando; Deinceps ea medica-
mina exhibendo, quæ tam extus quàm
intus scopo modò dicto satisfacere pos-
sunt. Externè itaque sæpiùs inunge-
tur totum Collum *Oleo rosac.* aut *Lil.*
alb. similive, hinc imponuntur *linthea*
dupli.

duplicata Spir. Vini camphorato aut theriacali, cum Spirit. Lumbr. terrest. alioque volatili salino permisto madefacta:

℞. Olei Chamom. (v. gr.

Rosar.

Amygdal. amar.

Violar. ana. ʒiiss.

Lil. alb. ʒiiss.

Camphor. ʒj.

M. d. ad oll. Quo Collum ter quotidie inungatur, super imponendo lanam succidam.

Vel ℞. Spir. Vini campb.

Theriac. campb. ana. ʒj.

Lumbr. terrest. ʒʒ.

Formicar. ʒij.

M. d. ad Vitr. Linteola in hoc madefacta subinde applicentur calidè.

Multum nobis præstitit quoque Cataplasma è Nido Hirundinum, Fimo columbino, Roob sambuci, floribus Sambuci, Meliloti, Chamomill. Bacc. Laur. Junip. Scord. Rutâ, & similibus cum Vino aut Lacte coctum. Lanam. Succidam nigramque, Oleo Rosar. vel Amygd. amar. inunctam alii Collò circumponunt, vel applicant Emplastrum de Meliloto, aut Ceratum simplex è Cerâ flavâ seu virgineâ cum Oleo Lilior. alb. Rosar. vel Melilot. parato. Ditioribus imponi potest Cataplasma è Theriac. Roob. Junip. Camph. atque salibus volatilibus. Gargarismata meliora componuntur ex Decocto Cancror. fluviat. Salv. Major. Scordii, Fumar. Brunell. Consolid. med. Flor. Ligustr. ac Malv. arbor. cum Aq. Simpl. factò & colato, præprimis si in eodem dein adhuc solvatur Mucilag. Semin. Psyll. Aq. Chelidon. extracta, cum Roob Dianuscum,

Melle rosaceo ac Spiritu theriacali simpl. vel Camphorat. v. gr.

℞. Decoct. Cancr. Fluv. cum Salv.

Brunell. Flor. Lig. ʒʒj.

Mell. rosac. ʒiiss.

Roob. Dianusc. ʒj.

Mucilag. Sem. Cydon. Aq.

Plantag. fact. ʒvj.

M. d. ad Vitr. Gargarizetur calidè.

Vel ℞. Aqu. Scabios.

Brunell.

Flor. Lig. ana. ʒiv.

Roob Dianusc.

Sambuc. ana. ʒiiss.

Spirit. Theriac. campb. ʒvj.

M. d. ad Vitr.

Alii sumunt Aquas destillatas Fumar. Scabios. Brunell. Flor. Ligust. Ulmar. cum Roob Dianuscum, Diamorom, atque Mucilage Semin. Cydon. & sic in Faucibus frequentem earum haustum calidè tenent, sine multâ gargarisatione & agitatione, utpote quâ plerunque Malum augetur magis quàm minuitur. Si Angina his non obstantibus Abscessum minatur, tum omni arte curandum, ut idem promptè maturetur, ruptusq; in Fauces suum pus emittat, quò sic commodè exspui possit; Hunc in finem præstant Gargarismata ex Malvâ, Alth. Flor. Chamom. Melilot. Ficus atque Croco in Lacte decoctis. Quibus ad faciliorem ruptionem tandem addere debemus Allium vel Cepas. Externè in hoc casu simul continuabitur applicatio Cataplasmatum supra dictorum, vel imponetur aliud è Medullâ Panis, Radicibus Lil. alb. Alth. Farina. Sem. Lin. Fœni græc. Croco ac similibus cum Butyro & Oleo Verbasci coctis.

Abscess.

Abcessus ruptus detergetur elotione frequenti cum *Aq. Chelid. majoris*, *Florum Sambuc. Scordii. Mell. rosac.* ac *Syrup. è Rosis siccis*, addita *Essentiâ Myrrhæ, Aloës, Bellid. minoris, Numulariæ, &c.*

In extremo necessitatis casu, quando Homo tantum non suffocari creditur, sine ullâ hæsitazione ad *Laryngotomiam* deveniri posse præstantiores Medici & Chirurgi autumant. Sed cum hoc remedii genus subinde periculi plenum sit, in circumspiciendi Celibriorum alius Medicorum Praxi in usum trahi vix solet. Quod si tamen instituere velimus Operationem, sequenti ferè modo expediri poterit. Primò cutis antè in Collo ad Laryngem usque per longitudinem inciditur, hinc diductâ Cute scalpellum inter tertium & quartum annulum cartilagineum Bronchii per intermediam tunicam adigitur, foramenque efficitur, in quod Cannula plumbea vel argentea, alis prædita, inditur, & tamdiu ibidem pro æris inspiratione relinquitur, donec faucium Inflammatio discussa fuerit. Postmodum exemptâ Cannulâ Vulnus debito modo per *traumatica nervina* consolidatur.

Quoad *Diætam* Aer sit maximè temperatus, transpirationem insensibilem minimè impediens; hinc omnis humidus, pluviosus, fumosus, austerrus, frigidusque fugietur. *Cibus* in ipso Malo præter juscula minus pinguis nullus præbeatur: Ad præseruationem autem convenit eupeptus, tenuis, parcus, minimè acidus aut austerrus, hincque non adeò falsus, vel

fumo induratus, vel aliàs-lentum, viscidum, acremque Chylum exhibens. *Potus* convenit ex Hordeo, cum radic. *Scorzoner. Rafur. C. C. & Herb. Agrimon.* in Aqu. coctâ, cui vel *Syrupum Viol. vel Papav. rb. Citri aut Granat. acid.* pro lubitu admiscere poterimus. *Somnus* moderatus conciliabitur *Emulsionibus refrigerantibus*, ex *Semin. frig. & Papav. alb. Animi pathemata* vehementiora cane pejus & angue fugiantur. Si alvus sit obstructa, sollicitabitur Clysmatibus aut suppositoriis. Æstivo tempore potus *Acidularum*, vel *Thermarum* quarundam, veluti *Fabariensium, Embsensem, Plumbariensium*, cum regimine Diætæ necessarius est. *Balnea* nocent. *Setaceum* in nuchâ, vel *Fonticulus* in alterutro brachio non sine fructu excitatur.

ANEVRISMA vel **ARTERIÆ DILATATIO** est tumor alicujus partis mollior, continuò pulsans, digitis facile cedens, sed statim iterum sese expandens, ab Arteriæ tunicarum ruptione originem ducens.

Pars affecta est Arteria aliqua hujus vel illius partis: Observationes enim testantur in Naribus, Brachio, Collo, Pedibus, aliisque membris, Aneurismata contigisse. Neque tamen in externis tantum partibus malum hoc evenire solet, verum etiam aliquando in internis contigisse observatum est.

Pro *Causâ proximâ* meritò agnoscimus rupturam tunicæ Arteriarum internæ, (ex glandulosâ, fibroso-membranoso - musculosâ substantiâ constantis) exterioris verò, utut sæpius

Aneurisma.

Subjectum.

Causæ.

pius etiam pertusæ dilatationem. Ruptura illa frequenter à pertusione Arteriæ in Brachio producitur, quando sanguis è disruptâ interiori tunicâ copiosius effluens, neque citò satis per exterioris cartilagineæ tunicæ foramen exire potens, inter utramque adigitur & cumulat, sicque stagnatione simul adeptâ *Tumorem* excitat. Adde quod in hoc casu non tam tunicæ cartilagineæ, quàm verò eam succingentis externæ tenuioris Vulnus citò coalescat, & adducatur, atque hinc circum-circa à sanguine appulso dilatetur. Subinde tamen etiam pro antecedentibus Causis ponere licet Salia acida atque corrosiva, quæ occasione datâ in extimis quibusdam tubulis aut etiam majoribus subsistentia internam tunicam facile erodunt & aperiunt.

Diagnosis.

Inter *Signa Diagnostica* Aneurismatis, recensetur ante omnia tumor mollis & laxus, digitorum applicationi cedens, sed semotis illis statim rediens; Pulsatio præterea in hoc tumore non secus ac in Arteriis deprehenditur; Cutis exterior circa Aneurisma livet ac sugillata plerumque apparet. Quandoque tamen etiam naturalis color Cutis remanet. Dolor adest nunc major nunc minor, prout tensio membranarum nervearum plus minusve potens est; Quin & ob pressionem vicinorum nervorum pars aut membrum contrahitur, vel in sui motu animali ac voluntario maximè impeditur.

Prognosis

In *Prognosi* Aneurismata majora periculosa sunt, difficilisque Curationis dicenda; Sicut enim per compres-

sionem, sanguinisque in Arteriam læsam impulsione evanescere rarò solent, ita sive sponte rumpantur, sive incautè aperiuntur, non nisi Mors per nimiam sanguinis effusionem expectanda venit, aut etiam si non aperiuntur, Gangræna tamen ac Sphacelus sæpè intra aliquot dierum vel hebdomadarum spatium subsequitur, hominemque è medio tollit. Minoraverò, & in minoribus vasis contingentia, præprimis si à validâ Arteriarum dilatatione tantum contingant, periculo ferè carent. Dantur subinde Aneurismata, quæ diù satis in eodem statu persistunt & quasi insanabilia, nihilominus hominem in vivis esse permittunt; Quando nimirum sanguis in Aneurismate non stagnat, sed continuo à succedente novo sanguine in motu tam intestino, quàm circulari conservatur.

Curatio hujus Affectus in hoc ferè consistere debet, ut quantum possibile sanguis è tumore Aneurismatis in canalem arteriosum repellatur, sicque tumor omnis evanidus reddatur. Quod quidem melius fieri nequit, quàm per compressionem ipsius Tumoris, *adstringente* prius *Emplastro obtekti*, sensim validiorem redditam atque instrumentis aptis cum ligaturâ convenienti institutam. Quadrat itaque huc impositio *Laminæ plumbeæ* cum ligaturâ fortiori, sed subinde iterum laxandâ, ne Gangræna acceleretur. Inter *Emplastra* imponenda commendantur *Diachalciteos*, *Contra rupturam*, *de Pelle arietinâ*, *de Bolo cum Gypso*, *Thure*, *Aloë*, *Sperniolâ Crollii*, &

& similia. Sunt, qui solâ manu aut digito locum affectum comprimunt, & aliquamdiu compressum tenent, id quod in principio hujus Mali valere potest ad præcavendam Aneurismatis magnitudinem. Quod si poterimus supra Aneurismatis locum Arteriam comprimere, sicque sanguinis arteriosi affluxum impedire, tum lanceolâ licebit Aneurisma aperire, sanguinem ibidem cumulatam educere, hincque Vulneri statim insigne aliquod *stypticum* v. gr. *frustulum Oli gossypio tenui involutum* applicare, simulq; splenia *Albumine Ovi* imbuta, ac Pulvere quodam constringente inspersa, super imponere, tum denique ligaturam strictiorem immittere. Si fortè ad manus est *Tinctura aliqua styptica fortissima*, eam Chirurgus simul in usum promptissimè trahat.

Quod si verò Aneurisma sit in arteriâ quâdam majore, tum ab ipsius incisione est abstinendum, utpote quam Sideratio & Gangræna certissimè subsequuntur, sanguine ob pulsum Arteriarum continuum sisti inepto. Alii proponunt hic *Cauterium actuale*, ruptæ arteriæ inurendum, quod tamen etiam fallax est remedii genus, quoniam escharâ abscedente Hæmorrhagia denuò subsequitur. Melius fortè est, Arteriam supra Aneurismatis locum per factam incisionem detegere, hincque probè ligare, & infra ligaturam dissecare; postea abscedente ligaturâ extremitatem dissectæ arteriæ, sicubi opus, cauterio actuali inurere, interim Aneurisma aperire, eductoque ex eo sanguine relictum Vulnus instar alio-

rum Vulnerum Vlcerumque extergere, consolidare, & ad Cicatricem perducere.

Internè ea sunt exhibenda, quæ acrimoniam sanguinis acidam & salisam, si quæ adsit, edulcorante suâ virtute feliciter corrigere valent, in quem censum referimus omnia *antifebrilia, absorbentia, modica diaphoretica*, sub formâ *Pulverum, Potionum, Mixturarum, & Apozematum vulnerariorum* exhibita. v. gr.

R̄. *Corall. alb. ppt.*

Crysell. alb. ppt.

Bol. armen. ppt.

Ocul. ☉. ppt. ana. ʒj.

M. F. pulv. subt. divid. in 8. partes æqu. m. ac vesp. sumendas.

Vel R̄. $\frac{1}{2}$ n. diaphor. ʒij.

Ebor. ppt.

Sanguin. Hirc. ppt.

Dent. Apr. ppt. ana. ʒiiij.

M. F. pulv. subt. in 12. dos. æqu. ad ch. m. ac vesp. dandas.

R̄. *Aqu. Plantag.*

Burs. pastor. ana. ʒj.

Syrup. Capill. ♀ ris ʒß.

$\frac{1}{2}$ n. diaph.

Bol. arm. ppt. ana. ʒj.

M. F. Potio d. ad Vit. pro. dosi, sæpe repetenda.

Vel R̄. *Aqu. Ulmar.*

Flor. Ligust. ana. ʒiß.

Syrup. Flor. Tunic. ʒj.

Terr. Sigillat. ʒij.

Confect. Alk. inc. ʒß.

Misce, detur cochleatim.

R̄. *Rad. Bistort. ʒij.*

Sarsæ parill.

Chinæ.

Lign. Guajac.

Cortic. Lign. Guajac ana. ʒiij.

Herb. Sanic.

Pyrol.

Alchymill.

Millefol. ana. Mj.

Flor. Rosar. rubr. Mʒ.

Sem. Fœnic. ʒij.

*Incis. & contus. coqu. in Aqu. fontanæ
Mensur. iib. per horam integram, dein
Colatura d. ad Vitr. M. ac V. Cyathi dosi
haurienda.*

Quando Arteria in Aneurismate
sæpius aperitur, sanguinemque copio-
sum fundit, tum superior pars Arte-
riæ digitis forti² est comprimenda, hinc
sanguine è tumore emisso stypticus Pul-
vis sequens cum *Crepitu Lupi*, *Stupâ-
que Albumini ovi* intinctâ est applican-
dus, desuper alligando *Laminam Plumbi*.

R. Terr. sigill.

Œli dulc.

Lapid. Hæmat. ppt. ana. ʒj.

Succi Catechu. ʒij.

Sacch. Saturn. ʒʒ.

Œli ust. ʒiij.

M. F. Pulv. subt. d. ad Ch.

In *Dieta* Viçtus sit admodum
tenuis, ut sanguinis & humorum co-
pia imminuatur; quem in finem etiam
Venæsectionem nonnihil largam pleri-
que simul Medici commendant.

*Anipro-
cidentia.*

ANIPROCIDENTIA seu PRO-
LAPSUS est Intestini recti dilatatio,
quâ sub fœcum alvinarum excretionem
cum tenesmo, aut etiam quandoque
sine dolore extruditur, hincque sæpius
ita prominet, ut difficulter vel à Na-
turâ retrahi, vel Arte in pristinum
locum restitui queat.

Pars affecta est Anus, Culus seu
Podex ejusque Intestinum rectum in
sui extremitate musculo sphinctere do-
natum, atque rugosum. Quicquid
autem ex Ano procidit, propriè est tu-
nica Alvi laxata, eaque triplex, glan-
dulosa, fibrosa & membranacea ex-
terna.

Causa hujus Mali, proxima qui-
dem est, violenta & nimia excernendi
difficultas, in quâ musculi levatores
plus minus relaxati Anum retrahere
non valent. *Antecedens* autem est nimia
Œsi cujusdam humoris, in glandulosâ
Intestini recti tunicâ collectio, qui
suâ acrimoniâ stimulat magnoperè
ad excretionem, & serosâ sui
portione fibras musculosas valde
relaxat. Hinc affectus Pueris & In-
fantibus, quibus aliàs teneræ sunt &
laxæ partes, admodum est familiaris,
non secus atque Adultis Dysenteriâ
aut Tenesmo laborantibus. Vnde pa-
tet quòd Affectus alii præcedanei, prout
sunt Diarrhœa longius protracta, Dy-
senteria, Pruritus, & Tenesmus Ani,
Hæmorrhoides valde dolentes, aut
etiam nimis fluentes, ut & Supposito-
ria acria crebrò intrusa, Purgantia ve-
hementia, Calculi vesicæ, Vociferatio
aut Tussis nimia, Cibi Œso-acres at-
que seroso-humidi ad huncce Affe-
ctum, tanquam *Causæ antecedentes re-
motiores* aut *procatacticæ*, contribuere
valent.

Diagnos hujus mali facilis est:
etenim ex relatione partim Ægri vel
Adstantium, partim etiam ex ipsâ af-
fecti loci inspectione, clarè satis cogno-
scitur. Procidentia verò nunc major
est,

est, pugni minoris magnitudinem non raro exæquans, magis dolorifica & inflammata: nunc minor leniorique cum dolore affligens. Sunt quibus singulis dejectionibus procidit Alvus, & dein sponte retrahitur. In aliis verò semper retrudenda est: in nonnullis quoque nec retrahitur, nec retrusa licet contineri potest.

Quoad *Prognosin* Affectus hic procausarum varietate facilius difficiliusve curatur: si magnus est, Ovi magnitudinem exæquans, aut m. major cum inflammatione intensiore conjunctus, tum non solum difficulter restituitur, sed etiam malè tractatus Gangrænam & Sphacelum post se trahit. Si autem à nervorum musculosorum in Ano resolutione acciderit, tum indolens quidem est Prolapsus, sed difficillimè sanabilis, quin plerumque fœcum alvinarum incontinentiam excitat.

In *Curatione* unicè attendendum, ut Prolapsus intra corpus retrudatur, quod quidem fieri potest facile, si non ita magnus sit: nimirum portio Intestini promens Oleo rosaceo atque Myrtino tepido inuncta cum tenero admodum linteo, eodem Oleo immerso, suum in locum restituitur. Prius tamen vel Vrin. vel lixivio quodam calefacto ablui potest, quanquam in hunc finem aliis Lac cum incoctione *florum Meliloti, Chamomillæ, Verbasci, Balaustrorum*, ut & *Fol. Myrt. Querc.* atque Pulvere Gallar. magis placeat. Post restitutionem Æger vel aliquandiu jaceat supra Ventrem, cum appposito ad anum sacculo adstringente è prædictis plantis concinnato, atque in *Aquâ*

Fabrorum cocto, vel infideat Asseri ex Ligno *Quercus* parato & nonnihil calefacto, postquam Anus Oleo Myrtino, Mastichis, Cydoniorum, aut etiam Scarabeorum inunctus, pulveroque Olibani, Mastichis, Flor. Balaustr. Bol. Armen. atque Musci arborei fuerit conspersus. Nonnunquam etiam fumus instituitur Ano admittendus, ex pulvere Myrrhæ, Succini, Mastichis, Thuris, Seminis Papaveris, Ligni Juniperini. &c. Quod si Inflammatio & Tumor Intestinum prolapsus jam prehenderit, tum fomentis debitis Inflammatio prius est abigenda atque hinc demum restitutio tentanda.

Intus in hoc Affectu semper pro sunt Remedia acidum omne absorbentia, ut & Oleosa; non secus atque Clysmata ex Lacte, Cremore Hordei, Succis plantar. Nasturcin. & Oleis anodynis parata.

ANOREXIA S. APPETITVS prostratus est ejusdem ablatio cum fastidio, subinde & nausæa affligens, à menstrui stomachici depravatione oriunda. Vocari etiam solet *Inappetentia, Asitia, vel Apositia.*

Afficitur hic primariò Venter, cum suis nervosis fibrillis in Oesophagum expansis, quatenus debitam vellicationem pro Appetitu suscitando vel non experiuntur vel non sentiunt.

Causa hinc proxima est defectus vellicationis in Oesophago ad Ciborum desiderium necessariæ, & aliàs fieri naturaliter consuetæ. Vellicationem autem dictam tollit penitus, vel ejus sensationem impedit omne id, quod Liquorem gastricum inertem reddere

Anorexia.

Subj. Eum.

Causa.

aptum est ; quod quidem fit partim à copiâ Assumtorum , quibus aliàs satiari Appetitus dicitur : vel ab humoribus crudis , viscidis crassis in Ventriculo hærentibus , fibrillasque nerveas oblinentibus : vel ab usu pinguium , dulcium , atque viscidorum , activitatem illius Liquoris vel Menstrui stomachici inviscantium. Hinc quamprimum Homo corripitur morbo quodam interno à Lymphæ vitiis oriundo , simul statim Anorexia aderit , cum in ejusmodi casibus menstruum stomachicum insigniter lædatur. *Causæ procatarticae & externæ* sunt v. gr. nimia fumi Tabaci suctio , & hinc instituta copiosior salivatio , crebra Vinorum ingurgitatio , Tristitia insignis , Ira vehemens & excessiva , Potus gelidi , Oleorû haustus enormes , Martialiû & Alcalinorum vel Terreorum Remediorum diuturnior usus internus , quæ omnia Volatilitatem , atque activam Menstrui gastrici virtutem deprimunt & tollunt. Subinde etiam vellicatio fit , & tamen non percipitur , quando videlicet mens admodum est distracta in deliriis aliisque Cerebri Affectibus.

Diagnosis.

Morbus hic per se patet ex simplici Ægrorum querelâ & relatione. Quando autem non percipitur titillatio Oesophagi ab acris Liquoris gastrici particulis , tum vel delirat ipse homo , vel saltem vires in eo admodum debiles sunt , spirituumque animalium penuria observatur ; quale quid in Hæcticis atque Senibus Marasmo laborantibus contingit. Interim cum hoc Affectu frequenter , conjun-

gitur magnum fastidium seu averfatio Ciborum , Cardialgia , Nausea , Vomitus , Ardor Ventriculi , Ructus frequentes , &c.

In *Prognosi* Anorexia Puerorum plus periculi quam Adultorum portendit : si in principium aut statum alicujus Morbi hic Affectus incidat , non adeo periculosus est credendus , si verò in diuturno morbo Appetitus semper remaneat , atro carbone notabitur : è contrario in declinatione rediens Appetitus bonum signum est. Quin in omni ferè Morbo haud malum signum æstimandum , quando citra insigne fastidium Ægri aliquid comedere possunt , si tamen in Morbo aliquo , præprimis Febri Appetitus aliquandiu prostratus subito iterum redeat , pro lethali signo id habendum est.

Curatio pro diversitate Causarum institui debet : Quod si enim juncta sit Anorexia aliis Morbis , horumque ferè productum sit , tum his curatis lymphæque tam naturali volatilitate quàm circulatione restitutis per se Appetitus sensim redibit. Vbi autem citra notabiles alios Affectus hominem afficit , & producta sit à cruditatibus biliosis , tum suademus statim Vomitorium ex Tartaro emetico , vel Asaro , aut similibus exhibendum : v. gr.

℞. Crem. Fri gr. XII.

℞. Absynth. gr. v.

℞. n. diaph. gr. iij.

℞. Fri emet. gr. ij.

M. F. pulv. subt. d. ad. Ch. pro dosi matutinâ.

Vel ℞. Radic. Asar. ℞j.

Crem. Fri ℞.

Gutt.

Gutt. Cambod. gr. ij.

M. F. pulv. subt. d. ad. Ch. pro dosi.

Vel R̄. Syrup. emet. ʒß.

Aqu. Cichor. ʒiij.

Cinam. cyd. ʒij.

M. d. ad. Vitri. pro dosi cum regimine dietæ sumendâ. Hinc verò Elixir propriet. sine acido cum Essentiâ Zedoaria & Absynthii propinandum: v. gr.

R̄. Elixir propr. s. a. ʒij.

Essent. Absynth. ʒiß.

Zedoar. ʒij.

M. d. ad Vitri. dosi à gutt. XII. ad XX.

Vel R̄. Elix. Vitriol. Myns. ʒij.

d. ad V. dos. 16. gutt. m. ac. v.

Vel R̄. Aqu. still. Nast. aqu.

Card. bened.

Cich. ana. ʒiß.

M. ac m. ʒ v. Cyathus exhibeatur plenus.

Si Vomitorium exhibere consultum non sit, dabuntur pulveres ex Oculis ʒ. Bol. Armen. Corall. Specif. stomach. Poter. & Sale Absynthii aliove lixiviali. Imò ipse Cremor ʒri cum ʒnio diaph. aliquoties datus cruditates bilioso-viscidas incidere, atque fluidiores redditas è Ventriculo præcipitare valet.

R̄. Crem. ʒri.

Pulv. fol. Card. bened.

ʒ n. diaph. ana. ʒj.

M. F. pulv. s. in sex dos. æqual. divid. m. ac v. sumend.

Anorexia à Pituitâ tenaci & viscidâ proveniens tollitur vel dosibus pluribus Pulveris stomach. Birkmanni M. ac v. sumtis, vel Vinis medicatis, purgantibus & præparantibus simul; vel Pulveres Salini lixiviales aliquot offeruntur, hincque incisa & fluidior reddita

faburra purgantis ope per Alvum aut Vomitus expellitur, quæ inter eminent Emetica superius laudata, dein Jalappa, Scammoneum, Folia Sennæ, Rhabbari radix debito modò præscripta. v. gr.

R̄. Salis Absynth.

Cent. min.

ʒri ʒlat. ana. ʒß.

M. F. p. subt. in 3. dos. æqu. divid. ad ch.

Vel R̄. Salis Tamaric.

Arcan. dupl. Myns.

Ocul. ʒ. ppt.

ʒ n. diaph. ana. ʒß.

Ol. still. garyoph. gutt. IV.

Sacch. ʒij.

M. F. pulv. subt. in 4. dos. æqual. m. ac v. sumendas. Ad purgandum.

R̄. Rad. Jalapp. ʒj.

Crem. ʒri ʒß.

Scamm ʒrat. gr. ij.

Ol. still. mac. gutt. ij.

M. F. pulv. s. pro dosi.

Vel R̄. Spir. Anis. ʒj.

Junip. ʒß.

Resin. Jalapp. gr. VIII.

Solv. lent. igne, add. Syrup. Viol. ʒij.

Aqu. Cinam. cum Vino ʒj.

M. d. ad. V. p. dosi.

Quod si Appetitus deficiat, ob defectum aut inertiam Menstrui stomachici, revocabitur Pulvere stomach. Birck. ad ʒij. vel ʒj. pro dosi sæpius exhibito: vel Aquâ Apii selini, Nasturt. Card. bened. & Cochlear. sæpius ad ʒij. vel iij. propinatâ. Vel parabitur pulvis ex Rad. Aron. Raph. rustic. Specif. stomach. Poter. Cortic. Aurant. Cinam. Anis. & Sacch. Plebeji solo Pulvere vel Absynthii vel Matricar.

Card. bened. Flavedin. Cort. aurant. semin. Nasturtii in hoc casu sunt contenti.

Quod si deficiat Appetitus à nimio usu Spiritus Vini, vel Medicamentorum absorbentium & Jialium alcalinorum, quemadmodum id contingit in variis Morbis, tum in usum trahi potest *Elixir Oli Myns.* vel *Elix. proprietat. Parac.* vel etiam *Sal* quoddam *essentiale* v. gr. *Card. bened. Acetosellæ, Succi Ribium, Rubi Idæi, Berberum, Citri, Limonum* & simile; vel *Cremor Fri* tragematibus usurpandis permisceatur.

*Anthrax.
Carbunculus.*

ANTHRAX sive **CARBUNCULVS** est tumor partis cujuscunque inflammatorius, maximè ardens, rubens, vel etiam nigricans, crustamque vel escharam in parte affectâ producens, colore vario circumcirca tinctus, & nunc cum nunc sine exulceratione junctus.

Pars affecta.

Afficiuntur in hoc Tumore corporis partes externæ qualescunque in primis tendinosæ, etenim in glandulosis magis oboriuntur *Bubones*.

Anthrax autem modò solitarius est sine alius morbi conjunctione, modò Pesti sociatus.

Causa.

Causa proxima sunt particulæ \ominus ino acidæ & corrosivæ, in locis affectis subsistentes, undiquaque circa se rodentes, scindentes, atque crispantes, ut hinc è tubulis sic constrictis nullus amplius humor vitalis influere queat, sed pars necessariò Gangrænam atque Sphacelum subire debeat. *Antecedens* est liquor \ominus ino - corrosivus in massâ humoralis vel genitus vel collectus:

Gignitur autem non ita difficulter in maximo æstu & ebullitione sanguinis. Colligitur ex particulis è primis viis in quibus Chylus non probè digestus est, sed corruptus & acidior redditus in Massam circulantem transmissus. Inter *Causas procatarticas & externas*, huc contribuunt *Aër* corrosivis particulis inquinatus, pestilensque aut malignus factus, unde facile tales particulæ sive per inspirationem cum Aëre, sive per deglutitionem cum Cibis, corpus subire possunt. *Cibi* hinc varii generis falso acri aut acido sale plurimum gaudentes vel etiam seminis verminosis inquinati. *Potus* aquarum stagnantium corruptarum, aut liquorum austeriorum: *Iræ* immodicæ; frequens corporis in æstu aëris exercitium, aut Mœstitia nimia ac diuturna. Quibus singulis Causis addere licet Febres malignas, pestilentes, aut etiam ephemeræ leviores graviorefque, quæ Anthraces frequenter præcedere solent.

Incipit Affectus à pustulâ exiguâ, una vel pluribus, præcedente pruritu: hinc sensim cum summo ardore ac dolore increfcit, rubescit, livescit, nigrescit: Tumor inde redditur durior, qui in sui medio & centro quandoque in Vlcus exedens aperitur, aut etiam clausus & siccus manet: Sæpenumero quaquaversum ambulat, atque vicinas partium fibras depascit vel corrumpit. Interdum crusta, vel Vlcus crustosum saltem enascitur, modò nigricantis, modò cinerei coloris, cum circulo rubente & ardente: Ablatâ hinc & separatâ crustâ, non semper pus, sed multoties

toties spongiosa caro occurrit. Si benignus est adhuc Anthrax ephemera saltem præcessit, vel adhuc juncta est febris & non ita difficulter curabitur. Malignum verò Carbunculum comitantur Febris, Nausea, Vomitus, Palpitatio Cordis, Animi Deliquium, Delirium, Anxietates præcordiorum, Convulsiones, Pestilentia. Nonnunquam primò occurrit pustula quædam albicans, acerrimo dolore pungens, cui succedens Vlcus crustosum, profundè admodum carnem mortificat ac depascit.

Si Carbunculus est minor sine conjunctione symptomatum & morborum graviorum, si magis ruber, non ita profundè depascens, tum omni periculo caret. Quod si autem circa partes magis nobiles hæreant Anthraces, si mox evanescant, si majores sint, si Pestis vel Febris maligna juncta, si maximè nigricans, atque ardens, si in manu vel pede existens totum membrum simul inflammet, tum inter acutissimos morbos numerandus est, & licet quandoque in Peste Anthrax pro critico humore haberi queat, nisi tamen per illius eruptionem maligna symptomata mitigentur, lethalis hæc magis crisis quam salutaris observabitur.

Curatio requirit *Dietam* in Febribus continuis præscribi solitam.

Interne quoque similiter *Antifebrilia* diaphoretico-absorbentia cum *Aquis destillatis* convenientibus diligenter exhibeantur. Etsi Carbunculus benignus sit, sordes primarum viarum vel *Clysmatibus* aliquot emollientibus

eluantur, vel leniori cathartico expurgentur. Venæsectionem autem nisi æger sit plethoricus, damnamus.

Externe scopus Medici unicè tendet ad sideratæ s. gangrænatae portionis à parte sanâ separationem: Quem in finem aliqui statim Scarificationem cum cucurbitulis adhibent, hincque *Cataplasma* è *Theriaca*, *Melle rosaceo*, atque *Radice Allii* adhibent; Alii sine scarificatione *Cataplasma* è *Pomis putridis dulcibus* cum *Oleo Nucum* coctis imponunt. Nonnulli utuntur *Butyro Antimonii*, quo circa Carbunculos saltem circulum ducunt, unde statim corrupta pars à sanâ secedet. *Emplastrum* quoque s. *Cataplasma* ex *Fuligine*, *Radice Raphani*, *Mithridatio Damocratis*, *Theriaca*, *Ficibus*, *Rutâ*, *Fermento*, atque *Melle* compositum ad crustæ remotionem multum facit.

Separato Anthrace reliquum Vlcus statim eluetur vel *Urinâ Pueri* vel *Spiritu Vini theriacali camphorato*, cum *Essentiâ Aloes* ac *Myrrhæ*, hinc *digestivum* è *Melle rosaceo*, *Theriaca*, *Myrrhâ*, *Colophonio*, *Succo Apii*, *Hieracii*, aut *Chondrillæ* concinnatum usurpabitur, atq; ad perfectam usque consolidationem *Emplastrum Norrimbergense* aut *Diapalma* aut *siccticum Crollii* super imponetur.

Anthrax pestilens desiderat internè quidem omnia *Alexipharmaca* debitâ ratione exhibenda; Externe verò *Cataplasmata alexipharmaca* singulis bihoriis repetenda conducunt, è radice *Chelid. Major.* *Cepar.* *Aristol. Herb.* *Scordii*, *Rutæ.* *Thure*, *Aloë*, *Myrrhâ*, *Unguento Basilic.* *Theriaca* atque

Anthrax pestilens,

que *Camphorâ* : Vel solum *Diascordium Fracast.* cum *Roob Juniperi*, *Fimo columbino*, *Cepis*, atque *Camphora* applicabitur : Vel *Pulpa Pomorum dulcium putridorum*, cum *Vitello ovi*, *Bolo armenate*, *Butyro* & *Croco* pulverisato in *Cataplasma* redigatur, & sæpius applicetur, donec eschara fuerit semota. Vlcus tandem relictum superiore modo curabitur, non omittendo *Unguentum Ægyptiacum*, sicubi luxurians Caro illius usum postulaverit.

ANTIADDES, Vid. *Tonsillarum Inflammatorius Tumor.*

Aphtha.

APHTHÆ, ALCOLA, sunt pustulæ ulcerosæ, nunc albicantes nunc flavescences, aut etiam nigricantes, in oris capacitae, Labiorum internâ facie, atque superficie Linguae cum aliquali interdum dolore, & ardore efflorescentes.

Pars affecta.

Pars affecta proin est tunica illa, quæ Os intus undique, nec non Linguam ac Labia circumcingit.

Causa.

Causa proxima est serum aliquod salso-acidum & acre, visciditate quâdam in tubulis partis affectæ stagnans, & cuticulam extimam in altum elevans; Hoc serum salso-acidum, si valde acre ac sulphureo æruginosum est, non tantum Pustulas excitat, sed simul brevi corrodendo Vlcuscula manantia format, insuperque vicinas partes depascere pergit, nisi efficacia ejus debitis remediis invertatur, & prorsus deleatur: sin minus acre verò illud & corrosivum fuerit, tum pustulas solum elevat, quæ brevi siccantur atque evanescent. Subinde humor ille stagnans magis salso-muriaticæ quam acidæ est

texturæ, atque hinc *Aphthas benigniores* producit. *Antecedentes* causæ sunt particulæ falsæ, acidæ & acres in Massâ sanguineâ præexistentes, Chylus crudior & acidior. Inter *Procatarticas* numeramus Lac acre Nutricis, Febri qualicunque, vel *Cacochymia* falsâ laborantis, multum etiam Vini bibentis, & acria falsa comedentis, Cibos salitos & acrioris succi, Vinum Infantibus propinatum; Hydrargyri exhibitionem vel inunctionem, falsas & acidas Massæ humoralis particulas copiosissimè ad glandulas Oris præcipitantem.

Patet hic Morbus facilè ex solâ Oris aperti inspectione, Tubercula vel Pustulæ instar semini Milii solis acuminatæ, nunc albicantes nunc rubentes, nunc flaventes ac nigricantes, plus minusve foetentes inibi deprehenduntur, quæ non solum loquelam, sed & masticationem impediunt, & ardente sæpius dolore molestæ existunt. Affligunt maximè propter Fibrarum ténitudinem Infantes & Pueros, rariùs Adultos. Subinde in Vlcuscula mutantur depascentia & sordida. Quoad differentias; aliæ humidæ, aliæ siccae: aliæ symptomatice, aliæ criticæ. Quoad numerum verò nunc pauciores nunc plures efflorescunt, & aliquando magis Linguam, aliquando magis palatum, gingivas aut membranam buccas internè succingentem affligunt. Reperiuntur etiam *benignæ*, quæ facilè medicamentis cedunt, & *malignæ*, *proserpentes*, *cancrosæ*, *exedentes*, à Sale caustico provenientes, & plerumque curatu difficiles.

Quan-

Quantum ad *Prognosin*, Aphthæ fœtidæ, glabræ, nigræ, ulceratæ, inæquales, crustosæ, inveteratæ, in Infantibus lethales existunt, & nunc brevi mortem inferunt, nunc paulatim Oris partes siderando & putrefaciendo necant. Si prodeunt in pestilentialibus aut aliis malignis Febribus, ut plurimum mortis prænuntiæ habentur. In Adultis quandoque ita exulcerantur, ut etiam, ossa tandem corrumpendo, Fistulas sordidas excitent. Inæquales & albæ melioris sunt notæ, quæ faciliè exurgunt, molliter obhærent, & citò cadunt, modò debitis remediis tractentur.

In *Curatione*, si Infans lactens Aphthis fuerit correptus, tunc Nutrici quidem propinari debent Remedia lactis acrimoniam corrigentia; & sic pro re natâ lenitivum aut laxans medicamen ante omnia dabitur, postea verò Pulveres diaphoretico absorbentes singulis sex horis exhiberi possunt, comp. è *Bezoard. miner. Corall. rubr. vel alb. ppt. Crystall. alb. ppt. Lact. Lun. Unicorn. foss. C. C. pph. ppt. Ocul. ☉. ppt. Antimon. Diaphor. Ebor. ppt. cum largis haustibus Aquar. Portulac. Lactuc. Endiv. Cichor. Card. bened. Taraxac. Hierac. Chondrill. & similia. Ipsi Infanti propinari potest vel *Emulsio* refrigerans, absorbens, diaphoretica & edulcorans; vel *Mixtura* ex dictis supra aquis & pulveribus cum *Syrupo de Alth. Fernel. Syrup. de Nymph. Portulac. Viol. ac Papav. rh. composita*. Interim simul *Eclegma* fiat emolliens temperans, humectans, ex *Oxymell. simpl.**

vel *squillit. Melle rosac. Mucilag. Cydonior. Seminis*, atque *Roob diamor.* & aliquoties Infantū os inde extergatur. Vel os colluatur cum *Decocto Radic. Alth. Liquir. Raparum, Pastinacæ flav. Brassic. rubr. cum Cremore Lactis & Saccharo*, dumque videmus benignas sic Aphthas ab acore remedii ruptas & deletas, tunc statim *Ulcuscula* hinc facta *Melle rosaceo, Roob dianuc. Cret. rubr. aut Lapid. Hæmat.* permittis; vel *Aqu. rosar. cum Vitell. ovor. & Saccharo* frequenter oblinita curabuntur. Mulierculæ simul collis Infantum in sacculo appendunt *Millepedes* quotidie vivos plures, aut *Herb. Chondrill. Hierac. cujuscunque, Eupatorii cannabin. Anagallidis, & similia.* In Pueris & Adultis, si opus videbitur, ante omnia *purgans rhabarbarinum* præscribetur, hinc si Æger jam *Venæsectioni* assueverit, Vena secabitur vel brachii vel sub lingua: Propinabuntur simul internè haustus diaphoretici ex *Aquis destill. Roob Sambuc. atque Pulver. absorbent.* supra dictis compositi. Deinceps verò colluetur primum Os, si Aphthæ sint albicantes benignæ, & nondum exulceratæ, cum *Aquâ Nasturt. vel Cochlear. spirituosâ, Mell. rosac. & Oxymell. squillitico*; vel tangentur Aphthæ *Oleo Raparum cum Saccharo candido.* Sunt qui tantillum *Spiritus Vitrioli* aut *Salis* cum *Aqu. Brunell. aut flor. Ligustr. aut Plantag. aut Cochlear.* permiscent, hincque Os semel aut bis colluunt, donec pustulæ undiquaque sint ruptæ. Tandem *Ulcera* relicta cum *Mucilagine Seminis Cydoniorum Aqu. Ros. factâ, Melle rosac. Lapid. Hæmat.*

atque *Essent. Numular.* perfanantur. Si Aphthæ sint malignæ, usurpabitur extus *Aquâ virid. Plateri*, hinc colluetur Os *Aq. Cochlear. Nasturt. Nuc. Jugland. flor. Ligustr. Plantag.* atque *Trif. fibrin.* cum *Bolo armen.* & similibus. Vel *Decoctum Hordei* aut *Raparum* cum *Spirit. Vin. camphorato, Essent. Myrrhæ, Aqu. theriac. simpl. Succ. Cancr. fluviatil. rec. express. Succ. Cochlear. Nasturt. &c.* cum *Lacte chalybeato* & *Melle rosaceo* permistum; vel etiam *Decoctum Plantag. Agrimon. Fol. Ligustr. Pilosell. Flor. Rosar. rubr. Bellid. min.* atque *Melilot. cum Roob Dianuc. Lapid. prunell. Spirit. Salis dulc.* usurpabitur Gargarismatis loco. Intus dentur quæ profunt in Febri continuâ & malignâ. Quæ Aphthæ ab *inunctione mercuriali* proveniunt, eo curabuntur modo, qui in Lue venereâ indigitabitur.

Apoplexia.

APOPLEXIA est actionum animalium, sensûs nimirum & motûs, nunc subitanea nunc paulatina abolitio, ab influxu Spirituum animalium qualitercunque impedito oriunda. Diverso autem modo hominem affligere solet; & hinc varii ejus gradus, differentiaëque exurgunt; communiter dividunt in *levem, fortem & fortissimam*; *Levis* appellari potest Somnus profundior cum animalium actionum abolitione, unde Æger tamen iterum ad se redit, nullâ vel exiguâ inde labe acquisitâ, sive quoad memoriam sive quoad phantasmam aut ratiocinationem illa contingat. *Fortis* est, quæ gravius affligit, & vel in Hemiplexiam sive Paralyfin, vel etiam in Fatuitatem, in-

fantilem senectam, oblivionem, aliamve Mentis læsionem mutatur. *Fortissima* tandem est, in quâ Ægri subito omni sensu & motu privantur, atque ad has actiones non amplius redeunt, sed vel statim moriuntur, vel sensim respiratione magis offensâ extinguuntur.

Afficitur primariò *Cerebrum*, & quidem ejus pars nunc corticalis, in quâ debita Spirituum animalium secretio non contingit: nunc medullaris, utpote cujus tubuli vel concidunt & angustantur, vel à lymphâ quadam viscidior in suis osculis obstruuntur. Inprimis autem oblongatam Cerebri medullam pro subiecto principali hujus Morbi quidam hodierni statuere solent. *Secundariò* totum corpus, quod sensu motuque priyatur, affligi dicendum est.

Causa proxima hujus Affectus est *causa* prohibitus Spirituum animalium in nervos influxus, ad quem *antecedenter* nunc compressio principii nervorum, ab onere vel extravasati hinc inde sanguinis aut lymphæ, vel ejusdem per circulationem in vasis suis prohibitam stagnantis & accumulati, hincque vasa nimis distendentis excitata: nunc subitanea ipsis Glandulis corticalibus Cerebri contingens obstructio, ab exundante nimium lymphæ copiâ producta contribuit. Hanc verò exundantiam producere valet remotius feri sanguinei vel nimis visciditas, vel quod frequentius evenit, nimia aucta fluiditas, à quantitate Salium fluidorum in Massâ sanguineâ oberrantium proveniens. Inter *Causas pro-*
catar-

catarticas & externas ad Morbum huncce proclives valde reddit homines hæreditaria dispositio, corporis obesitas, crapula frequens, victus humido falsus quotidie copiosus, vita sedentaria, imprimis in loco humidior; consuetæ evacuationes aliquandiu retardatæ, præprimis Ulcera pedum diuturna subito sanata.

Signa diagnostica, sunt modò subitanea, modò paulatina sensûs ac motûs vel iminutio, vel omnimoda abolitio, sine prævio doloris alicujus sensu. Præcedit tamen frequenter interdum Vertigo, Oculorum caligo, Somnolentia insolita, torpor aliqualis sensuum, & spontanea quædam lassitudo, muci aut salivæ abundantia, Memoræ labilitas, Cephalalgia obscura, ingenii stupiditas, stridor dentium in somno, consuetarum qualiumcunque evacuationum suppressio & similia. Præsentem Apoplexiam indignant sensûs motusque privatio nunc paulatina, nunc subitanea in toto corpore, vel aliquibus ejus membris. Si totum subito corpus affligitur, tum homo in terram collabitur, ac instar Cadaveris ferè hæret cum membris flaccidis, quovis motu voluntario privatis. Quandoque instantem Apoplexiæ insultum cum subitanâ virium debilitate persentiunt, eumque nonnullis interdum verbis, quibus promptum etiam auxilium expetunt, cognoscendum præbent. Si fortis sit Apoplexia calor in toto corpore deprehenditur, cum sequente primum calido, deinceps autem frigido Sudore: Faciei color non pallidus sed rubicun-

dus simul adest, Respiratioque satis libera; in progressu autem homines stertunt ac difficulter spirant. Quibusdam spuma ex ore fluit, in aliis etiam humida ori immissa, cum deglutire nequeunt, per nares iterum rejiciuntur, pulsus quandoque naturalis, quandoque verò inæqualis, intermittens, magnus, debilis, interdum & celer. Oculi sunt clausi: non sentiunt Homines, quamvis urantur aut pungantur, membra non rigent, sed resoluta languent, & ab Adstantibus elevata, mox prout in cadavere iterum sponte concidunt. Sæpè in particulari Apoplexiâ, aut leviori ejus insultu os in alterutrum latus diducitur, neque semper gravior statim paroxysmus subsequitur. Imò haud rarer ipse Apoplexia in alterutro tantum latere totius corporis, aut uno duntaxat membro contingit, cum sensûs motûsque ablatione, hinc ubi totum alterutrum latus afflictum est, Hemiplexia dicitur; subinde loquelæ usus tollitur, quando videlicet Trachææ aut Linguae muscoli Paralyfi afficiuntur. Hinc Apoplexia in *universalem* dividitur, in quâ omnes totius corporis partes sensu atque motu privantur, & *particularem*, quæ est resolutio vel alterutrius lateris totius, & *Hemiplexia* vocatur, vel alicujus partis specialioris, putà nunc Linguae, aut musculi alterutrius Maxillarum lateris; nunc Palpebrarû; nunc sphincteris Ani aut Vesicæ; nunc Manuum aut Pedum extremorum. *Apoplexia* differt à *Lethargo*, quòd Lethargici excitari possint, & citra Paralyfin in somnum re-

Differt à Lethargo

labantur, præfente fimul Febre plus minus acutâ, cuius ferè fymptoma exiftit; Apoplectici autem forti nimirum infultu afflicti, difficiliùs excitentur, excitatque paralyfin frequenter incur-

A Caro.

rant citra Febrim. *A Caro* differt, quia in hoc refpiratio magis eft integra, punctique fentiunt Ægri, in Apople-

*A Paf-
fione hy-
pericâ.*

xiâ autem fecus. *A fuffocatione Ute-
ri* difcrepat, quòd in hac faciei color admodum mutetur, lividusque red-

*A Syn-
cope.*

datur, in Apoplexiâ autem fubinde color magis vividus appareat. *A Li-
pophymia Syncope* diftinguunt, quòd in hac fimiliter faciei color expallefcit, dentes, os, manusque frequenter claudantur, refpiratio valde exigua, pulfusque vix perceptibilis obfervetur; in Apoplecticiis autem os manusque laxæ manent, Pulsus optimè animadver-

*A Ca-
tarrho
fuffoca-
tivo.*

tatur, & Refpiratio quanquam interdum difficulter fiat. Tandem à *Catarrho fuffocativo* difcernitur, quoniam in hoc fensus motusque non aboletur.

Prognofis

Quoad *Prognofin* Apoplexia levis curabilis dicenda, fed qui tamen femel Apoplecticus exiftit, facile in eandem poftliminiò relabatur, ac plerumque tandem eâ moritur, nifi optimo vitæ regimine id præcaveat. Fortis Apoplexia per fe maximè periculofa eft, & fi non hominem è medio ftatim tollit, eundem tamen vel paralyticum reddit, vel fatuum ingenio, memoriave orbatum aut debilitatum relinquit; aut etiam aphonon & alogon efficit, ita quidem ut poft aliquanti temporis intervallum recurrente novo Apoplexiæ infultu extingatur. Apo-

plexia fanguinea à ftagnatione vel extravafatione fanguinis aut lymphæ copiofæ, vel valida nervorum compressione oriunda, ficque fortiffima reddita, hominem vel fubitò, vel intra paucos dies aut horas, nunc cum nunc fine præcedaneis Convulfionibus, è medio tollit.

In *Curatione* quædam funt facienda ftatim in accessu Morbi, quædam extra ipfum paroxyfimum. In *Paroxyfmo*, ficubi aliquam fanguinis turgescientiam obfervemus, ftatim venam brachii fecabimus; ubi verò pituitofa magis videatur Apoplexia, Vomitus exhibitò *emetico* mox procurabitur. v. gr.

R̄. Aqu. bened. Rul. 3vj.

Vel Oxyfacch. em. 3ß.

Aqu. Verben. 3iij.

Anth.

Cinam. ana. 3iß.

M. d. ad vitr. pro dofi in Adulto.

Hinc Æger vel ad ambulandum, ficubi poffit, omni modo follicitabitur, vel fi jam motus voluntarius ceffaverit, valde commovebitur, donec ad fenfum motumque aliqualem redeat.

Quem in finem etiam pro majori minorive rei exigentiâ Naribus *fternutatoriâ* infufflentur, vel *Spiritus volatiles* qualescunque infpergantur, aut etiam accenfæ Volatiliū pennæ admoveantur. Quin & Capiti toti prius raso fomentum ex *Spiritu Cerafor. nigr. Junip. Meliff. Anth. Lil. convall.* aut fimili, cum *Spiritu volatili Lumbric. Tincturâ Caftorei* cum *fpiritu Salis armoniaci* paratâ, vel *Spiritu C. C. maximè volatili* fociato, frequentiffimè adplicabitur.

Vertici

Vertici, Temporibus & Nuchæ Olea destill. Succini, Rutæ, Bacc. Junip. Anthos, Salviæ &c. inungantur. Frictiones cum linteis calidis undique instituuntur. Plantæ pedum verticillo fricentur. Quibus nil efficientibus post Clysteres ex radicibus & herbis cephalicis paratos, atque Felle Tauri, Elect. lenitivo, vel etiam Syrup. emetic. Ang. Sal. acuatos, Bregmati capitis Cauterium ætiale inuratur; aut hujus loco Vesicatorium satis magnum ibidem, aut in Nuchâ vel Brachio utroque admoveatur.

Intus statim Mixtura antapoplectica ex Aquis atque Syrupis cephalicis cum Liquore C. C. succinato, Sale volatili oleoso qualicunque, Aqu. Vitæ Matthioli, Spiritu Anth. Aqu. Anhaltin. & similibus concinnata cochleatim propinabitur. v. gr.

Rx. Aqu. apopl. Baub. ʒiβ.

Beton.

Centaur. min. ana. ʒβ.

Syrup. de Cinam. ʒvj.

Spirit. C. C. volat. ʒij.

M. d. ad. v. Sumatur cochleatim.

Vel Rx. Aqu. Verben.

Flor. Til.

Salv. ana. ʒj.

Spirit. Anhaltin. ʒvj.

Aqu. Vitæ Matth. ʒβ.

Tinct. Cast. cum Spirit.

Sal. armoniac. par. ʒβ.

Lapid. bezoard. occidental. ʒβ.

Sacch. perlat. ʒiβ.

M. d. ad. Vitr.

Vel Rx. Spirit. Cochlear. ʒβ.

C. C. volat. ʒij.

M. d. ad. vitr. Dos. ʒo. gutt. m, ac, vesp.

Vel Rx. Tinct. ʒn. ʒij.

Spir. Cochlear. ʒiij.

M. d. ad. Vitr. Dos. 20. ad 26. gutt. m. ac. v.

Rx. Cran. hum. ppt. ʒij.

Cinnab. nativ. optim.

Bezoard. min. ana. ʒβ.

Sal. volat. C. C. ʒj.

M. F. Pulv. s. in 4. doses æqu. ad ch. m. ac. v. sumend.

Vel Rx. Ocul. ʒ. ppt.

Pulv. Viper. ppt. ana. ʒj.

Sal. volat. Ebor. ʒβ.

Auri horizontal. gr. XII.

M. F. pulv. subt. in 2. dos. æqu. ad chart.

Itaq; simul pulveres maximè penetrantes, & resolventes, si Homo ad se rediit, frequentius in usum trahi poterunt, ex Sale Volat. C. C. aut Viperar. Cran. human. ppt. Bezoard. mineral. Ægagropilâ, Lap. Bezoard. orientali vel occidentali, & similibus compositi. Extra paroxysmum suademus Vinum medicatum purgans, ex cephalicis, incidentibus atque purgantibus præparatum. Postea verò commendamus frequentem potum Herbæ Thee, aut alius nostratis simili virtute gaudentis. v. gr. Veronicæ, Betonicæ. Chamædr. Salv. Serpill. Thym. Majoran. Meliss. Lavendul. Cum quo etiam Essentia Succini, vel Liquor C. C. succinatus, aut Sal quoddam volatile oleosum, guttatim per longum tempus sumtum, ab ulterioribus paroxysmis hominem præservare, vel etiam Paralyfin, si quæ adest, tollere valet. Eodem collimant & Elixiria cephalica, quale est Aqu. Vitæ Matthiol. aut etiam Spirit. Cerasor nigr.

vel *Meliss.* quotidie cochlearis unius & alterius dosi, ante vel post cibum sumptus. *Balsama apoplectica.* v. gr. *Majoranae*, *Rut.* *Succin.* *Lavend.* in paroxysmo, aut extra eundem subinde non secus ac *Oleum Succini destillatum* Vertici atque Temporibus diu inungi possunt. Tandem vel *Setaceum* in Nuchâ, vel *Fonticulus* unus & alter in Brachiis aut Pedibus excitetur. *Venaesectiones* singulis trimestribus instituantur; subinde & *Cucurbitulae* cum *scarificatione* applicentur.

APOSITIA, Vid. *Appetitus abolitus.*

APOSTEMA, Vid. *Abscessus.*

Appetentia.
Canina.
S. Bulimia.

APPETENTIA, CANINA, FAMES *Appetitus, auctus, caninus, Bulimia,* est appetitus Ciborum usque adeo auctus, ut Homines continuè esuriant, & Ciborum assumendorum perpetuo desiderio flagrant, indefinenter ferè oblata edulia devorent.

Pars affecta.

Affligitur hinc stomachus quoad fibras œsophagi sui nerveas, in quibus ferè Ciborum assumendorum desiderio ansa prima contingit.

Causa.

Etenim *Causa hujus incommodi proxima* est ejusdem partis affectæ vellicatio, sive continua sive frequentissimè repetita, ab humore aliquo plus minus acido-acri, fluido, rodente proveniens. Ad quam proin rosionem contribuit ipse Liquor gastricus, sive Stomachi fermentum depravatum & justo acidius acriusve redditum, qualem quidem texturam à *Causis antecedentibus remotioribus* adipisci potest, nimirum à lymphâ sanguinis nonnihil acriori, vel etiam salivâ in recessu

sive occultè acidiore. Nonnunquam & in Febribus, præsertim quartanâ, à superabundante stomachi glandularum lymphâ acidiore, vel in malignis Febribus paulo ante mortem à corrosivis particulis, œsophagi fibras admodum rodentibus, similis Affectus excitari valet.

Procatareticæ & externæ causæ sunt *Aër* valde subtilis, levis & purus, aut etiam particulis nitrosis volatilibus copiosissimè inprægnatus, unde lymphâ corporis acido-volatilior reddita, causam Affectus proximam producere facillè potest. Sed & calculum suum addunt cibi acidi atque acres frequentius & largius comesti, graviditas in Fœminis, vermes stomachi & intestinorum; potus Acidularum, aliarumve aquarum mineralium, vel liquoris alicujus maximè digerentis, quales sunt Vinum album, tenue & generosum, vel Cerevisia tenuior optimèque defœcata. Exercitia corporis modica neque admodum vehementia.

Affectus hic facillè cognoscitur ex continuis Ægri querelis, cibum usque & usque petentibus atque deglutientibus. Testantur hinc observationes, nonnullos homines nunquam ferè nisi cibos manibus tenentes & comedentes visos esse: sed cum ventriculum perpetuè saginent, vel frequens inde oboritur vomitus, aut alvi dejectio; vel etiam, si appetitui non continuè satisfiat, Lipothymia viriumque dejectio inde enascuntur.

Morbus hinc facillè in Vomitum diuturnum, Passionem celiacam, aut Hydropem transit. In declinatione Febrium

Diagnosis.

Prognosis.

Februm continuarum fames hæc canina subito accedens recidivam ut plurimum post se trahit. In malignis autem circa morbi statum comparens mortis est prodromus. In morbis chronicis, prout sunt quartana, hectica &c. longitudinem morbi denunciat.

In Curatione ante omnia studendum, ut ventriculus non solum ab onere crudis, sed & à lymphâ acriori gastricâ quantum fieri potest statim exoneretur, & quidem per exhibitum emeticum Aegri viribus proportionatum quale, ex Syrup. emet. Ang. Sal. vel Infuso Croc. metall. aut pro emetico, Radice Asari, Sale Vitrioli vomitivo fiet. Quod si emetico nullus sit locus, Vinum medicatū purgans præscribi potest, compos. ex Radicibus Caryophyllatæ, Polypodii, Chelidonii majoris, Rhapontici, Herbis. Scolopendr. Hep. Rob. Cuscut. Agrimon. Plantag. floribus Rosar. rubr. Papav. rhead. Foliis Sennæ, Rhabarb. opt. Cort. Winterani, Sale Tamaricis, atque Limaturâ Chalybis. Absoluto hujus usu, vel spirituosâ sulphurea ex Spiritu Cerasor nigror. Aqu. vit. Matthioli, aliaque non assimilia in usum m. ac vesp. per cochlearia trahantur; vel etiam pulveres absorbentes ex Diaphoretico martiali, Specif. stomach. Poterii, Croco Martis aperitiv. Unic. fossil. Corall. Bol. armen. præscribantur, sub 3ß. dosi per plures dies m. ac vesp. sumendi. Quibus pro lubitu associari poterunt alcalia etiam alia, plus minus volatilia & fixa, v. gr. Sal. volat. C. C. Lumbric. terrest. Viper. Ebor. Sem. Nasturtii, Cochlear. Dauc.

Salia item lixivialia Absynth. Card. bened. Cichor. Centaur. min. Tamaric. Sunt, qui cum fructu exhibent Tincturam Martis aperitivam, vel Corall. & ½ iii, cum Essent. Croc. & Opii liquidâ. Neque hic contemnimus Fumum Tabaci subinde suctum, aut etiam largiores Vini generosi haustus, licet non ad ebrietatem usque multiplicatos.

In Diætâ commendantur imprimis *Diætâ.* Cibi pingues, lenti, Caro-bubula, porcina, Cerebra animalium, Pastæ farinaceæ cujuscunque generis, Panis secalinus & similia. Quod si Lipothymia hominem corripiat, solitis remediis inde excitetur, atque postmodum dicta remedia in usum vocentur.

APPETITVS ABOLITVS, PROSTRATVS, DEJECTVS, Vid. Anorexia.

APPETITVS IMMINUTVS, DYSOREXIA, est symptoma, quo homines minus Ciborum appetunt & comedunt, quàm naturaliter consueverunt, & quidem cum aliquâ lassitudine. Quia autem hic Affectus ab iisdem causis cum Anorexiâ producitur, gradu tantum minore differentibus, hinc & iisdem medicamentis sanatur; vide proin Anorexiam. *Dysorexia.*

APPETITVS DEPRAVATVS *Appetitus depravatus.* est symptoma, quo homines loco Ciborum consuetorum insuetos, subinde etiam planè absurdos appetunt & comedunt. Duplex est hujus species, quarum altera vocatur Malacia, altera verò Pica, de qua suo loco agitur.

MALACIA verò est symptoma adpeti-

adpetitûs depravati, quo homo cibos quidem consuetos, sed eos vel crudos planè, & impræparatos, vel nimîâ copiâ appetit & comedit; Carnes. v. gr. crudas diversorum animantium, ita ut observatæ sint desiderio humanæ carnis comedendæ fragrantès, Piper, Zingiber, Farinam, Cineres & similia.

Causa. Obtingit Prægnantibus maximè fœminis, quandoque & Virginibus non benè mēstruatis, aut Mensium suppressione aliquandiu laborantibus; unde stomachi Liquor, qui naturaliter salino-volatilis blandè acriusculus esse solet, in suâ texturâ mutatur, talemque crasin & configurationem adipiscitur, sub quâ fibras œsophagi nerveas ita vellicat & crispat, ut hinc propagato ad sensorium commune earundem & Spirituum in illis hospitantium præternaturali specifico motu, idea appetendarum & comedendarum rerum absurdarum nascatur. Oportet igitur, ut heterogeneus aliquis humor ferroso-acidiusculus, ac certâ particularum suarum configuratione, ad producendam illam specificam vellicationē necessariâ, præditus inq; sanguineâ Massâ collectus tandem per Glandulas in Ventriculi cavum illabatur, dictumque Affectum producat. Quando hinc Mensium fluxus ab imprægnatione, vel aliis causis est suppressus, ubi venereæ imprimis cogitationes multæ intervenerunt, tum secretitius humor lyphaticus talem non rarò acrimoniam specificam consequitur. Si figuram aut numerum earundē particularum scire exactius desideres, impossibile quid exigis, cum subtiliora hæc

sint, quam ut adcuratè admodum explicari & determinari queant.

Vtut autem hic Affectus Prægnantibus maximè sit familiaris, repertiuntur tamen etiam in *Ephemeridibus Naturæ Curiosorum* observationes v. g. Puellæ bimulæ, Puerorum item eodem afflictorum & laborantium. Retulit mihi ante aliquot annos Matrona nobilis, annum octogesimum jam ingressa, se quadragesimo ætatis suæ anno gravidam desiderio Panum mellitorum, & Spiritûs Vini assumendorum tanto flagrâsse, ut intra 24. horarum spatium ducentos & octoginta octo tales panes, adeoque tot, quot in suis ædibus tum habebat, devorâsse, & dein unius horæ intervallo quatuor libras Spiritûs Vini dephlegmati exhaussisse, sine ullâ subsequente noxâ, tandemque filiam sanam & vegetam, in hunc usque diem viventem, peperisse. Vix elapsus est abhinc annus, quo Fœmina quædam, sexto jam Mense gravida, in foro piscario alii fœminæ adstiterat, Carpium piscem ementi, dumque hæc monetam Piscatori numerabat, ipsa interim clam pisci caudam amputavit, crudamque comedit.

Affectus hinc vel ex solâ Ægrotantium aut assistentium relatione cognoscibilis, à *Picâ* differens, quod in hac absurda, esuique insueta comedantur vel desiderantur, in *Malaciâ* autem esui consueta, sed cruda, aut impræparata appetantur.

Quanquam Malacia per se nullum discrimen portendat, si tamen diu perseveret atque appetitui utcunque irregulari

Subje-
ctum.

Diag-
sis.

Progn-

gulari non satisfiat aliquando, potest etiam periculosos alios morbos, Febrim continuam, Cardialgiam, Colicam, Passionem hypochondriacam, & fortè quid hisce pejus post se trahere. Plerumque tamen Gravidæ primis mensibus tali malo laborantes post quartum gestationis mensem liberantur; si verò ulterius protrahatur, etiam Abortus periculum infert.

In Curatione id præcipuè agendum, ut perversa illa fibrarum stomachicarum stimulatio corrigatur. Fiet hoc, si blandè ante omnia laxemus Alvum, ubi Fœminæ prægnanti sine noxâ sequens exhibere licebit:

R̄. Rhabarb. elect. ℥iij.

Crem. Fri ℥ss.

Scammon. Rat. gr. ij.

Ol. stillat. Mac. gutt. j.

M. F. pulv. subt. d. ad. ch. Sumatur mane pro dosi cum Jusculo farinaceo, vel alio vehiculo, simul observato regimine diætæ.

Vel R̄. Syrup. de Cich. cum Rhabarb. flor. Persic. ana. ℥j.

Elect. e Succ. Rosar. ℥iij.

Aqu. fl. Acac.

Borrag. ana. ℥ss.

Balsam. Embryon. ℥j.

M. F. Potio d. ad. Vitr. Hauriatur summo mane jejuno stomacho pro dosi.

Vel R̄. Panacæ solutiv. alcalin. sive Magnesiae albæ ℥ss.

Dividatur in 4. doses æquales, quæ cum

Aquâ Bugloss. vel Plantag. quadridui spatium mane sumantur.

Hæc Panacea laxans est blandum, vias primas insensibiliter ferè eva-

cuans, si quid modò purgandum inest, absorbens maximum inodorum & insipidum, adeoque Prægnantibus valde conveniens. Dosis ejus ad ℥ij. extendi potest, si ℥j. vel ℥ss. effectum nullum habuerit. Purgato corpore ad usum absorbentium & præcipitantium est deveniendum, quibus liquoris stomachalis perversa activitas blandè destruitur; in hunc finem dari possunt v. gr. seqq.

R̄. Spec. diatr. Santal.

diamarg. frigid. ana. ℥ij.

Terr. sigillat.

Unicorn. fossil. ana. ℥iij.

Cinam. elect. ℥j.

Sem. Fœnic. ℥ss.

Sacch. cand. alb. ℥j.

M. F. Pulv. subt. d. ad. Scatul. dosi m. ac. vesp. ℥ij. ad ℥j. vel ℥iij. cum Vino albo aut rubro veteri.

Vel R̄. Corall. rubr. ppt.

Ocul. ☉. ppt. ana. ℥iij.

Specif. stomach. Poter. ℥j.

Sem. Anis. ℥ss.

Sal. Card. bened. ℥j.

Sacch. cand. alb. ℥ss.

M. F. pulv. subt. d. ad. scatul. Sumatur mane ac vesp. ante Cœnam à Drachmâ dimidiâ ad Drachmam integram.

Vel R̄. Aqu. Betonic. ℥j.

Meliss.

Plantag. ana. ℥vj.

Naphæ. ℥ss.

Syrup. de Pulegio.

Fumar. ana. ℥iij.

Cinam. ℥ij.

Spir. Sal. armon. anis.

Liquor. nitr. fix. ana. ℥ij.

M. d. ad Vit. Sumatur cochleare plenum singulis trihoriiis.

Vel R_x. *Aqu. Borrag.*

Card. bened. ana. ʒiʒ.

Matricar.

Syrup. de Absynth. ana. ʒʒ.

Balsam. Embryon. ʒij.

Θis volat. oleos. Sylv. ʒʒ.

Ocul. ʒ. ppt. ʒij.

Diaph. martial. ʒj.

M. d. ad Vit. m. ac. vesp. capiatur laxulus.

Vel R_x. *Conserv. Fumar.*

Anthos. ana. ʒvj.

Condit. Cort. Aurant. ʒiʒ.

Nuc. indic. ʒj.

CrySTALL. alb. ppt. ʒij.

Bol. Arm. ppt.

Matr. perl. ppt. ana. ʒj.

Ol. Tartar. per deliq. ʒʒ.

stillat. Mac. gtt. IV.

Syrup. Flor. Tunicæ. q. s.

M. F. Elect. d. ad Oll. Dosis Nucistæ magnitudo m. ac. vesp.

Pro specificis nonnulli commendant cum Jul. Cæsare Claudin. Cineres ossium Columbarum: alii laudant Semen Ammeos, Portulacæ, Plantag. Amylum in Jure, Fabas cum Saccharo; Aquam Pampinorum Vitis Virgæ Pastoris, aut destillatam, Decoctum flor. Chamomill. summit. Aneth. quibus tamen Aromata atque absorbentia addere possumus. Decoctum Lignorum lene pro potu ordinario jungendum; Venæsectio etiam ad ministranda, vel Hirudines venis hæmorrhoidalibus applicandi. Vinum Malvaticum, Frontiniacum, aut Hispanicum, Balsamus Embryonum, Aqua Cinnamonum buglossata subinde ad co-

chleare unum vel alterum est concedendum.

Denique indulgendum est interdum Ægrotantibus, permittendumque ut absurda quædam, si valdè desiderata fuerint comedant, modò ne excessus committatur. Sæpè enim ab ejusmodi rebus irregularis Appetitus correctus fuisse notatur; & contrà, si mordicus denegatæ illæ sunt, Fœminæ in Lipothymias & abortiendi discrimen inciderunt. Quod si verò etiam discursu & confabulatione amicâ dehortari possis à desiderio noxiarum, rem certè præstiteris Mulieri uterogenti maximè salutarem. Denique reperiuntur Matronæ, quæ haustibus quibusdam Acidularum à Malaciâ fuerunt liberatæ.

ARDOR VENTRICVLI sive SODA est exhalatio maximè acris, bilioso-acida, è Ventriculo per Oesophagum & Gulam in Palatum elevata, atque Fauces ardente sive urente dolore valdè molestant.

Pars affecta est Ventriculus primariò, hinc & Gula atque Fauces, quoad fibras suas nervoso-membranaceas, à fervente exhalatione molestatas.

Proximè molestiam hanc producit non nisi vitiosa ebullitio alcalinorum atque acidorum humorum in Ventriculo existentium, sub quo effervescentiæ actu particulæ in rapidiorem motum concitatæ exitum hinc inde quærunt, simulque caloris ardorisque sensum producant. Ebullitio autem illa contingit à concursu particularum alcalinarum & acidarum in Ciborum ingestorum solutione; dum enim Cibi af-

bi assumti partim maximè pingues aut lenti sunt, partim de acido alcalino ve Sale plurimū participant, evenit ut nō nullis post pastum horis, sub Chylificationis actione; particulæ æreo elasticæ nimium inviscantur aut comprimantur, hincque cum difficultate penetrantibus Materiæ subtilis molculæ tota massa in motum intestinum rapidiorem agatur, ac ita ebullientibus vaporibus falso-acribus oleosis Ardor in Faucium tunicâ producatur. Proin omnes Pastæ farinacæ, Caseus, Butyrum, Cepæ, Allium, Porrum, mellita, saccharata, Carnes maximè pingues, Fructus horæi multum comestī, præprimis superhausto largius Vino nonnihil austero, Sodam frequenter tribus vel quatuor horis post pastum excitant. Vterius tamen ad eandem contribuunt Studia mox ab assumto Cibo reassumta, præcipuè dum corpus inflectitur, sicque bilioso-sulphureus humor in Ventriculum quasi è Duodeno propellitur: deinceps etiam nimia Corporis exercitatio, qua Ciborum ingestorum particulæ in Ventriculo vehementius inter se agitantur.

Quibus itaque acidus nimis contingit Liquor digestivus Ventriculi, illis Soda familiaris est, promteque tum excitatur, quando sese Cibus supra dictis in Convivio nimium saginârunt; vel quando prioribus Cibus nondum planè digestis, novos largius ingesserunt; quando itidem Vina, imprimis nondum planè defæcata copiosius ingurgitârunt.

Cognoscitur ex solis Hominum

querelis; contingit autem nunc sanis utcunque hominibus, nunc ægris, in quibus variorum morborum symptoma esse potest. Halitus nimirum sunt acres stomachi, qui inter eructandum per Gulam flammeum quasi ardorem, subinde cum Nauseâ, in Palato efficiunt. Nullus tamen propriè ructus percipitur, sed tantum ardens ac veluti urens halitus vel flammeus quasi Spiritus in Faucibus obhæret, erumpere vix potens. Præcipuè contingit tribus quatuor vel quinque horis post pastum, ubi materia ciborum in statum turgescentiæ devenit. Molestia est ingens, ultra horam vel diutius etiam durans; præprimis si vehemens corporis exercitium intervenerit.

In *Prognosi* multum heic dici nequit, dum præter magnum incommodum faucium omni alio periculo Affectus hic careat. Si tamen duret diutius, tandem Cacochymiam vel Cachexiam post se trahit. *Prognosis*

In *Curatione* molestiæ præsentis huic indicationi unicè est satisfaciendum, ut pugnantium inter se humorum ebullitio sedetur, atque deprimatur. Quod quidem fit exhibendo *Pulveres alcalinos* spicula salium turgescientium in sese absorbentes, aliave salina corpuscula præcipitantes, sicque particulis in liquore effervescente alium prorsus situm conciliantes: quales sunt præ aliis *Panacea solutiva alcalina, species Diacretæ Myns.* vel solitariè etiam *Creta alba, Oculi ☉. Bolus Armen. C. C. ustum, Lapid. Carpion. Grana Touris, Corall. ppt. Margarit. ppt. Siliquæ dulces comestæ, Nux moscha-* *Curatio.*

ta, Rad. Liquirit. pulver. è quibus cum Saccharo pulvis usualis concinnari facile potest, nunc per se, & siccè, nunc cum Syrupo Violarum aut Aquâ Plantag. Cichor. Hierac. Taraxac. vel simpl. Aqu. fontan. sumendus: à quo pulvere sæpius in momento Soda extinguitur. v. gr.

R̄. Spec. diacr. Myns. ʒj.

Sacch. alb. ʒvj.

M. F. pulv. subt. d. ad scat. Dosis cuspidis cultri.

Vel R̄. Cret. alb. Colon.

Ocul. ʒ. ppt.

Corall. alb. ppt. ana. ʒij.

Bol. armen. ppt.

Pulv. rad. Liquir. ana. ʒj.

Sacch. alb. ʒj.

M. F. pulv. subt. d. ad Ch. Dosis cuspidis cultri plenus.

Parari sic etiam poterunt ex iisdem pulveribus cum Saccharo, Aquâ Plantaginis soluto, Rotulæ magistrales, necessitatis tempore frequentius lambendæ. v. gr.

R̄. Corall. alb. ppt.

Crystall. alb. ppt.

Bol. armen. ppt.

Lapid. Carphon. ppt.

Cret. alb. Colon. ana. ʒij.

Nuc. mosch. ʒʒ.

Conf. Alkerm. inc. ʒj.

Sacch. alb. Aq. Rosar. solut. ʒiiij.

M. F. l. a. Rotul. d. ad Scat.

Vel R̄. Magnes. alb. ʒj.

Ocul. ʒ. ppt.

Cret. alb. Colon. ana. ʒʒ.

Pulv. rad. Liquir. ʒij.

Sacch. alb. Aq. Ros. solut. ʒiiij.

M. F. l. a. Rotulæ d. ad Scatul.

Quod si post singulos ferè pastus hæc Affectio hominem torqueat, tum nihil ubi valdè obstat, Vomitorio aliquo Ventriculus à depravato fermento liberari, hinc verò per aliquot dies Pulvis ejusmodi absorbens debitâ ʒʒ. dosi mane ac vesperi in usum vocari poterit. Præservationis gratiâ curatio quoque instituitur, ita enim qui crebrius huic Incommodo sunt obnoxii, tandè ab illo fecilicissimè per Potû Acidularum, Thermarum fabariensium, Succorum è Plantis Antiscorbuticis expressorum, aut Aquarum ex Herbis alcalinis aut traumaticis destillatarum liberantur. Rosiones Ventriculi ab acrimoniâ Bilis oriundæ præter Acidularum vel Aqu. Plantag. Scabios. Taraxac. Endiv. Cichor. Lactuc. unum aut alterum haustum simul tolli possunt Pulvere Hepatico rubro, Cremore Tartari, Lapide Prunellæ, Antimonio diaphoretico, Terr. sigill. & id genus aliis in pulverem redactis. Finckius in Enchirid. Pract. sequentes commendavit Morfulos.

R̄. Cret. alb. Colon. ʒj.

Ocul. ʒ. ppt. ʒʒ.

Abluantur ter aut quater cum Aquâ Borragin. & Violarum. dein adde

Bol. Armen. ppt. ʒiiij.

Corall. rubr. ppt. ʒij.

Margarit. ppt. ʒj.

Macis torrefact. ʒʒ.

Cinnam. opt. ʒj.

Sacch. cand. alb. Aq. Ros. solut. ʒviiij.

M. F. l. a. Morfuli, de quibus tempore Sodæ aliquid comedatur.

Celeberr. Wedelius Amœnit. Mat. med.

Med. refert, in Aulis quibusdam solenne esse, solo obtutu *Carlinæ* scandentis, & post florem perfectum in Semen fatifcentis Sodam curare: novimus inquit, *Nobilem eruditissimum*, qui malo isto mirum quantum vexatus unâ hâc utitur antidoto cum insigni successu, nullâ forsan aliâ de causâ, quàm quòd ad spectu illo *Archæus* moveatur fortius ad resistendum effervescentiæ illi humorum acidorum & biliosorum constringentium.

Extus Ventriculi regioni cum fructu sæpius tepidè adhibentur roborantia, & effervescentiam quomocunque compescunt: quemadmodum laudantur inter alia *Oleum omphacinum, rosaceum, myrtinum, Cydonior. Lentisci, Myrtillorum, mastichinum, Absynthii, nardinum.*

In *Dieta* abstinendum à multo usu Ciborum pinguium, Vinorum item largius haustorum, aut Cerevisiæ qualiscunque facile acescentis. Temperant verò Ardorem Olera humida diluentia, v. gr. *Lactuca, Intybi species, Violæ, Borrago, Acetosa, Trifolium acetosum, folia Vitis, Capreoli Vitium.* Sunt qui Fructus quoque acidulo succo præditos commendant, v. gr. *Poma Citria, Limon. Aurant. Granat. Cerasa, Pruna, Fragas, Uvas crispas, Ribes*, sed minus tamen istos efficaces deprehendimus, imò nòxios, si *Vinum* superhaustum fuerit, unde Ardorem planè auctum deprehendi. *Aqua fontana* optima, vel *Decoctum* nobis à multis annis pro potu ordinario consuetum ex *Ligno Sassafras & Radice Filicis*, mirè Sodam compescit & impedit. Aliis placet tempore paro-

xyismi haustus frequens *Aquarum destillatarum Lactucæ, Portulacæ, Endivie, Plantag. Cichor. Buglossi. Acetosæ, Nymphææ*, quibus pro Julepo faciendo quandoque *Syrupus Violar. de Nymph. Portulac.* admisceri potest.

ARIDVRA MEMBRORVM, ATROPHIA, TABES SPECIALIS, Glied - Schwveinung, est Nutritio in hoc vel illo membro tantum, non autem in toto corpore simul abolita. Diversæ autem partes sunt, quæ hanc Ariduram experiuntur, subinde Oculus alteruter, nonnunquam Brachium vel Crus, Manus aut Pes alteruter ita contabescunt. In his verò partibus non substantia Osium, Cartilaginum Tendinum aut Membranarum durior & solidior, sed substantia mollior pinguis & carnosæ consumitur, atque non tam in longitudine, quàm in amplitudine minuitur.

Sed notandum tamen, consumptionem unius tantum partis rarius vel nunquam esse totalem, aut ita perfectam, ut tandem planè consumpta pars emoriatur, reliquis membris sanis manentibus; quin aridura aliquousque progreditur, & in certo ut plurimum gradu subsistit, cum semper aliquale nutrimentum, si non sufficiens in partis nutriendæ poros admittatur.

Affectus proin est cognitu facilis ex solo intuitu, & partis, si quæ adest, oppositæ comparatione; nimirum metiri oportet membrum v. gr. Crus aut Brachium, quod tabescere creditur, & cum opposito dein conferendum, sic discrimen ad oculum patebit ex diminutione & flacciditate quadam affectæ

Aridura, Atrophia specialis.

Pars affecta.

Diagnosis.

Partis; cùm sana pars nonnihil solidior deprehendetur. Vt plurimum etiam dolor velut terebrans, contundens, aut lancinans partem prehendit ac tenet, præprimis si in lecto sub stragulis teneatur; quando quidem membrum ejusmodi calorem pennarum sine augmento doloris perpeti ac tolerare nequit. Friget etiam pars tabescens magis quàm sana, & sicubi homo ad sudorem sese componit, omnia membra facili sudore madebunt, exceptâ solâ parte arefcente, quæ sicca, imò ut plurimum frigida manebit; unde etiam nostrates appellant Malum hoc sæpè ein kaltes Gesicht, quam hujus passionis speciem Rheumatismi, vel Doloris rheumatici nomine indigitare alias soleamus. Quando autem tabes membri jam aliquotusque progressa est, tum cutis in ipso flaccida, rugosaque evadit, quæ in membris reliquis sanis durior, atque expansa magis existit.

Causa

Nutritum itaque deficit in parte, quando hæc vitio quodam laborat, ob quod nutritiæ particulæ discerni, atque intra poros admitti sufficienter nequeunt. Vitium illud esse solet nunc erosio, nunc discissio, dilaceratio, contusio, obstructio, compressio aut tensio nervulorum membranaceorum. Erodunt ac putrefaciunt humores acres; discindunt instrumenta varia acuta vulnerantia & secantia; dilacerant res maximè externæ: contundunt res graves, ponderosæ; obstruunt liquores nonnihil viscosi; conprimunt tumores vicini qualescunque pituitosi, sanguinei aliive; tendunt de-

niq̃ue, dolorificè lancinant, atque sæpius spasmodicè crispant & contrahunt particulæ acres Lymphæ alicujus inter membranas collectæ, stagnantis, ac subinde adquisito qualicunq̃; sese diffundendi conatu fibras circumstantes expandentis. Lymphæ stagnanti occasionem haud raram præbent sudor percussus, frigidus Aër, gelida ve Aqua membra calentia subito, vel diu nimis lambens, unde cutis cum vasis subjectis constringitur, pori ac tubuli angustantur, sicque Lymphaticus humor in suo cursu impeditur. Contingit in uno membro magis quàm in altero, quando unius fibræ fortiores efficacius rigidis circumfluentium corporum particulis obsistunt, quàm alterius fibræ teneriores. Itaque cum ob qualemcunque dictarum causarum tonus fibrarum nervosarum in parte nutriendâ mutatur, debilitaturve, tum pori quoque, per quos succus nutritius ex sanguine transcolari debet, ita angustantur, ut succo tali sufficienti transitum concedant difficilem; hinc & in Paralyfi ob defectum Liqueoris nervei, tonum fibræ exhibere consueti, Aridura membrorum contingit. Difficiliter & non nisi cum dolore intenso membra hoc morbo laborantia ferunt stragula Lecti, & plumarum sive pennarum calorem, utpote à quo humor stagnans frustraneum sese expandendi nisum adipiscitur, à quo nisu postea distentæ perpetim membranæ dolent; idque tanto magis, quando tensio nervorum satis magna evadit, humorque stagnans è suâ sede dimoveri nequit.

Obsti-

Obstinatum hoc est Malum, sæpiusque diu hominem vexat & excruciat, ut quo se vertere cum doloris levamine queat, penè nesciat; in alium tamē affectum rarò mutatur. Si Paralysis nervorum membri in culpâ est, tum dolor nullus affligit, Affectusque curari potest, tum quando nervi non sunt vel discissi vel dilacerati, erosi aut tenacius obstructi, heic enim curatio nulla est speranda.

Curatio proin vel obstructos qualitercunque nervulos aut poros, vel eosdem compressos, aut Per validiorem membranarum expansionem distortos, quale quid Lympha stagnans plus minus viscida & acris producit, respicere solet. Si obstructi sint pori, per quos succus nutritius transire debet, aut propter flaccidi resolutionem nervi, tum intus ante omnia purgans unum vel alterum dabitur, v. gr.

℞. Mass. pilul. Marocost. ℥j.

Mercur. dulc. opt. gr. 15.

Resin. Jalapp. gr. 2. vel 3.

Ol. stillat. Lavend. q. s.

M. F. pilulæ no. 15. d. ad scat. Suman-
tur manè jejuno stomacho pro dosi cum re-
gimine diætæ.

Vel ℞. Mass. pilul. è succ. Crat.

Hydropic. Bont.

Cinnab. ḡ n. correct. ana. ℥ß.

Magister. Scañ. gr. 2. vel 3.

Ol. stillat. Thym. q. s.

M. F. pilulæ no. 15. Inaur. d. ad scat.
Suman-
tur pro dosi ut supra.

Vel ℞. Extr. Cathol. ℥ß.

Trochiscor. Albandal. gr. 1.

Cinab. nativ. opt. gr. 8.

Ol. still. Succin. vel Rorism. q. s.

M. F. l. a. Pilulæ no. 10. vel 12. Inaur.
d. ad scat. Suman-
tur pro dosi ut supra.

Ejusmodi purgantes Pilulæ ali-
quoties, bis nimirum vel ter in hebdo-
madâ, dari possunt, ad obstructionis
pertinaciam tanto melius superan-
dam; vel etiam Vinum medicatum
per epicrasin purgans exhibere licebit:
v. gr.

℞. Rad. Angelic.

Calam. arom.

Imperat. ana. ℥iij.

Herb. Betonic. Mj.

Majoran.

Meliss.

Ocymi.

Summit. Abrotan.

Centaur. min. ana. Mß.

Flor. Primul. veris p. ij.

Semin. Fœnicul.

Bacc. Junip. ana. ℥iijß.

Fol. Senn. opt. mund. ℥j. ℥ij.

Rhab. el. ℥ß.

Rad. Helleb. nigr. ℥iijß.

Cortic. Winteran.

Spic. indic.

Θis Juniperi. ana. ℥j.

Incisis, contusis inque nodulo ligatis,
affunde

Vini albi veter.

Aqu. fontan. ana. ℥iijß. pond.
civil.

Stent per primam noctem in cineribus
calentib⁹, postea singulis diebus mane Cya-
thus unciarum quatuor plus minus ex-
hauriatur.

Dum verò hoc vino aut præce-
dentibus remediis utitur Æger, simul
alia aperientia blanda in usum voca-
bit:

bit: & quidem si manè purgans fuerit assumptum, vesperi, si nullum verò sit datum, mane ac vesperi sequentium remediorum unum vel alterum assumat:

R̄. ☉is volat. oleos. Sylv. 3℞.

D. ad Vitr. dos. 15. ad 25. guttæ cum

Aquâ Beton. vel Infus. fol. Beton.

Meliss. Thee &c.

Vel R̄. Spirit. Salis arm. fœnicul. aut anisati. 3ij.

Meliss.

Essent. Succin.

Beton. ana. 3j.

M. d. ad Vitr. Sumantur 20. aut 30. guttæ pro dosi.

Vel R̄. Tinct. aperit. Mæb. 3℞.

Essent. Trif. fibrin. 3ij.

M. d. ad Vitr. Dosis ut supra.

Vel R̄. Spirit. Cochlear. 3℞.

Tinct. Castor. cum Salis arm. parat. 3ij.

M. d. ad Vitr. Dosis 20. 25. vel 30. guttulæ.

Vel R̄. ☉is vol. ol. 3℞.

Essent. Ambr.

Succin. ana. 3j.

M. d. ad Vitr. Sum. mane ac vesp. 25. guttulæ. pro dosi.

Vel R̄. Tinctur. ☿ ii cum Nitr. par.

Spirit. ☿ri. ana. 3ij.

M. d. ad Vitr. Dos. 25. ad 30. gutt.

Vel R̄. Specif. antihect. Pot.

Spod. ex Ebores ppt. ana. 3ij.

☉is vol. C. C. purior.

Radic. Ireos flor. ana. 3j.

Pulv. Fol. Thymi.

Melissæ.

Ocymi. ana. 3ij.

Sacch. cand. alb. 3i℞.

M. F. pulv. subt. detur ad Scatulam; Dosis 3ij. ad 3j. manè ac vesperi cum vehiculo convenienti.

Vel R̄. Radic. Aron.

Sigill. Salom.

Scrophular. ana. 3j.

Folior. Betonic.

Majoran. ana. 3ij.

Semin. Anis.

Pæon. ana. 3iiij.

Corall. rubr. ppt.

☿ ii diaphoret. ana. 3ij.

☉is volat. Fuligin. aut

Succin. 3j.

Sacch. alb. 3i℞.

M. F. pulv. subt. detur ad scat. Sumatur ut supra.

Vel R̄. Specier. dianth.

diamor. ana. 3j.

C. C. philos. ppt. 3iiij.

Rad. Pæon.

Semin. Rorismarin.

☉is vol. Ebor. aut.

Viperarum. ana. 3ij.

Sacch. penid. 3j.

M. F. pulv. subt. d. ad scat. Dosis ut supra.

Vel R̄. Specif. cephalic. Michaël. 3vj.

Diaphoret. lunar. 3ij.

Sacch. rosat. 3iiij.

M. F. pulv. subt. div. in 16. dos. æqu. ad ch. mane ac vesperi sumendas.

Vehiculum ejusmodi Remediorum esse potest, Infusum fol. Thee, Betonic. Meliss. Ocym. Serpill. Salv. Nasturt. aquat. Beccabung. Plantag. aquat. Trif. fibrin. &c. cum Rad. Calam. aromat. Angelic. Caryophyllor. arom. Cort. rec. Aurant. & similia. Vel Aquæ destillat.

lat. talium Plantarum largis haustibus, aut Vinum Creticum, Hispanicum, Frontiniacum, Hungaricum, aliudve generosum modicè simul propinabitur. Præterea convenientia sunt omnia remedia, quæ intus assumenda in Paralyfi commendata inveniuntur.

Extus si homo sufficientem sanguinis quantitatem habeat, Venæsectio in latere Membri affecti celebrabitur post purgatum ante omnia corpus, vel Cucurbitulæ cum scarificatione dorso, & sine scarificatione Parti laboranti applicantur. Præterea quotidie mane ac vespere ejusdem Partis frictiones calidæ & fortes satis cum duro panno vel linteo instituendæ veniunt, ac deinceps Unguentum contra Tabem, qualecunque probatum, diligenter inungendum, quemadmodum hætenus sequentia cum felicissimo successu in plurimis usurpata esse comperimus:

℞. Radic. Angelic.
Imperat. ana. ʒiij.
Herbar. Calaminth.
Levistic.
Origan.
Chamæpith. ana. rec. Mj.
Summitat. Juniper. Pini,
Sabin. ana. rec. Miß.
Lavendul. Mß.
Flor. Chamomill. rec. Mj.
Baccar. Juniper. matur. Mß.
Cancr. vivor. contus. no. 7. vel 8.
Incisis atque leniter invicem contusis
affunde
Vin. alb. veter. ℥iß.
Axung. Porc. rubr.
Ungul. Caballi ana. ℥j.

Coque omnia invicem, usque ad humiditatis omnis evaporationem, hinc cola & exprime Unguentum, cui tamen ulterius permisce

Ol. stillat. Bacc. Juniper.

Spicæ.

laurin. ana. ʒß.

M. F. Unguentum calidè inungendum.

Vel ℞. Radic. Calam. arom. ʒß.

Summit. Abrot. Mij.

Sabin. Mß.

Herb. Salv. nob.

Urtic.

Perficar.

Rutæ,

Rorismarin. ana. Miß.

Bacc. Juniper.

Laur. ana. ʒvj.

Semin. Fœnicul.

Levistic. ana. ʒiij.

Incis. & contusis affunde

Vini alb. veteris. ℥iß.

Stent per noctem in loco tepido postridie mane adde

Medullæ ossium bubulor.

Butyr. recent.

Axung. Vulpis vel

Ursi, Taxi aut

Canis, ana. ʒviiij.

Coque statim leni igne ad humiditatis consumptionem, postmodum cola, & colato Linimento permisce ulterius

Pulv. Rad. Pyrethr.

Cyper. rotund. ana. ʒiij.

Semin. Sinap.

Piper. alb. ana. ʒij.

Ol. Lumbr. terr. ʒß.

Laterum aut

Philosophorum. ʒj.

M. F. Unguentum detur ad Ollam.

L

Vel

Vel \mathcal{R} . *Sanguin. porcin. vel*
Vitulin. rec. adhuc calent. ℥j.
℞is commun. ℥℥.
Pulveris Semin. Sinap.
Rad. Euphorb.
Zingiber.
Garyophyll. arom. ana. ℥iij.
Misce probè super ignem lenem,
& adde
Axung. orcin.
Caballin. ana. ℥iij. v. q. f.
Detur ad Ollam ac inungatur calidè.
Alii laudârunt sequentia, quæ contem-
nendæ virtutis non sunt.

\mathcal{R} . *Ung. dialthææ.*
Olei laurini. ana. ℥vj.
Adipis vulpin.
Taxi, ana. ℥ij.
Ol. Lumbric. terrestr.
Castor.
Cheiri,
Juniperi ex Lignis,
Laterum,
Petræ,
Terebinth.
Succin. nigr.
Spicæ,
Resin. liquidæ. ana. ℥j.
Ceræ citrin.
Terebinth. ana. ℥iij.
Pulv. Piper. nigr.
Alumin. plumos.
Radic. Pyrethr. ana. ℥vj.
M. F. l. a. Unguentum.

Vel \mathcal{R} . *Butyr. recent.*
Axung. porcin. ana. ℥℥.
Baccar. matur. Junip. Mij.
Summit. Sabin. incis. Mij.
Misce & coque tamdiu invicem, do-

nec Baccæ Junip. crepare desinant; co-
latæ dein Pinguedini immisce

Pulv. Baccar. Laur.
Caryophyll. arom.
Piper. nigr.
Zingiber. ana. ℥℥.

Atque sic probè in formam Vnguenti
redige, quod calidè semper post fri-
ctiones inungi potest.

Sunt qui Cochleas recentes con-
tusas cum Baccis Juniperi, itidem con-
quassatis, in recenti Butyro nonnihil
coquunt, dein per linteum exprimunt,
postea agitari curant, usque ad re-
frigerationem & incrassationem, tan-
demque permiscent adhuc aliquid de
Spiritu Anthos, Ceras. nigr. Juniperi,
aut *Melissæ.*

Quòd si Vnguentis prædictis ad-
das sufficientem quantitatem *Ceræ,*
Picis, ac *Terebinth.* tum habebis Em-
plastrum itidem efficax, Parti applican-
dum. Præter hæc Membrum affli-
ctum quotidie per aliquot tempus est
ad sudorem compellendum, idque in
particulari, quantum possibile, *Laco-*
nico, vel calentem Laterem coctum
propè admovendo, vel vaporem cali-
dum maximè ex *Decocto Herbarum ce-*
phalico-nervinarum, aut *Spiritu Vini*
accenso, admittendo. Si hæc nil pro-
ficient, *Embrocatio* in locum affectum
quotidie semel aut bis, quadrantis ho-
ræ spatio, venit admittenda, eaque
vel cum Aquâ calente Balneorum aut
Thermarum mineralium, vel cum de-
cocto quodam Herbarum cephalica-
rum. Embrocationes tales excellen-
tium sunt virium, atque sub *Duciæ, la*
Duche vel Touche, nomine in Thermis
Lotha-

Lotharingiæ Plumbariensib⁹ frequentissimæ existunt. Vfus tamen etiam solus, sive Balneatio Thermarum quarumvis v. gr. Fabariensium Rhætiæ, Badensium Helvetiæ, Wisbadensium Wetteraviæ, Embsensium, Carolinarum Bohemiæ aliarumve, malum hoc omne, ni inveteratum fuerit, tollere valet. Non rarum quoque est, *pica-tia* vel *picationes*, *rubefacientia*, aut ipsa quoque *vesicatoria* patienti membro applicare, utpote à quorum Sale volatili penetrante sæpè stagnans humor dissolvitur aut dissipatur.

Quando compressi sunt à luxato articulo nervi, tum luxatione correctâ statim Aridura cessat. Si verò dilacerati, erosi, discissi, vel amputati iidem sint, tum Vulnus consueto more curabitur, sed Aridura qualiscunque membri præcaveri nequit, quoniam discissi nervi aut tendines nunquam ita amplius regenerantur, ut pristinum tonum partibus impertiri queant. Si Tumores scirrhuso-pituitosi fuerint in culpâ, tum curatio ea est instituenda, qualis in Scirrhuso commendari solet. Vbi autem facta contusio originem malo præbuit, nil melius, quàm *Spiri-tum Vini camphoratum*, aut *Herbis cephalicis* atque *Baccis Lauri & Juniperi* imprægnatum, calidè sæpius applicare, vel Sacculum iisdem Herbis repletum & Vino incoctum crebrò admovere.

ARQVATVS NIGER, Vid. *Icterus niger*.

ARTHRITIS est dolor Articulorum cum flectendi impotentiâ, subinde & tumore plus minus inflam-

matorio conjuncta, ac ab humore salino-acido, lento, viscido aut glutinoso, glandulas Articulorum infarciendo, hincque tendinum ordines & fasciculos rodente, pungente atque à se invicem distendente oriundus.

Varias hic Affectus admittit *Dif-* *Ejus dif-*
ferentia. *ferentias*: etenim ratione *loci* nunc est in Articulis Pedum, & appellari consuevit *Podagra*; nunc in Articulis Manuum & vocari solet *Chiragra*; nunc in juncturâ Coxendicis vel Ossis Ischii suam figit sedem, sub nomine *Doloris Ischiadici*; nunc in Articulis vertebra-rum dorso atque aliarum partium simul affligit, & *Rheumatismus* nuncupatur. Respectu *durationis* Arthritidis dividi potest in *fixam*, quæ diu admodum non sine tumore unum eundemque possidet torquerque Articulum, atque intra octidui vel plurium dierum spatium vix inde recedit: & *vagam*, quæ sine notabili tumore Juncturam quandam occupat, ac intra 24. horarum aut bidui vel tridui spatium iterum cedit, sed in alium mox Articulum transit, sicque de parte in partem subinde per plures septimanas migrat, donec dyscrasiâ Massæ humoralis optimè correctâ penitus cesset & extinguitur.

Proximè igitur Arthritidem in genere producit humor seroso-viscidus, lentus, tartareus & acris, multo Sale fixo, plus minus acido, sed minimè tamen corrosivo constans, ac intra glandulas, Articulorum, internodia frequenter stipantes, earumque tubulos stagnans, non autem uti nonnulli crediderunt, extravasatus. Dum *Causa*
proxima

verò humor sic stagnat, sensim appellentibus jugiter novis particulis accumulatur, hinc vascula distendendo, ac fibras acrimoniâ suâ salsâ lancinando, in vicinis tendinum ac membrarum nervis maximè sensibilibus Dolorem, quem vocant, arthriticum, excitat. Inflammatio dein simul oboritur, quando stagnatio etiam in extremis arteriolis contingit, per quas postea salino-sulphureus Sanguis ob suam crassitiem penetrare nequit. Quod si hinc stagnatio contingat in Talo vel Articulis digitorum pedis, inibi què diu fixè hæreat, ac denique tumorem pariat, plus minus inflammatorium, dicitur *Podagra* consuevit, prout in manibus *Chiragra*; in Genubus *Gonagra* &c. nuncupatur. Atque hæ sunt species fixæ *Arthritidis*. Si autem stagnatio levis sit, partem què in tumorem non attollat, nullam inflammationem valdè notabilem pariat, paucis atque horarum intervallis inde iterum recedat, aliumve mox Articulum occupare incipiat, materiæ stagnantis minorem fixitatem aut terrestreitatem præsupponit, atque *Arthritidis vagæ* nomine venit. Tandem si idem humor stagnans ex falsis admodum fixisque particulis constet, *Arthritidem vagam scorbuticam* inducit.

Causa
antecedente

Ad causæ istius proximæ collectionem *antecedenter* contribuunt ferrosæ, salsæ, fixæ, plus minus acidæ ac terrestres particulæ, copiosius in Massâ humoralis natæ: hinc & Liquoris gastrici minor volatilitas, ac proinde chylicatio debilitata, & balsamico-volatilium alimenti assumpti particula-

rum imbecillis exaltatio. Subinde tamen accusandus venit lentor massæ sanguineæ, à diuturniore morbo inductus: neque enim infrequens est, *Arthritidem vagam* tali Affectui succedere. Adde quod apud nonnullos hæreditaria sit dispositio humorum ad *Arthritidem* formandam. In Causis *procatarteticis* Aër vernalis vel autumnalis, quoad frigus, humiditatem & calorem indies mutabilis plurimum ad multiplicandos *Arthritidis* paroxysmos confert. Sed nec minorem ansam præbent Cibi sale fixo vel falso copioso, & succo crasso, lento, prædicti: Vina in solo vel terrâ calcariâ, cretaceâ & bolari provenientia, crassa, tartarea, minimè diuretica: Cerevisia minus defœcata: Ira frequens & vehemens: Venus nimia crebraque.

Quoad *Diagnosin* *Arthritidis fixæ* *Diagnos.* imminere creditur, quando causæ ejusdem præcesserunt, nimirum si Parentes fuerint simul arthritici, si homo Iræ nimie, Veneri atque Vino maximopere indulserit, si ex levissimâ causâ, scilicet: ambulatione aut calceorum novorum attritu, statim dolorem circa Articulos persentiat. *Arthritis* hæc fixa seu *Podagra* ut plurimum homines in virili ætate constitutos primumprehendere solet, rarius infra aut supra illam ætatem versantes, rarissimè adhuc foemininum sexum. *Vaga* autem *Arthritis* nulli fermè nec ætati nec sexui parcit. Sicuti & *Rheumatismus*, Dolorque *Ischiadicus* promiscuè homines qualescunque adoriri consuevit. *Præsentem* verò *Arthritidem fixam* indignant vehemens dolor pun-

pungens, tensivus, ardens ac pulsans; tandem etiam tumor atque rubor, cum flectendi impotentiâ in Articuli unius vel plurium affectorum regione, ac circa eam. In principio hic Morbus ferè solum Articulum pollicis pedis semel aut aliquoties invadit, postea autem ulterius obambulando etiam alios Articulos sensim corripere solet. Novi paroxysmi ferè semper inchoant cum Febri ephemerâ, plus minus intensâ siti, & appetitu imminutò, aut prostrato. In progressu autem paroxysmi subinde appetitus utcunque bonus adest. Sæpè etiam ex improvviso hi dolores aliquem corripunt. Tumor cum rubedine aliquâ mox citius mox tardius supervenit: aliàs etiam citra manifestam rubedinem tumor iste magis œdematicus videtur. In carnosissimis autem Coxæ vel Homoplatae locis tumor ejusmodi non compareret, saltem visibilis non est. Symptomata dein ista diutius in eadem parte, & quidem frequenter ad octo, decem pluresve dies permanent, licet enim sæviens dolor plerumque intra biduum aut triduum mitior evadat, subsistit tamen postea adhuc tumor, isque non nisi paulatim discutitur. Dum verò sic unum Affectus Articulum deferere incipit, mox alium illico prehendit, nonnunquam etiam duos vel tres in brachiis aut pedibus eodem tempore simul tenet, ut adeo totum Paroxysmi arthritici tempus non rarò ad duos aut tres pluresve menses extendatur. Subinde paroxysmi levius & mitius Ægrum habent, subinde gravius affligunt, prout nunc plures & graviores,

nunc etiam leviores causæ morbificæ in circulante massa existunt, Ægerque diætæ laudabiliori aut deteriori indulserit. Podagra autem succedente tempore, & postquam per plurimos jam annos hominem est excruciatâ, nodosa ac tophacea redditur, cum tendinum exiccatione, & membrorum incurvatione, sive contracturâ: in quâ quidem, juxta internodia digitorum Manus vel Pedis, frequenter tubercula dura nascuntur, quæ successu temporis suppurata & aperta nunc album fluidum ac lentum pus, nunc materiam gypsi vel calcis instar concretam, albam maximè & friabilem, exhibere solent, quæ siccata veram calcem refert, sæpè etiam intra Articulos ipsos in calculos plures paucioresve inæquales plus minus indurata mutatur & convertitur.

*Podagra
nodosa.*

Arthritidem præsentem vagam produnt eadem symptomata modò dicta (exceptis nodis atque contracturis) citra notabilem plerumque tumorem Articulos prehendentia, sed citò & intra paucarum horarum spatium sæpissimè iterum evanescentia, inque alium Articulum migrantia. Vbi tamen causa morbifica fixioris non nihil est texture, malum hoc etiam ad duos vel tres dies unum torquere locum potest. Morbo huic, plerumque conjuncta est Febricula continua lenta cum siti, anorexiâ, maximâ lassitudine, subinde & Cephalalgia, Alvi constipatione, Pulsu celeri minusque forti, Urinæ crassitie & turbatione, non sine sedimento vel corallino vel cinereo. Tota autem morbi periodus ut plurimum per integrum mensem durat, sæpius etiam ultra tri-

*Signa
præsentis
mali va-
gæ.*

mestres, imò ad semestres protrahitur; sed qui semel eundem est expertus raro secundâ, aut terriâ vice in eum incidit: cùm è contrario *fixâ* Arthritis singulis aâis, bienniis aut trienniis semel vel pluries redire soleat. *Ischiadic⁹* dolor hyberno tempore diu durare, æstivo autem citiùs suam periodum absolvere, hominemque citra aliorum Articulorum offensionem vexare consuevit. Etenim pluries observavimus, non podagricos Homines, sed alios quoscunque Ischiadico affectu magis affligi. Denique & hoc notabile, Podagricos, si obesiores fuerint, frequenter ante insultum paroxysmi Glandularum palatarum, fauciumque inflammatione, quandoque in Abscessum abeunte, laborare.

Prognosis

Prognosis nobis indicat in genere, omnem Arthritidem, qualiscunque fuerit, non quidè per se adeo periculosa, sed dolorum tamen vehementiâ molestissimam, atque duratione sæpius contumacem existere. Fixa etiam Arthritis, quæ quotannis ferè aliquoties affligit, & irradicabilis apud plerosque *Ægros* existit, tandem citius vel tardius contracturam affert, nonnullaque eorum membra ad motum aut gressum impotentia reddit. Chronicus ergo hic est Affectus, à Juventute aut virili ætate ad senium usque incertis temporum intervallis affligens. Tandem cum materia arthritica non amplius externa membra petit; sed intus subsistere incipit, morbos vel acutos vel lentos atque lethales post se trahit, v. gr. Febres ardentes, Inflammationes viscerum, Apoplexias, Convulsio-

nes, Asthmata, Orthopnoeam, Tussim, Cordis palpitationes, Hydropes pectoris, Phthises, Nephritides intensissimas, Vomitus continuos, Hæcticam, &c. Inprimis autem hoc notetur, Nephritidem Podagræ sæpius conjungi, & quidem nunc antecedere nunc subsequi paroxysmum Arthriticum. Fixa porrò Arthritis malum est ferè incurabile inprimis ubi nodosa fuerit reddita, profundas jam egerit radices, ac per malum victûs regimen jugiter acuta sit, aut etiam ubi hæreditaria extiterit. Spes autem nonnulla Curationis superest, cùm morbus adhuc est in principio inque juvenili corpore. Arthritis *vaga* sine *Scorbuto* minus est periculosa, & semel perfectè curata vix amplius redit: poterit tamen intempestivâ Diætâ in Arthritidem fixam in Viris mutari. Arthritis *vaga scorbutica* autem frequentius revertitur, nisi ipsius Scorbuti causæ antecedentes sint eradicatæ. *Ischiadicus* dolor quandoq; per erosionem ligamenti, in Acerabulo ossis Ischii siti, luxationem femoris post se trahere, hominemque sic claudum reddere valet. *Rheumatismus* tandem omnium felicissimè per discussionem Lymphæ non adeo tenacis curatur.

In *Curatione* Arthritidis fixæ commendamus Diætam à Blancardo in *Tractatu de Podagrâ* descriptam, quæ si diligentissimè observetur, hominem juvare plurimum, & si non planè ab affectu liberare, à frequentioribus tamen paroxysmis tutos præstare valet. In Paroxysmi autem arthritici principio post *Clysmâ* unum alte-

alterumve injectum, (à purgantibus enim ceu magis lædentibus jure abstinemus) Venæsectionem nullatenus reformidamus, præprimis si homocantillum sit plethoricus.

℞. Radic. Aristol. ℥℞.

Gentian. ʒij.

Herb. 5. emoll.

Salviæ, ana. Mj.

Bacc. Junip. ʒij.

Incis. & contus. coque in sufficient q. Aq. font. Colaturæ ʒxij. adde

Ol. rosac. ʒij.

Mell. mercur. ʒj.

M. F. Clysma tepidè applicandum.

Postmodum statim mane ac vesp. pulveres diaphoreticos ex Bezoardico miner. Ocul. ☉. C. C. philos. ppt. Ebor. ppt. Antimon. diaphoret. Conch. ppt. Lumbric. ppt. Milleped. ppt. Cinnabari nativâ vel Antim. correct. Semin. Fœnicul. Rad. Petasitid. atque Chelid. maj. Crystall. alb. ppt. Pulvere viperino, aut similibus præscribimus, cum haustu Aqu. Nasturt. Apii selini, Cherefol. Card. bened. &c. sumendos, & per plures dies continuandos, reiterando subinde, ubi opus videtur, Clysterem.

℞. Pulv. Viper. ppt. ʒij.

Antim. diaph.

Ocul. ☉. ppt. ana. ʒj.

M. F. pulv. subt. in 8. dos. æq. ad Ch. mane ac vesp. sumend.

Vel ℞. Cryst. alb. ppt.

Antim. diaph.

Lumbr. terr. ppt.

Cinnab. nat. opt.

Radic. Petasit.

Semin. fœnicul. ana. ʒj.

M. F. pulv. subt. Div. in 12. dos. æq. m. ac v. cum jusculo sumendas. Potest & Mixtura sequens diaphoretica propinari:

℞. Aq. Absynth.

Card. bened.

Plantagin.

Scabios. ana. ʒij.

Roob Sambuc. ʒ℞.

Ant. diaphor.

C. C. philos. ppt. ana. ʒ℞.

M. d. ad Vit. singulis triboriis 3: cochlearia capiantur.

Mane ac vesp. etiam per aliquot hebdomadas Cyathus exhaustur Aquâ Nasturt. aquat. Chelidon. major. Cochlear. Centaur. minor. Absynth. Scabios. Agrimon. &c. repletus. Vel haustus destillati Hippenterorum. Pro potu ordinario cedat Decoctum Lign. Sassafr. Quajac. &c. Sequens Decoctum intra quatrimum Arthritidis dolores compescuit:

℞. Radic. Chin. ʒ℞.

Hermoadetyl. ʒj.

Lign. Sassafr.

Guajac.

Quercin. ana. ʒvj.

Semin. Fœnic. ʒij.

Coque per bihorium in Aqu. fontan. mens. ij. & Vini albi veteris M℞. Colaturæ ʒiij. singulis sex horis hauriantur.

Externè nihil admittimus fermè præter Bolum armenatem, Radicem Liquirit. pulveris. Terram sigillatam, Lapid. calamin. ppt. Pulv. flor. Sambuc. Cretam albam, Farinam secalinam tostam, & Camphoram, invicem mixta, atque cum linteis applicata. Sunt, qui etiam Ceratum simplex vel Diapalma,

ma, vel etiam sequens cum Fructu applicant :

℞. Cer. alb.
Ol. rosac. ana. ℥j.
Camphor. ℥ij.
Lapid. calam.
Bol. armen.
Oliban.
Mastich. ana. ℥i℥.

M. F. Ceratum.

Cura
Arthri-
tis vaga.

Arthritis vaga curabitur felicissimè & citissimè, in principio statim exhibendo laxativum ex unciis aliquot Syrup. Flor. Persic. vel de Cich. cum Rhabarb. Rosar. solut. composit. & hinc Venam brachii secando, eamque semel aut bis intra octiduum repetendo. Interea tamen simul m. ac vesp. propinandæ ℥iiij. pluresve, Aquæ destillatæ Nasturtii. aquat. Card. bened. Fumar. Cherefol. Apii Selin. & Cochlear. Vbi notandum, quod hæ plantæ recentes invicem mixtæ & concisæ, unâ cum nonnullis Fimi Caballi, Avenâ probè saginati, bolis destillatæ, liquorem huic morbo perfanando aptissimum exhibeant. Vel poterit Spiritus Cochleariæ, Nasturt. aquat. proprio è succo factus, ad gutt. 30. vel 40. m. ac. v. sumi. Essentia autem Trifolii fibrini ad gutt. 30. tantum dari eundem in finem potest. In usu verò Aquæ modò dictæ Hippenterorum per aliquot hebdomadas est continuandum, ac interea subinde simul dosis una vel altera de Pulvere quodam antarthritico ex Conchis, Sem. Nasturt. atque Cinnabari nat. opt. Pulv. Viper. ppt. Ebore ppt. exhibenda. In Diætâ pro potu ordinatio convenit Decoctum Lignorum, Rad.

Hermod. Gramin. Filic. Passular. &c. Juscula dein optima carnis, interdum Herbis antiscorbuticis alterata, sunt danda. Ab acidis, falsis, abstinentium. &c.

Externè Sacculi ex Avenâ, Ciceribus, Lentibus, Floribus Sambuci, Chamomill. Foliis Solani &c. compositi, siccè & probè calefacti imponantur. Emplastrum de Meliloto, de Baccis Lauri cum Cinnab. communi, Myrrhæ, Bolo armenat. Antim. diaph. Camphor. in quibusdam profunt. Rarò autem oleosa vel spiritiosa applicata conducunt. Linthea autem fumigata, fumo nimirum Mastichis, Olibani, Ungularum Caball. Herb. Menth. Aneth. Flor. Chamomill. Melilot. Sambuc. Semin. Cumin. Anis. Dauci, Rasur. Lign. Juniper. &c. imbuta, & calidissimè imposita sæpius citò dolorem omnem auferunt.

Rheumatismus, si pertinaciter duret, iisdem cum vagâ Arthritide remediis sensim tollitur.

In utroque tamen Affectu quoad fontem Chirurgicum Venæsectiones non sunt negligendæ, & quidem ab initio statim easdem ter in septimanâ instituere convenit, si modò sanguinis sufficiens quantitas adfuerit, qui per incisam venam extractus crustâ pituitosâ, tenaci, albâ vel cinericiâ ut plurimum post coagulationem obregetur. Præterea externa remedia nulla usurpentur alia, quàm quæ superius jam commendata extant. Clysmata imprimis frequentia, emollientia, laxantia, & anodyna heic levamen afferre possunt. v. gr.

℞. Rad.

R̄. Rad. Alth.

Liquirit.

Lil. alb. ana. ℥j.

Herb. Alth.

Malv.

Betæ,

Betonic.

Calaminth. ana. Mj.

Summit. Aneth.

Flor. Chamom. ana. Miß.

Stœch. p. ij.

Semin. Lini.

Fœni græc.

Cumin. ana. ℥ß.

Incis & contus. coqu. in s. qu. Aqu. font. Colaturæ ℥xj. adde

Mell. mercurial. ℥j.

Olei Verbasc. ℥iß.

Tereb. Vitell. Ov. solut. ℥ij.

Salis Gemm. ℥ß.

M. F. Clyster. aliquoties applicandus.

Vel R̄. Radic. Malv. ℥j.

Enul. camp.

Ireos nostr. ana. ℥ß.

Herb. Mercurial.

Violar. ana. Miß.

Meliss.

Chamæpith.

Majoran. ana. Mj.

Flor. Hyperic.

Calend. ana. Mß.

Semin. Fœnic.

Seseleos ana. ℥ij.

Incis. & contus. coq. in s. q. Aqu. font. Colatur. ℥b. j. adde

Elect. lenit. vel

de Hier. Logad. ℥j.

Olei chamæmel. ℥iß.

Rut. 3vj.

Æis commun. ℥ij.

M. F. Clyster. tepidè injiciendus.

Vel R̄. Decoct. Herb. emoll. Salv.

Cheref. & Furf. ℥bj.

Olei Nucum.

Lil. alb.

Mellis. ana. ℥j.

Salis commun. ℥j.

M. F. Clyster tepidè inspergendus.

Vel R̄. Aqu. muriat. v. gr.

Brassic. Sale cond. vel

Urin. Pueror. ℥x.

Olei Amygd. dulc. rec. express.

Violar. ana. ℥j. vel

Olei Olivæ. ℥iib.

Mellis anthos. ℥j.

M. F. Clyisma tepidè infundendum.

Arthritis vaga scorbutica, quia scorbuti est symptoma ac soboles, nulla peculiaris remedia desiderat, sed sponte cedit, quamprimum radices Scorbuti erutæ sunt. Destillatum tamen equinum per plures hebdomadas usurpatum; vel Potus Thermarum Fabariens. aut similium, usus item Panaceæ alcalin. solut. valde conducit.

Tandem Ischiadicus dolor ante omnia purgans requirit debitâ dosi exhibitum, & cum Mercurio dulci permixtum. v. g.

R̄. Mercur. dulc. opt.

Rad. Jalapp. ana. ℥j.

Crem. Tart. ℥ß.

Ol. destill. Rorism. gutt. ij.

Scamm. sulphurat. gr. iij.

M. F. pulv. subt. d. ad ch. pro dosi.

Vel R̄. Extract. Cath. ℥j.

Mercur. dulc. gr. XV.

Resin. Jalapp. gr. ij.

Ol. destill. Succ. q. s.

M. F. l. a. Pilulæ no. XV. d. pro dosi.

M

Dein

Dein *Venæsectionem* in Pede lateris affecti commendamus, & loco dolenti *Emplastrum Norimbergense* alutæ superinductum applicamus.

Internè etiam per aliquot dies m. ac. vesp. Pulv. diaphoretico-anodynus ex *Antimon. diaph. Bezoard. mineral. Lumbr. terrest. Asell. ppt. Ebor. ppt. &c.* cum *Sale volatili C. C.* vel *Viperar. in Aqu. destillat. Chamædr. aut Betonic.* propinamus.

R̄. *Antim. diaph.*
Spod. ppt. ana. ʒj.
Sal. volat. C. C. ʒß.
Sacch. ros. ʒj.

M. F. pulv. s. in 2. doses mane ac vesp. sumend.

Vel R̄. *Antimon. diaph.*
Ocul. ʒ. ppt. ana. ʒj.
Nitr. ppt. ʒß.
Camph. gr. vj.

M. F. pulv. s. in 2. dos. æqu. ad ch. m. ac. vesp. sumend.

Vel R̄. *Crystall. alb. ppt.*
Pulv. Viper. ppt.
Lumbr. terrest. ppt.
Bezoard. min. ana. ʒß.

M. F. p. s. in 4. dos. æqu. ad ch. m. ac. v. sumend. cum jusculo.

Quibus nihil vel parum proficientibus externè simul inter continuatum eorum usum femur sudare facimus copiosè, vel applicando, quam prope id fieri potest, *Lateres ignitos Vino rubro extinctos*, & *linteo eodem Vino malido involutos*; vel *Panem è clibano recens extractum*, ferventemque admoveamus, eorumque usum mane ac vesp. repetimus. Quod si neque his dolor leniatur, ferumque in profundo

stagnans benè discuti nequeat, *Vesicatorium* amplum semoris in medio applicare jubemus, & internè ne ab hoc remedio stranguria oboriat, aliquot haustus *Emulsionis seminum frigidorum* concedimus. Ac si nec tum Æger liberetur, Ferrum satis latum & rotundum ignitum bis vel ter *Ischio* sive *Coxendici*, quam propè Æger ferre poterit, admoveatur, donec observemus valde minutum esse dolorem. Interim *Purgatio mercurialis* post XII. vel XV. dies reiteranda venit. Loco pulverum etiam internè *Pilulæ* ex eadem materiâ cum *Extracto Trifolii fibrin. Betonicae*, & *Theriaca Cœlesti* concinnari poterunt, sicque cum vehiculo convenienti aut cum infuso *Herbæ Thee exhiberi*. Quid si *Aquâ Thermarum Fabariensium* ad manus sit, hyberno etiam tempore non secus atque per æstatem extra fontem bibi cum fructu poterunt, ceu valdè penetrantes, & partim ipsum lentorem humorum corrigentes, partim & stagnantem in loco affecto lympham in pristinum fluorem redigentes.

In omni verò Arthritide specifica Remedia antarthritica, eaque diversa à diversis Medicis commendari solent, subinde cum successu data, imprimis si optima simul Diæta fuerit observata. Inter illa recensemus, quæ quidem ipsi vidimus à nonnullis feliciter usurpata; v. gr.

R̄. *Lumbr. terrest. ppt. ʒß.*
Antim. diaph. ʒij.
Ocul. ʒ. ppt.
Unicorn. fossil.
C. C. phil. ppt.

Cinnab.

Cinnab. nativ. ana. ʒj.

M. F. pulv. in 12. doses redigendus, & quotidie mane sumendus.

Pulvis antarthriticus Celeberrimi Scaffhusiensium Archiatri, D. D. Wepferi sequens aliquando fuit:

Rx. Lumbr. terrest. pp. ʒʒ.

Ungul. Alc. ppt.

C. C. phil. ppt. ana. ʒij.

Antim. diaphor. ʒiʒ.

Sal. volat. C. C. ʒʒ.

Camphor. ʒʒ.

Ol. Nucist. expr. gr. 8.

Sacch. albiss. ʒij.

M. F. pulv. subt. d. ad Scatul. Dosis ʒj. mane ac vesp̄ri.

Pulvis antipodagricus P. Capucini, Itali, uti quidem nobiscum communicatus fuit ab Illustriss. DN. Barone de Reding, Suitensi-Helvetio, qui cum per plures annos ob graviſsimos & frequentissimos Insultus podagricos suis amplius pedibus insistere atque incedere nequiverat, eo ultra annum felicissimo cum virium corporis redeuntium & incessus facilis successu usus fuit, sequens est :

Rx. Radic. Aristoloch. rot. ver.

Rhabarb. Monach.

Gentian. maj. luteæ.

Herb. Chamædr.

Chamæpith. s. Ivæ arthetice.

Sumit. Centaur. minor. ana. q. v.

Siccentur in aëre singula seorsim; hinc pulverisentur tenuiter, & partibus æqualibus invicem misceantur. Sume quotidie sub vesp̄eram hujus Pulveris ʒʒ. ad ʒj. Affunde Vini boni albi veteris, tenuis, probè defæcati, ac diuretici ʒij. stet per noctem in loco tepido; postridie mane

Pulvis cum Vino simul hauriatur; atque sic per integros plures menses, imò per integrum annum quotidie semel reiteretur. Secundo autem anno bis hebdomadatim; tertio tandem anno semel aut bis in mense debet assumi. Vel sequens potest usurpari:

Rx. Antim. diaph. ʒʒ.

C. C. pph. ppt.

Matr. Perlar. ppt.

Cinnab. nat. opt.

Unicorn. fossil. ana. ʒj.

Laud. Opiat. gr. vj.

M. F. pulv. subt. in XII. dos. æqu. divid. m. ac. vesp̄. sumend.

Aliis placet seqq.

Rx. Pulv. Herb. Chamæpith.

Flor. Primul. Ver.

Lil. convall. ana. ʒij.

Cinam. opt. ʒj.

Zingiber. ʒʒ.

Semin. Anis.

Nasturt.

Dauc.

Cochlear.

Ocul. ʒʒ. ppt. ana. ʒj.

Fol. Senn. fineſt.

Rhab. opt. ana. ʒiʒ.

Sacch. albiss. ʒiij.

M. F. pulv. s. cujus dosis ʒj. cum Aq. Card. bened. & Chelid. maj. quotidie per longum tempus assumitur.

Commendant alii etiam Potum lactis bubuli per unum pluresve annos continuatum. Optimum verò Podagram, si nodosa haud fuerit, sanandi arcanum extra Paroxysmum est adcurata Diætæ observatio, quantum quidem in Victu, Vino, Venere & Irâ consistit; in his enim si quis rectè se gesserit,

gesserit, à Podagra non amplius, vel rarius saltem affligetur, atque mitius etiam tractabitur. *Victus* autem quàm exquisitissimus & simplicissimus requiritur, ab aciditate, falfedine excedente, lentore, & viscositate omni alienus. Culpanitur hinc *Carnes duriores*, fumo siccatae, aceto immersae, ac solutu difficiles, *Casei* qualescunque, *Ova friza* atque ad duritiem cocta, *Pastæ farinaeae*, *Placentæ*, *Cochleæ*, *Astaci*, *Ostreæ*, *Pisces limosi* ac tenacioris carnis, vel ficcati, salitive, *Olera salita* aut *muratica*, *Fungi terrestres* varii & similia. In usu quoque optimorum aliàs *Ciborum quantitas modica* quolibet pastu assumenda, excessus rari committendi, vel si aliquando datâ occasione fiant, jejuniò corrigendi. A *Vino*, *Cerevisiâ*, *Hydromelite*, & simili potu haud difficulter acescente, vel penitus, vel saltem per annos aliquot est abstinendum, aut certè parcissimis haustibus bibendi veniunt ejusmodi liquores: horum verò loco *Aqua* vel purissima, vel cum incoctione lignorum & similia, aciditatem nullam causantium, pro ordinario potu est seligenda, à quo diutissimè continuato *Paroxysmi podagrici* & rariores longè & mitiores etiam evadunt, id quod jam à pluribus annis in hominibus excellenter podagricis expertus fui. Decennium vix elabitur, quo *Aurifaber* quidam nostras 36. ætatis annum egrediens, summè podagricus simul & nephriticus, post *Arthritidis* paroxysmum *Ischuriam vesicalem*, à calculo orificium *Vesicæ* crispante ortam, incidit, atque ne guttulam quidem *Vrinæ* emittere po-

tuit, unde repleta tridui spatio *Vesica* rupturam, vel certè *Convulsiones* lethales minabatur, frustra adhibitis quibuscunque remediis internis, externisque, donec tandem frater meus *Jacobus Zuingerus*, *Chirurgus expertus*, *Catheterem*, post situm atque decubitus *Ægrotantis* diversimodè mutatum, in *Vesicam* intrudere, sicque *Vrinam* omnem emittere potuerit, secuto demum post bidui spatium *Lapillo minuto*, & copioso sabulo. Hoc autem symptomate, quod mortem propemodum attulerat, maximè territus *Vir*, cum largiorem *Vini* potum sæpius haustum illi occasionem dedisse persuasus esset, protinus animo statuit firmo, se *Vini* usui ordinario valedicturum; id quod in hunc usque diem felici cum successu præstitit, ordinariè nil nisi *Ptisanam*, nobis consuetam ac familiarem, ex *Decoct. Radic. Sarsæ parillæ* & *Filicis* constantem, bibens, & rarius *Vini* defœcati optimè, perq; *Vrinam* pellentis, plenum unum vel alterum vitrum exhauriens; unde non tantum *Renes* atque *Vesica* ab omni sabulo purgatæ fuerunt, sed ab eo quoque tempore *Nephritis* omnis cessavit, & *Paroxysmi arthritici*, qui bis velter quotannis *Hominem* magnâ cum vehementiâ affixerant, adeo rari ac mites redditi fuerunt, ut se vix amplius *Podagricum* esse persentiat. Ab isto tempore plures alii *Podagrici* eandem vivendi ac bibendi rationem, usu quotidiano *Vini* repudiato, ineuntes maximum levamen invenerunt. Sed & *Veneris* exercitium vel omnino est intermittendum, vel rarissimè profectò insti-

tuendum, utpote à quo Spirituum latex valde debilitari solet. Rustici hinc nostris in oris nulli evadunt podagrici, quoniam strenuè corpus suis in laboribus exercendo ita fatigantur, ut Veneri litare multum nequeant, ac simul ob facultatum penuriam quotidiano Vini potu carere debeant. Ira denique est maximè fugienda, præcipuè vehemens & crebra, ob quam Podagrici sæpè novos accelerant paroxysmos.

Præterea nonnulli usu *Thermarum Fabariensium*, *Plumbariensium*, *Embsensium*, aliarumve in *Arthritide frigida*, à fero minus acri sed pituiroso lento provenienti; alii verò in *Podagra* magis, ut sic loquar, calidâ *Acidularum* potu numerum atque vehementiam *Paroxysmorum* se minuisse testantur. Potum *Lactis asinini* aliquibus jam senescentibus Podagricis levamen attulisse magnum novimus. Viginti quatuor doses *Panaceæ solutivæ alcalinæ* etiam sumptæ multum conferre debent ad sanguinem Podagricorum planè emendandum. Pro specificis dein antarthriticis habentur *Chamæpithis*, quæ *Iva* proin *arthetica* dicitur, *Primula veris*, *Betonica*, *Salvia*, *Acorus*, *Stæchas*, *Serpillum*, *Origanum* &c: è quibus *Decocta*, *Pulveres*, *Conservæ*, atque *Syrupi* fieri & concinari possunt, frequenti usu probata remedia.

Externa tandem plura à pluribus magni sunt, imprimis autem *Moxæ instio*, olim usitata, quâ certè dolor confestim quidem cessabat, sed insimul paulatim tendines Articulorum ita siccabantur, ut tandem contractura

subsequeretur. Ab aliis æstimatur *Balneum Urinæ humanæ*, *Spiritus Salis armoniaci* *Aquâ Ulmaria* dilutus, & parti dolenti cum pennâ calidè frequenter illitus, *Liquor solutorum Limacum* in *Vase cupreo* cum *Sale*, *Succus* aut *Aqua destillata Feliolum Lappæ majoris* sæpius calidè applicata, & plura ejusdem farinæ. Quidam etiam *Cataplasmata* nunc è *Rapis* in *Aquâ decoctis*, nunc è *Farinâ Fabar.* cum *Aquâ nivis*, nunc è *Croco* *Radic. Ulmar.* *Alth.* cum *Aquâ Solani* faciunt & imponunt. Valde conduxisse aliquibus Podagricis notavimus, si statim post paroxysmum manus atque pedes, ipsumque corpus usque ad scrobiculum Cordis immerferunt aliquot vicib⁹ *Balneo calenti Aquæ dulcis*, cui permistum fuerat *Lixivium lignorum Fagi, Quercûs, Juniperi, Samentorum Vitis, Ossium equinorum, bovinorum, cervinorum, vel caprinorum*; simulque incoctæ *Herbæ Althææ, Consolid. maj. Virg. aur. Serpill. Lavendul. Chamæpith. Chamædr. Beton. Salv. Summitat. & Lignum Juniperi, Strobili Pini* &c. cum *Sulphuris communis* & *Aluminis* aliquâ portione, additis etiam *interaneis Animalium*. Robur deniq; Articulis conciliant extra Paroxysmum *Thermæ* quædam ad tempus usurpatæ *sulphuræ, salsæ, nitrosæ*, item *Acervus acinorum vinaceorum*, ab *Uvis nigris expressis congestus*, & effervescentia calens. In paroxysmo membra continuè fovenda sunt *Pelle leporinâ* aut *felinâ*.

Sunt, qui Emplastrum discutiens mox applicant, quando dolor paroxysmi arthritici inchoat. v. gr. *Empl. diapho-*

diaphoret. Myns. de Meliloto, de Baccis Lauri, cum Camphorâ vel Resinâ lariceâ & Opi. Qui adstringentia Emplastra adhibent, pessimè faciunt, quoniam materiam morbificam veluti repellunt intra corpus, unde postmodum ea in partes internas præcipitata longè pejora mala, Apoplexiam, Asthma, Hydropem pectoris, Ascitem, Phthisin aut Hæticam excitat. Orientales quidam Populi statim atque Dolor arthriticus membrumprehendit, Cataplasma è contusis foliis *Lappæ majoris, Alliariæ & Ranunculorû* paratû Articulo dolenti tepidè unâ vel alterâ vice applicant, usque dum rubescat admodum & in vesicam attollatur, quâ dein apertâ serum effluere permittunt, & mox foliû *Brassicæ* tepefactum per diem unum vel alterum cum inuncto Butyro, tandem *Emplast. alb. coct.* sive de *Spermate Ranarum* applicant, sicque intra paucorum dierum spatium à paroxysmo arthritico liberantur. Plurima etiam alia externa circumferuntur atque commendantur, quorum descriptiones prolixè in *Praxi Plateri, Operibus Ettmülleri*, atque *Boneti Thesauro Medico-Practico* reperiuntur, sed pleraque tamen, si non circumspectè usurpentur, plus nocent quàm prosunt.

ASCARIDES, Vid. *Lumbrici*.

ASCITES, Vid. *Hydrops*.

Asthma.

ASTHMA, Ἀσθμα, ab Ἀσπν, Flo S. iro, in genere quælibet est *anhelitus* vel *spirandi difficultas*, *Respiratio difficilis*, *Anhelitus gravis*, adeoque symptoma *Respirationis offensæ*. Læditur autem *Respiratio*, actio illa corporis ex vitali & animali mixta, quando

vel *aboletur planè*, vel *gravis plus minus redditur*; sive dein hoc in utroque inspirationis & expirationis actu, sive in expiratione tantû volûtariâ quoad vocem & loquelam contingat. Aboleri non potest diu respiratio sine vitæ discrimine, & morte subsequente; cessat tamen aliquando ad tempus, vel saltem adeo obscurè procedit, ut ab adstantibus, etiam plumâ naribus *Ægrotantis* admotâ, percipi nequeat. *Asthmate* hinc, sive respirandi difficultate laborare dicuntur homines, quando crebrò & majore vel minore cum labore atque impedimento Spiritum ducunt, à quacunque demum causâ id contingat.

Differentiæ Asthmatis, graduum quidem respectu, tres numerantur, quarum *prima* eaque levior est *Dyspnœa*, in quâ homo graviter quidem sed sine ullâ ut plurimum Febre, sine sono, sine angore magno aut anhelatione forti, respirat. *Secunda* est *Asthma* propriè sic dictum, quando Patiens cum sibilo, aut anhelatione sonorâ difficulter respirare cogitur. *Tertia* vocatur *Orthopnœa*, in quâ Homo non nisi erectâ cervice, thorace elevato, erectoque corporis trunco, sive stans, sive sedens, aut sedendo decumbens in lecto Spiritum trahere cogitur. Id autem si cum magno conatu fiat, ita ut præsens suffocationis periculum adsit, tum *Suffocatio* vel *Strangulatio* nuncupatur.

Principaliter heic affligitur *Pulmonis* tenera, mollis atque vesiculosa substantia, quoad fistulas suas tracheales & vesiculas, à qualicunque demum causâ

Diff. rent.

Pars secta.

causâ præternaturaliter angustatas. *Minus principaliter* autem, sed ut plurimum tamen prius, aliæ quoque partes, tam internæ quàm externæ, ad Respirationis actionem aliàs contribuentes afficiuntur, & læsæ deprehenduntur.

Proxima videlicet Asthmatis cuiuscunque causa est bronchiorum sive ramorum Asperæ Arteriæ, & Vesicularum pulmonalium angustia, quam diversæ admodum, eæque longè plures efficere possunt causæ *antecedentes*; idque vel obstruendo aut infarciendo, vel comprimendo, vel spasmodicè constringendo. *Obstruunt & infarciunt* catarrhi sive humores serosi, plus minus viscosi, tenaces, crassi aut fluidi, lentè vel confertim & subitò substantiam Pulmonum implentes, noctu & humidâ tempestate maximè contingentes; sanguis itidem extravasatus in Hæmoptoë, & Vesiculas sensim aut citò occupans; calculi in substantia Pulmonum nati, aut pulveris per Inspirationem in Pulmones intronissi copia, quemadmodum id Lapicidis subinde evenit; purulenta materia è ruptâ Vomica, Ulcus Pulmonis, Oris & Narium qualiscunque obturatio, in Apoplexiâ, Epilepsiâ; Faucium major vel minor obturatio in tumore Amygdalarum, Uvulæ; Anginâ, Strumâ, Bronchocele; vel Abscessu in vesiculas pneumonis effusa; *Comprimunt* obesitas nimia, Sanguis æstuans per vasa pneumonica decurrens, Tumores item vicini inflammatorii, erysipelatosi, scirrhusi, alii; ut &

pus vel serum in cavitate Pectoris ex Pleuritide aut Hydrope collectum; Aquæ porrò Abdomen valde expandentes, inferiores Thoracis costas diducentes, & sic Diaphragma nimis tendentes; Venter à cibis, vel veneno interdum nimis expansus; Luxatio primæ Cervicis vertebræ; Flatus copiosi in Abdominis visceribus collecti, & hinc inde dispersi, ita ut Diaphragma in motu suo præpediatur. Huc pertinent angustia pectoris nativa, vel acquisita in gibositate; pulmonis cum pleurâ connexio, vel coalescentia post Pleuritidem; Fractura costæ unius aut alterius introrsum de-trusæ, Luxatio itidem Costarum introrsum reflectentium, *spasmodica* constrictio fit in Cardialgiâ, Polypo Cordis, Incubo, ut plurimum ab humore seroso-falso vel acido-acrimucoso, plus minus lancinante, rodente, pungente & crispante; qui simul interdum musculos Diaphragmatis, fibras item nervoso membranaceas trachearum & vesicularum pneumonicarum contrahit. Ita & spasmus Musculorum pectoralium, à flatu aut lymphâ inter illos hærente ac expandente oriundus, Thoracis motum impediendo; nec non convulsiva crispatio nervorum pneumonicorum, per consensum in suffocatione hysterica, Lumbricis intestinorum, Colicâ flatulentâ, Passione nephriticâ contingens, Anhelitûs difficultatem similiter inducit. *Periodicum* denique Asthma fixam quandam aut glutinosam acrimusculam pituitam, aliquo in pectoris loco hærentem materiam, nervos pe-

rio dicè crispantem pro sua causâ agnoscit.

*Species
Asth-
matu.*

Asthma proin respectu diversarum causarum, atque accidentium conjunctorum diversas agnoscit species, epithetis diversis etiam insignitas. Ita enim Asthma *humorosum* appellatur, quod ab humorum vitio suam habet originem, comitemque sæpius Tussim obtinet: Asthma *convulsivum* sive *spasmodicum ac siccum*, quod cum aliquali nervorum pneumonicorum aut diaphragmaticorum constrictione contingit, cum que Tussi vel nullâ, vel siccâ affligit; *compressivum & strangulatorium*, à compressione Pulmonis aut asperæ Arteriæ qualicunque proveniens: Asthma *sympathicum*, quod per consensum nervorum in aliis partibus, v. gr. Stomacho, Vtero, Intestinis &c. graviter afflictorum oboritur; *idiopathicum*, quod læsionem Pulmonis ipsius subsequitur: *scorbuticum*, quod Scorbuti morbo jungitur: *periodicum*, quod per certa incertave intervalla gravius, mitiusque redit: *breve aut diuturnum*: *recens vel inveteratum*: *hereditarium vel adventitium*.

Diagnosis.

Si *Diagnosin* spectes, facile quis præsentem respirandi difficultatem, imò & ejusdem species, ex solo Ægrotantis intuitu atque examine cognoscet. Gravius vel mitius hominem affligit, nunc subitò accedens, nec adeo diù durans; nunc sensim occurrens, atque à tenaciore causâ proveniens, & contumaciter durans. Jacentes plerumque & supinè ac profundius dorso incumbentes, noctu itidem, atque hybernâ vel pluviosâ tempestate,

ubi crassior est Aër, difficilius adhuc respirant; ut singulis ferè momentis ultimum se spiritum trahere autument. Nunc inspiratio, nunc expiratio est laboriosior; anguntur etiam magis vel minus Ægri in pectore. Conjuncta est hæc molestia cum variis Ægritudinibus aliis, imò eorundem est crebrum accidens; ita enim comitatur sæpè Febres continuas, Peripneumonias, Pleuritides, Hydropes Pectoris, Ascitem, Tympanitidem, Vomitas, Ulcera, Scirrhus, Tussim Infarctus Pulmonum, Phthisin, Polypum Cordis, Spasmos atque Dolores musculorum pectoralium & intercostalium. Si *scorbuticum* fuerit Asthma, ex Scorbuti variis accidentibus conjunctis, nimirum inflationibus ac ructibus Ventriculi, Cardialgiâ crebrâ, Nauseâ, Vomitu, tensionibus hypochondriorum sensilibus, borborygmis Ventris, cordis frequenti Palpitatione, sputatione crebrâ, cum intercurrente tamen siccitate oris, Pavoribus in somno, Anxietate, Cephalalgia, aliisque cognosci poterit. Si *Uterinum* fuerit Asthma, subitò accidere, nec diu durare solet sine Tussi aut Febre; *Stomachalis* Dyspnœa cum maximâ ut plurimum Cardialgiâ, Tussi, materiæ viscidæ exspuitione, Nauseâ ac vomendi quodam desiderio, sæpè & ventris inflatione hominē excruciat. Si Catarrhus vel mucus hæreat in Pulmone, atque sic *humorosum Asthma* producat, Tussis aderit plus minus humida, sonitus interdum aut sibilus, ab aëre in respirationis actu materiam tracheis impactam mobilem cum aliquo labore penetrante, oriundus

du-

duſ auditur. *Convulſivum* Aſthma repentinè hominemprehendit, quandoque & ſubitò iterum ceſſat; plerumque ſolet eſſe periodicum; familiare hyſtericis Fœminis, ſcorbuticis, hypochondriacis, imò & illis, qui Hydrope pectoris laborant, ſicut ſuo monſtratur loco. *Ichoroſum* Aſthma ab effuſâ in Veſiculas pulmonales lymphâ tenui productum, ex Tuſſi plerumque ferinâ, ſiccâ, ſine exſcreatione cognosci ſolet.

In *Prognofi* omne Aſthma morbus eſt gravis, & eventûs ratione ſuſpectus habendus; qui inprimis cum Febre ardente conjunctus pro periculoſo ſi non lethali eſt habendus. Citra Febrim autem Aſthma nonnullis præprimis valde obexis, aut gibboſis, nativâ quin & thoracis anguſtiâ laborantibus, quibus item Pulmo hinc inde Pleuræ membranæ eſt adnatus, conſuetum eſſe, ac uſque ad vitæ terminum ſine ullo remedio perdurare ſolet. Aſthma convulſivum periodicum difficulter curatur, nonnunquam in Phthiſin aut pectoris Hydropem immedicabilem tranſit. Quod verò Aſthma cum aliis Affectibus & Morbis eſt conjunctum, iis curatis per ſe evaneſcit; ſi verò illi curari nequeunt, tum nec Aſthma ſanari poterit.

Curatio itaque pro diverſitate circumſtantiarum atque cauſarum, diverſimodè eſt inſtituenda, quod ſi humorofum fuerit Aſthma, & à Pituitâ crâſſâ lentâ, viſcidâ, Pulmonum veſiculas infarciēte oriatur, tum purgans ante omnia eſt exhibendum, v. gr. ex *Maſſ. pilul.* è *Gumm. ammon.* vel è *Sa-*

gapen. cum *Milleped.* *Jalapp.* in *Spirit. Anis.* & *Ceras nigr. ſolut.* Purgantis operatione finitâ ad decocta pectoralia, mane ac vesp̄i calidè bibenda, eſt accedendum: non negligendo *Venæſectionem*, ſicubi corpus ſit plethoricum, aut ſufficiente ſanguinis quantitate impletum. Heic etiam proſunt *Aquæ* è *Plantis antiſcorbuticis deſtillatæ*, atque vel trium unciarum doſi frequenter potæ. Quibus *Pilulæ* arident, iis parari poterunt è *Gummi arabico* vel *ammoniac.* cum *Seminibus Naſturtii*, *Cochleariæ*, *Napi*, ac *Floribus Benzoin* vel *Sulphuris*; v. gr.

R̄. *Gumm. ammoniac.* 3℞.

arab. ʒj.

Aqu. Hyſſop. q. ſ.

Solutis leni igne adde

Spir. Salis armon. anis. ʒ℞.

Flor. Benzoin. gr. vj.

Syrup. de Eryſ. Lobel. ʒ℞.

detur ad Vitrum & ſumatur pro doſi.

Vel R̄. *Gumm. ammoniac.* ʒij.

Aqu. veronic. q. ſ.

Solutis probè adde

Syrup. Bellid. min.

de Hyſſop. ana. ʒij.

Balsam. Sulphuris anis. ʒ℞.

detur ad Vitr. & hauriatur pro doſi,

quæ pluries mane ac veſp̄. repeti poteſt.

Vel R̄. *Oxymel. ſquillit.*

Syrup. de Jujub. ana. ʒi℞.

Aqu. Scabioſ.

Flor. Til.

Anis. vel

Fœnic. ana. ʒj.

Spir. Sal. armon. fœnic. vel

Salis volat. oleos. ʒj.

Effent. Helen. ʒij.

M. d. ad Vitr. Singulis trihoriis unum vel alterum cochleare plenum sumatur.

Vel R̄. Oxymel. helleborat. Gesn. ℥ij.

Syrup. de Farfar. ℥j.

Aqu. Beton.

Fenic. ana. 3vj.

Misce d. ad Vitr. Mane ac vesperi quotidie duo cochlearia sumantur.

Vel R̄. Salis volat. oleos. ℥ij.

Essent. Croc.

Zedoar. ana. 3j.

Myrrh. ℥ij.

Misc. d. ad Vitr. Dosis m. ac. vesp. gutt. 30. vel plures cum Aquâ Veronic.

Vel R̄. Bals. Sulphur. terebinthin. ℥ij.

Essent. Helen.

Veron. ana. 3j.

Misc. d. ad Vitr. Dosis ut supra.

Vel R̄. Aqu. antasthmatic. cujuscunque ℥iij.

Veronic. ℥iij.

Syrup. de Hed. terr. ℥j.

Misc. d. ad Vitr. singulis bihoriis vel trihoriis cochleare plenum hauriatur.

Ficus etiam aliquot inciduntur, aut Saccharum cand. album conteritur, Spiritus hinc Ceras. ardens superaffunditur, accenditur, & postquam deflagavit, quicquid superest liquoris & materiae cochlearium aliquot dosi subinde deglutitur. Mixture simplex D. Ludov. Tinctura Castor. cum Spir. Sal. arm. parat Spiritus C. C. vel Eboris, Viperarum, similisque alius volatilis, Tinctura bezoardica, Essentia Lignorum, viperina, Liquor C. C. succinatus, Elixir cephalic. item carminativum, ad guttas 20. 30. aut 40. cum vehiculo convenienti non sine successu capiuntur, modò in eorum usu aliquandiu

continuetur. Horum vices præstant Salia volatil. C. C. Viper. Ebor. Succin. ac similia ad 5. 6. plurave grana quotidie per longum tempum cum Infuso Thee, vel alio vehiculo data. Pannacea etiam solutiva alcalina per plures hebdomadas quotidie dosi 3j. vel 3iij. sumpta cum vehiculo debito insensibiliter ferè resolvit blennam viscidam Visceribus inhærentem, eamque postea blandè per alvum educit. Sequentem etiam Aquam antasthmaticam in hac Astmatis specie excellentem sæpius deprehendimus:

R̄. Rad. Irid. florent. ℥j.

Aristol. rot. ver.

Helen.

Squill. marin. ana. 3vj.

Fol. Heder. terrest.

Salv. nobil.

Hyssop.

Meliss.

Veron. ana. Miß.

Baccar. Junip.

Semin. Anis.

Fenic.

Urtic. ana. ℥ij.

Cinam. opt. 3vj.

Cardamom.

Cubeb. ana. 3ij.

Incisis & contusis affunde

Vini Malvatic. vel Hispan. vel

Hungar. vel Frontiniac. opt.

℔ij.

Spir. Ceras. nigr. opt. ℔ij.

Stent per 6. vel 8. dies in leni digestionem intra Cucurbitam vitream, cum superimposito Alembico. Postmodum adde adhuc

Aqu.

Aqu. Veronic.

Scabios. ana. ℥viii.

Hed. terr.

Flor. Acac. ana. ℥iiij.

Herb. rec. Nasturt. hortens.

Fol. & Flor. rec. Bellid. min. ana. incif. Mij.

Pulmon. Vitul. aut Vulp. rec. extract. & concif. no. j.

Sang. Hirc. vel Cerv. rec. adhuc calentis ℥j.

Hinc imposito statim Alembico rostrato in Balneo Mar. vel Aren. destillentur leni igne in Aquam spirituosam, quæ dein Saccharo cand. albo tantillum pro lubitu edulcorata subinde cochleatim exhiberi & assumi potest, ad incisionem, attenuationem & excreationem mucii Pulmonum viscerum promovendam. Valet & Aqua antasthmatica Giessensis, cochleatim sumta; non secus atque Elixir quaecunque balsamicum incidens pectorale, quemadmodum sequens expertum est:

Rx. Spir. Ceras. nigr. ℥iij.

Vini ex Infusione Fragor.

& Rubi idæi fruct. ana. ℥iv.

Cochlear. ℥iij.

Cinam. acut. ℥j.

Galang.

Cort. Winteran.

Zingiber. ana. ℥ij.

Caryophyllor. arom.

Cardam. minor.

Macis ana. ℥j.

Semin. Fenic.

Rad. Ireos florent. ana. ℥j.

Summitat. Majoram.

Anth.

Thym. ana. Mj.

Flor. Anthos.

Betonic.

Salv. ana. pij.

Sacch. cand. alb. ℥vj. vel ℥viii. aut plures.

Incis. & contus. inde vitro probè clauso, stent in digestionem per aliquot dies; postmodum Tinctura rubicunda expressa & filtrata servetur ad usum. Dosis est Cochleare plenum subinde noctu horâ somni. Prodest heic etiam Destillatum Hippenterorum cum Herbis antiscorbuticis ac incidentibus, superaffusâ simul portione Vini albi veteris, paratum, ad ℥iij. quotidie bis datum, & quidem per plures hebdomadas. Si quis suam propriam Urinam aliquoties haurire non fastidiat, citò etiam à suo Asthmate humeroso liberari poterit. Juscula Herbarum antiscorbuticarum succo alterata, vel succus ipse tali Herbarum quotidie semel vel bis assumtus ad ℥ij. vel ℥iij. effectum similiter laudabilem præstat. Maximè etiam conducunt Infusa aut Decocta pectoralia atque traumatica, in Aquâ fontan. vel mediâ parte Vini & Aquæ facta, ex Radicibus Ireos florentin. Aristol. rot. ver. Tussilag. Succis. Filipend. Gentian. Pimpinell. Vincetox. Apii, Herbis Alchymill. Betonic. Marrub. alb. Veronic. Hyssop. Adiant. Meliss. Matricar. Scab. Saturejæ, Scordii, Alliaria, Card. bened. Psorol. Millefol. Heder. terrestr. Baccis Jujub. Laur. Ficibus, Jujubis, Pistaciis, Passulis majoribus exacinat. Seminib. Anis. Carv. Fenic. Lign. Guajac. Sassa. & similibus. Sperma Ceti ad ℥j. in Jusculo vel Infuso Thee solutum, & statim haustum sæpè multum juvat; vel

fequens *Puls* inde parata, ac sensim absorbta multum levaminis affert:

℞. Olei *Amygd. dulc. rec. express.*
℥iij.

Axung. Canin. rec. ℥℞.

Spermat. Ceti. rec. ℥ij.

Invicem probè solutis & mixtis adde

Sacch. cand. alb. pulveris. ℥vj.

Essent. Croc. ℥℞.

Spir. Sal. armon. anis. ℥ij.

M. d. ad Oll. subinde cochleare plenum hauriatur.

Quod si hæc nihil efficiant remedia, tum verno aut æstivo tempore *Thermales Aquæ* v. gr. *Plumbarienses. Lotharing. Burbonenses. Burgund. Fabarienses, & Salsulæ Rhæticae*, aliæve cum debito regimine *Diætæ* in potu maximè veniunt usurpandæ. Vel *Infusum Millepedum* per aliquot hebdomadas est potandum, quod suo Sale volatili magnam incidendi, aperiendi & resolvendi vim obtinet. Nimirum 20. 30. pluresve *Millepedes* vivi quotidie mane ac vesperi, antè probè loti, & dein contusi sumuntur, superaffunditur illis vel *Aqua Veronic. Cherefol. Hyssop. Nasturt. flor. Acac. aut similis. vel Decoctum* quaecunque pectorale, vel etiam *Vinum album vetus*, tenue, probè defæcatum ad uncias duas vel tres, cum aliquot drachmis *Aqu. Cinam. servatur* hinc in *Cineribus calidis* probè tecta, postea exprimitur *Liquor* per linteum & hauritur. Sic *Decoctum* etiam *Granor. Coffeè testorum cum Croco & Caryophyllis aromat. injectis* diu sorbillatum prædest.

Cura
Asthma
vis à Ca-
tarrho
tenui,

Si *Catarrhus tenuis*, in *Vesiculas pulmonis effusus*, existat causa Asth-

maticis, tum statim *Clyisma* quoddam injiciendum, detergens satis & irritans. v. gr.

℞. *Radic. Lilior. alb.* ℥j.

Imperat. ℥℞.

Herb. Violar.

Parietar.

Malv. ana. Miß.

Hyssop.

Erysim. ana. Mj.

Flor. Genist.

Salv. ana. M℞.

Bacc. Junip.

Semin. Lini.

Anis. ana. ℥℞.

Incis. & contus. coqu. in s. q. Aqu. fontan. Colatur. ℥bj. in *Adultis* admisce

Elect. de Hiera picr. ℥j.

Ol. Olivar. ℥iij.

Sal. commun. ℥j.

M. F. Clyster tepidè injiciendus.

Vel similiter *Clyisma euporiston* fieri potest ex *Aquæ muriaticæ* ℥t℞. *Lactis vaccin. vel caprill.* ℥iij. *Mellis rosac.* ℥j. *Olei Olivar.* ℥ij. & tepidè aliquoties infundi.

Post *Clyisma* si vomendi desiderium adfuerit, ipseque *Æger* haud difficilis ad vomendum sit, tum præmissâ tantillâ sanguinis per venam in brachio aut pede sectam extractione, emeticum exhiberi potest. v. gr.

℞. *Guttæ Gamandr.* gr. 8. vel 9.

Crem. Tartar. vel

Salis essent. Rub. idæi, Acetosell.

aut Card. bened. gr. 6.

Ol. stillat. Mac. gutt. j.

Sacch. rosat. ℥℞.

M. F. pulvis d. ad chart. sumatur statim unâ vice.

Vel

Vel R̄. Sal. essential. Citr. vel
Crem. Tart. ʒʒ.

Sal. Helen. gr. v.

Tart. emet. gr. ij.

Sacch. rosat. gr. viij.

M. F. Pulv. subt. d. ad ch. pro dosi.

Vel R̄. Oxyfacch. emet. ʒiij. aut ʒʒ.

Syrup. de Erysim. Lob. ʒj.

Aqu. Fœnic.

Succis. ana. ʒiij.

M. d. ad Vit. pro dosi.

Præmissis his universalibus statim E-
clegma vel Electuarium incrassans est
ordinandum. v. gr.

R̄. Dicod. Montan.

Syrup. de Jujub.

Aqu. Plantag.

Borrag. ana. ʒj.

Essent. Succin. ʒʒ.

Spec. diatr. frig. ʒij.

M. d. ad Vit. sumatur cochleatim.

Vel R̄. Conserv. fl. Rosar. rubr.

Fumar. ana. ʒvj.

Nuc. Indic. cond. ʒj.

Condit. Cynosb. ʒiʒ.

Unic. fossil.

Succin. alb. ppt.

Corall. rubr. ppt. ana. ʒij.

Syrup. de Farf. q. s.

M. F. Elect. d. ad Pyxid. Dosis singu-
lis trihoriis magnitudo Nucistæ.

Si quis Pulverem malit, ex Bolo
arm. ppt. Terr. sigillat. Sang. Dracon.
vero, Unic. foss. Succin. alb. ppt. Corall.
rubr. ppt. C. C. vel Ebor. ust. Fol. Li-
chen. petr. Pilosell. Beton. Majoran. flor.
Ros. rubr. Salv. Nuce mosch. & simili-
bus parare, cum æquali Sacchar. cand.
albi, quantitate permiscere, & ʒj. dosi

quotidie bis aliquandiu usurpare po-
terit.

In ipso etiam tali Paroxysmo sin-
gulis trihoriis, vel quadrihoriis 20. 30.
vel 40. guttæ Tincturæ antiphthis. Vel
Tinct. Mart. adstring. cum Aqu. Plan-
tag. Burs. Pastor. ac Syrup. Papap. er-
rat. sumi possunt. Quod si Corpus
vomitorio purgare non licet, Purgans
nihilominus per inferiora præscribe-
tur, & quidem, si sumi possunt, è Pilu-
lis. v. gr.

R̄. Mass. Pilul. Marocost. ʒj.

Resin. Jalapp. gr. ij. vel iij.

Ol. stillat. Mac. q. s.

M. F. l. a. Pilulæ no. 12. Inaurat. d.
ad ch. & sumantur pro dosi cum regimi-
ne Diætæ.

Vel Syrupus flor. Acac. aut flor. Per-
sic. ad ʒiij. cum Aquâ Hyssopi propinari
potest. Nocte hinc unâ vel alterâ
Pilulæ catarrhales dandæ; v. gr.

R̄. Mass. pilul. è Styrac. gr. vij.

Cynogloss. gr. j.

Extract. Betonic. gr. iij.

Ol. stillat. Mac. q. s.

M. F. Pilulæ no. vij. Inaur. dentur
pro dosi.

In Asthmate scorbutico atque hypo-
chondriaco mineræ morbifica remediis
antiscorbuticis & spleneticis ex hau-
rienda venit. In Paroxysmo hinc
Asthmatis hujus Clysmâ unum vel alte-
rum infundetur, probè emolliens atque
detergens; dosis etiam spermatis Ceti
ad ʒj. in jussulo dabitur; Mixtura si-
mul sequens vel similis, cochleatim
propinanda, ordinabitur:

R̄. Aqu. Veronic. ʒij.

Heder. terr.

N 3

Fumar.

Cura
Asth-
matis
scorbu-
tici vel
hypo-
chon-
driaci.

Fumar. ana. ℥j.
Syrup. Capill. Vener.
Papav. rhead. ana. 3vj.
Spir. Sal. armon. vel
Tinct. Cast. cum Spir. Sal. armon.
par. 3j.
Theriac. celest. 3℔.
Cinnab. antimon. optim. 3℔.
Diaphor. Jovial. 3ij.

Misc. detur ad Vitrum.

Noctu etiam horâ somni dosi*s* *Pilularum antasthmaticarum* exhiberi potest. v. gr.

℞. *Extract. Fumar.*

Trifol. fibr. ana. gr. iv.

Mass. pilul. de Styrac. gr. 8.

Essent. Myrrh. q. s.

M. fiant Pilulæ no. 10. Inaur. d. ad ch. sumantur unâ vice cum Syrup. de Farfarâ aut simili.

Si continuat Asthma, nunc fortius nunc mitius hominem excruciare, usus *Mixturæ* cujusdam simul continuabitur; quemadmodum factâ mutatione sequens esse potest. v. gr.

℞. *Aqu. Solan. commun.*

Endiv.

Scabios. ana. 3j.

fl. Acac. 3vj.

Syrup. de Alth. Fern. vel

Jujubin. 3j.

de succo Nicotian. 3℔.

Essent. Croc.

Succin. ana. 3℔.

Spir. Cochlear. 3ij.

Mixta dentur ad Vitr. ac singulis trihoris vel quadrihoris duo cochlearia capiantur.

Juxta hanc mixturam mane ac vesperi *Infusum Millepedum* cum Vi-

no vel *Aquâ Fumar. ac Hyssopi* paratum hauriatur. Vel *Juscula* *Herbis Cochleariæ, Nasturt. cujusvis. Plantag. aquat. Cherefol. Piperitidis, Beccabungæ, Trifol. fibrin. Borragin. aliisve alterata;* aut *Succi earundem Herbarum expressi man. ac vesp. dosi 3iij. vel 3iv. diligenter præbeantur.* Vel *Radici Bryoniæ 3j* infundatur in *Aqu. Veron. atque flor. Acac. s. q. addito, si lubet, Semine Anis. aut Fœnicul. & tantillo Flor. Salis armoniac. hincque m. ac vesp. uncia tres vel quatuor Saccharo edulcoratæ propinentur.* Vel *Decocti* alicujus *pectoralis* dosi capiatur; v. gr.

℞. *Radic. Alth.*

Tussilag.

Aristol. rot. ver.

Ireos flor.

Fœnic. ana. 3℔.

Herb. Agrimon.

Scolopendr. ana. Mj.

Cuscut.

Hyssop.

Card. bened. ana. M℔.

Sem. Anis.

Seseleos.

Bacc. Juniper. ana. 3ij.

Ficuum ping. par. jv.

Passul. maj. exacin. 3i℔.

Incis. & contus. coqu. in Aqu. fontan. Mens. ii℔. in Vase clauso per horam integram supra ignem lenem, in fine addendo Mellis Violar. 3ij. Colatura d. ad Vitr.

Vel ℞. *Radic. Scrophular.*

Card. bened. ana. 3℔.

Helen. 3ij.

Herb. Veron.

Marrub. alb.

Hed.

Hed. terr.

Flor. Bellid min. ana. Mj.

Sem. Fœnic. 3iij.

Jujubar. par. vj.

*Incis. & contus. coque per quadran-
tem horæ in Aqu. fontan. & seri Lactis
ana. ℥iij.*

*In fine adde Sacch. cand. alb. 3vj.
Hinc Colatura detur ad Vitr. Dosis 3iij.
vel 3jv. mane ac vesp. calidè.*

*Vel mane ac vesp. 3ß. ad 3ij. Salis
polychrestli cum haustu Aqu. Nasturt.
& Veronic. per aliquot dies aut hebdo-
madas capiatur. Vel sequens Pulvis
usurpetur eundem in finem :*

R. Radic. Ireos florent.

Sigill. Salom.

Trifol. fibr.

Aron. ana. 3j.

Ocul. 5. ppt.

Diaph. Jovial. ana. 3ij.

Sal. volat. C. C. aut

Ebor. 3ij.

*Semin. Anis. vel communis vel
stellat. 3j*

Sacch. cand. alb. 3iß.

*M. F. pulv. subt. d. ad scatul. Dosis
3ß. ad 3ij. cum vehiculo convenienti.*

*Vel R. Spec. diatrag. frig.
diar. simpl.*

Millep. ppt. ana. 3j.

Lact. aut Flor. Sulphur. 3ß.

Specif. antib. Pot. 3iß.

Pulv. fol. Veron.

Hyssop. ana. 3ij.

Semin. Fœnic. 3ß.

Sacch. cand. alb. 3ij.

*M. F. pulv. subt. d. ad scat. Dosis ut
supra.*

Vel Panacea solutiva alcalina per

*aliquot hebdomadas mane ad 3j. cum
Aqu. Fumar. Cherefol. Nasturt. Borrag.
Scolopendr. &c. & per reliquum diei
spatium Mixtura quædam superius or-
dinata sumatur. Interea Fonticulus in
alterutro Brachio, vel in Brachio ac
Pede alterutro simul excitetur. Æsti-
vo tempore Thermæ Fabarienses vel
Emsenses, vel Plumbarienses haurian-
tur, præmittendo per quatuor, quin-
que, aut sex pluresve dies potum Aquæ
alicujus mineralis salsæ, quemadmo-
dum in Burgundiâ ad Burbonium, in
Rhætiâ ad fontem Salisularum reperiu-
tur, unde pluries sine torminibus la-
xantur homines, sicque ab onere feri
superflui liberantur. Sal volatile oleos.
Spiritus Cochleariæ, Salis armoniaci, San-
guin. human. Urinæ, C. C. Eboris, simi-
lisque volatilis ad gutt. 20. 30. plures-
que cum Infuso fol. Thee vel Aquâ aliquâ
destillatâ mane ac vesp. assumi quoque
potest. Celeberr. Wedelius suam ex-
tollit Tincturam Martis helleboratam.
Profunt etiam Elixiria pectoralia v. gr.
Rolfincii, Michaelis, aliorum. Si quis
Fumum Nicotianæ tolerare potest,
fortè & hic aliquid adjumenti præstare
posset. Extus totum Pectus, quoad
costarum regio ante ac retro pertendit,
Oleo Lini, Chamomill. Aneth. Vulpin.
Lilior. alb. Amygdalar. Melilot. è flori-
bus Slotani, Unguento dialtheæ, rubro
potabili, pectorali resumtivo, Axungia
Anatum, Canis, Capon. Anserum, le-
porinâ, vulpinâ, cervinâ, aut simili-
bus quotidie bis valdè inungere simul
non sine fructu consuevimus. Deni-
que Pediluvia ex Decocto Herbarum
Serpilli, Origani, Hyssopi, Chamomill.*

Meli-

Meliloti, Cinerum, Furfuris. &c. in Aquâ aut Lixivii parte mediâ parata, frequenter in usum vocentur. Si fortè Animi deliquia superveniant, tum Balsamus Rutæ, Succini, Majoranæ, apoplectic. Vel Sal. vol. C. C. aliudve, vel Spiritus volatilis qualiscunque, vel Spir. Regin. Hungar. aut apoplecticus alius crebrò Naribus, capitis Vertici atque Temporibus calidè applicari debet, usque dum Patiens ad se & Spiritum faciliorem redeat.

Curatio
Asth-
matis.
convulsi-
vi & pe-
riodici.

In Asthmate convulsivo atque periodico, dum paroxysmus adest, Clyster emolliens atque detergens statim injiciendus, isque etiam pro rei exigentiâ semel vel bis reiterandus. Hinc vel Cucurbitulæ cum scarificatione dorso applicandæ, vel Vena brachii aut pedis secanda, sanguisque ad uncias sex, septem, pluresve extrahendus est. Mixture dein statim antispasmodica cochleatim sæpius exhiberi potest, eaque parata ex Aquis destill. Chamomill. Anethi, Cochlear. Nasturt. flor. Til. Melissæ, Matricariæ, Pulegii, Menth. Pæon. Florum omnium, Solani communis, Syrupis Papaveris rhead. Sempervivi, de Pæon. de Succo Nicotianæ, Diacodio Montan. cum Liquore C. C. succinat. Spiritu theriacal. camphorat. spiritu Salis armoniac. cum Gummi. ammoniaco destillato, Tincturâ Castorei cum spir. Salis armoniaci parat. Tincturâ vel Essentiâ anodynâ, Sale volatili oleoso, Essentiâ Croci, Spiritu antasthmatico Myns. v. gr.

Rx. Aqu. Pæon. mar.

Semperviv. ana. ʒiʒ.

Flor. omnium. ʒj.

Syrup. de Hed. terr.

anod. ana. ʒvj.

Æis volatil. oleos. ʒj.

Bezoard. min. ʒʒ.

M. d. ad Vitr. subinde cochleare plenum capiat.

Vel Rx. Aqu. fl. Til. ʒiʒ.

Chamomill. ʒj.

Puleg. ʒʒ.

Diacod. Mont. ʒvj.

Syrup. de Succo Nicot. ʒʒ.

Spir. theriacal. camph. ʒij.

Ungul. Alc. ppt.

Unicorn. marin. ppt.

Cinnab. ʒ n. correct. ana. ʒj.

Misc. detur ad Vitr. sumatur ut supra.

Observavimus & Sal polychrestum quotidie mane ad ʒj. cum granis quinque vel sex Salis volatilis C. C. aut Viperar. Eboris, Succin. &c. in vehiculo conveniente sumtum, mira aliquando præstitisse, modò per integram septimanam vel etiam longiùs hauriri potuerit. Ita & Succus è Sempervivo majore, Rutâ, Cherefolio, Nasturtio, Cardamine, Cochleariâ, Beccabungâ, Hederâ terr. Malvâ & similibus recen-ter expressus, filtratus, atque ʒij dosi mane ac vesp. per aliquot hebdomadas haustus levamen sæpius haud contemnendum attulit. Pariter prodest Infusum Millepedum, vel etiam Destillatum Hippenterorum item Panacea solutiva alcalina per 15. dies semel quotidie primò quidem ad ʒij. vel ʒiij. hinc minore dosi usque ad ʒʒ. vel ʒij. exhibita juvit. Æstivo tempore potus Salsularum mineralium Rheticarum, vel Burbonicarum, vel Emsensum in usum trahendus, ad minimum per octo

octo dies, à quibus ita sufficienter purgatus atque exterius Æger ad potum *Lactis atiniani*, *caprilli*, vel *Thermarum Fabariensium*, *Plumbariensium*, aliarumve sese accingere potest, non sine spe recuperandæ sanitatis integræ. Si quis verò *Acidulas Sualbacenses*, vel similes alias frigidas diureticas, suo in stomacho ferre queat, neque præterea teneram nimis Pulmonum texturam habeat, is certè tales Aquis, cæterisque Liquoribus calentibus præferre haud cunctabitur. Multi *Sperma Ceti* ad 3j. sæpius in *Jusculo* solutum & haustum deprehendunt esse in hoc morbo valde proficuum.

Vel R̄. *Ol. Amygd. dulc. rec. expr.* 3iβ.
Axung. Can. 3β.
Sperm. Cet. rec. 3iβ.
Tinct. Croc.
Spir. Sal. arm. anis. ana. 3β.
Sacch. cand. alb. 3β.

Misc. detur ad Fictile, & singulis quadrihoriis inde aliquid lambatur.

Sed & *Pulvis antasthmaticus* aliquis ex absorbentibus antispasmodicis paratus conducit, diligenter in usum vocatus. v. gr.

R̄. *Radic. Pæon.* 3j.
Valerian. 3ij.
Ras. Ebor. ppt.
Corall. rubr. ppt. ana. 3iβ.
Bezoard. miner.
Milleped. ppt.
Cinnab. ʒn. correct.
Diaph. ʒvial. ana. 3j.
Laud. opiat. gr. vj.
Sacch. cand. alb. 3vj.
M. f. Pulv. subt. d. ad Scat. sumatur

hinc m. ac vesp. 3β. vel 3ij. dosis cum Infus. fol. Thee vel Beton.

Vel R̄. *Ungul. Alc. ppt.* 3iij.

Semin. Pæon.

Aquileg.

C. C. phil. ppt.

Ægagropil. subtiliss. trit. ana. 3j.

Diaphor. lunar. 3ij.

Laud. opiat. gr. vj.

Sacch. cand. alb. 3vj.

M. f. Pulv. subt. d. ad Scat. Dosis ut supra.

Noctu subinde *Pilulæ* sequent. horâ somni capiantur ab Adultis :

R̄. *Extract. Trifol. fibrin. gr.* jv.

Croci. gr. ij.

Massæ Pilular. è Styrac. gr. v.

Cynogloss. gr. j.

Ol. stillat. Lavend. q. s.

M. f. l. a. Pilulæ. no. 9. Inaur. d. ad ch. sumantur pro dosi.

Vel R̄. *Extract. Veron.*

Liquirit.

Pæon. ana. gr. ij.

Theriac. celest. gr. v.

Essent. Croc. q. s.

M. f. Pilulæ num. 8. Inaur. d. ad ch. Capiantur unâ dosi:

Vel R̄. *Extr. Hed. terr. gr.* v.

Mass. Pilul. è Cynogl. gr. ij.

Salis volat. Succin. gr. iij.

Essent. Croc. q. s.

M. f. l. a. Pilulæ num. 7. Inaur. dentur ad Scat. sumantur unâ vice.

Interea Æger ejusmodi non solum in Paroxysmo, sed singulis propemodum mensibus *Cucurbitulas* cum scarificatione admittat, nisi ab his malè se habere aliquoties expertus fuerit. Singulis verò trimestribus, ubi id complexio

plexio Hominis tolerabit, sanguis per *Venæsectionem* extrahetur. Juxta hæc simul vel *Setaceum in Nuchâ*, vel *Fonculus in Brachio*, forsan & *Pede* simul excitabitur, quo certè remedio multo heic in tali Affectu maximè adjuti, atque ab insequente alias Apoplexiâ vel Hydrope planè liberati, aut certè diu præservati fuerunt.

Cura
Asth-
matis
Sympto-
matici.

Quod si denique Asthma alios Morbos qualescunque, tanquam umbra corpus vel effectus suam causam sequatur, tum Morbi ejusmodi principaliter sunt curandi, utpote quibus sublatis ipsum Asthmatis symptoma per se cessabit. Interim remedia *antasthmatica* nihilominus aliis sunt intermiscenda.

Atecnia

ATECNIA, *Carentia liberorum*, est *Sterilitas humana*, de quâ suo loco agitur.

Athero-
ma.

ATHEROMA, *A'θήρωμα, αλος*, ab *A'θήρα*, *Æolicè A'θήρα*, quæ vox *pulticulæ* vel *polentæ* genus apud Græcos olim sonuit, est Tumor cysticus major vel minor, indolens, cuti concolor, mollis, in variis corporis partibus subter cutim tenui ex principio natus, atque sensim auctus, in quo materia quædam serosa, & quasi caseosa albicans pulticulæ instar, collecta hæret atque manet.

Diagno-
sis.

Hic Tumor frequentius in Capite subter cutim enascitur, cumque hæc arctè satis cranio adhærescat, in latum sese magis extendit, & ita subinde *Testudinis* vel *Talpæ* nomine venit. Sed & in aliis partibus gignitur, vidimus enim nos in Scapulâ dextrâ duorum annorum spatio genitum A-

theroma, quod quartâ capitis humani partem suâ amplitudine exæquabat. Cysticum esse tumorem vel inde cognosci debet, quod subter cutim mobilis sit hinc inde, & tenui tantum radice alicubi adnatus. *Atheroma* verò existere ipsius mollities indigitat, *Meliceridis* enim Tumor densior atque solidior existit, & *Steatoma* Hepatis vel Renum densitatem atque duriem suâ consistentiâ refert. Quod si aperiatur Atheroma, materia effluet serosa pultacea, ut plurimum cineritia, subinde aliquid caseosi, instar lactis coagulati in sese continens. Indolens præterea est tumor à tenui radice enascens, atque affluente paulatim novâ materiâ lentè increescens. Quando igitur humor Atheromatis nullam acrimoniam adipiscitur tum diutissimè illud durare potest & solet sine ullâ mutatione, nisi quod lento gradu incrementum capiat, ac tandem, si folliculus membranaceus sese expandi ulterius non patitur, in eadem magnitudine persistat. Quando autem materia tumoris acido-acris evadit, tum circum circa rodere, pericranium dolorificè pungere, ipsumque tandem os Cranii corrumpere & cariosum reddere valet, nisi aperto tumore humor effluere permittatur.

Prog

Caus

Oriri autem videtur Atheroma non nisi à vasculo lymphatico, aut à membranulâ sive vesiculâ membranaceâ, quæ nutritium succum recipere & continere solet, vel disruptâ vel præternaturaliter dilatatâ, qualiscunque demum huc contribuerit causa antecedens, comprimens nimirum vel contundens

dens in lapsu vel ictu, aut similis alia, ob quam dein non solum guttulæ succi nutritii vel lymphæ copiâ præternaturali sensim excernuntur, colliguntur, vasq; lymphaticû (veluti sanguis Venâ in Varice, aut Arteriam & membranas circumstantes in Aneurismate) p. n. expandunt, sed & particulæ ferroso-aquosæ aliæ, quæ perfectè coagulari & indurari nequeunt, ex humo-rali massâ prodeunt, atque hinc intra membranulam peculiarem, quæ subinde ab ipso succo affluente nutritionem, incrementum & expansionem adipiscitur, coactæ, cumulataeque cysticum Tumorem efficiunt, eumque indolentem, dum humor acris non est, sed dulcis adhuc; cutique concolorem, quia tumor subter cutim planè est, neque adeo humor in folliculo contentus transparenere ullo modo valet. Quando autem materia tumoris ab accedentibus forsan è sanguine circulante particulis salino-acutis evadit acris, tum illa pungendo, lancinando, & rodendo fibras membranaceas dolorem inferre demum solet.

Potest etiam Glandula quædam & obstructa, ac intumescens, vasculum Lymphaticum adjacens comprimere, sic ad ejus extensionem sive expansionem præternaturalem contribuere. Facit denique humoris affluentis diversa textura & crasis, ut Tumor evadat vel *Atheroma* vel *Meliceris* vel *Steatoma*.

Quod *Curationem* attinet, requirit Tumor hic non secus atque Meliceris vel *Steatoma* sui ablationem per remedia discutientia, vel auxilia extir-

pantia. Discuti nonnunquam potest, si junior vel recens adhuc fuerit; nimirum corpus purgare oportet ante omnia sequentibus, vel similibus Pilulis:

℞. *Massæ Pilul. Emanuel. vel*

Marocost. gr. xv.

Extract. Helleb. nigr. gr. v.

Mercur. dulc. opt. gr. 10.

Ol. stillat. Succin. q. s.

M. f. l. a. Pilulæ no. 15. Inauratæ dentur pro dosi matutinâ, cum regimine diætæ sumendâ.

Si Pilulas fastidiat homo, dari poterit Pulvis laxans. v. gr.

℞. *Radic. Jalapp. ʒj.*

Crem. Tartar.

Mercur. dulc. opt. ana. ʒß.

Scammon. sulphur. gr. ij. vel iij.

Ol. stillat. Mac. gutt. j.

M. f. Pulv. subt. Sumatur unâ vice mane jejunió stomacho.

Purgato semel, vel si opus videbitur, bis corpore, intus & extus volatilia, attenuantia, solventia ac discutientia in usum vocari debent. Intus profunt *Salia volatilia C. C. Eboris, Serpentum vel Viperarum, Succini*, quæ ad quinque plurave grana quotidie mane ac vespri cum *Infuso fol. Thèe, Beton. vel Vino, vel Ptisanâ ordinariâ* exhibentur. *Sal autè volatile oleosum* qualecunque *ad guttas 20. aut 30.* dabitur m. ac vesp. cum vehiculo simili, vel *Aquâ destill. Beton. Verben. Fœniculi.* Sequens pulvis etiam proficiuus:

℞. *Radic. Ireos flor.*

Scrophular. ana. ʒiß.

Sigill. Salomon.

Folior. Beton.

Ocym. ana. ʒj.

Ebor. ppt.

Ocul. ʒ. ppt. ana. ʒij.

Sal. volat. C. C. ʒij.

Semin. Fœnic. ʒʒ.

Sacch. cand. alb. ʒiʒ.

M. f. Pulv. subt. d. ad scatul. Dosis ʒij. vel ʒj. m. ac vesp. cum vehiculo conveniente.

*Remedia
topica.*

Extus Tumor aliquandiu bis, ter aut etiam pluries calidè lavandus est *Spiritu Anthos, Melissa, Lumbric. terrestr. Carminativo Sylvii, Anhaltino, Baccarum Juniperi*, atque desuper applicanda fomentatio calida adstringens, simul & discutiens, v. gr.

R. Radic. Scrophul.

Tormentill.

Bistort. ana. ʒvj.

Angelic. ʒʒ.

Herb. Pentaphyll.

Salv.

Aneth.

Polygon. ana. Miʒ.

Flor. Balaust. Mj.

Cortic. Tamar.

Granat. ana. ʒiij.

Incis. & contus. coque in Vini s. q. Lintea postmodum huic liquori immersa, expressaque calidè applicentur.

Loco Spirituum superiorum illiniri vel inungi possunt Olea resolutiva, v. gr. *Laurinum, Philosophorum, Laterum, Anethi, Galbanetum Paracelsi, Unguentum martiatum, & similia.* Juxta hæc Emplastra quoque profunt, v. grat. *Empl. de Cicutâ, de Nicotianâ, de Ladano, de Galbano crocatum, de Ranis Vigonis cum Mercurio. Vel Resina Pini cum Cinnab. factit. Camphorâ,*

Gummi aminoniac. Galbano, Cerasorum, Styrace calamitâ, Radice Scrophulariæ, Bryon. Baccis Lauri, Juniperi, atque Oleo Philosophorum vel laurino in Emplastrum redigatur, ac ita imponatur.

Quando autem Tumor est inveteratus, sicque discuti nequeat amplius, tum ad suppurationem aliqui Jatro-Chirurgi promovendum, vel causticis sive cathæreticis ad radicem usque erodendum illum esse credunt. Verùm hanc medendi methodum in Tumoribus ejusmodi tunicatis neutiquam probamus, utpote & longam nimis, & facilè vel cancrosum vel fistulosum Vlcus post se trahentem. Præferimus è contrario folliculi excisionem integram, si fieri possit commodè, quæ hac ratione perficitur: inciditur Cutis per longitudinem, non autem in crucem, quousque necessarium esse videbitur, usque ad ipsum folliculum, hic dein integer usque ad radicem suam separatur ab ambientibus omnibus membranis, in radice autem acu perfoditur, circa acum injicitur funiculus sericeus, sicque Tumor in ipsâ radice firmissimo nodo ligatur, & hinc statim cis ligaturam excinditur totus, quo facto deligatio fit sicuti in recentibus Vulneribus consuetum est. In primâ tamen deligatione fila linea carpta Vino, cui *Lardum, Betonica, Scordium vel Alliaria, Scabiosa, & similia* prius fuerunt incocta, immerguntur, atque foramini Vulneris immittuntur, desuper applicato calente fomento, quod ex decocto Herbarum discutientium, & balsamico-cephalicarum in Vino paratum esse debet.

Sequen-

*Tum
excij*

Sequentibus deligationibus *digestivum Hildani*, aut simile cum *Elixiri amaro Vulneri* immittitur, *Oleum Hyperici, Rosarum, & Chamomillæ* circa Tumoris locum inungitur calidè, desuper imponitur *Emplastrum diapalma*, vel *diasulphuris Rulandi*, vel *Diachylum simpl.* simulque adhuc *Fomentum* continuatur, usque dum contracta omninò cutis fuerit, jamque ejus consolidatio aliquousque perrexerit; tandem solo *digestivo & Emplastro* deligatio usque ad Cicatricem perficitur. Notandum tamen, quando funiculus sericeus decidit ex Vulnere, statim immittenda esse fila carpta, aliquo *Elixiri amaro* imbuta, quo Remedii genere radix Tumoris planè destruitur, sicque novo generando materia præciditur.

Quod si folliculus Tumoris integer eximi nequeat, tum nihilominus separandus, quantum fieri potest, reliquæ dein *Unguento Ægyptiaco*, quod *Ungt. digestivo* permiscetur, destrui possunt, quo facto simplex *Unguentum digestivum*, cui *Mel rosaceum & Elixir amarum* sociatur, in usum vocatur, donec Vulnus ad Cicatricem procedat; ubi deligatio superius commendata postmodum est instituenda, & ad Cicatricem usque continuanda.

ATROPHIA, Vid. *Marasmus*.

AVDITVS ABOLITVS, SVRDITAS, *κώφωσις, κωφόιτης, Ανηκία, Auditus defectus*, est omnimoda auditorii sensûs in alterutrâ vel utraque Aure ablatio, à variis causis oriunda. In genere proin affliguntur Aures, & quidem harum modò alterutra, modò

utraque, sive quoad meatum auditorium, sive quoad tympanum, ejusque membranam, sinus varios, atque cochleam; sive denique quoad Nervos acusticos.

Hinc & à diversissimis grave hoc *Causa.* malum causis produci solet: primò enim sæpè obstruitur auditorius meatus, vel etiam tympanum aut trochlea, à crasso, lento & viscoso quodam cerumine; aut à lymphâ copiosâ ceu catarrho in plurimis tubulis stagnante, eosque expandente, & sic meatum claudente; aut à carunculâ quadam enascente; aut à pure ex Abscessu rupto, ut hinc sonorus aër ad tympanum sese diffundere nequeat. Tumor dein etiam qualiscunque Auris meatum comprimens, vel quovis alio modo occludens idem præstat. Porro membranæ tympani vitio Cophosis evenit, si flaccidum aut tensum nimis reddatur, vel prorsus erodatur, pertundatur, aut à vehementi quodam sono rumpatur. Imò si fibræ tendinosæ, quibus ossicula tympani adhærent, resolvantur, suumque tensionis officium præstare nequant, Surditas vel certè gravis Auditus similiter oboritur.

His addimus Nervi auditorii obstructionem, resolutionem, erosionem, tenaci mûco obliuionem atque tensionem nimiam, ut suo hinc munere defungi nequeat; nec non meatûs auditorii, aliarumve partium, ad sensum Auditûs contribuentium vitium nativum, sive structuram præternaturalem, ob quam sonorus aër vel penetrare ad omnes Aurium meatus, & acusticum nervum nequit, vel pene-

trans utcunque tympani tamen membranam aut nullam prorsus, aut osseam planè invenit, aut auditorium etiam Nervum debito modo percellere haud valet. Non rarum est etiam, in Apoplecticis insultibus, Febri malignâ, difficultate partûs similiter Cophosin oboriri, idque vel per obstructionem nervorum auditoriorum, vel per viscidos catarrhos ad Aures depositos.

Diagnos.

Per se hic Affectus ex simplici Ægrotantium relatione cognoscitur; notandum tamen, non semper utramque Aurem surditate affligi, sed subinde tantum unam, dum ex alterâ interim homines optimè audiunt. Aboletur autem hic sensus omninò, ita ut vel nullum penitus sonitum, quantuscunque in aëre externo fiat, percipiant, vel etiamsi fortè quendam auribus sonum hauriant, illius tamen differentias probè discernere, quidque significet, cognoscere & dijudicare nequeant. Qui ab ortu Surdi sunt, simul muti existunt, *surditatem hinc nativam vel originalem* appellant. Dantur tamen *Surdi*, qui seipso loquentes quodammodo audiunt, etiamsi alios nullatenus audiant sonos. Sicuti autem Cœci subinde tactûs ministerio non solum magnitudines & figuras objectorum distinguere posse observantur; ita etiam Surdi interdum aliorum nervorum ministerio sonos in aëre contingentes cognoscere atque discernere valent, dum nimirum vel ore hiant, vel in vertice capitis voces loquentium excipiunt, unde alii patentes nervi simili modo cum nervis acusticis percussi speciem sonitûs in cerebro Surdi producant.

In *Prognosi* Surditatem immedicabilem eam statim pronunciamus, quæ à nativitate est contracta, adeoque homini coæva; quæ item à disrupto tympano, erosio, resolutis, dilaceratis, ruptis, aut muco tenaci oblinitis nervis acusticis; vel à scirrhoso tuberculo, meatum auditorium opplente, oboritur; quæ denique à pertinaci ac diuturnâ eorundem nervulorum obstructione nascitur. Verum quando in Febri acutâ malignâve circa Morbi statum accedit, uti salutarem crisin portendit, ita post aliquot hebdomadas iterum dissipatur sponte; neque perfecta hæc Surditas esse solet, sed difficilis solum Auditus. Etiam à copiâ Ceruminis, vel Abscessu & Ulcere meatûs auditorii, nisi erosi & exesi planè sint nervi, oriunda Surditas curabilis existit. Subinde tamen diuturnum est malum, si tenacem auditorii meatûs aut labyrinthi pituitam pro causâ agnoscit.

In *Curatione* ergo ad causas diversas est attendendum, juxta quas medendi methodus est instituenda. Si à Cerumine cumulado, viscido, crasso, tenaci, aut indurato originem traxerit, tunc licet quidem ante omnia corpus expurgare v. g. sequenti medicamine.

Rx. *Majs. pilul. è Succ. Crat.*

Marocost. ana. ʒʒ.

Cinnab. nativ. opt. gr. viij.

Resin. Jalapp. gr. i. vel ii.

Ol. Jillat. Kerijm. q s.

M. f. l. a. pilulæ no. xij. Inaur. sumantur mane pro dosi cum regimine dietæ.

Dein extus omni arte Cerumen illud

illud prius est emolliendum, ac deinceps auriscalpro eximendum. Emollitur, si *Succus fol. Malvæ, Sempervivi, Violaria, Altheæ, Parietaria, Mercurialis, Telepii*, vel similis subinde calidè cum bombace Auribus immittatur; vel si succo huic *Oleum rosaceum* aut *Amygdalarum amararum* permisceatur, priusquam indatur. Hoc pluries præstito tentanda est Ceruminis extractio; si parum ejus extrahere valenius, emollitio continuanda, & extractio ulterius instituenda: si difficilis hac ratione emollitio contingit, tum sacculi ex herbis emollientibus facti Aquæ sunt incoquendi, & hinc calidè Auribus applicandi tamdiu, donec emollitum cerumen eximi queat. Etiam Emollientibus sequentem in modum coctis, spongia est immergenda, exprimenda parum, atque Auribus calidè crebrò applicanda. Imò Decoctum tale ope Syringæ sæpe in Aures inspergi posset, ad meliorem emolli-
tionem.

℞. Rad. Lil. alb.

Alth.

Pimpinell.

Vincetox. ana. ʒiiss.

Herb. Euphras.

Artemis.

Parietar.

Malv.

Mercur.

Rutæ.

Flor. Melilot.

Verbasc. ana. Mj.

Sem. Lini. ʒß.

Incis. & contus. coqu. in s. q. Aquæ fontan.. In fine coctionis adde Mellis

Rosac. vel Violar. ʒj. Colatura vocetur in usum calidè.

Infusum vel Decoctum Herb. Theè, Chamædr. Betonic. Mercurial. Parietar. Flor. Bellid. min. Primulæ Veris interea quotidie simul bibendum semel vel bis. Vinum album bonum vetus ac tenue, pro ordinario potu est concedendum; à fructibus horæis, caseo, carnibus dyspeptis est abstinendum.

Si Cophosis proveniat ab obstructione nervi acustici, tum purgans supra scriptum, vel sequens est sumendum.

℞. Spirit. Anth. ʒj.

Anis. ʒj.

Resin. Scammon. gr. viij. vel jx.

Solut. lento igne adde

Syrup. de Beton. ʒij.

Aqu. Cinam. c. vin. ʒj.

M. f. Potiuncula d. ad Vitrum pro dosi matutinâ.

Postmodum Vesicatoria pone Aures utrinque sunt applicanda. Vel Cucurbitulæ cum scarificatione prius Nuchæ & Dorso sunt apponendæ. Infusum Theè sequens quotidie per longum tempus bibendum:

℞. Rad. Calam. arom. ʒiij.

Vincetox. ʒvj.

Lign. Guajac.

Sassaph. ana. ʒj.

Fol. Theè opt. ʒij.

Herb. Beton.

Veronic.

Meliss.

Beccabung.

Nasturt. aquat. ana. ʒj.

Cinam. elect. ʒij.

Incis.

Incis. & contus. d. ad Pyxidem, usurpentur ʒij. vel ʒiij. pro dosi.

Frequenter simul gutt. 16. vel 20.
Salis volatilis oleos. Sylvii, vel Essent. Succin. Spir. Sal. armon. anis. vel fœniculat. sunt dandæ. Errhinus pulvis bis vel ter quotidie naribus est attrahendus. v. gr.

R̄. Radic. Ireos florent. ʒiij.

Fol. Betonic.

Nicotian. ana. ʒvj.]

Meliss.

Ocymi.

Thymi. ana. ʒij.

Majoran.

Flor. Anth.

Salv.

Primul. Ver.

Cheiri.

Lil. convall. ana. ʒj.

Storac. Calamit. ʒiij.

Ambr. Saccharo trit. gr. vj.

M. f. Pulv. subt. d. ad scatul.

Aurium cavitati frequenter intrudatur
calidè Bombacis Aquâ acusticâ Mynsichti, vel Spiritu Anth. ac Lil. convall. imbuti frustum. Vertici Capitis raso Emplastrum de Betonic. cum Tacamahacâ imponatur.

In progressu & diuturnitate mali
 Vinum medicatum purgans est præscribendum; hinc Fonticulus vel in Nuchâ vel in sinistro Brachio est exci-
 tandus. Tragema quoque cephalicum in usum vocandum. v. gr.

R̄. Specier. Imperat.

Dianth. ana. ʒij.

Pulv. Fol. Majoran. ʒiij.

Salv.

Flor. Betonic.

Lil. convall. ana. ʒj.

Corall. rubr. ppt.

Dent. aprin. ppt. ana. ʒʒ.

Sacch. albi. ʒvj.

M. f. Pulv. subt. d. ad scatulam. Dosis mane ac vesp. ʒij. vel plus.

Si à frequenti stagnatione Lymphæ intra tubulos & poros tunicæ meatûs auditorii (quam stagnationem cum vel sine extravasatione contingentem Veteres sub nomine Catarrhi exprimere consueverunt,) Surditas gignatur, tum in curatione eodem modo procedimus, quo in casu præcedenti fecimus; addimus tamen adhuc sacculos ex Herbis & Seminibus carminativis compositos, atque siccè, calidèque applicatos, v. gr.

R̄. Radic. Angelic.

Imperat.

Galang. ana. ʒj.

Herb. Meliss.

Artemis.

Salv.

Beton.

Origan.

Aneth.

Absynth.

Summit. Amarac.

Thym. ana. Mj.

Semin. Fœnic.

Carv.

Anis. ana. ʒʒ.

Incis. & contus. tenuiter d. ad cb. Insuantur Sacculo interpassato, & calidè applicentur.

Imò farinæ jam fermentatæ immiscetur contusum Semen Fœniculi, vel Carvi, vel Anethi, Anisi, cum Pulvere Folior Amarac. Aneth. Rorismarin. &c.
 hinc

hinc Clibano immittitur, ad dimidium tempus excoquitur, dein in medio dividitur, ac utrique Auri pars calidè applicatur.

Ab Abscessu, Ulcere, Inflammatione proveniens Cophosis curatur, si tales morbi fuerint prius è medio sublatis, de quo vide Aurium morbos.

Reliquæ Surditatis Causæ sunt inextirpabiles.

AVDITVS IMMINUTVS, GRAVIS, DIFFICILIS, Βαρυκῶια, Δυσηκῶια, symptoma Auditionis læsæ, quo homines ægrè sonos percipere ac discernere nōrunt, nisi altos admodum & elevatos, ita ut qui cum illis fermocinari gestiunt, suam extollere vocem, sæpè etiam clamare cogantur. *Gradualis* est in hoc Affectu *differentia*, dum alii aliis melius vel difficilius audiunt. Apud nonnullos etiam tam gravis est Auditus, ut nisi quis in patulas ipsorum Aures cum vociferatione loquatur, nihil prorsus intelligere valeant.

Si ætiologiam hujus Affectionis spectemus, proximè quidem hic accusare debemus fibrarum Nervi auditorii tonum & activitatem debilitatam, sive id Nervi ipsius, sive reliquarum Auris partium vitio contingat. Imò etiam Cerebri morbus gravior in principio Nervi acustici aliqualem compressionem, obstructionem aut debilitatem efficiens, huic Auditûs difficultati an-sam præbet. Nervus autem auditorius ipsemet vel flaccidior ab humoris affluentis cingentisve copiâ in complexione hominis pituitosâ redditus, vel

ficcior in temperamento opposito, aut in senectute factus ad idem incommodum contribuit. Cœteræ dein causæ pleræque, à quibus Auditum penitus aboleri supra indigitavimus, mitiore gradu Aurium structuram offendentes, Barycojam quoque excitant. Inprimis autem accusamus meatuum auditoriorum obstructionem, nondum totalem aut perfectam, à mucro viscido, tenaci, cerumine copioso indurato, tuberculo vel excrescentiâ carnosâ, rebus illapsis, abscessu, ulcere, catarrho seroso copiosè ex auribus fluente, similibusque aliis rebus productam. Huc pertinet Auris externæ abscissio, ob quam sensus auditionis quoque imminuitur; conformatio item partis præternaturalis, sive nativa, aut hæreditaria, sive adventitia; & spirituum ad Nervos acusticos depluentium inopia.

Hinc pro causarum diversitate *Prognosis* Barycoja facilior aut difficilior curatu. Quæ nativa vel hæreditaria est, à conformatione perversâ oriunda, curationem vix ullam admittit. Quæ autem in malignis Febribus circa statum morbi hominibus contingit, prænuncia criseos ut plurimum salutaris esse solet, per narium Hæmorrhagiam plerumque futuræ, & per se tandem redeuntibus corporis viribus, restitutaque sufficientium spirituum ad acusticos Nervos distributione cessat.

Quando igitur eadem causæ *Curatio* Barycojam producant, quas Surditatem excitare in præcedenti Affectu diximus, eadem etiam curatio institui poterit. Attamen monere heic debemus,

mus, quod illi, quibus propter Aurium externarum amputationem difficilior auditus est factus, instrumento aliquo externo, nimirum exiguâ quadam tubâ ex argento, aliove metallo factâ, atque ad aures applicatâ externos sonos recipere, eosq; distinctissimè audire soleant. Tuba autem talis infundibuli figuram habet, & acutæ suæ partis foramine auris meatui applicatur, oppositâ ampliore versus aërem externum porrectâ. Hoc instrumentum vicem replet Auris externæ, admissumque aërem sonorum facile reflectit, ac defert in meatum auditorium.

Dein & in illis, quorum aures à pituitâ qualicunque viscidâ, tenaci, præprimis retro membranam tympani, sunt impletæ; vel quorum acustici nervi tonû imbecillem sunt nacti, Embrocatio frequens cum *calente Decocto Herbarum cephalicarum ac nervinarum* in nucham quotidie mane ac vesperi per aliquot hebdomadas, quadrantis semper horæ spatio, non sine fructu institui potest. In *Thermis Plumbariis Lotharingiæ* vocant talem medendi modum *Duciam*, & frequenter à Balneatoribus exercetur in illis, qui quidem necessarium sibi credunt esse hoc auxilii genus.

Tuberculum fungosum.

Triennium vix elabitur, cum ad Filiam Pastoris cujusdam extra Urbem 25. annos natam, vocarer, sinistrâ aure tantum non planè surdam; rara erat mali causa, nimirum tuberculum fungoso-carnosum, livido-rubicundum, hætenus indolens, quod ex meatu auditorio intra anni spatium paulatim

ad magnitudinem Avellanæ nucis crescendo, illi⁹ ostium jam jam occludere cœperat, cancriforme tumorem minabatur. Examinato probè hoc malo, initoque cum præsentè Chirurgo consilio, conclusum fuit, purgans ante omnia esse dandum, hinc Venam brachii secandam, ulterius Tincturam purificantem cum decocto Herbarum traumaticarum per plures hebdomadas exhibendam, hinc purgans unâ vel alterâ vice repetendum; atque inter hæc topica quoque applicanda. Cum autem Filia sanguineo-melancholica esse videretur, & hætenus mensium fluxu naturali gauderet, sequentes ordinatæ fuerunt Pillulæ:

R̄. *Maß. pilul. è Succino Craton.*
gr. xv.

Extract. Helleb. nigr. gr. v.

Cinnab. nativ. opt. ʒß.

Resin. Scammon. gr. ij.

Ol. stillat. Rorismar. q. s.

M. f. Pilul. num. 14. Inaur. d. ad ch. pro dosi matut.

Tinctura sequens fuit:

R̄. *Tinct. ʒn. cum Nitr. par. ʒß.*

Essent. Betonic.

Lignor. ana. ʒiß.

Aqu. Cinam. cum Vin. destill. ʒj.

M. detur ad Vitr. Dosis 25. ad 30. gutt. m. ac vesp. cum Decocto traumatico seqq.

R̄. *Radic. Caryophyllat.*

Aristol. rot. ver. ana. ʒß.

Herb. Betonic.

Sanicul.

Pyrol.

Vinc. pervinc.

Millefol.

Alchy-

Alchymill. ana. Mj.

Flor. Primul. ver.

Salv. ana. Mß.

Incisa d. ad chart. Manipulus hinc coquatur parum in Aquæ fontan. ℥iij. & Vini albi veter. ℥iij. De colaturâ mane ac vespere tres vel quatuor unciae hauriantur.

Extus Tuberculum, quousque possibile erat, sericeo filo circumligato valide stringebatur, sicque manebat donec sponte frustum inde decidebat, hinc statim ablato simul filo, Tuberculi reliquum filis carptis tegebatur, sequenti digestivo oblinitis :

Rx. Terebinth. Vitell. Ovor. solut. 3vj.

Mellis rosac. 3ß.

Myrrh. elect. 3j.

Aloës succotrin. 3ij.

Garyophyll. arom. gr. iv.

Misc. detur ad Pyxid.

Prius tamen ablutum semper fuerat Tincturâ sequenti :

Rx. Myrrh. elect.

Thur. masc.

Aloës succotr. ana. 3ß.

Theriac. Androm.

Radic. Aristol. rot. ver.

Gentian. ana. 3ij.

Hellebor. nigr. 3j.

Incis. & contusis affunde

Spir. Vin. Frisat. q. s. ad

eminentiam quatuor vel plurium digitorum, stent, donec extracta sit Tinctura.

Sequenti die novum denuo frustum Tuberculi, præparatis ad hanc rem aptis ac subtilibus instrumentis ligabatur, & priori modo tractabatur. Atque sic tertiâ quartâque vice, intra

meatum ipsum subtiliter institutâ, operatione tandem ad radicem Tuberculi perventum est, quæ dein, solâ Tincturâ modò descriptâ, pluries tacta, cum applicato desuper Unguento superiori digestivo, intra paucarû hebdomadarum spaciû extirpata fuit, ita ut hætenus nunquam repullulârit Tumor, sensusque Auditûs integer redierit atque permanferit.

Aurium *Ulcus* quomodo tractandum sit, paulo infra docetur. *Vulnus* autem curatur generali methodo, suo loco traditâ.

Si Catarrhi plus minus crassi, vel Lympha suis in vasculis obhærens & stagnans in culpâ fuerit, acustica remedia attenuantia, resolventia, atque discutientia diligenter in usum sunt vocanda, quemadmodum præter ea, quæ supra adversus Surditatem commendata fuerunt, adhuc sequentia non sine successu felici usurpavimus. Nimirum purgato prius corpore semel aut pluries, exhibitis *Pilulis cephalico-catarthicis*, *Errhina*, *Sternutatoria*, atque *Apophlegmatizantia*, in usum trahimus: v. gr.

Rx. Radic. Ireos flor. 3j.

Pyrethr. 3iijß.

Fol. Beton.

Salviæ.

Thymi, ana. 3ß.

Majoran.

Summit. Lavendul.

Rorismarin.

Flor. Violar. purpur.

Lil. Convall.

Granor. Styrac. calamit. ana. 3ij.

Rasur. Lign. rhod. 3ß.

P 2

M. f.

*M. f. Pulv. subt. d. ad scatul. mane
ac vesperi aliquid naribus immittatur.*

*Si fragrantem magis, nec minus
efficacem desideres, tum*

R̄. Folior. Tabac. Virgin. ʒiʒ.

Radic. Ireos flor. ʒʒ.

Cyper. rotund. ʒij.

Lign. Rhod. ʒiij.

Herb. Betonic. ʒvj.

Meliß.

Ocym. ana. ʒiʒ.

Flor. Rosar. Damascen.

Lavend.

Semin. Nigell.

Cinam. elect.

Styrac. calam.

Asæ dulc. ana. ʒj.

Zibeth. gr. v.

*Mosch. oriental. Spirit. Ros. solut.
gr. viij.*

*M. f. Pulv. subt. d. ad scatul. Usur-
petur quotidie aliquoties.*

Euporistus magis Pulvis est seqq.

R̄. Fol. Betonic.

Nicotian. ana. ʒiʒ.

Flor. Lavendul. ʒij.

Lil. convall.

Semin. Nigell. ana. ʒiʒ.

M. f. Pulv. subt. d. ad scat.

*Ad salivam autem copiosiore
eliciendam masticatorium usurpan-
dum est, quem in finem commodissi-
mi sunt Trochisci sublinguales v. gr. se-
quentes:*

R̄. Radic. Angelic.

Pyrethr.

Calam. arom. ana. ʒj.

Cinam. elect.

Cubebæ. ana. ʒij.

Semin. Fœnicul. ʒʒ.

Sacch. cand. alb. ʒiʒ.

*Mucilag. Gumm. Trag. Aqu. Ci-
nam. fact. q. s.*

*M. f. l. a. Trochisc. d. ad scatul. Sæpe
lambatur unus vel alter.*

*Si quis amet Fumum Tabaci, se-
quens fragrantissimus commendari
poterit, nisi communem prætulerit,
quotidie usurpandus:*

R̄. Tabaci Virginian. vel

Hanoviensis, aut.

Nostratis opt. ʒʒ.

Folior. Beton.

Meliß. ana. ʒj.

Styrac. Calamit. ʒvj.

Semin. Fœnicul.

Anis. ana. ʒiʒ.

Mosch. oriental. Spirit.

Ros. solut. ʒj.

*Incisa & contus. misce, & asserva in
Pyxide ad usum.*

*His igitur remediis si excrementa
seroso-mucosa per os & nares frequen-
ter eliciuntur, tum sæpè fit revulsio
causæ morbificæ ab Auribus. Quod
si humor peccans nondum crassus fue-
rit, sanguinisque & feri copiâ homo
præditus, tum scarificatio dorsi men-
struatim repetita proderit. In crassiore
autem ac tenaciore catarrho emollien-
tia ac discutientia maximè usurpanda;
præstat hoc Oleum Amygd. dulc. vel
amar. rec. express. vel solum, vel cum
guttulis quibusdam Olei laurini, nardi-
ni, aut Gran. Junip. destill. permixtum.
Alii Oleum Terebinth. Laterum, vel Spicæ
vitello ovorum permixtum Auribus in-
dunt. Valent etiam Axungia Canis,
Murium alpin. Caponum, Anatum, Ca-
stor. Pinguedo Anguill. Fella Leporis,
Trutta,*

Truttæ, Corvorum, Serpentis, Tauri, Anguill. Succi Herbarum Semperviv. Absynth. fol. Persicorum Salic. rubr. Cyclaminis, Aneth. Verbasci, Taraxaconis, Urtic. Hieracei, Ceparum, Ovorum Formicar. trit. Olea Chamomill. Verbasce. Aneth. Rosar. Vitell. ovar. Violar. Scorpionum, Formicar. item Olea destillata Cherefol. Fœnicul. Lavendul. Majoran. Nuc. mosch. Rorismar. Salv. Rutæ, Aneth. Thymi, Spiritus Anthos, Lavendul. qualiscunque Antapoplectic. Spir. Sal. armon. urinos. vel oleos. Urina leporina, quæ ita sunt invicem miscenda, & Auribus quotidie cum Bombace indenda, ne vel inflammatio, vel excoariatio quædam inde oboriatur. Circa Aures, & in Temporibus etiam Unguenta ac Balsama inungi possunt, v. gr.

R. Axung. Anatum ʒß,

Olei Aneth.

Scorpion. Matth. ana. ʒij.

still. Spic.

Lavend.

Majoran. ana. gutt. vj.

Gran. Juniper. ʒß.

M. d. ad Fictile, m. ac vesp. inunctio fiat calidè.

Sed maximi momenti sunt fomentationes Aurium diutius institutæ, quales heic fieri possunt è Radicibus *Alth. Malv. Lil. alb. Angelic. Diétamn. Cretic. Doronic. Hellebor. nigr. Calam. aromat. Foliis & Herbis Lauri, Alth. Salicis, Malvæ, Meliss. Majoran. Origani, Hyssopi, Absynth. Aneth. Abrotan. Levistic. Calaminth. Serpill. Thym. Beton. Chamædr. Flor. Stæchad. Chamom. Melilot. Salv. Baccar. Junip. Laur. Semin. Lin. Fœni græc. Anis. Fæ-*

*nic. Carv. & similibus Sacculo inditis, qui dein Aquæ primùm & Lacti incoctus, atque expressus calidè Auribus per plures dies applicari debet, quousque nimirum opus esse creditur ad emollitionem, attenuationem ac resolutionem humoris tenacis præstandam. Deinceps autem Discussio ejusdem humoris tentanda est Vapore decocti earundem Herbarum in Vino facti, qui Vapor per Infundibulum excipi quotidie bis vel pluries Auribus potest. Alii Acerum Formicarum totum cum Ovis contusum, & cum Herbis *Meliss. Aneth. Baccis Junip. & Seminib. carminativis* mixtum in Aceto & Aqua coquunt, vase ex parte obturato, hinc Vaporem Auribus excipiunt. Vidimus etiam cum successu sequentem Vaporem usurpatum, nimirum *Spirit. Salis armon. urinosus* vel solus, vel cum *Spiritu Anthos*, aut *Decocto herbarum cephalicar. & Seminum carminativ. in Vino factio*, permistus immittebatur Cucurbitæ vitreæ minutæ, sex liquoris uncias vix capienti, longo, angusto, & superius recurvo collo præditæ; hujus dein colli extremitas Auris cavitati applicabatur, fundum autem Cucurbitæ super Prunas, aut in Arenâ Cineribusve admodum calentibus tenebatur, sic spirituosus Liquor sensim incalescens suos per collum angustum Cucurbitæ vapores calentes in Aures mittebat; atque his Vaporibus pluries exceptis tandem Catarrhus fuerat discussus, cum sensu Auditûs subsequente integro.*

Laudantur dein etiam euporista varia discutientia; v. gr. Sume Her-

bam recent. Levistic. Allii & Fœnicul. contusas linteo involve, hinc pastæ farinacæ immitte, atque in clibano cum alio pane coque; si coctio fuit perfecta, panem exime, disseca, & nodulum Herbaceum exprime, sic obtinebis *Liquorem*, qui sæpius cum bombace auribus immissus Auditam revocat. Vel excava grandem quandam radicem *Cepæ*, immitte *Succum* ex herbis *Anethi*, vel *Absynth. Alliarie*, *Cichorii*, *Taraxaconis*, *Hieracii cujuscunque*, *Chelidoniæ majoris*, expressum, hinc *Cepam madidæ stupæ involutam* coque sub cineribus, tandemque succum ex toto exprime ac filtra, eumque sæpius in Aures calidiuscule instilla. Vel *Herbar. Cichorii*, *Endiv. Chelidon. major. Taraxac. Urtic. urent.* una cum *Radicib.* in Clibano sicca, hinc pulverem Ollæ terreæ novæ immitte, hanc operculo benè coopertam per quinque vel plures dies sub terrâ conde, & sepeli, sic Pulvis in *Liquorem* abibit, qui dein usurpari potest uti superiores.

Intus tandem sequens Tragema diutissimè usurpatum juvare potest:

℞. *Radic. Taraxacon. ʒß.*
Chelidon. major.
Angelic. ana. ʒij.
Fol. Betonic.
Semin. Fœnic.
Flor. Calend.
Primul. Ver.
Salv. ana. ʒj.
Rasur. Ebor. ʒiij.
Cubebæ.
Cinam. opt. ana. ʒiß.
Sacch. Penid. ʒvj.
M. f. Pulv. subt. d. ad scat. Dosis

quotidie semel aut bis ʒj. cum vehiculo conveniente.

AUDITVS DEPRAVATVS, *Oba-*
 OBAVDITIO est symptoma Auditionis læsæ, quando vel sonus externus falsè percipitur, propter motum quendam sive aëris, sive humoris in aure existentis, stagnantisve internum præternaturalem obstrepentem; vel sonitus quidam intra auris cavitatem producit, etiamsi nullus extra aurem in aëre contingat.

Læditur heic maximè aër inter- *Par-*
 nus auris, dum à quacunque demum *affec-*
 causâ præternaturaliter agitur, atque tremulum motum adipiscitur; qui motus postea vel aliquandiu sine intermissione durat, vel per vices solum producit, ac modò hujus, modò illius sonitus extraordinarii specie hominem molestat & inquietum reddit.

Quando igitur liquor aliquis fla- *Causa*
 tuoso-serosus in tubulis aut poris interioris Aurium cavitatis obhæret, ita ut neque transpirare, neque suum per tubulos cursum prosequi possit, tum particulæ ejusmodi humoris, à pulsatione vicinarum arteriolarum, vel ab æthere cum aliquantillo labore transeunte plus minus vehementer concussæ motum tremulum impetrant, huncque dein proximo aëris, & per hunc nervi acustici papillulis impertiunt, sicque sonitus cujusdam, extra aurem non contingentis, sensum excitant. Flatuosus ille humor in Tympano retro membrantulam subinde etiam colligitur, ex humoralis massæ circulante eo plus minus copiosè depositus, cumque dein aër ejus loci humori tali per-
 misce-

miscetur, & spumosas vesiculas excitat, tum æthereæ particulæ rectilineo, quo penetrare ac transire conantur, motu in spumofum liquorem impingentes tremulam facile agitationem, atque hinc sonitum præternaturalem homini molestum, produciunt, similem ferè illi, quem experiuntur, qui aurium cavitatem vel digito claudunt, vel aquâ replent. Accidit etiam sæpe, ut tubuli Aurium membranacei ob stagnantem, vel tardius transeuntem humorem, præternaturaliter expansæ meatûs auditorii ac tympani sinus angustet, unde subtilis materia transitûs sui rectilinei obstacula inveniens tremere particulas facit aëreas, à quibus dein vibratæ nervi acustici fibrillæ, per motum suum usque ad meditullium cerebri continuatum, ideam sonitûs cujusdam excitant.

Sonitus autem iste, utcunque homini satis molestus, gravis tamen non est, neque intensus adeo, quemadmodum ab objectis externis sæpius in aëre produci solet. Vnde plures specie distinctos cum *Platero* observant Practici, quorum *primus* vocatur *Tinnitus Aurium*, quando sonitus ille Aurium tinnabuli cujusdam, aut hujus illiusve campanæ pulsatæ acutam resonantiam exprimit; *secundus* dicitur *Sibilus*, quando sonitus auditur instar strepitûs, quem flat⁹ edit per oblongo angustum foramen coactus; ita ut continuè perfonet instar syllabæ Si; *tertius* appellatur *Pulsus*, cum sonus auditur instar illius, qui vel à vapore ex *Æolipila* vi ignis propulso, vel ab aëre è folle in carbonem ignitos leniter & continuè

efflato produciatur: *quartus* nuncupatur *Fluctus* vel *Fluctuatio* aut *Murmur*, quando continuè sonitus auditur fluctuantium aquarum strepitui haud ab- similis; *quartus* dicitur *Susurrus* quando auditur sonus instar cantilenæ *Vesperum*, *Apum*, *Muscarum*, &c. Sunt tamen adhuc aliæ forsan ejusmodi pinat. Sonituum in auribus differentiæ, sed quæ forsan ex hætenus descriptis sunt comixtæ, & hinc peculiari nomine indignæ generaliter duntaxat *Streptus Aurium* appellantur. Omnes verò hæ species non nisi à diversâ aëris, sive in aurium sinibus existentis, sive per angustiam meatûs præternaturaliter transeuntis, trepidatione proveniunt.

Affligit hominem Obauditio nunc per se sine aliis qualiscunque Morbi conjunctione; nunc verò est symptoma Ægritudinis cujusdam præcedentis, v. gr. Febris, Cephalalgia aut aliarum.

Affectus hic quandoque brevi, quandoque diu durat, atque non solum homini valde molestus evadit, sed & in Surditatis discrimen conjicit. Si fortè stagnatio humoris in Aure major & uberior evenit, tum obstructio-nem inflammatoriam, in Abscessum & Ulcus facile abientem, post se trahit. Quandoque Tinnitus solet esse prodromus Lipothymia, Passionis hysterica, Vertiginis, aut Apoplectici insultûs. Quæ tandem Obauditio ultra biennium jam duravit, sanabilis vix est, quoniam radices nimis firmas jam egit intra Aures.

Quod si proin Obauditio qualiscunque fuerit alicujus morbi symptoma,

Fluctus.
Murmur.

Susurrus

Streptus
Aurium

Prognosis

Curatio.

ma, tum vel per se cessabit Morbo curato; vel certè externis remediis mitigabitur, prout mox demonstrabimus. Quando enim nullus morbus præcessit, aut comes adhuc sit, tum ante omnia corpus expurgandum est, sequenti aut simili medicamine, per inferiora operante:

R̄. *Maß. Pilul. è Succ. Craton.*

Extract. cathol. ana. ʒß.

Mercur. dulc. opt. gr. 12.

Resin. Jalapp. gr. iij.

Ol. stillat. Rorism. q. s.

*M. f. Pilulæ no. 14. Inauratæ suman-
unâ vice jejuno stomacho mane cum regi-
mine diætæ.*

Vel R̄. *Aqu. Vitæ Matthiol. ʒj.*

Spirit. Anth. ʒß.

Resinæ Scammon. vel

Jalapp. gran. 8.

Solutis leni igne adde

Syrup. de Fumar. vel

Cinam. vel

Julepi rosacei ʒij.

Detur ad Vitr. sumatur ut supra.

Vel etiam *Vinum medicatum purgans*, sive *Apozema catarthicum*, aut *Panacea solutiva alcalina* pluries exhibetur. Postea *Venæsectio* vel *Cucurbitulæ cum scarificatione* laudantur, pro rei exigentiâ administrandæ. Desuper verò mox *Tragema ex Aromatibus cum radic. Valerian. Petasit. Fol. Betonic. Majoran. Semin. Anis. Fœnic. Nasturt. Bacc. Junip. &c.* præscribetur, ac diligenter ab Ægro sumetur; v. gr.

R̄. *Specier. dianth.*

diatr. sant.

dianosch. dulc. ana. ʒj.

Radic. Petasit. ʒij.

Valerian.

Ment. ana. ʒß.

Semin. Anis. ʒiijß.

Aquileg. ʒß.

Rasur. Ebor. ʒß.

Sacch. alb. ʒiij.

*M. f. Pulv. subt. d. ad Scatul. Dosis
ʒij. semel aut bis quotidie.*

Vel loco *Tragematis Sal volatile oleosum Sylv. aut Essent. Ambr. Beton. Succin. Galang. Doronic. Angelic. Cinamom.* per hebdomadam vel ulterius, m. ac vesp. ad gutt. 16. vel 20. cum vehiculo conveniente dabitur.

Extus autem ad humorem stagnantem discutiendum, meatum auris magis patulum reddendum Vapor subinde Auribus excipiat, v. gr. ex *Herbis Malv. Meliss. Salviæ, Parietar. Menth. Organ. Ocym. Absynth. Urtic. Aneth. Majoran. Verben. Baccis Juniperi, Lauri, Florib. Stæch. Chamomill. Seminibus Lini, Fœni græci, Fœniculi, Anisi, Carvi, Cicutæ, Papaverum* invicem mixtis atque Aceto & Aquæ incoctis. Vel *Panis cum Baccis Lauri, Juniper. Semin. Anis. Cumin. Fœniculi, Nasturtii, Petroselini, Dauci, Foliis Anethi, Menth. Cicutæ, Origani &c.* in Clibano coctus, hinc extractus, atque per medium divisus, ulteriusque Spiritu quodam aromatico, apoplectico, *Lil. convall. Anth. carminativo, Anisi*, aut simili irroratus Auribus applicari potest. Vel *Lintea calientia*, ac fumo *Pulveris Mastich. Thuris, Ladani, Storacis calamit. fol. Menth. Meliss. Ocym. Flor. Sambuc. Salv. Semin. Cumin. Carv. Anis. & simil.* imbuta frequenter admovebuntur. Faciunt quoque *Sacculos ex Radici-*

Radicibus, Herbis, Seminibus carminativis ac cephalicis, eosque Vino vel simplici, vel cum Aquâ aut Lixivio mixto incoctos, expressosque calidè Auribus cum fructu applicant. Vel Succus Cochleariæ, Raphani, Porri, Cepar. Rutæ, Violaræ, Origani, Folior. Vitium, Meliss. Marrubii alb. Taraxac. Succis Hieraciorum, Cyclamin. &c. Vel Spiritus aliquis aromaticus, cephalicus, carminativus, aut Spirit. Formic. Lumbr. terr. Salis armon. anis. cum Succo Semperviv. Cymbalaria; Vel Zybethum solum, vel Succus è Cancris fluviatilib. Cochleis, Formicarum Ovis, expressus, cum tantillo Spiritus Cochleariæ permixtus, & gossypio exceptus calidè Auribus intruditur, non sine successu. Alii immittunt Oleum Amygdal. dulc. vel Rosar. Nardin. Violar. Verbasci &c. admiscunt guttulas aliquot Olei destillat. Rutæ, Lavendul. Rorismar. Thymi, Baccar. Juniperi. Si quis talia vel humida, vel oleosa ac spirituosa tolerare suis in Auribus nequeat, ei Sacculos paramus ex Herbis, Seminibus & Baccis discutientibus, eosque dein calefactos Auribus applicamus, atque sæpè Auribus admovemus, uti suprâ dictum.

Juxta hæc profunt *Errhina, Sternutatoria, Masticatoria, & ea denique omnia, quæ in Aurium obstructione infra commendantur.*

AVRIGO, vide *Icterus Flavus.*

AVRIS OBSTRVCTIO, est meatûs auditorii à lento ac viscido quodam humore, aut cerumine aliâve quâdam re facta obstructio, cum Auditionis imminutione vel abolitione.

Læditur nimirum heic canalis Aurium sive ante membranam tympani, sive etiam retrò illam in sinus processus mastoidei, & cavitates ossis petrosi tendens.

Itaque *Causa proxima* est omne id, quod cavitates modò dictas opplere & infarcire potest; sive sit pituita quædam viscida, sub catarrhi nomine veniens; sive cerumen copiosius, & sui morâ ibidem tenacius redditum; sive lymphæ copiosa tenuis, quæ aliàs effluere in Infantibus frequenter solet; sive Vermis; sive res aliqua dura in Aures per infortunium delapsa; sive denique pus aut sanies quædam ex Ulcere jugiter emanans.

Quoad *diagnosin* Obstructio cognoscitur ex Auditu imminuto, vel abolito à rebus in meatu dicto plus minus conspicuis. Si viscida est pituita, aut etiam humor tenuis copiosus, meatum valdè angustans, tum plerumque sibilus aut tinnitus simul oboritur. Quandoque junctus adest dolor, si res obstruens vel acrimoniâ quadam pungat, vel copiâ distendat. Vermes intolerabilem quandam molestiam excitant. Pus effluxu suo cognoscitur.

Si spectes *prognosin*, Obstructio ab humore tenaci profundius latente, Obauditionem difficulter curabilem, & si in Tympano vel retrò hanc cavitatem existat, prorsus ferè immedicabilem, si non Surditatem totalem inducit. Ab aliis verò rebus excitata, imprimis si causa morbifica ad Oculum pateat, facilius curatur.

In *Curatione* ad causas respiciendum proximas, externâ ut plurimum

Q

ope

ope tollendas. Quod si proin humor tenax aut cerumen crassius, nondum induratum, in meatu hæreat, tum *Auriscalpris* sub meridiem ex Aure, versus Solis lumen porrectâ, est eximendum, si verò siccius illud sit ac jam duriusculum, tum prius nonnihil emolliendū venit, sive cum *Oleo amygdalino* sive cum *Lacte* aut *Succo Sempervivi* ac *Malvæ* calente. Si obstructio contigerit ab humore lymphatico tenui, tum ante omnia purgans est præscribendum, sive ex *Pilulis cum Frio dulci*, sive ex *Infuso folior. Senæ & Rhabarb.* cum *Betonic. & Agrimon. v. gr.*

R̄. *Extract. Pilul. aurear.* ʒß.

Maß. Pilul. è Succ. Crat. gr. viij.

Merc. dulc. opt. ʒß.

Resin. Jalapp. gr. iij.

Ol. still. Fœnic. q. s.

M. f. l. Pilul. num. xij. Inaur. d. ad ch. pro dosi.

R̄. *Rad. Helen. Irid. Fl. ana ʒj.*

Fol. Sen. m. ʒß.

Rhab. el. ʒj.

Semin. Anis. ʒiiij.

Crem. Fr. ʒij.

Incis. & contus. in ʒ nodulo ligatis affunde per noctem Aqu. Scab. q. s. sequenti mane bulliant parum, Colat. ʒiiijß. adde Syrup. Flor. Acac. ʒß. d. ad Vitr. pro dosi.

Dein *Oleo Amygdalarum amararum*, *Melleve rosaceo* Auris est extergenda, tandemque admissione fumi è *Rasurâ Lign. Juniper. Mastich. Succin. & Storac.* paulatim est exsiccanda. Intus quoque *Decoctum Radicis Chinæ & Lignorum* aliquoties per diem exhibendum. Profunt & hic *Lac tepidum*

cum *Melle rosaceo* permixtum, ac *Auri* subinde inditum; vel *Oleum Rosarum*, aut *Violaceum* cum *Essentiâ Croci & -u Regin. Hung.* Vel *Spirit. Formicar. Cochlear.* Item *Aqua Mellis* cum -u aut *Essent. Sem. Fœnic.* *Essentiâ* item *Plantag. & Myrrh.* permixta. Placent aliis *Vinum*, in quo *Radix Ireos* aut *Angelicæ* cum *Myrrh. Storac. & Croc.* sunt cocta; vel etiam *Vinum Alumine* nonnihil acuaturn, & tepidiusculè immisum. Quod si *Aqua* vel *aqueum* quid in Aures inciderit, quemadmodum hoc natantibus & aquæ immerfis contingit, tum *Auris* prona est habenda, ut liquor effluere possit, vel *Æger* super pede à directo *Auris* affectæ exitiat, capite in aurem inclinante. Veteres *Oleum Anisi* infundebant. Et si his modis liquor exeat, tum per immisam *Syringam* extrahi poterit, aut *spongiola* sicca *Auri* immittatur, ut humorem absorbeat. Tandem & sternutatio excitari solet, ad eliminandum, quicquid in *Auris* meatu hæret.

Si *Obstructio* orta est ab illapso vel innato quodam Verme, tum vivus, ille si possibile, provocandus est dulcibus, v. gr. *Pomo dulci asso*, vel *Fermento* cum *Melle* applicatis. Vbi hoc frustra fuerit, necandus est infuso *Succo Absynthii*, *Cent. min. Aneth.* vel *Oleo nucleor. Persic. Amygdal. amarar. Absynth.* vel etiam -u *Vini* aut -u quocunque alio *vinoso cephalico*. Interfectus dein educitur immisâ turundâ *Terebinthinâ* imbutâ, utpote cui facile adhærescit, vel commodis instrumentis extrahitur. Si verò res duræ in Aures inciderint, tum meatus illarum primū

primùm *Oleo rosaceo*, *Violaceo* aut *Verbascino* emolliendus atque lubricandus, dein instrumentis res ipsa venit extrahenda. Si Obstructio hæreat in tympano, retro membranulam, tum purgans mercuriale statim exhibebitur, vel *Vinum medicatum cephalico-purgans* per aliquot dies propinabitur, hinc verò *Sacculi carminativi ex flor. Chamom. Melilot. Herb. Matricar. Menth. Meliss. Tanacet. odorat. Ozym. Semin. Aneth. Cumin. Danc. Baccis Juniperi vel Lauri*, in *Vino albo* decocti & expressi calidè frequenter applicabuntur. Quorum tamen loco aliis magis arridet *Panis rec.* è clibano extractus, per medium discissus, & sic cum linteo Auribus applicatus. In Plethoricis *Vena-sectio* aut *Cucurbitulæ* cum scarificatione non sunt contemnendæ.

AVRIS VLCVS est solutio continui in Aure, ejusque inprimis meatu ab humore acri & erodente producta Afficitur autem & exulceratur maxime tunica, tam membranosa quam glandulosa, meatum auditorium succingens, hinc inde glandulis obsita. Quandoque & externa Auris Ulcere quodam affligitur, & Saniem fundit.

Proximè talem morbum producit humor seroso-salsus plus minus acris & corrosivus, in tubulis membranæ Aurium stagnans, atque hinc fibrillas sensim exedens & dilacerans. Aliquando tamen & Vulnera, res item duræ & acutæ in meatum illapsæ, Vermes atque Inflammatio ad productionem Ulceris talis *antecedenter* contribuere possunt. Inprimis autem humores acres massæ sanguinæ ad glandulas Aurium

præcipitatæ proximam illius causam excitare valent, tantoque id magis, quando simul ab aëre inclementi frigido & humido, sanguinis transpirationem insigniter impediante, pori Aurium cutanei fuerunt constipati.

Signa hujus Affectûs *diagnostica* *Diagnosis.* sunt dolor & punctio plus minus gravis in Auris cavitate, cum tinnitu ac saniei nunc ichorosæ nunc purulentæ & crassioris, nunc etiam serosi tantum humoris effluxu conjunctus. Affectus non tantum Pueris familiaris, sed & Adultis, scorbuticis, aut Lue præ laborantibus subinde contingens.

Quantum ad *Prognosin*, si Vlcus *Prognosis.* hæreat in parte meatûs auditorii magis externâ, tum non multum discriminis aut difficultatis in se habet: at ubi profundius intra meatum existit, ac insuper humor stagnans valdè corrosivus deprehenditur, tum periculum est, ne ipsa Ossa per erosionem & consumptionem vicinarum fibrillarum cariiosa evadant, sicque Fistula enascatur, non nisi diuturno temporis spatio aut etiam nullo unquam tempore curabilis. Vidimus nos tale Vlcus in Viro sexagenario Hecticam lethalem produxisse.

In *Curatione* eo diligenter annitendum, ut ad radicem Ulceris, quantum possibile est, deveniamus, illam dein mundificemus, ac tandem *Ulcus* probè consolidemus. Quem in finem ante omnia purgans ex *Pilulis catholicis* cum *Ërio dulci*, vel *Vinum medicatum* præscribatur. *Curatio.*

R̄. *Extract. cathol.*
Merc. dulc. ana. ʒj.

Q₂

Resin.

Resin. Jalapp. gr. iij.

Ol. still. Succ. q. s.

M. f. l. a. Pilul. num. xv. Inaur. sumantur. pro dosi mane.

Vel R̄. Radic. Aristoloch.

Pimpinell.

Cal. arom. ana. ʒß.

Herb. Betonic.

Origan.

Virg. aur. ana. Mj.

Summit. Abs. Mß.

Semin. Dauc. ʒij.

Fol. Sen. opt. m. ʒj.

Rhab. elect. ʒij.

Agar. troch. ʒß.

Θis polychr. ʒiß.

Cinam. opt. ʒiiij.

Incis. contus. & sacculo inditis affunde

Vin. alb. vet. Mj.

Aqu. Beton. Mß.

Singulis hinc mane Cyathus exhauriatur cum Regim. Diætæ.

Post hæc intus quotidie Decoctum Lignorum cum Herbis traumaticis paratum, tanquam validè exsiccans propinabitur, simulque de Essentiâ Bellid. min. Virg. aureæ, Numul. Hyperic. Gramin. Parnass. Myrrh. aliâve traumaticâ bis quotidie 30. guttulæ exhibebuntur.

Extus ad deterfionem Vlceris profunt Succu Chondrillæ, Hieracii, Urtic. Apii, Taraxac. Plantag. Cepar. Geranii Robertiani, Alliariæ, Scordii, Ulmar. cum Melle rosaceo, Essent. Aloës, Myrrh. quibus tepidiusculè frequenter Auris extergeri potest. Post deterfionem simul usurpare licet Unguentum nutri-

tum cum Tutiâ Sacch. ʒiii & Oleo Ovorum.

R̄. Unguent. nutr. ʒj.

Tut. ppt. ʒiiij.

Ocul. ʒ. ppt.

Bol. ana. arm. ppt. ʒij.

Ol. Ovor. q. s.

Essent. Myrrh. ʒj.

M. f. Ungt. d. ad Oll.

Ad exsiccationem promovendam uti possumus Melle rosaceo cum Croco ʒtis, Tutiâ, Lap. calam. ppt. & Essentiâ quâdam traumaticâ. Veletiam Pulvis fumalis ex Mastiche, Ligno juniperino, Virgâ aureâ, Styrac. calam. Succin. Thur. &c. carbonibus injici, hincque Fumus Aure ulcerosâ excipi debet.

R̄. Ras. Lign. Junip.

Mastich.

Thuris, ana. ʒß.

Herb. Virg. aur.

Sanic.

Flor. Samb.

Stæch. ana. ʒj.

M. f. Pulv. d. ad lb.

Si Vlcus est sinuosum & fistulosum, tunc eo studendum, ut injectio aliqua, quemadmodum in Fistulis alias fieri solet, commodè adhiberi queat. Vel ubi ad Fistulæ ipsius radicem devenire possumus, sive per Sectionem, sive per cauteria; tum minimè cunctandum, sed quanto citius fieri poterit, id expediendum, hincque Ossis, si quod est, cariosi portio adhibitis convenientibus medicamentis siccis separari debet, tandemque solito more Vlcus detergendum & claudendum venit.

AVRIVM VVLNVS est solutio continui in Aure, facta à re quadam pun-

pungente, scindente, contundente, aut alio modo vulnerante. Hoc vulnere nonnunquam pars Auris externa aufertur aut dilaceratur, subinde & interna pars plus minus graviter læditur.

Causa proxima est instrumentum quoddam externâ vi in Aurē adactum: ita cultro, gladio, globis sclopetariis, ensibus, lapidibus, baculis, &c. continuïtas in Aurē solvitur. Huc facit etiam lapsus ex alto cum forti capitis allisione, & si quæ adhuc sunt aliæ causæ. Quamvis ipse Affectus per se pateat, attamen hisce Vulneribus sæpius jungi solent Febres, Otagiæ, Cephalagiæ, Hæmorrhagiæ, Animi deliquia, & similia.

In *Prognosi* hoc statim tenendum, Vulnera Aurium quandoque post se trahere Vlcera diu manantia, hincque necessariò sensum Auditûs offendere, inprimis si vel tympani membranula fuerit læsa, vel tota externa Auris ense recisa sit. Cumque cartilaginea multa substantia in hac contineatur corporis parte, curatio quoque & difficilior existit & diutius, protrahitur.

In *Curatione* hujus Morbi ad id magnopere attendendum, ut quicquid solutum est, iterum uniatur, quod fit per mundificantia & consolidantia: suademus hinc in Adultis ante omnia præservationis gratiâ *Clysmā* alvum benè laxans; deinceps *Venæsectionem* ac *Pulveres diaphoreticos* sex vel octo, ex *ſn. diaph. C. C. vel Ebore phil. ppt. Ocul. ſ. ppt. Corall. rubr. ppt. Terr. sigillat.* & similibus compositos, atque mane & vesp. cum vehiculo *Aquæ Plantag. Scabios. Brunell. aut Ulmar,*

sumendos. Quibus addimus usum *Decocti* alicujus *vulnerarii*, quemadmodum sub titulis de Vulneribus aut Vlceribus in genere describuntur: nec non *Tincturæ* ejusdam *traumaticæ*, ibidem commendatæ.

Extus Vulnus statim *Decocto herbarum Gratiolæ, Geranii. Robert. atque Ulmar.* in Vino albo factō eluatur, hinc si Hæmorrhagia adsit, *Albumen Ovi* stupæ impositum, atque pulvere adstringente ex *Terr. sigill. Bolo, Croco ſis adstring. Crepitæ Lupi, Musco arboreo* aut *terrestri* aspersum applicetur. Sequenti deligatione autem, si nulla Hæmorrhagia amplius metuenda sit, Vulnus communi more tractabitur, & inprimis *Balsamum* quoddam *vulnerarium* glutinans, atque humorum è dilaceratis vasculis effluxum impediens applicabitur, superimposito semper *Emplastro stictico Crollii* aut *Diapalmâ*.

AVRIVM HUMIDITAS est fluxus Ichoris continuus, ex Aurē nunc copiosior, nunc paucior, cum vel sine dolore, foetore & obauditione affligens. Afficitur autem heic maximè tunica glandulosa Aurium, vel ipsius minutæ glandulæ alias Cerumen exhibentes.

Culpantur heic *proximè* tubuli ac fibrillæ glandularum modò dictarum, justo magis laxatæ aut dilatatæ, hincque plus lymphæ vel ichoris transmittentes. Fons autem & scaturigo istius humoris est ipsa sanguinis massa, quando justo majori copiâ in ipsâ fuit collectus, ac eam præcisè adeptus suarum particularum configurationē, sub quâ

Aurium humiditas.

Causa.

magis per Aurium, quàm aliûs partis glandulosæ poros, secedere aptus est. Huc confert maximè Victus largior minusque purus, qui Pueris imprimis solet esse consuetus: ut & \ominus ino principio valde refertus, à quo humoralis massa abundanter inquinata tandem ejusmodi secretionem per Aurium glandulas instituit. Sed & fortè Aër nebulosus, crassus, turbidus, arenosus, externè in Aures diu illabens, & ostiola tubulorum laceffens fluxum istum provocare potest.

Diagnosis.

In *Diagnosi* fluxus hic seu humiditas Infantibus quàm Adultis familiarior. Humor autem fluens obscure flavidiusculus, & oleosæ sæpiùs consistentiæ observatur. Nonnunquam cum dolore junctus, sicubi acrimoniâ quâdam fibrillas membranaceo-nervæas rodat. Fœtet autem humor serosus peccans, quando \oplus reæ particulæ cum \ominus ino-volatib⁹ alcalinis exaltatæ ac dissolutæ auras petunt, adstantiumque nares feriunt. Auditus imminuitur quoque à materiâ canalem aurium implente ac infarciante.

Prognosis

Quoad *Prognosin* Affectus hic subinde diuturnus, & auditioni plus minus nocivus observatur; nisi enim benè curetur, vel Tympani membranam laxando, vel meatum Auris obstruendo, vel nervosas fibras oblinendo, Auditus imminuere aut etiam planè tollere potest.

Curatio.

Curatio absolvitur ante omnia purgans exhibendo, vel è *Trochiscis hermeticis*; v. gr. pro Infante trimulo:

R \bar{z} . *Troch. Herm. no. iv.*

d. ad ch. pro dosi matutin.

vel ex *Infuso Folior. Sen. cum Rhabarb.* vel pro quadrimulo ex *Syrupo aliquo laxante cum Zrio dulci.*

R \bar{z} . *Syr. de Cich. cum Rh. 3j.*

Aqu. Bet. 3ß.

Cinam. 3ij.

Elect. è Succ. Ros. 3ß.

Merc. dulc. 3ß.

M. d. ad v. pro dosi.

Post purgans convenit *Decoctum Lign. Sassafr. cum Sem. Fœnic.* pro Potu ordinario, quod tanto efficacius erit, si palatum Ægroti simul permittat incoqui *Cortices Tamaricis, Pyrolam, Saniculam, Millefolium, Vincam pervincam &c.*

Externè si dolor adsit simul, conveniet *Lac tepidum*, in quo *Crocus, Malva & Chamomilla* ebullierunt, cum gossypio *Auri* frequenter immissum. Aliàs etiam conducunt *Olea Rosarum, Violarum, Verbasci, Meliloti.* Sordes verò Aurium detergant, atque hinc fluxum sistunt *Mel rosaceum & Aqua Mellis cum Succo Rutæ, Semperviivi, Apii & Plantaginis.* Vel etiam *Radix Aristolochiæ, Ireos, Tormentillæ, Myrrha, Crocus, Alumen, Vino aut Aquæ Plantaginis* incoqui possunt, & hoc liquore Aures extergeri, fluxusque sisti poterit. Quòd si Sordes ita fuerint deterfæ, & humiditas tamen non planè cesset, purgans repetatur, simulque *Essentia Myrrhæ cum Regin. Hung.* permixta aliquoties *Auri* infundi poterit. Hisce pro majori exsiccatione nonnulli jungunt *Pulveres ex Tutia, Lapide calaminari, Bolo armenate ac similibus*, quibus tamen præferimus

Fumos

Fumos è Succino, Mastiche, Thure, Solano, Menthâ, Ligno santalino, Baccis Juniperi, & similibus, Auribus exceptos, cum linteis fatis calentibus desuper impositis.

AVRIVM DOLOR, OTALGIA, est sensatio quædam tristis à variis causis organum Auditûs plus minus graviter lædentibus producta. Affliguntur hinc membranoso-nervosæ partes sive in externâ, sive in internâ Aure existentes; in quibus Dolor modò *pruriens*, & ad frictionem stimulans, modò *pungitivus*, modò *pulsatorius*, modò *lancinans*, divellens, *tensivus*, aliusve, pro variâ lædentis causæ modificatione, excitatur.

Dolor hic modò continuus est, modò intermittens, nonnunquam in interiore Auris cavitate & juncturâ maxillæ, tum demum affligens, quando homo aliquid deglutit; quod quidem frequenter illis obtingit, quibus Tonsilla & profundior Faucium contignatio muco tenaci obducta est.

Causa ejusmodi doloris est, quicquid fibras affectæ partis nervosas præternaturaliter offendere, pungere, lancinare, crispare, tendere, rodere, scindere, lacerare, aut fortiter comprimere potest. Itaque si quid illapsum est in Aures, lædendi qualicunque virtute præditum; humor item serosus, falsus, acris, plus minus viscidus in cavitate Aurium stagnans; cerumen acre, falsum, imprimis quando excerni nequit; sanguis etiam crassus intra tubulos subsistens, collectus, atque *Inflammationem* pariens; *Abscessus* ab hac

ipsâ Inflammatione enascens; Excoriatio, Vulnus, Ulcus, Sanguinis, Saniemiei, aut serosi humoris plus minus frequens profluvium; vel denique suppressâ ejusdem materiæ effluxio, cruciatus inferre potest, nunquam majores, quàm si humor aliquis acris copiosè stagnat intra poros membranæ Aurium, eamque valde distendit.

Hinc Dolor ejusmodi subinde effectus & productum est aliûs Morbi comitis, qui si in profundiore Auris sede existit, adnoto lumine splendido Solis vel Candelæ ardentis sæpè detegi potest; quando v. gr. rubedo quædam, tuberculumve rubicundum & ardens conspicuum sic redditur. Solet denique & gravior tinnitus aut sibilus dolorem Aurium membranæ inferre. Dolores intensiores sunt in Auris Inflammatione, ubi non simpliciter tantum membranæ divelluntur, sed & sanguinis stagnantis particulæ sub actu suppurationis rapidè inter sese colliduntur. In hoc casu, non secus atque in stagnatione lymphæ ac ceruminis, capitis quoque dolor sæpiùs simul effligit. Cùm itaque Inflammatio in Abscessum convertitur, dolor intenditur, usque dum maturus ille rumpatur, & suum pus in principio saniosum, dein autem magis coctum, & albicans, quandoque aliter coloratum ac virosum effundat; tum enim dolor remittit, si non ex toto, saltem maximâ ex parte. Si Inflammatio ingens est in Aure, plerumque Febris simul continua hominem molestat, cum variis symptomatibus febrilibus.

Ad Otagiam hinc producendam contri-

contribuere solet Aër maximè frigidus, præprimis si aliquandiu cum venti cujusdam flatu in Aures propellatur; hinc enim vascula sanguinem aut lympham vehentia constringuntur facile, talesque humores subsistere & stagnare faciunt. Idem præstare valet Aqua, vel alius qualiscunque Liquor frigidus. Validi conatus in excernendo Fœtu, aut Fœcibus exprimendis; vehementes item vociferationes per consensum quoque in Auribus dolorem excitare valent; quatenus videlicet sub conatibus istis aër vehementer è faucibus versus aurium internos sinus propellitur, ut ab eodem aëre dein vascula membranularum fortiter comprimantur, ac ita humorum motum impediendo stagnatio dolorifica producat.

Prognosis

Affectus hic subinde diuturnus est, si à lymphâ crassâ, viscidâ, acri, & stagnante proveniat. *Inflammatio* in *Abscessum* plerumque mutatur, *Abscessus* verò in *Ulcus* abit, quod dein, nili radicitus extergi queat, in *Fistulam* promptè mutatur, inprimis si humor fluens tenuis, acris, & corrosivus extiterit.

Curatio.

Quod *Curationem* spectat, si *Otalgia* à catarrho seroso, viscido, membranas distendente proveniat, tum corpus primò expurgandum est seqq. aut simili:

℞. Spirit. Anth.
Anis. ana. 3℞.
Magist. Jalapp. gr. viij.
Solutis leni igne adde
Syrup. de Betonic. 3ij.

Detur ad Vitrum, & sumatur mane una vice.

Vel ℞. Extract. panchymag. Croll.
Maß. Pilul. Marocost.
Cinnab. ʒn. correct. ana. ʒ℞.
Magist. Scammon. gr. ij. vel iij.
Ol. stillat. Fœnic. q. s.
M. f. l. a. Pilulæ no. 13. Inaurat. sumantur mane pro dosi cum regimine Dietæ.

Pueris & Infantibus vel Syrupus de Cichor. cum Rhabarb. vel Trochisci nostri pædocathartici, juxta numerum annorum exhiberi debent.

Purgato corpore intus quidem Sal quoddam volatil. oleosum, vel Essentia Beton. Succin. Zedoar. Ambr. Trifol. fibrin. Vel Spiritus Cochlear. Salis armon. succinatus, anisatus, aut fœniculatus ad guttas 20. aut plures quotidie cum Aquâ Verben. Borragin. Beton. Fumar. aut Cherefol. sumendus commendabitur. Vel sequens Tragema ordinabitur:

℞. Specier. dianth.
diatr. piper. ana. 3j.
Fol. Beton. ʒiiij.
Majoran.
Flor. Lilior. conv.
Primul. Veris. ana. ʒij.
Radic. Ireos florent. 3j.
Ocul. ʒ. ppt. 3℞.
Diaph. ʒvial. 3ij.
Semin. Fœnic. 3i℞.
Sacchar. cand. alb. 3ij.
M. f. Pulv. subt. detur ad Scatul.
Dosis mane ac vesper. 3j. ad 3ij. cum vehiculo conveniente.

Extus conducunt ea ex parte, quæ supra contra Auditum gravem lauda-

laudavimus. Inprimis verò attenuans, resolvens, & discutiens focus aut vapor, auribus crebrò calidè exceptus, valde proficius existit; qualem eodem loco descriptum videre licet. Sed etiam heic promptè juvare valet *halitus subtilis & calens Spiritus Salis armon. urinosi sive simplicis, sive anisati*, per collum angustum alicujus cucurbitæ vitreæ prunis impositæ in Aures crebrò admissus. Prodest etiam *Sucus Cochlear. Cepar. Hieracii, Rutæ, Cymbalariae, Alliariae, Nasturtii, & similibus* cum *Aquâ Fumar. Betonic. Scabios.* aut *Lacte* permistus & calidiusculè auribus inditus. Vel *Spirit. Formicar. Anth. Lumbr. terrestr. Meliss. Anhaltinus, acusticus Myns. otalgicus Mindereri &c.* auribus cum gossypio immitti potest; superimponendo semper siccos calentesque admodum *Sacculos* è *Radicib. Valerianæ, Angelic. Calam. arom. Petasitid. Cyperi, Baccis Laur. Juniper. Seminibus carminativ. Herb. Abroton. Absynth. Anethi, Galaminth. Matricar. Pulegii, Meliss. Menth. Origan. Ocym. Thymi, & similibus* compositos.

Si non obstantibus his persistat Dolor, tum vesicatoria Nuchæ, aut retro Aures applicanda sunt. Purgans quoque reiterandum.

Quando Aurium dolor provenit ab humore tenui, falso, acri, modò fluente ex auribus, modò subsistente & stagnante, tum in Pueris quidem *Trochisci pædocathartici nostri* aliquot vicibus, v. gr. tres vel quatuor Puero tres annos nato, dabuntur: Adultis

autem *Vinum medicatum alterans & purgans* præscribetur; v. gr.

R̄. *Radic. Angelic.*

Apii.

Caryophyllat. ana. ʒ℞.

Rasur. Lign. Guajac. 3vj.

Santal. citr. ʒij.

Herb. Agrimon.

Beton. ana. Mj.

Cochleariæ recent.

Summit. Absynth.

Centaur. min. ana. M℞.

Baccar. Juniper.

Semin. Anis.

Seseleos. ana. ʒij.

Fol. Senæ probè mund. ʒj.

Rhabarb. elect. ʒiij.

Agar. trochiscat. ʒ℞.

Spicæ Indic. ʒi℞.

Cortic. Winter. ʒiij.

⊖ *is Juniper. ʒj.*

Incis. contusis, & Sacculo ex Sindone inditis affunde Vini albi veteris.

Aquæ fontan. ana. ℞. iij.

Stent per primam noctem in cineribus calidis, postea quotidie mane cyathus plenus unciarum trium vel quatuor exhauiatur cum regimine diætæ.

Interim *Errhina, Sternutatoria, Apophlegmatismi, Fumus Tabaci* pro re natâ concedentur, sicuti sub titulo de *Auditu gravi* præscripta inveniuntur. *Friktiones* capitis quotidie aliquoties cum *Linteis* calidis, ac *fumo* accensi *Pulveris fumalis* imbutis instituentur. *Vesicatorium* etiâ Nuchæ applicabitur. Vertex capitis & Tempora singulis diebus *Oleo destill. Succin. Baccar. Juniper. Lavendul. Rutæ, Rorismarin. Thym. Angelic. & similib.* calidiusculè illinen-

R

tur;

tur. *Cucupha* quoque, si modò ferre possit *Æger*, gestabitur, v. gr. ex frequentibus concinnata:

R̄. *Folior. Amarac. Betonic.*

Origan. ana. 3iβ.

Summit. Abroton.

Rorismarin.

Thymi. ana. 3j.

Flor. Lil. convall.

Cheiri,

Salv. ana. 3β.

Storac. calamit.

Mastich. elect.

Asædulg.

Nuc. mosch. ana. 3j.

M. f. Pulv. grossiusculus, insuatur sindoni rubr. pro Cucuphâ.

Cucurbitulæ cum scarificatione dorso admoveri, vel *Vena poplitis* secari potest in *Plethoriscii*.

Intus vel *Pulvis* absorbens, exiccans, & *tonum Fibrarum* roborans dabitur, ex *Radice Caryophyllat. Bistortæ, Foliis Saniculæ, Betonic. Floribus Rosar. rubr. Tunica, Unicornis foss. Ebore ust. ppt. Corall. rubr. ppt. Terrâ sigill. Bolo Armen. ppt. Lactē Lun. Matre Perl. ppt. Diaphoretic. martial. Specif. stomach. Poter. Nuce mosch. & similibus concinnatus.*

Vel sequens *Electuarium* concedetur.

R̄. *Conserv. Ros. rubr. ʒlat.*

fl. Tunic. ana. 3vj.

Nuc. Indic. condit. 3j.

Condit. Cortic. Aurant. 3ij.

Terr. sigillat. 3iβ.

Syrup. flor. Tunic. q. s.

Misc. f. Electuar. d. ad Ollam, mane ac vesp. magnitudo nucistæ capiatur.

Singulis partibus haustus Vini

rubri satis boni aut generosi concedatur. Præterea omnia, quæ serum corporis nimium augere possunt, fugientur.

Si humiditas *Aurium* nimia fuerit in culpâ, tum ea usurpabuntur, quæ supra sub titulo de *Aurium humiditate* prolixè fuerunt comendata, tanquam utilia. *Vulnus Aurium* generalem sanandi *Vulnera* methodum admittit; vid. titulum de *Vulneribus*. *Vermes* eximuntur, sicuti sub præcedenti titulo dictum. *Ulcus* tractatur quoque, uti paulò supra explanavimus. *Ceruminis* aut *Lymphæ* excretionem suppressam corrigunt ea omnia, quæ superius in *Catarrho crasso* adnotavimus. *Res* qualescunque in *Aures* demissæ sunt eximendæ, atque totius irritatæ illarum membranæ immisso *Verbasci, Consolidæ major. vel Altheæ Succo* demulcendus.

Quando *Inflammatiô* adest in *Aure*, tum purgatis ante omnia per *Clystma emolliens* ac detergens viis primis, *Vena Brachii* incidenda, vel *Cucurbitulæ* cum scarificatione dorso applicandæ. *Intus* dein pulveris diaphoretici, ex ʒnio diaphor. Bezoardic. miner. C. C. phil. ppt. Ebore ppt. compositi, dosi mane ac vesp. per plures dies exhibenda, cum *Aquâ Scabios. Endiv. Ulmar. Card. bened. flor. Sambuci, &c.* Extus verò primùm tentanda est *Inflammationis* discussio per applicationem *Spiritus Vini camphorati* cum *Aquâ Solani, flor. Sambuc. Spermatidis Ranar. commixti*, vel per aliorum remediorum adhibitionem. Si autem hoc frustra est, atque in *Abscessum* vergat *Inflammatiô*,

tio,

tio, tum protinus instituenda est Tuberculi sive Apostematis maturatio, imposito Cataplasmate è *Farinâ Fabar. secalinâ*, vel *Micâ Panis*, cum *Croco*, *Melle*, *Lacte*, & portione alicujus *Cepæ*, composito: maturatum Apostema plerumque suâ sponte aperitur, atque tum saniem fundit quotidie usque ad Ulceris perfectam deterfionem, quæ debitis remediis est instituenda, & ad consolidationem promovenda, sicuti sub titulo præcedente de *Aurium Ulcere* docuimus.

AVRIS FISTVLA est Vlcus auris sinuosum, cum continuo saniei aquosæ acris profluvio, oriundum à fero falso corrosivo, partes Auris internas sensim depascente. Ut autem sinus hujus fistulosi Ulceris callosi sint, non secus atque in aliis Fistulis totius corporis evenire solet, quoniam tamen ejusmodi callositas ob loci angustiam satis crassa & firma evadere nequit, hinc etiam suppressus frequenter effluxus liquor saniosus corrosivâ suâ qualitate fibras nervosas adoriens & crispans, immanem sæpe dolorem excitat, cum Hemicraniâ aut Cephalalgia ut plurimum comite.

Fons & scaturigo ejusmodi Fistulæ imperscrutabilis est, quando saniosum serum ex Auris profunditate venit. Si liquor emanans lividus; ac foetidus existit, signum est ossis alicujus jam Carie infecti & corrupti. Oportet igitur, ut intra cavitatem organi istius dilaceratio vasculi unius vel alterius lymphatico-membranosi, ab humore v. gr. stagnante acri produ-

cta fuerit, quæ dein cicatricem respiciens continuè effluentem lympham exhibeat, non secus atque excitatus in hac aut illâ parte Fonticulus. Fovet autem ejusmodi fistulosum Vlcus perpetim affluens è Sanguine cacochemico circulante succus aquoso-salinus acris; sed non simpliciter fovet, quin cum remedia ad ejus radicem penetrare nequeant detergentia atque consolidantia, jugiter circumquaque rodit, & ita partis affectæ substantiam membranoso-mollem paulatim consumit; tandemque ad Sanguinis massam ex parte rediens, eamque penitus inquinans, Tabem & Febrim hecticam producit, quâ dein Homines lentâ morte consumti intereunt.

Si Curationem desideres, nullam *Curatio.* scimus aliam quàm quæ communis est cum Fistulæ cujusvis sanatione. Cumque propemodum impossibilem eam judicemus, hinc etiam palliativa tantum cura, in Symptomatum mitigatione consistens, adhiberi solet, quam sub titulo de Fistulis sufficienter attigimus.

AXILLÆ, vel HUMERI LVXATIO est capitis rotundi ossis Humeri, quâ quidem cum processibus ossis Scapulæ, coracoide & cervice per intervenientia ligamenta junctum est, è suâ sede propulsio. De hac vide Titulum de *Luxatione* suo loco. *Axilla luxatio.*

AXILLÆ IMMOBILITAS est *Axilla immobilitas.* motus vel flexionis Ossis humeri impossibilitas, à variis causis producta.

Hæc si proveniat à musculorum Brachia

chia moventium resolutione, tum ad *Paralysin* referenda, de quâ suo loco: si verò ab humoris seroso-lymphatici collectione & stagnatione inter Articuli tendines oriatur, vel *Arthritis* est, de quâ alibi agitur, vel *Catarrhus* Arthritidi similis, eodemque cum hac modo curabilis: si denique à Luxatione vel Vulnere Articuli ortum suum habet, ad *Luxationem* vel *Vulnus* pertinet, de quibus vide suo loco.

B.

BALBVTIES & BLÆSITAS,

Vid. *Linguae* Balbuties.

BARYCOIA, Vid. *Auditus* Gravitās.

Barba
defectus.

BARBÆ DEFECTVS, est deformitas faciei in Viris, quando pili circa labia & mentum vel non crescunt planè, vel tardius erumpunt, vel excidunt aut defluunt, nec amplius regenerantur. Equidem deforme esse credunt Fœminæ, sicubi pilos suis in mentis crescentes habeant; sed multo adhuc indecentius in se esse arbitrantur Juvenes & Viri, quando Barbæ defectu laborant; maximeque deforme reputatur in senescentibus, facie prorsus glabrâ & rugas ducente, esse præditum, sicque ut *Comicus* fuit olim locutus, *Senem mulierem* referre.

Quando autem *Pili* omnes canaliculi vel tubuli sunt diversicolores, qui è peculiaribus radicibus, sive bulbulis ovalibus mucosis, subter cutim jacentib⁹, ac ejus averſæ superficiei adherentibus nascuntur; necesse est, ut ejusmodi bulbuli in certis tantum re-

gionibus cutis existant, ubi pili aliàs extra cutim nascentes comparent. Crescunt hinc felicius illi, sicubi radices naturaliter sint constitutæ, atque succum nutritium, ex arterioliis suis jugiter acceptum, sine impedimento per canaliculos Cutim penetrantes emittere valeant.

Accidit verò nonnunquam, ut ejusmodi radices & bulbuli pilorum vel planè deficiant in structurâ nativâ præternaturali; vel à viscidiorre mucos obstruantur, atque transitum succo nutritio denegent; vel à resolutione nervulorum flaccidiores evadant, & sic nutrimentum nullum è Sanguine accipiant, atque transmittant; vel à nimio sanguinis allabentis fervore v. gr. in Febribus exiccentur; vel ab humorum circulantium acrimoniâ erodantur; vel denique à malignâ quadam aurâ externâ ita constringantur, ut hinc pili vel sponte elabantur, vel levi attactu extrahi queant. Artificialiter etiam per *psylotra* remedia pili extrahuntur, radicibus subinde erosis; quod pluribus orientalibus Populis familiare esse perhibetur. In castratis porrò Juvenibus Barba non crescit, quoniam propter feminalem materiam in Sanguine manentem, pilorum nutrimentum mutatur, aut corrumpitur plerumque, ita ut ad Barbæ generationem nihil amplius faciat.

In *Curatione* si vel nativum est malum, vel si radices fuerint erosæ, atque evulsæ, remedium superest nullum. Si autem à siccitate, obstructione aut resolutione bulbulorum Pilorum malum provenierit, tum purgandum

dum est unâ vel altera vice corpus; hinc sudorifera ac diaphoretica pluries sunt danda, sudorque non semel pellendus. Extus verò ea, quæ vel singulari quadam proprietate Pilorum generationem promovent, vel obstructionem canaliculorum referant, & siccitatem corrigunt, in usum sunt trahenda, v. gr. *Radices Malvæ, Alth. Lil. alb. Nymphææ, Asphodeli, Scillæ, Raphani hortens. Ceparum, &c. Folia Brassicæ, Betæ, Cherefolii*, invicem confusa, cum *Sale communi*, & *Axungia porcinâ* mista applicantur singulis noctibus; postridie mane partem cum *Vino calente* abluendo. Vel sume *Pulveres* aut *Cineres Radicum* v. gr. *Asphodeli, Cyclaminis, Asari, Valerianæ, Imperatoriæ, Helenii, Cortic. Pini, Sambuc. Arundinis, Herbarum Lavendulæ, Adiantbi, Rutæ, Abrotoni, Trichomanes, Absynth. Aneth. Visci tiliacei, Semin. Staphisagriæ, Erucæ, Cochleariæ, Nasturtii, Sinapi, Hyoscyami, Putaminum Nucis Avellanæ & Juglandis, Ossium Dactylorum, & similium*; misceantur cum *Oleo irino, Axungia Anatæ, Anserum, Porcorum*, aut *Melle*, & sic quotidie mane ac vesperti inungantur locis, ubi Barba erumpere debet; hocque remedium per aliquot hebdomadas continuetur, usque dum aliquem inde effectum observemus. Ita nonnulli heic commendant *Succos Ceparum, Allii, Alliariæ, Scordii, Raphani, Nasturtii, Beccabungæ &c.* calidè cum linteis quotidie applicatos. Sunt qui *Oleum è Nucleis Avellanarum, Persicorum, Amygdalarum amararum, expressum*; vel *Oleum Oliva-*

rum vetus, laurinum, raphaninum, Lucernarum, anethinum, Ovorum, aut simile cum pulvere rerum supra dictarum, aut Apum vel Formicarum; stercoreibus item Columbarum, Anatæ, Gallorum, Murium, cineribus Vespærum, Cantharidum, Muscarum, Asellorum, Talparum, Lacertarum, Ranarum, Pellis ursinæ, vulpinæ, Erinacei terrestris permiscant, & singulis diebus applicant.

Quando à nimia humiditate & laxitate tubulorum Barba deficit, post corpus aliquoties *Vino medicato* purgatū, ea extus adhibenda, quæ tonum fibrarum nimis laxum roborare, atque firmiorem reddere possunt, id quod producere valent blandè ficcantia atque leniter adstringentia; v. gr. *Radices Cyperi, Calam. arom. Angelic. Petasitid. Caryophyllat. Herbæ capillares omnes, Folia Myrti, Anethi, Absynth. Pyrorum, Quercus, Marrubii albi, Diétamni Cret. Chamædr. Chamæpith. Salicis, Ulmi, Rosar. rubr. Flores Balaustior. Cortices Granatorum, Ulmi, Gallæ, Nuces Cupressi, Baccæ Lauri, Juniperi, Semina Anisi, Levistic. Fœnicul. Aquilegiæ, &c.* quæ vel cum *Vino rubro*, vel cum *Lixivio* aut *Aceto* coqui, & applicari singulis noctibus possunt. Alii in hoc casu *Fumum* ex accensis *Pinis, Juniperino ligno, Olibano, Styrace, Ladano, Floribus Rosar. rubr. Foliis Myrti, Origani, Ocymi, Menth. Chamæpityos &c.* linteis excipiunt, & calidè admovent. Ex iisdem etiam simplicibus, unâ cum *Baccis Lauri, Juniperi, Seminibus Seseleos, Pæon. Nasturtii, Pice, Cera* atque *Terebinthina*

Emplastrum concinnari potest, quod applicatum quotidie, similiter ad Barbæ generationem contribuit.

Bronchocele.

BOCIVM, BRONCHOCELE, HERNIA GUTTURALIS, est Tumor flatuosus juxta Bronchia à distensione & inflatione violentâ membranarum, inter Cutim & asperam Arteriam hærentium, oriundus, & instar sacci quandoque propendens.

Pars affecta.

Afficitur heic maximè illa membrana duplex Gutturis seu Arteriæ asperæ, à flatibus ut plurimum distenta: subinde tamen etiam nervi talium partium membranarum convolvuntur, & dispositionem ganglioformem nacti musculos atque cutem Colli simul expandunt. Imò hic ipse Affectus aliquando illæsis suprâ dictis membranis solas Colli musculorum, sive longorum sive scalenorum, aliorumve tunicasprehendunt & occupant.

Causa.

Causa proxima hujus Tumoris est vehemens distensio atque divulsio membranarum sive Gutturis, sive musculorum Colli, à violentâ admodum Spiritûs retentione, (sicut in *Tubarum* inflatione validâ & crebrâ, in Fœcum alvinarum & Fœtus uterini extrusione difficili, ponderosiorum denique onerum elevatione contingit) hincque alicujus humoris flatuosi, vel Spirituum aëreorum inter distentas tunicas collectione originem ducens, quæ quo major evadit, eo etiam *Bronchoceles* faccus grandior apparebit. Cum verò sic membranæ Colli aut Gutturis velut in Scroto alias contingit, divelluntur, ideo Tumor hic *Hernia gutturalis*, sive *Bronchocele* vocatus fuit.

Quoad *Diagnosin*, *Bronchoceles* Tumor in parte Colli anteriore versatur, rotundus est, insignis subinde magnitudinis, atque sacci penduli aut vesicæ inflatæ adinstar conspicuus, indolens aliàs, nec nisi deformitate, aut respirationis offensione incommodus, usque adeo tensus, ut cum pulsatur, sonum edat; cum verò premittitur, cedit quidem, sed mox iterum attollitur. Deformat hinc Collum, vocem efficit raucam, & deglutiendi ac respirandi difficultatem inducit, interdum adeo magnam, ut ea propter suffocationis, vel strangulationis periculum homines incurrant. In ipso autem Tumore continetur ut plurimum flatulenta materia, quæ subinde Lympham quandam coagulata secum fert. Differt hinc *Bronchocele* à *Scrophulis* & *Strumis*, quòd hæc 1. mobiles sint, nec ita fixæ sicut *Bocium*. 2. *Asperæ Arteriæ* non cohæreant. 3. Non in membranis distentis, sed in Glandulis Colli intumefactis subsistant. Et 4. non tam antèrius, quàm ad latera Colli conspiciantur.

In *Prognosi* tenendum, hunc morbum in principio sui curabilem esse, quando autem jam excrevit multum, prorsus insanabilem, aut certè curatu maximè difficilem existere, imò propter affluxum atque stagnationem lymphæ & aëris, quotidie interdum majorem, ægro periculum suffocationis vel strangulationis subitanæ afferre, dum guttur hac ratione validè comprimitur. Quandoque, si *Bronchocele* redditur dolorifica, ac in se se abscondit salia corrosiva, in cancerosum

sum Abscessum & Vlcus converti potest.

In *Curatione* quoad *Dietam*, optimo Ager fruatur *Aëre*, inprimis non nebuloso aut pluvioso; *Victus* sit parvus & eupeptus, Cibi crassi, fumo indurati, caseosi fugiantur: è contrario aromatica & aperientia omnia conveniunt. *Potus* non sit Aqua aliqua stagnans, aut è faxis vel montolis locis scaturiens, qualis inprimis Strumas solet excitare; sed conducit Vinum tenue, penetrans, minimè tartareum; Cerevisia item optimè defœcata; aut alteruter horum potuum cum Infusione *Radicis Scrophulariæ* atque *Cinnamomi*. Commendatur & *potus Theæ* frequentissimus: æstivo tempore etiam *potus Thermarum*, inprimis *Embsensium*, aut *Piperinarum Helveticarum* prodest. *Motus* & *Quies* non excedant. *Alvus* etiâ quotidie respondeat. Præcipuè *Vociferatio* nimia atque crebra, & diuturna spiritus retentio in ponderum elevationibus, Fœcum alvinarum aut Fœtus uterini protrusionibus, similibusque rebus maximè vitetur. *Animi* tandem *Motus* vehementiores rationis freno cohibeantur.

Quod *Pharmaciam* attinet in Bronchocele ante omnia tentandæ sunt vires remediorum purgantium ac discutientium, quæ quidem Strumis feliciter medentur. Si verò hæc nullum præstent effectum, ad Operationem manualementem accedendum, quâ Bronchoceles tumor in parte molli & declivi inciditur, hincque è Vulnere per spongiam præparatam dilatato materia flatuoso-lymphatica eximi-

tur; Vlcus postea probè mundificatur, & consueto more ad consolidationem promovetur. Inprimis ante & post operationem *Cataplasmata carminativa* è *Chamomillâ*, *Hordeo*, *Meliloto*, *Melissâ*, *Salviâ* &c. concinata frequenter applicantur. Quod si verò tumor adhuc recens & exiguus sit, tum *Oleum Chamomillæ*, *Lacertarum*, *Scorpionum*, *Scarabæorum*, *Lumbricorum terrestrium*, quotidie mane ac vespere per plures septimanas calidè cum fructu inungitur; imò & *Emplastrum de Baccis Lauri*, de *Cicutâ* cum *Mercurio vivo* & *Oleo Philosophorum* malaxatum imponitur. Aliis etiam *Cataplasma* arridet ex *Cepis albis*, *Radice Lilior. alb.* *Hellebor. nigr.* *Alth.* cum *Sapone nigro*, *Oleo Chamomillæ* ac *Scarabæorum* compositum. Ad impediendam verò ulteriorem Tumoris augmentationem, si discuti nequeat, adstringens aliquod *Emplastrum* discutienti permiscendum atque imponendum est; v. gr.

℞. *Emplastr. ad ruptur.* ʒj.

de Bacc. Laur. ʒß.

Cortic. Granator. ʒij.

Sanguin. Dracon. ver. ʒj.

Ceræ & Tereb. q. s.

M. f. Emplastrum tenax, d. ad ch.

Vel *Cataplasmata* è *Stercore columbino*, *anserino*, *Herbis Menthæ*, *Pulegii*, *Melissæ*, *Matricariæ*, *Levistici*, *Feniculi*, *Rutæ*, *Scabinæ*, *Scrophulariæ*, *Pilosellæ*, *Verbenæ*, *Aristolochiæ*, *Farinâ* qualicunque, *Albumine ovorum*, aut *Melle* fieri possunt & quotidie semel aut bis recenter imponi. *Platerus* heic ad fortiorem discussionem commendavit extus *Cataplasma* ex *Radicibus Bryoniæ*,

Bryoniæ, Iridis nosiratis, Cucumer. asini, Scillæ, invicem contusis ac in Vino coctis, addendo postmodum Farinam Fabarum & Orobi, Amygdalas amaras, ac Nucleos Persicorum contusos, semen Cumini, cum Pipere, atque Oleo Irino. Vel Emplastrum è Gummis ammoniac. Galban. Bdellii in Aceto fortiss. solutis, cum Pulvere Radic. Ireos, Semin. Sinapi, Urticæ, Pulpæ Colocynth. Salis Aluminis, ac Resinâ denique Pini, Navali Pice & Oleo Nucum antiquiss. concinatum. Intus autem sequentem Pulverem, tanquam expertum laudavit:

*℞. Radic. Ireos flor.
Galang. ana. ʒiʒ.
Herb. Puleg.
Saturejæ,
Herniar. ana. ʒʒ.
Semin. Anis. Fœnic. ana. ʒj.
Petroselin. ʒʒ.*

*Piperis longi,
Spicæ Nardi.
Nucis mosch.
Cinamom. opt. ana. ʒij.
Myrrhæ ʒʒ.
Alumin. usti ʒʒ.*

Sacchar. ros. tabul. ad pondus omnium.

M. f. Pulv. subt. d. ad scatul. Dosis ʒiʒ. cum Vino.

Denique heic ea omnia remedia conducunt, quæ in Hydrocele & Pneumatocele alias proficua esse deprehenduntur. Emplastrum sequens apud Fœminam, incipiente post difficilem Partum Herniâ gutturali laborantem, feliciter usurpatum fuit:

℞. Gummi Galban. Sagapen. & Ammoniac. ana. ʒʒ.

Myrrh. rubr.

Thuris mascul.

Ladan. ana. ʒij.

Invicem contusa solve super ignem lenem in Aceti scillitici q. s.

Dein iterum inspissa, & adde

Ceræ citr. ʒʒ.

Picis naval.

Colophon. ana. ʒiʒʒ.

Cinnabar. commun. ʒʒ.

Semin. Fœnic.

Levis.

Pulv. rad. Scrophular. ana. ʒiʒ.

Olei Philosoph. ʒij.

Lumbric. terr.

Scorpion. Matth. ana. ʒj.

Terebinth. Venet. & Ol. ros ana. q. s.

M. f. l. a. Emplastr. d. ad ch. inducatur Alutæ & imponatur.

BVBO est tumor inflammatorius Glandularum præcipuè in Inguinibus, sub Axillis aut pone Aures, ab humore ibidem stagnante ac ad suppurationem tendente originem ducens.

Afficiuntur heic imprimis prædictæ Glandulæ; tum verò & aliæ plures aliarum partium. Ita enim in Dorso, Brachiis, ac Pedibus, similes oboriuntur Tumores urentes & mordicantes, non tamen adeo magni, qui sub nominibus *Phygetlorum, Phymatum* aut *Furunculorum* venire solent.

Causa proxima uti Bubonis, ita & reliquorum Tuberculorum est stagnatio sanguinis aut lymphæ plus minus viscidæ & acris, subinde & malignæ aut corrosivæ, prout in Febribus pesti-

lenti-

lentibus & malignis contingere solet. Videlicet primum aliquid Lymphæ stagnat, illud verò dein acrimoniâ suâ crispando fibrillas tubulorum sanguiferorum simul guttulas sanguinis subsistere & stagnare facit, quæ dein sensim accumulatae Tuberculum vel Tumorem inflammatorium producant. Depluit ad Partem affectam materia illa peccans per Arterias, ut adeo *Causa antecedens* ex ipso Latice arterioso derivanda veniat, utpote in quo sive per malè digestos in primis viis cibos, sive per inspirationem malignæ cujusdam auræ particulæ heterogeneæ salinæ viscidæ, acidæ, acres, aut corrosivæ cumulantur, quæ dein cum in circulari suo cursu per affectarum Glandularum poros transire nequeunt, intra tubulos suos stagnant, & novarum jugiter particularum appulsu cumulatæ proximam causam efficiunt. E *Causis procatarteticis* huc contribunt in primis aura quædam maligna, rodente acido prædita; dein etiam Cibi \ominus si, aliive ad putrilaginem inclinantes, Carnes, aut Olera hortensia, verminosis seminiis conspurcata; Potus Aquarum paludosarum, in quibus seminia sive ovula Insectorum copiosè latitant. Hæ verò causæ omnes in majoribus quidem glandulis v. gr. Inguinum, Axillarum &c. *Bubones*, in Glandulis autē pone Aures *Parotides*; in Glandulis minoribus & subcutaneis *Furunculos*, *Phymata*, *Phygethla*, *Panulos* vel *Panos* &c. excitant. Usque adeo ut omnes ejusmodi Tumores reverâ sint Inflammationes, modò benignæ, modò malignæ, quæ

ut plurimum in Abscessus per stagnantis humoris suppurationem mutantur, tandemque cum rumpuntur, in Ulcera terminantur.

Bubo vel similis Affectus, si *simplex* est, dignoscitur ex partis tumore cum renitentiâ, rubore, dolore ut plurimum ardente & pulsante, continuaq; Febri leviculâ. *Symptomaticus* dein Bubo cognoscitur exinde, quod nulli alii morbo supervenit: *Criticus* verò is est, qui morbum alium sequitur, & plerumque hominem ab illo liberat citra symptomata maligna. *Bubonem* porrò *malignum* ac *pestilentem* denunciant symptomata vehementiora, summus nimirum ardor, cum livido cutis colore, Febris acuta, Animi deliquia, aliaque simul præsentia Febreos malignæ signa. *Bubo* φ reus inguina ut plurimum affligit, & cum reliquis Luis φ reæ signis est conjunctus. Bubones a. primò apparent ex albido rubicundi, postea paulo rubicundiores ac splendidiore redduntur, imò sæpius fusci ac ex nigro rubicundi coloris evadunt, cum ardore sive æstu summo. Plerumque altius sub cute latitant in Glandulis, atque in principio hinc inde trudi ac moveri possunt; verum statim magis magisque intumescunt, ac cum tensione & aliquali duritie immobiles redduntur. Bubo etiam, vel *Phygethlon* &c. aliquando ante Febris insultum erumpit, interdum post eam demum exsurgit. Hinc ergo Bubo vel *benignus* est, qui sine malignis symptomatibus, aliquando etiam sine Febri hominem affligit: vel *malignus*, aut etiam *pestilens*, qui

Diagnos.

Bubo pestilens.

Bubo venereus.

cum Febri malignâ, aut Peste ipsâ excruciat: vel *venereus*, qui in Lue venereâ partes corporis pudendas maximè torquet. Dein *Bubo* vocatur propriè, si glandulas axillares vel inguinales occupat; si verò in Glandulâ pone aures compareat, *Parotis* dicitur. Quod si denique, ut plurimum citra Febrim, has illasve Glandulas subcutaneas invaserit, *Phyma*, *Phygetlon* aut *Furunculus* nuncupatur.

Prognosis

In *Prognosi* dubii semper eventus est faciendus Bubo, si maligna Febris simul adsit, ac ipse Tumor tardius maturetur, aliquando enim Ægri nondum suppurato Bubone moriuntur. Interdum etiam idem Tumor in Fistulam periculosam convertitur. Nonnunquam in Herniosis Bubo inguinalis maturatus & ruptus simul Intestinum quoddam erosisse observatus est, ut inde excrementa intestinalia cum ipso pure effluxerint. Sed etiam periculum hic ex ætate, regione, ac viribus designatur. Majus verò discrimen imminet, si Ægri in principio Bubones negligunt, remediaque tam interna, quam externa aliquandiu respuunt. In Bubonibus pestilentibus si vires consent, & remedia interna non revomantur, sed potius per sudorem operentur, tum non levis sanationis spes superest. Quo citius Bubones in Febris apparent, quoque constantius permanent, & ad maturationem abeunt, eo etiam majorem felicitis curationis spem faciunt. Si verò dispareant iterum, atque ita stagnans humor acris in massam humorum circulantem revertatur, tum plerumque

mortem inferunt, idque tanto certius, quando Vomitus frequens, Lipothymia, Deliria, Convulsiones, Facies subito immutata & cadaverosa, Urinae foetidae & nigricantes subsequuntur. Bubones tamen solent terminari aliquando etiam per discussionem paulatinam, plerumque verò ad suppurationem & partis exulcerationem tendunt, hincque plus minus tardam consolidationem post se trahunt.

Quod *Curationem* Bubonis attinet, in *Dietâ* quidem Aër purus, copiaque materiae subtilis refertus, est eligendus, frigidus autem, squalidus crassus aut foetidus est fugiendus. *Cibus* extra Febrim sit euchymus & eupeptus, in Febri autem conjunctâ *Juscula consumata* Caponum, Pullorum, Gallinarum, Perdicum, Alaudarum, Carnis bubulae, &c. multo ☉ e volatil. balsamico referta frequenter exhibebuntur. *Potus* vitetur nimium frigidus aut vinosus, nihil enim magis in hocce Affectu, quam *Vinum* nocet, *Decoctum* verò *passular minor*, *Rasurae C.C. Herb. Agrimon. Ulmar. cum Radic. Scorzonerae, Fragariae* pro ordinario potu praescribatur.

℞. Rad. Cichor.

Ulmar.

Scorzon.

Sem. Fœnic. ana. ʒij.

Hordei integr. ʒß.

Passular. minor. ʒvj.

Incis. & contus. coqu. in Aqu. font. Mij. Vigiliae & Somnus teneant moderamen; Animus tranquillus & curis sit vacuus. In Fonte pharmaceutico imprimis attendendum, malignane vel benigna Febris

Pha
mac
tica.

bris simul adsit, aut etiam, an à Febris planè sit immunis. Quod si Febris adsit, eaque benigna, tum neque purgantia, neque Venæsectiones profunt, sed primæ viæ ante omnia lenitivo quodam ex Syr. Ros. sol. simpl. evacuantur; v. gr.

R̄. Syr. Ros. s. comp.

Flor. Persic. ana. ℥i℥.

Aqu. Plant. ℥ij.

M. d. ad Vit. pro dosi.

Vel etiam Clysmate emolliente & evacuante eluantur; v. gr.

R̄. Juscul. Carnis probè saliti ℥ix.

Ol. Olivæ. ℥iiij.

Mell. mercur. ℥i℥.

M. F. Clysma tepidè injiciendum.

Hinc statim internè Pulveres diaphoretici plus minus volatiles, ex C. C. phil. ppt. ½ nio diaph. Ebor. ppt. Cran. human. ppt. Bezoard. minor. Bol. Armon. Camph. Sale volat. C. C. aut Viper. concinnati, dabuntur, idque cum vehiculo Aquar destill. diaphoreticarum.

R̄. ½ n. diaph.

Oc. ̄. ppt.

Ebor. ppt.

Terr. sigill. ana. ʒij.

⊖is vol. C. C. ʒj.

Sacch. ros. ʒj.

M. f. Pulv. subt. in 6. dos. æqu. m. ac v. dand.

Profunt & alternatim Roob Samb. atque Juniper. Elect. Diascord. Mithridat. Damocrat. & similia.

R̄. Mithrid. Damon.

Elect. Diascord. Fr. ana. ʒ℥.

½ n. diaph.

C. C. phil. ppt. ana. ʒ℥.

Misc. cum Sacch. fiat

Bolus pro dosi, sæpè reiterandus.

Et ubi notamus, sanguineam Massam esse acrem, tum præscribemus Emulsiones diaphoretico-refrigerantes, ex Semin. frigid. maj. aut minor. Nucl. Persic. cum Sem. Napi, Card. ben. & Nasturtior. Aquâ Plantag. Fumar. aut flor. Samb. faciendas, de quibus singulis 4. horis ʒiiij. vel iiij. cum vel sine pulveribus propinare possumus:

R̄. Sem. 4. frig. major. ana. ʒii℥.

Nap. ʒij.

Card. bened. ʒiiij.

Aqu. Plantag.

Portulac.

Borrag. ana. ʒiv.

F. l. a. Emuls. cui adde

Dent. aprin. ʒj.

Syr. Capill. ♀ r. ʒij.

D. ad Vit.

Externè Bubonibus statim Cataplasmata applicare convenit ex Succo Chelid. maj. rec. expresso, vel in ejus defectu succo Cepar. aut Alliorum, cum Farinâ secalinâ aut Farinâ sem. Lin. vel Radic. Alth. & Melle, quibus ad dolorem leniendum addere licet Crocum. Vel etiam ex micâ panis, farinâ sem. Lini radicis Alth. Malv. maj. & Croco in Lactē coctis, egregium Cataplasma fieri potest, cui tamen adhuc Cepam contusam, aut herbas Violarie, Parietarie, Althææ vel Malvæ, minutissimè incisas addere licet. Hæc verò Cataplasmata citius ac felicius Bubonem maturant, quàm Emplastra quævis, ab aliis applicari solita. Quanquam in Phymatibus & Furunculis applicatione Emplastr. diachyli simpl. aut cum Gum. vel stict. Croll. possumus esse contenti.

Chirurgica.

In *Bubonibus* *ſreis* interne quidem usurpanda est Cura antivenerea suo loco descripta. Externe autem cum fructu applicabitur *Emplastrum de Ranis Vigonis* cum quadruplo *ſrii*, ut & *Diachylum cum Gumm.* Oleo *ſrii* ac *Rosarum* malaxatum. Vel *Emplastrum Norimbergense Gruberianum* cum suff. quant. *ſrii*. Rupti Abscessus tales primò mundificabuntur cum variis liquorib⁹, in curatione Abscessuum suo loco jam descriptis, modò *Mercurium* quoque *dulcem* addiderimus. Consolidatio autem promovetur balsamicis, quæ inter eminet *Balsam. Peruvianus*, aliaque *Balsama vulneraria*, *Myrrhæ* vel etiam *Thuris* pulverem recipientia; atque à pinguib⁹ omnibus immunia

*Bubo
pestilens.*

In *Bubonibus pestilentibus* tandem omni curâ & opere Abscessus ad maturitatem est perducendus, quod quidem non melius fieri potest, quàm supra jam allegatis *Cataplasmatibus*. Quibus tamen etiam addi potest *Theriaca*, *Diascord.* *Fracast.* *Roab Junip.* imò subinde necesse est, ut etiam *Vesicatorium* applicemus, vel certè *Fermentum* admisceamus, aut *semen Erucae* vel *Sinapi* contusum. Quamprimum verò Abscessus maturatus est ac ruptus, tum statim *Unguentum digestivum Hildani*, vel *mundificativum de Apio*, cum *Theriacâ* atq; *Essentia Myrrh.* & *Aloës* permixtum est inungendum. Subinde ipsum *Vlcus* *in Vini camphorato*, cum *Essentiâ Virg. aureæ* aut *in matricali* permixto, aut etiam *Decocto traumatico amaro* est eluendū, tandemque *Emplastro magnetic. Ang. Sal.* vel *Diapalmâ*, *Stict.* *Croll.* aut *No-*

rimbergensi est tegendum, sicque sensim consolidatio promovenda. Intus verò ea præscribentur Remedia, quæ suo loco de *Peste* ac *Febribus malignis* indigitabuntur.

BVBONOCELE, vide *Hernia Inguinalis*.

BVLIMIA, vide *Appetentia canina*.

C.

CACHEXIA est Intemperies five *Cacochymia* massæ humoralis pituito-aquosa, cum colore totius corporis pallido, & tumore molli inprimis pedum præternaturali.

Afficitur hinc primariò quidem massa sanguinea circulans: *secundariò* autem simul affliguntur tubuli lymphatici per totum corpus, præternaturaliter distenti, adeoque in amplitudine aucti; unde hæc Aegritudo proximus est gradus ad *Anasarcam* vel *Leucophlegmatiam*.

Causa proxima est copia humorum pituitoso-aquosorum in sanguine collecta, ob quam particulae reliquæ oleoso- Θ ino-volatiles & balsamicæ, quæ naturaliter exaltatae esse deberent, nimio pre deprimuntur, diluuntur & quasi suffocantur, unde serum Massæ sanguineæ auctum & spissius redditum, tardius intra vascula sua decurrit, illaque sic expandendo, molliusculam corporis intumescenciam cum colore pallido producit.

Antecedens causa chylus est crudior & aquosior per vasa lactea ad Cor quotidie longo temporis spatio transmissus. Hunc verò progignit debilis

in

in Ventriculo contingens assumptorum digestio, & quidem talis, sub quâ particulæ Ciborum Æreæ non sufficienter exaltantur, Æinoque volatiles haud perfectè extravertuntur, unde fit, ut aquosæ & Æno -fixiores prædominium obtineant, sicque Chylum pituitoso-crudiorem exhibeant. Ansam malæ isti digestionis facilem præbent Morbi alii præcedanei, prout sunt largiores Hæmorrhagiæ qualescunque, aut etiam frequentiores sanguinis missiones seu Venæsectiones, Gallis Italisque communes: Phthisis etiam, aliæve hæcticæ & lentæ Febres.

Inter *Causas procataceticas* eminent *Ær* crassus atque humidus, in quo *Æger* forsan continuè aut crebrò versatur; *Cibi* multo aquoso, pauciore verò $\text{Æino-oleoso-volatili}$ principio gaudentes; *Potus* largior & frequentior Vinorum, aut Cerevisiæ etiam minus benè defœcata; Vita sedentaria; Curæ & sollicitudines animi nimiae, Tristitia excessiva; Somnus nimius; Excrementa alvina ægrè & segniter prodeuntia; Urinæ diu apparens paucitas, à tubulorum aut glandularum renalium obstructione proveniens; Mensium suppressio, & similia.

Si *Diagnosin* spectes, Affectûs huius præsentia indigitatur per colorem totius corporis pallidum aut plumbeum, tumorem itidem exiguum mollemque circa oculos, genas, manus & pedes, somnolentiam frequentem, sensuum torporem, Virium lassitudinem, vel languorem quendam, Dyspnœam & Cordis palpitationem, quo-

ties vel scalæ tantum sunt scandendæ.

Prognosis Affectum hunc curabilem facit, si Urinæ sine impedimento profluant, si morbus nondum diu duravit, si nullus alius lethalis sit simul junctus, si sitis ablit, si denique nulla Febricula lenta vel Hæctica comitem sese præbeat. Quando autem obstructions internæ glandularum adsunt, & Sitim aliqualem Anorexiam, Urinæ imminutionem, frequentem corporis horrorem, Anxietates præcordiorum, & Asthma cum Febriculâ lentâ post se trahunt, tum vel in Hydropem Pectoris, vel in Anasarcam aut Ascitem, vel etiam in Apoplexiam ipsam lethalem converti potest. Si alius morbus incurabilis sit junctus, tum Cachexia hæc ut plurimum est mortis prodromus.

In *Curatione* ante omnia corpus à superfluitate feri sive pituitæ per purgans aliquod est liberandum, quale concinnari potest è *Pilulis hydropicis Bontii* cum *Ærio dulci*, *Extracto itidem Pilularum cochiarum*, *panchymagogo Crollii*, *catholico*, ut & *Radice jalappæ*, ac similibus. v. gr.

Rx. Maß. pilul. hydrop. Bont.

Extract. Cathol. ana. gr. jx.

Resinæ Jalapp. gr. iij.

Ol. stillat. Tereb. q. s.

M. F. l. a. Pilulæ no. xiiij. Inaur. d. pro dosi matut.

Vel *Rx. Spirit. Anis.*

Juniper. ana. 3ß.

Magist. Jalapp. gr. vij. vel viij. Solut. lento igne adde.

Julep. rosat. 3ij.

Detur ad Vit. pro dosi.

S 3

Post

Post purgans statim ea exhibenda sunt, quæ partes $\frac{1}{2}$ reo-volatiles in Mass. sanguineâ exaltare, atque eapropter salino-fixiores aut acidas absorbere, edulcorare, imò etiam per vias Vrinae aut insensilis Transpirationis expellere possunt. Laudamus in hunc finem *Pulv. cachect. Quercet. Croc. Jis aperit. Diaphoret. Jiale, Ocul. $\overline{\text{O}}$. Cochleas ppt. Lumbric. terrestr. ppt. Asellos ppt. Radicem Ononid. pulverisatam*, \ominus ia itidem incidentia lixivialia *Juniper. Fabar. Absynth. Cent. min. Card. ben Ononid. &c.* è quibus pulvres dosi \mathfrak{z} ij. aut \mathfrak{z} j. fieri, & cum haustu *Aqu. Plantag. Flor. Sambuc. Beccabung. Nasturtii aut Urtic. urent. mane ac vesp. propinari possunt.* Post singulos pastus non sine fructu Ager quoque bibet *Decoctum granor. Caffè aut Phaeolorum nostratium tostorum*, vel m. *Decoctum Herbæ Thee, Veronicæ, Virg. aureæ, & similium.* Postquam a. ita per 12. aut plures dies continuatum est, tum *Vinum medicatum purgans* in doses vj. vel viij. præscribi & singulis matutinis exhiberi poterit, ex *Radic. atque Herb. aromaticis ac diureticis* inprimis compositum; v. gr.

\mathfrak{R} . *Radic. Vincetox.*
Rubiæ,
Apii,
Fœnic. ana. \mathfrak{z} ß.
Cortic. Lign. Guajac. \mathfrak{z} iiij.
Herb. Agrimon.
Marrub. alb.
Artem. ana. Mj.
Flor. Calend.
Summit. Abs. ana. Mß.
Bacc. Alkek.

Laur. ana. \mathfrak{z} ij.
Semin. Fœnic. \mathfrak{z} iß.
Fol. Sen. opt. mund. \mathfrak{z} j.
Rad. Helleb. nigr. \mathfrak{z} ß.
 \ominus is Absynth. \mathfrak{z} iß.
Cinnam. el. \mathfrak{z} iiij.
Limat. Chalybis nod. ligat. \mathfrak{z} ß.
Incis. & contus. sacculoque illigatis affund.

Vin. alb. vet. \mathfrak{t} biij.

Aqu. font. \mathfrak{t} biß.

Singulis mane Cyathus exhauriatur. Hinc verò iterum ad pristina remedia incidentia recurrere licet, aut si eadem non satis efficacia deprehenderimus, etiam *Tincturam Jis aperit. vel \mathfrak{z} nii, Essent. Virg. aur. Succin. Zedoar. Absynth. Ononid. Tincturam Salis \mathfrak{F} ri \mathfrak{z} ij. aperit. Penoti ad gtt. xx. vel xxx. mane ac vesp. cum Aqu. Veronic. Urticæ &c. propinabimus* Sed in usu *Decocti Caffè* continuandum, imò, si pus videbitur, *Tragema* quoque *stomachum* jungetur, ex *Spec. aromat. rosat. aut Imperat. cum Ocul. $\overline{\text{O}}$. Coch. ppt. Pulver. fol. Sen. atque Sacch. compositum. v. gr.*

\mathfrak{R} . *Spec. Arom. ros.*

Diatr. sant. ana. \mathfrak{z} j.

Ocul. $\overline{\text{O}}$. ppt. \mathfrak{z} ij.

Diaph. Jial. \mathfrak{z} j.

Pulv. fol. Sen. \mathfrak{z} iß.

\ominus is polychr. \mathfrak{z} iiß.

M. f. Pulv. subt. d. ad scatul. Dos. m. ac v. \mathfrak{z} j. ad \mathfrak{z} ij.

Sequens Infusum quoque efficacissimum est.

\mathfrak{R} . *Radic. Arist. rot. ver.*

Rubiæ.

Asar. ana. \mathfrak{z} ij.

Zedoar.

Zedoar. ʒiʒ.
Herb. Artemis. Mj.
Majoran.
Meliss.
Flor. Calendul. ana. pij.
Semin. Fenic.
Bacc. Laur.
Juniper. ana. ʒij.
Cassia lign. ver. ʒiʒ.
Caryoph. arom.
Cinnam. opt. ana. ʒiʒ.
Θis Fabar.
Junip. ana. ʒiʒ.
Limat. Chalyb. ʒʒ.
Incis. & contusis affunde Vini alb.
vet. ʒiʒ.
Aqu. dest. Gram.
Flor. Samb. ana. ʒxij.
Digere per 4. dies, agita quotidie,
tandem Colaturæ adde Syrup. de 5. Ra-
dic. ʒiiij. m. ac vesp. hauriatur ʒj. vel ʒiʒ.
Ex fonte Chirurgico damnamus Ve-
næsectionem aut Cucurbitulas cum sca-
rificatione, sed è contrario modis om-
nibus suademus Fonticulos, vel utrique
pedi, vel brachio uni alterive pedi in-
cidendos, & aliquandiu post morbi
ablationem etiam retinendos. Conve-
nit simul Emplastrum è Gummis cum
aromatibus & Terebinthinâ in Ventricu-
li regione continuè gestandum. Pla-
cent & Laconica subinde instituta,
ante quorum ingressum Æger semper
ʒij. Rob. Sambuci capiet.

CACOCHYMIA, *κακοχυμία*,
 in genere dicitur pravorum succorum
 sive humorum collectio & abundan-
 tia in corpore; cumque modò hic mo-
 dò ille humor, hæ vel illæ particulæ in

circulante Sanguinis massâ redundant,
 ac ita naturalis crasis sive mixtura, na-
 tivaque qualitas mutata sive vitiata
 observetur, hinc etiam *Intemperiei* no-
 mine insigniri consuevit. Hæc ipsa
 verò *Intemperies* varietate suâ adeo
 ludit, ut impossibile prorsus sit, omnes
 illius species accuratè describere & de-
 terminare. Quia verò plurimum hæc
 in re situm est, ut à Medico Practico
 videlicet ejus natura, producendi mo-
 dus, atque curandi ratio sciatur, hinc
 etiam operæ pretium erit præcipuas
 species explicare, idque tanto magis,
 quòd hæc ratione fons vel morborum
 præsentium evacuari, vel futurorum
 emendari ac præcaveri queat. Equi-
 dem Veteres omnes quæsi verunt tales
Intemperies magis in Solidis partibus,
 sive omnibus in universum, sive sigil-
 latim in Cerebro, Ventriculo, Hepate,
 Liene, Renibus, Vtero &c. quas cre-
 debant vel calidas, vel frigidas, humi-
 das aut siccas nimis existere. Sed
 vanæ sunt hæc opiniones, utut homi-
 num plebejorum mentibus ita infixæ,
 ut ne quidem felicissimus atque idem
 eruditissimus Medicus meliores sug-
 gerere ausit, nisi prò Bruto haberi at-
 que æstimari velit. Populi hæc &
 Agyrtarum qualiumcunque vox est
 constans atque perpetua, Ægrum hunc
 laborare *Intemperie* humidâ vel siccâ,
 calidâ vel frigidâ, habere Cerebrum v.
 gr. humidum, Ventriculum frigidum,
 Hepar calidum, & sic consequenter.
 Addiderunt dein Veteres suas in Hu-
 morum numero quaternario constitu-
 tas *Cacochymias*. Verùm hodiernæ
 Medicinæ facies maximè mutata, lon-
 geque

geque splendidior reddita, in Partibus solidis quidem subinde mutatas qualitates, v. gr. figuram, mollitiem, asperitatem, ac similia notavit; in fluidis autem solis propriè *Intemperies* illas si-ve Cacochymias quærere, atque earum genera constituere plura, eaque clarius explicare consuevit, quàm in Veterum Medicinis factum deprehendimus. De singulis specialius & quidem sigillatim agendum erit.

Intemperies sanguinea.

CACOCHYMIA vel **INTEMPERIES SANGVINEA** est vitiosa sanguinis constitutio, quâ vel quantitas vel qualitas ejus præternaturaliter est mutata, indeque diversæ corporis actiones molestantur. Respectu *quantitatis* vitium est nunc *in excessu*, nunc *in defectu*; quorum illud *Plethora*, hoc verò *Anæmia* vocatur. De hac *Anæmia* supra jam suo est actum loco. *Plethora* verò est abundantia nimia boni sanguinis, quando videlicet ejus particulæ balsamico-butyræ, ac seroso-gelatinosæ justo majore quantitate in corpore sunt cumulatae, ut hinc non solum vasa magnopere distendantur, sed & corpus lassitudinem adquirat, periculumque sit, ne idem sanguis in qualitate simul mutatus, videlicet crassior redditus, Febres siue ephemeræ, siue continuas alias, Cephalalgiam, Asthma, Hæmorrhagias varias, aut alias ægritudines excitet.

Causa.

Plethoram gignit proximè Chylus copiosus optimi succi, balsamico-vel butyro-o-gelatinosus, quotidie ad sanguinis massam è primis viis transmissus. Chylum verò talem exhibent alimenta eupeptâ & euchyla, pro-

bè in Ventriculo per laudabilem succum gastricum digesta; digeri solent optimè, si tempestivè, sufficienter, non intemperanter quotidie fuerint assumpta; si in Aëre quis semper versetur subtili aut temperato; si motu & quiete reciprocè atque moderatè quis gaudeat; si animus fuerit perpetim hilaris, ac lætus, à curis, ab irâ, odio, invidiâ, atque tristitiâ alienus: si excreta ac retenta naturaliter se habeant; si somnus atque vigiliæ mutatis vicibus sint moderatæ; si denique Homo subinde nunc Laconicum, nunc Balneum Aquæ dulcis ingrediatur.

Cognoscitur Plethora facilè è corporis habitu *εὐσάρκω*, colore faciei roseo, venis manuum pedumque tumetibus, frequenti lassitudine spontaneâ, quibus accedit subinde Cephalalgia, Hæmorrhagia qualiscunque, vita anteacta, quæ facilè sanguinis abundantiam conciliare potuit.

Non est contemnenda Plethora, neque fides adhibenda illis, qui nullam dari posse opinati fuerunt. Omnino exundare in vasis aliquando solet sincerus etiam sanguis, ut nisi medela afferatur, ille vel spissescere atque corrumpi, hincque Cephalalgias graves, Inflammationes, Arthritides vagas, Febres continuas aut intermittentes, Asthma, & alia producere mala posset; vel vasa nimis distendendo rumpere, & ita Hæmorrhagias varias excitare valeret. Etsi autem Adolescentibus hæc Plethora familiarior existat, reperiuntur tamen in quavis ætate tales, in quibus sanguis circulus justo majore quantitate accumulatur.

Ad

atio.

Ad emendandam itaque Plethoram requiruntur evacuantia pleraque; viæ primæ sunt mundandæ per lenitiva, siue intus exhibita, quemadmodum sunt Syrupi Ros. solut. compos. cum Rhab. Ag. & Sen. de Cichor cum Rhab. flor. Persicor. &c. siue extus sub formâ Clysmatum emollientium ac detergentium applicata. Deinceps sanguis est minuendus per Venæsectionem unam atque alteram, per Cucurbitulas cum scarificatione applicandas, Hirudinum admotiones. Inprimis etiam Victûs ratio tenuis est servanda, Cibus Potusque modicè assumendus, corporis Motus & exercitium subinde vehemens instituendum, Vigiliis indulgendum. Sunt etiam, qui tempestivam, eamque non infrequentem Venerem commendant. Alvus quotidie semel aut bis respondeat. Urinæ sufficienter profluant.

itas
ra
uini

Vitium Sanguinis in qualitate duplex est, nimirum tenuitas & crassities nimia illius. Tenuitas à fervore aëris, cibis aromaticis falsis tenuibus copiosis, exercitiis corporis vehementibus, potu liquorum spirituosorum crebro & excessivo, vigiliis nimis producit, & facillè Diarrhœas, Sudores colliquativos, Dysenterias, Hæmorrhagias, aliaque mala excitat, nisi vitium debitis remediis fuerit emendatum. Emendatio autem hæc per incrassantia maximè obtinetur, inprimis quando opiata fuerunt intermixta; in hunc finem post evacuatas unâ alterâque vice primas vias, Cucurbitulas etiam cum scarificatione applicatas, Conserva flor. Rosar. rubr. Tunica, fo-

liorum Myrti, Plantaginis angustifoliæ, Pilosellæ, Conditura radic. Sympb. Baccar. Cynosb. carnis Cydonior. Cornorum, & simil. cum Pulveribus absorbentibus Terræ sigillat. Boli Armen. ppt. Unic. fossil. Cerall. rubr. vel alb. ppt. C.C. vel Ebor. ust. ppt. Crystall. alb. ppt. in usum vocare cum fructu possumus; v. gr.

℞. Conserv. Ros. rubr. ℥lat. ʒiʒ.

Conditur. Cydon. ʒij.

Conf. Hyac. incompl. ʒj.

Bol. Arm. ppt.

C. C. ust. ppt. ana. ʒij.

Syrup. flor. Tunic. q. s.

M. f. Electuar. d. ad Oll. Dosis mane ac vespere magnitudo Nucistæ.

Victûs ratio debita quoque est observanda: conveniunt Cibi sanguinem magis incrassantes, quàm attenuantes, Hordeum, Oryza, Rapæ, Carnes vitulinæ, bubulæ &c. Potus esse potest Aqua chalybeata, Vinum rubellum, decocto Ligni Sassafras leni dilutum. Aëstus aëris, motus corporis vehementiores fugiantur.

Crassities sanguinis nimia à contrariis tenuitati causis inducta, variis obstructionibus Viscerum, Catarrhis crassis, Tussi, Asthmatis, Pleuritidi, Peripneumoniæ, Affectibus soporosis, aliisve ansam præbet, & corrigi potest Remediis blandè incidentibus, attenuantibus, resolventibus, volatilibus, ut plurimum alcalinis, quæ vim adeo habent temperatè calefaciendi, & particulis salino-volatilibus aromaticis, aut oleosis, vel urinosi pollent. Attramen profunt ante omnia, quæ blandè laxant, v. gr.

*Crassities
nimia
sanguinis*

T

℞. Sy-

℞. Syrup. Violar. purpur. vel

Capill. ♀ r. ʒj.

Θis polychr. ʒij.

Ptisan. ordin. vel

Decoct. rad. Gram. Fœnicul. &

Coriandr. ʒvj.

M. f. Potio pro unâ dosi, aliquot haustibus mane aut vesperi sumendâ. Vel Sal polychrestum ad ʒii. per aliquot dies mane ac vesperi in Jusculo non salito, aut vehiculo superiore dari potest. Dein profunt seqq.

℞. Specier. aromat. rosat. vel

Imperator.

dianth. aut

diatr. piper. ana. ʒiʒ.

Radic. Ireos flor.

Sigill. Salomon.

Semin. Fœnic.

Nasturt. ana. ʒj.

Ocul. ʒ. ppt.

Spod. ex Ebor. ppt. ana. ʒiiij.

Sacchar. alb. ʒiiij.

Misc. f. Pulv. subt. d. ad scatul.

Dosis ʒj. vel ʒiʒ. cum vehiculo conveniente.

Vel ℞. Radic. Chelid. no. maj.

Pimpinell.

Fol. Betonic.

Semin. Anis. ana. ʒj.

C. C. phil. ppt. ʒiʒ.

Cinam. elect. ʒiiij.

Cubeb. ʒij.

Mac. ʒj.

Θis volat. Fuligin. vel C. C. ʒj.

Sacch. cand. alb. ʒiiij.

M. f. Pulvis subt. d. ad scat. Dosis ut supra.

℞. Salis volat. oleos. Sylv. ʒvj.

D. ad Vit. Dosis 20. 25. vel 30. gutt.

cum vehiculo convenient.

Vel ℞. Spirit. Cochlear. ʒʒ.

Essent. Trifol. fibr. ʒij.

Zedoar. ʒj.

Misc. detur ad Vitr. Dosis ut supra.

Vel ℞. Spirit. Salis armon. anisat vel

Fœnic. ʒij.

Volat. C. C. ʒj.

Misc. detur ad Vitr. Dosis ut supra.

Vel ℞. Spirit. Sanguin. humani.

volat. Fuligin. ana. ʒij.

M. d. ad Vitr. Dosis 20. ad 25. gutt.

Vel ℞. Essent. carminat. Wed. ʒij.

Imperator.

Trifol. fibr. ana. ʒj.

Misc. detur ad Vitr. Dosis 25. vel 30. gutt.

Vel ℞. Tinctur. ♀n. vel

ʒt. aperit. vel

Corall. ʒiij.

Essent. Zedoar. aut

Galang. vel Cal. arom. ʒiʒ.

M. detur ad Vitr. Dosis ut supra.

Eundem effectum præstant Aquæ destillatæ Nasturtii aquat. vel hortens. Beccabung. Cherefol. Taraxac. Cardamin. Petroselini Macedon. sive Apii selin. Cochlear. Card. bened. Fœnic. Chelidon. major. ac similes, si per aliquot hebdomadas m. ac vesp. ad tres vel quatuor uncias bibantur. Blandè enim spirituosæ sunt tales Aquæ, quarum proin vel una sola, vel plures invicem mistæ hauriri possunt. Similiter conducunt Succi earundem Plantarum expressi, ac filtrati, ad uncias duas per æquale temporis spatium hausti. Egregiæ quoque efficaciæ est Destillatum hippenterorum cum iisdem

dem Plantis institutum, quod mirè Sanguinem crassum attenuat & mundificat. Quæ in Rhæticis montibus scaturiunt *Aquæ salsa* & *Fabarienses*, magna sæpius in hâc sanguinis Intemperie præstiterunt. Denique *Sal volatile Succini*, *Eboris*, *C. Cerv. Viperar.* & simile, vel solum, *ad gr. 5. vel 6. pro dosi*, vel cum *Sale lixiviali Jæniperi*, *Absynth.* *Cichor.* *Aneth.* *Card. bened.* diligenter & crebrò assumtum Crassitiem humorum feliciter tollit. Solent & *Balnea*, vel *Thermæ* qualescunque aliquandiu usurpatæ multum conferre.

CACOCHYMIA sive **INTEMPERIES BILIOSA** est vitium Massæ humoralis, in quo particulæ salino volatiles oleosæ, plus minus acres, præternaturaliter abundant, & hominem datâ levi occasione in Febres acutas, Diarrhœas, Choleras humidas, Iram, vel alias animi comotiones vehementes, Cephalalgiam &c. præcipitant.

Producunt hanc Sanguinis dyscrasiam non solum Ira frequens, sed & aromatici, oleosi, butyrosi, dulces saccharini ac melliti Cibi, Vina generosa excessivè crebrò pota, ac similes aliæ res. Contribuunt huc quoque Temperies nativa biliosa, æstus aëris, Exercitia corporis vehementia, Vigiliæ diuturnæ, usus nimius Spiritus Vini, aut similium Liqueurum spirituosorum. A quibus certè omnibus rebus Sanguis valde tenuis, fluxilis, & particulis sumè mobilibus, spirituosus præditus, Fluidumque nervosum maximè subtile, acre, elasticum, ad

concipiendas phlogoses admodum facile evadit.

Cognoscitur haud difficulter exinde, quòd qui illâ laborant, maximè proclives sint ad concipiendam Iram, aliasque enormes animi comotiones; quòd vigiliis dediti, suis in actionibus prompti, siticulosi, amarori Oris, pulsui celeri & frequenti, calori partium admodum mordaci obnoxii sint. Ut adeo, ni maturè præcaveamus, homo talis promptè in Febrim acutam, Choleram, aliosque gravissimos morbos delabiqueat.

Ad emendandam proin hanc Caco-chymiam curatio specialis & prolixa venit instituenda. Ante omnia videlicet vel Pulvis aliquis, vel Tinctura Bilem præparans dari poterit: v. gr.

℞. *Tinctur. Fri*, vel

Junii, vel *Corall. 3ij.*

Detur ad Vitr. Dosis m. ac vesp. 20. vel 25. guttæ cum Vino, vel Aquâ Card. bened.

Vel ℞. *Elix. Vitriol. Myns. 3ij.*

D. ad Vitr. Dosis ut supra.

Vel ℞. *Elix. propr. Clauderi, aut Crollii 3ij.*

D. ad Vitr. Dosis ut supra.

Vel ℞. *Crem. Fri 3j.*

Θis Absynth.

Arcan. duplic. Myns. ana 3ß.

M. f. Pulv. subt. in 4. dos. æqu. divid. quæ m. ac vesp. sumantur.

Vel ℞. *Fri Olati.*

Θis essential. Card. bened. vel Acetos. vel Rub. id. ana. 3j.

M. f. Pulv. divid. in 4. doses æquales, m. ac vesp. cum vehiculo convenienti sumendas.

Diagnos.

Prognosis

Curatio

Præparatis sic humoribus ad blandè evacuantia est accedendum, & quidem pro re natâ vel Vomitoria, vel Catarthica. Ad vomitum ciendum sequentes in Adultis formulæ sufficiunt; v. gr.

R̄. Crem. Fri vel

Θis essential. Succu Citri gr. xij.
Centaur. minor.

‡ n. diaph. ana. gr. 5.

Fri emet. gr. 2. vel 3.

Misc. f. Pulv. subt. d. ad ch. sumatur mane jejuno stomacho pro dosi, cum regimine diætæ.

Vel R̄. Arcan. duplicat.

Fri Θlat.

Bezoard. min.

Cinnab. ‡ n. corr. ana. gr. 5.

Mercur. vitæ correct. gr. 3.
vel 4.

M. f. Pulv. subt. d. ad ch. pro dosi matutinâ.

Vel R̄. Radic. Asari gr. 25. vel 3ß.

Θis Absynth. 3ß.

M. f. Pulv. subt. pro dosi matutin.

Vel R̄. Oxysacch. emet. 3ß.

Syrup. de Card. bened. 3j.

Aqu. Endiv. 3iiiß.

Cinam. bugloss. 3j.

Misc. detur ad Vitr. pro dosi matutinâ.

Si quis magis indigeat Cathartico, ei sequentium aliquod concedatur.

Vel R̄. Rhabarb. elect. 3iiß.

Crem. Fri 3ß.

Scamon. Rat. gr. ij. iij. vel iiij.

M. f. Pulv. subt. d. ad ch. pro dosi matutinâ.

Vel R̄. Radic. Gramin. Scorzoner.
ana. 3j.

Herb. Agrimon. Mß.

Fol. Senn. opt. mund. 3ß.

Rhab. elect. 3ij.

Crem. Fri 3j.

Semin. Fœnic. 3iß.

Incisis, contusis, & in nodulo ligatis affunde

Aqu. fontan. Vel

Endiv. q. s.

Stent per noctem in loco tepido, postridie mane bulliant parum, Colaturæ 3iiij. adde

Syrup. flor. Persicor. 3ß.

Detur ad Vitr. sumatur pro dosi.

Postea per octo vel plures dies Elixir proprietat. sine acido, vel Clauderi, vel Tinctur. Corallorum aut Antimon. cum Nitro par m. ac vesp ad guttas 20. 25. aut 30. cum Aquâ Cichor. Plantag. aut Endiv. propinabitur. Vel Tinctura Martis cum Succo Acetosell. parata eodẽ modo usurpabitur. Æstivo tempore potus Acidularum qualiumcunque prodest; vel Juscula illarum loco dabuntur, per aliquot hebdomadas, quotidie semel vel bis, in quibus Acetosa, Numularia, Endivia, Oxytriphylion, Lactuca, Portulaca, Pimpinella sanguisorba, Hepatica nobilis vel stellata, Fragaria, aut similes Plantæ hepaticæ bullierint. Commendantur quoque Julepi subinde hausti ex Syrupis Rub. id. Ribium, Berber. Ceras. nigr. de Nymph. Agrest. Violar. purpur. Vel Fructus tales probè maturi interdum comedendi exhibeantur, sive crudi, sive cocti. Amant alii Acetaria è radicibus Cichor. Apii, Herbis Taraxac. Lactuc. Portulac. Endiv. Petroselini Macedon.

cedon. Nasturt. aquat. Borrag. Beccabung. &c. cum vel sine Saccharo accommodata.

In *Diatâ* nocent omnes motus corporis vehementiores, fervor aëris nimius, lucubrationes nocturnæ crebriores, aromatica acriora, dulcia copiosa, purgantia fortiora. E contrario, quæ blandè refrigerant, æstumque sanguinis & spirituum cohibent, probè conducunt.

CACOCHYMIA PITVITOSO-SEROSA est intemperies Massæ sanguineæ, in qua particulæ aquoso-mucoso-crassæ præternaturaliter abundant, atque occasionem variis morbis præbent, v. gr. Catarrhis crassis, Tussi pertinaci, ut plurimum siccae, Hydropi, Asthmatis, Affectibus soporosis, obstructionibus Mesenterii, Hepatis, Renum, Uteri, Cephalalgiae, & similibus.

Oritur plerunque ex Chylo crudiore, minus probè digesto, mucoso, viscido, non acri, sed dulci, quem gastricus ejusdem qualitatis Liquor è Cibis qualitate vel quantitate excessivâ peccantibus in Ventriculo producit. Vbi tamen aëris Intemperies humida, somnus largior, quies corporis excessiva, Alvi segnitie, Vina pendula, Cerevisiæ crassæ &c. suas quoque partes habent.

Cognoscitur è variis hæc Caco-chymia *signis*, in primis autem Faciei pallore, Sensuum heberudine, Actio-num torpore, Alvi segnitie, Urinis crudis, ut plurimum pallidis, sedimento albo, crasso præditis, Somnolentiâ, copiosiore vel Saliva, vel narium Muco, Aurium frequenti Tinnitu, aut ip-

sus Auditionis imminutione, denique & Amygdalarum sive Tonsillarum crebro infarctu, pluribusque aliis signis.

Nisi ergo quis in periculo talium Affectuum impetrandorum versari velit, is remedia ad corrigendam suam Intemperiem aliquandiu diligenter assumere debet. Ante omnia verò ex *Hippocratis* præcepto crudus humor coquendus, præparandus, ac deinceps per Evacuantia tam universalialia quàm particularia eliminandus est. Ad præparationem humoris faciunt Infusa, Decoctaque alterantia & incidentia, Tincturæ item, aut Essentiæ Balsamico-spirituoso-salinae, v. gr.

℞. *Radic. Vincetoxic.*

Apii. Sarsæ parill.

Calam. arom. ana. ʒß.

Herb. Agrimon. vel Majoran.

Betonie. vel Rorismarin.

Card. bened. ana. Mj.

Flor. Calendul. vel Salv.

Genist. ana. Mß.

Semin. Fœnic. ʒij.

Θis Absynth. ʒj.

Cortic. Winteran. ʒiß.

Incis. contusis & nodulo ex sindone illigatis affunde

Vini alb. veteris

Aqu. fontanæ calentis ana. ℥iiij.

Hinc mane ac vespere cyathus ʒiiij. ex-bauriatur.

Vel ℞. *Radic. Aristoloch. rot. ver.*

Asparag. Chinæ.

Carlin. Sarsæ parill.

Diptamn. alb. ana. ʒiiij.

Lign. Sassafras vel Guajac. ʒvj.

Herbar. Agrimon. vel Scabios.

T 3

Alchy-

Prognosis

&

Curatio.

*Alchymill. vel Saturejæ.
Beccabung. vel Melijs.
Anserin. vel Calaminth.
Cherefol. ana. Mj.
Chamædr. Mß.*

Semin. Anis.

Sesel. ana. ʒiß.

Crem. Fri ʒj.

Incis. & contusa coque in Aqu. fontan. ℥ viij. per quadrantem horæ, Colatura dein detur ad Vitr. mane ac vesp. hauriantur uncia quatuor pro dosi horâ unâ ante pastum.

Vel R̃. Rad. Eryngii vel Fœnicul.

Filipendul. vel Levistic.

Ireos Florent. vel Succis.

Pimpinell. vel Rubiæ.

Herbar. Fumar. vel Hed. terr.

Card. bened. vel Hyssop.

Marrub. alb. vel Matric.

Melissæ vel Ocymi.

Summit. Absynth. vel Cent. min.

Baccar. Juniper.

Semin. Ammios.

Coriandr.

Nasturt.

Cinam. elect.

Crem. Fri ana. ʒj.

Incis. & contus. coqu. in Aqu. fontan. ℥ 8. per quadrantem horæ, Colatura detur ad Vitr. Dosis ut supra.

R̃. Tinctur. St. aper. vel

† n. aut Corall. cum Nitr. ʒiiij.

Aqu. Cinam. cum Vin. destill. ʒj.

Misc. detur ad Vitr. Sumantur m. ac vesp. 20. guttæ pro dosi cum præcedenti Decocto, vel alio vehiculo conveniente.

Vel R̃. Ois volat. oleos. Sylv. vel

Spir. Salis arom. anis.

Elix. propr. sin. acid. vel

Claud. ana. ʒiß.

Aqu. Cinam. cum Vin. destill. ʒj.

Misc. d. ad Vitr. Dosis ut supra.

Vel R̃. Elix. propr. Clauder. ʒiiß.

Essent. Absynth.

Zedoar. vel

Calam. arom. vel Galang. ana. ʒj.

Misc. detur ad Vitr. Dosis ut supra.

Ad evacuandum profunt vel Vina medicata, vel Pilulæ aliquoties repetendæ; v. gr.

R̃. Radic. Apii, Angelic.

Fœnic. ana. ʒß.

Herb. Agrimon. Scabios.

Card. bened. ana. Mj.

Semin. Anis.

Dauc.

Bacc. Juniper.

Alkekeng. ana. ʒiß.

Fol. Sen. opt. mund. ʒj.

Agar. trochisc. ʒß.

Rad. Helleb. nigr. vel

Rhab. elect. ʒiiij.

Spic. Indic.

Cortic. Winter. ana. ʒiiij.

Ois Cichor. ʒj.

Incis. contusis & in Nodulo ligatis affunde

Vini albi veter. vel

Cerevis. opt. tenuis & clar ℥iiij.

Aqu. fontan. calentis ℥ij.

Stent per primam noctem in loco calido, v. gr. in Cineribus calidis. Postea quotidie mane Cyathus ʒiiij. vel iiij. exhauriatur.

Si Apozema quis malit non adeo ingratum, ei sequens ordinari poterit.

R̃. Radic. Carlin. Scorzon. ana. ʒiiß.

Herbar. Anserin. Succis. ana. Mß.

Fol.

Fol. Sen. opt. mund. ℥ij.

Passular. minor. ℥℞.

Semin. Fœnic.

Coriandr. ana. ℥ij.

Crem. Fri. ℥℞.

Incisa & contusa coque in Aquæ fontan. q. s. ad remanentiam duarum librarum pond. civ. In Colaturâ postmodum dissolve

Mann. calabr. ℥x.

Clarifica hinc cum Album. Ovor. & admisce tandem Aqu. Cinamom. ℥j.

Detur ad Vitr. Dosis quotidie mane ℥iij. ℥iv.

Pilulæ autem purgantes sequenti vel simili modo parari possunt.

R̄. Maß. Pilul. Cochiar. vel hydrop. Bont.

Extract. cathol. ana. ℥℞.

Mercur. dulc. opt. gr. 12.

Magist. Jalapp. gr. ij. vel iij.

Essent. Abs. q. s.

M. f. l. a. Pilul. no. 14. Inauratæ sumantur pro dosi.

Vel R̄. Maß. Pilul. marocostin. vel Emanuel. vel tartar.

Extract. Helleb. nigr. ana. ℥℞.

Cinnab. ḡ n. correct. gr. viij.

Resin. Scammon. gr. j. vel ij.

Crem. Fri gr. j.

M. f. cum Essent. Myrrh. Pilulæ num. 15. Inaur. d. pro dosi matutinâ, cum regimine diætæ sumend.

Vel R̄. Extract. Panchymag. Croll. Rhabarb. ana. gr. 8. diacarth. gr. 6.

Crem. Fri gr. ij.

Resin. Jalapp. gr. j.

Ol. still. Succin. q. s.

M. f. l. a. Pilulæ no. 13. Inaur. d. ad ch. pro dosi mane sumend.

Loco horum etiam per aliquot dies mane cochlearia unum aut duo plena Syrupi de Cichor. cum Rhab. vel Syrupi macrobii, aut Syrupi domestici, cum 20. vel 30. guttulis Tincturæ ḡ nii, Corallor. ḡ t. aperit. vel Fri & tantillo Aqu. fl. Sambuc. assumi possunt.

His præmissis intus quidem aromatica incidentia & blandè volatilitantia aliquandiu in usum trahenda sunt; quæ inter commendantur Pulveres cephalici cinnabarini, Specificum cephalicum Michaëlis, Radices Aronis, Ireos flor. Sigilli Salomon. Cyperi, Zedoar. Angelic. Semina carminat. Salia volatilia vel simplicia, vel oleosa, Spiritus volatiles oleosi, Spiritus & Essentiæ antiscorbuticæ, & similia. Hinc v. gr. mane ac noctu tempore somni Tabella una vel altera Confectionis Imperatoris completæ, vel aromatica cum Oleo stillat. Caryophyllor. assumi potest; vel

R̄. Conserv. flor. Anth.

Tunic. ana. 3vj.

Aurant. ℥℞.

Conf. Alk. compl. 3j.

Specif. cephalic. Mich. ℥iij.

Syrup. de Cinam. q. s.

M. f. Elect. d. ad Pyxid. mane ac noctu Juglandis magnitudo capiat.

Vel R̄. Tragemat. stomach. simpl. ℥ij.

Rasur. Ebor. 3ij.

Radic. Aron. 3j.

Ireos florent. 3ij.

Confect. Aromat. cum Ol. still.

Caryophyll. 3j.

Sacch. cand. alb. 3℞.

M. f.

M. f. Pulv. subt. d. ad Scatul. Dosis m. ac vesp. 3j. ad 3ij. cum frusto Panis tost. in Vino emollito.

Vel R̄. Aqu. Beton. Fœnic. ana. 3iβ.

Nasturt. aqu.

Cinamom. opt.

apopl. Lang. ana. 3j.

Spir. Salis armon. anis. 3β.

Syrup. Bell. min. 3j.

Misc. detur ad Vitr. mane ac noctu duo vel tria cochlearia capiantur.

Vel R̄. Salis volat. oleos. Sylv. 3iij.

D. ad Vitr. Dosis m. ac v. 25. gutt. in Infus. fol. Thee ac Beton.

Vel sequens Sal volatile oleosum præparari tibi cura.

R̄. ̄is ammoniac pur.

̄ri ana. 3vj.

Ol. stillat. Fœnic.

Anis. ana. 3iβ.

Thym.

Amarac.

Garyophyll. ana. 3j.

Celeriter probè invicem commixta sublimentur in Cucurbitâ vitreâ in Balneo Arenæ, ut inde evadat Sal volatile, quod ex Alembico dein cautè est eximendum, atque in vase probè munito usui asservandum. Hujus autem Salis, si siccum fuerit, grana 8. vel 10. si verò liquidum, gutt. 12. ad 15. pro dosi sumantur.

Extus particularia conveniunt evacuantia, quemadmodum sunt v. gr. Clysteres è Plantis cephalicis incidentibus, detergentibus, emollientibus parati, & crebrò infusi. Item Errhina, aut blandè sternutatoria, v. gr. ex Pulvere foliorum Nicotian. Betonic. Chamædr. Majoran. Thym. Meliss. Flor.

Lil. convall. Salv. Cheiri, &c. parata, & mane ac vesperti naribus immitenda. v. gr.

R̄. Fol. Nicotian. 3ij.

Amarac.

Beton. ana. 3β.

Summit. Anth.

Thym. ana. 3ij.

Flor. Lil. convall. 3iβ.

Radic. Helleb. alb. 3β.

Rasur. Lign. Rhod. 3β.

Ol. stillat. Garyoph. gutt. 15.

Cinamom. gutt. iij.

M. f. Pulv. d. ad Scatul. cui ad meliorem gratiam admisceri possunt pro lubitu

Moschi orient. ver. gr. vj.

Ambr. gryf. Spir. Ros. solut. gr. iij.

Ad Salivam proliciendam vel Fumi Tabaci succio concedenda, vel Radices Angelicæ, Petasitid. Calam. arom. aut similes in taleolas scindendæ, atque masticandæ. Profunt etiã in hunc finem Trochisci sublinguales, v. gr.

R̄. Specier. diair. simpl. 3iβ.

arom. rosat. 3j.

Radic. Angelic. 3ij.

Pyrethr. 3j.

Mastich. elect. 3iβ.

Cinam. optim. 3β.

Cubebæ. 3j.

Piper. alb. 3β.

Ol. stillat. Garyoph. gutt. 6.

Sacch. alb. 3ij.

Mucilag. Gummi. Trag. Aqu.

Ros. fact. q. s.

M. f. l. a. Trochisci d. ad Scatul. Subinde aliqui lambendi.

Tandem Fonticulus in Brachio aut Pede

Pede excitatas, *Balneorum* vel *Thermarum* Δ rearum usus, Potus *Thermarum* v. gr. *Fabariensium Rhetiae*, *Pediluvia* cum incoctione Plantarum cephalicarum profunt.

CACOCCHYMIA SEROSO-SALSA est ea Sanguinis Intemperies, in quâ particulæ aquosæ & falsæ præternaturaliter abundant, sicque *Diathesin scorbuticam*, *Lymphæ effusiones crebriores*, *Catarrhos pectorales falsos*, *suffocativos*, *Tusses*, *Asthmata*, *Raucedinem*, *Dolores Artuum vagos*, *Rheumatismos*, *Oedemata subitanea*, *Diarrhœas cineritias*, *Sudores frequentes*, *salivationē largiorem*, *Tormina Ventris*, & plurima alia excitant, nisi *Cacochymia* fuerit brevi correctâ. *Scorbutica* proin est hæc Intemperies, quæque adeo gignitur & curatur, prout sub titulo de *Scorbuto* fusius indigitatur.

CACOCCHYMIA ACIDO-MELANCHOLICA est Intemperies sanguinis, in quâ particulæ salino-acidæ modò volatiles, modò fixæ ac austæræ, plus minus acres, subinde vappescen-
tiam, aliàs tenuitatem acrimoniam-
que humorum producentes, multum
abundant, atque ita prædominantur,
ut Homines eapropter facile in hyste-
ricam, vel hypochondriacam Passio-
nem, Maniam, ac Deliria melanco-
lica, (sub quibus *Cacodæmon* inter-
dum suas Comœdias ludit) denique
& in Epilepticos motus, atque Con-
vulsiones interdum miras incidant.
Cum autem hæc Intemperies eodem
modo gignatur, cognoscatur, atque
curetur, quo quidem *Affectionem hy-*

pochondriacam produci atque curari
suo loco indigitavimus, hinc Lecto-
rem eo remittimus.

Vt autem brevibus rem comple-
ctamur, humorum præparatio primùm
venit instituenda, quod quidem per
incidentia, aperientia, splenetica &c.
fieri potest, quemadmodum existunt
Radices Raphani rustic. *Fœnicul.* *Apii*,
Pimpinell. *Enulæ*, *Polypod.* *Filic.* *Levi-*
slic. *Carlin.* *Rubiæ*, *Rusci*, *Herbæ Asple-*
nii, *Cuscutæ*, *Nasturtiorum omnium*,
Plantag. aquat. *Beccabung.* *Polytrich.*
Scordii, *Lupuli*, *Fumar.* *Cherefol.* *Tri-*
fol. fibrin. *Melissophyll.* *Agrimon.* *An-*
serin. *Salviæ sylvestr.* *Card. bened.*
Chelidon. minor. *Cochlear. flor.* *Sambuc.*
Calendul. *Summit.* *Centaur. min.* *Se-*
mina Aquileg. *Carvi*, *Cumin.* *Fœnic.*
Anisi, *Apii*, *Nasturt.* & alia, quæ vel
Jusculis, vel sero Lactis, aut Aquæ in-
coqui; vel Vino & Aquæ infundi,
ac ita propinari possunt. Deinceps
Corpus expurgandum: v. gr.

\mathcal{R} . *Extract. Helleb. nigr.*

Lapid. Lazul. ppt. ana. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.

Resin. Scammon. gr. iij. vel iiij.

Elix. propr. Claud. q. s.

M. f. Pilulæ num. 12. Inaurid. ad scat.
sumantur mane unâ vice cum regimine
Diætæ. Vel

\mathcal{R} . *Radic. Gramin.*

Caryophyllat.

Polypodii.

Filicis ana. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.

Herb. Trifol. fibrin.

Cuscut.

Scolopendr. ana. \mathfrak{Mj} .

Card. bened.

Flor. Aquileg. ana. $\mathfrak{M}\mathfrak{ss}$.

U

Semin.

Semin. Anis. 3ij.

Fol. Sen. mund. 3x.

Rad. Rhab. elect. 3ß.

Helleb. nigr. 3ij.

Cinam. elect.

Spic. Indic. ana. ʒiiij.

ʒis Juniper. 3j.

Limat. Chalib. in nod. ligat. ʒiiij.

Incis. & contus. insuantur sacculo ex Sindon. rubr. cui affunde

Vini alb. veter. ʒiiij.

Aqu. fontan. calent. ʒij.

Hinc quotidie mane cyathus uncia- rum trium vel quatuor exhauriatur.

Præmissis purgantibus alterantia, quæ sanguinis massam emendare possunt, aliquandiu in usum vocari debenti in quem finem prodest *Confectio aromatica*, cujus tabella m. ac vesp. comedatur. Vel *Electuarium* quoddam præscribatur. v. gr.

℞. Conserv. flor. Tunic. vel Amarac.

Borrag.

Melij. ana. 3ß.

Nuc. Indic. condit.

Specier. aromat. rosat. ana. 3j.

Corall. rubr. ppt. 3ij.

Matr. Perl. ppt.

Diaphoret. ʒv. vel Dar. ana. 3j.

Confect. Alk. compl. ʒij.

Syrup. flor. Tunic. q. s.

M. f. Electuar. d. ad Pyxid. mane ac vesp. capiatur magnitudo Juglandis.

Vel ℞. Specier. Imperator. ʒiiij.

Ebor. ust. ppt.

Corall. alb. ppt. ana. 3ij.

ʒn. diaphor.

Diaph. ʒial. ana. 3j.

Conserv. fl. Borrag.

Tunic. ana. 3ij.

Conf. Alk. compl. 3j.

Bals. Peruv. opt. ʒij.

Sacch. alb. Aqu. Cinnam. & Rosar. solut. ʒiiij.

M. f. Confectio in Morsulis vel Rotulis majoribus, de quibus una vel altera mane ac vesp. capiatur.

Juxta hæc *Essentia Betonic. Es- sent. Ambr. Tinct. Corall. ʒt. aperit. ʒnii cum Nitro parat. Sal volatil. oleos. Elix. propr. Clauder. & simil. ad guttas 10. 15. 20. m. ac v. usurpari quotidie per aliquot tempus possunt cum Aqu. Borrag. Scolopendr. &c.*

CACOCHYMIA ACIDO-VISCIDA, Veteribus **ATRABILARIA** dicta, est ea Sanguinis Intemperies, in quâ particulæ salino-acidæ austæræ, & aquoso-viscidæ abundant, atque occasionem obstructionibus Viscerum diversorum præbent. In hac Intemperie corporis habitus ad gracilitatem & macilentiam sive siccitatem inclinat, humoresque offæ alicui vappescenti similes evadunt; atque hinc sensuum aliqualis torpor, motuum inertia, perpetua lassitudo, vel segnities in omnibus actionibus producitur. Si quis verò æstus simul corpus prehendit, ille per accidens contingit, propter motum vappescents sanguinis intestinum auctum, progressivum autem hinc inde impeditum. Interim in circulante massâ oleosarum particularum inopia adest, quoniam sulphuræ particulæ depressæ manent, atque ob copiam viscidarum particularum exaltari sufficienter nequeunt. Usque adeo ut à Liquoris gastrici vitio, per Ciborum quantitatem aut quali-
tatem

tatem vitiosam, non secus ac per animi Pathemata, tristitiam nimirum, curas & sollicitudines quotidianas severas, vigilias, exercitia corporis, & lucubrationes nimias, potum denique quotidianum Vini aut Cereviniæ vaporescentis contracto, hujus Intemperiei labes unice sit derivanda.

Signa verò diagnostica sunt symptomata superius dicta, præprimis torpor sensuum, macilentia, motuum segnities, tristitiæ & solitudinis amor, alvi constipatio frequens, cogitationes fixæ, atque in rem unam diu intentæ, appetitus imminutus, & similia. Vnde concludendum est, hanc Intemperiem citò esse curandam, quoniam, etsi non deleteria sit, cum successu temporis tamen in Melancholiam radicatam, in cancriferos & scirrhiferos Viscerum, aut Glandularum Tumores, Atrophiam atque Febrim lentam mutari facile potest.

Curatio autem tota consistit in præscriptione humectantium, incidentium, volatilifantium, Spiritus restaurantium, sulphureo - balsamicas partes exaltantium, & acidum destruentium; quibus scopis ferè satisfaciunt *antiscorbutica, sale volatili tam acrisalfo, quàm sulphureo - balsamico* gaudentia; quibus intermiscenda quoque ea, quæ occulto sale alcalino pollent; subinde etiam addendo anodyna, irritatas nimium fibras demulcentia. Si opus quoque videbitur, purgans melanagogum unum vel alterum concedendum. Hæmorrhoidum ac Mensium fluxus ordinarius, sicubi fuerit supressus, revocari debet, Æstivo tem-

pore pot^o Thermar. *Fabar.* concedend^o; imò simul Balneum usurpandum. De omnibus consule Titulos de *Affectione hypochondriacâ, & de Scorbuto.*

COECITAS, Vid. *Oculorum Cæcitas,*

CALCVLVS est concretio lapidosa in variis corporis partibus è materiâ terrestri & salinâ producta. Non enim Renes tantum aut Vesica urinaria huic malo subjiciuntur, sed in Ventriculo quoque, Secundinis Fœminæ primiparæ, Intestinis, Pancreate, Vesiculâ Fellis, ac Tubulis lymphaticis sublingualibus lapides concretos notavimus. Alii verò Medici adhuc in Cerebro, Pulmonibus, Utero, &c. observârunt. Non ita pridem Viro, quinquagenario majori, Calculus è Virgâ sive Vrethrâ exemptus est, in quâ ad radicem Glandis per 15. propemodum annos sine notabili incommodo obhæsit, donec Julio mense Anni 1708. alius è Vesicâ excussus ad pristinum illum allideret, sicque transire haud potens intolerabiles virgæ cruciatus excitaret. Prior itaque calculus, qui velut innatus erat, non nisi cum labore, & fibrillarum nervosarum irritatione, imò & sanguinei alicujus tubuli dilaceratione eximi potuit, posterior autem sponte dein cum urinâ prodiit, etiamsi major nonnihil priori fuerit deprehensus.

Tota genesis Calculorum, s. Lithogenesis est deducenda proximè è particularum terrestrium accumulatione in Massâ sanguineâ, & factâ hinc depositione earundem atque concretione, sive intra tubulos angustos quarundam

Calculus.

Causa

rundam partium, præcipuè Renum, five intra cavitates ampliores, veluti sunt Vesica urinaria, & Folliculus Felle. Nimirum una vel altera particula ejusmodi terrestris ex humore, cui inest, præcipitata, ob irregularem suam figuram in tubulo, vel partis alicujus cavæ mucò obhærescit, ad quam dein alia atque alia nova accedens quoad superficieularum planitiem priori semper apponitur, firmiterque à circumstantibus aliis qualibuscunq; particulis vel corpusculis apprimitur, sicque per multijugem accessum five continuatam appositionem novarum semper molecularum tandem Calculus majoris vel minoris magnitudinis, hujus vel illius figuræ producitur. Si quæras, quidnam sit, quod tales invicem in Chylo vel Sanguine cohærescere faciat particulas, ut evadant terrestres, sabulosæ, ac lapidosæ? Respondere nonnulli voluerunt, Spiritum esse austerum, acidum, lapidificum; verum rem aliter se habere Sylvius demonstravit, dum ostendit, quod spiritu acidissimo Nitri non raro Lapides dissolvantur, in humano corpore geniti, ac præterea analysis chymica plurimas è Calculis humanis exhibeat salino-alcalinas volatiles, nullas vero acidas particulas. Usque adeo ut probabilius sit, interveniente spiritu urinoso alcalino corpuscula terrestria cum viscidis gelatinosis lentis combinari, & sibi invicem concreescere.

*Materia
è quâ
Calculi
produ-
cuntur.*

Materia proin Calculorum cum Chylo ad sanguineam massam transmittitur; cumque Sanguis eam intra suos poros amplius retinere omnem

nequit, tum ejus moleculæ paulatim sibi invicem concretæ suo pondere è consortio reliquarum decidunt. Chylus eandem materiam adipiscitur ab ingestis Alimentis, multas tartareas five terrestres aut crassas, viscidas, austeras, glutinosas particulas in sese habentibus, copiosè aut frequenter assumtis, hincque ulterius vitiosè dissolutis. Ad vitiosam hanc digestionem five dissolutionem, sub quâ particulæ assumtorum non intimè digregantur, volatilifantur, & in sua principia resolvuntur, contribuit partim ipsorum Ciborum quantitas excessiva, aut qualitas talem volatilisationem respuens; partim Liquor gastricus debitâ volatilitate & activitate destitutus; partim Aër externus, frigore aut æstu nimio chylicationem ventriculi debilitans; partim intemperantia in assumendo potu, Vini imprimis generosi admodum sulphurati, minus defæcati, crassi & valde tartarei, prout Alsatica, Austriaca, Lacotica Bernensia, aliave deprehenduntur, aut Cerevisiæ non absimilis; partim incontinentia in Veneris usu; & si quæ sunt adhuc plures aliæ Causæ procatarticæ, atque occasionales. Vbi non prætereunda est Dispositio quoque hæreditaria.

Materia è quâ Calculi constant, juxta Clariss. Maëzii, Chymici olim Lugduno-Batavi peritissimi, aliorumque experimenta ac ratiocinia, est magna quantitas terrestrium particularum, cum intermixtis multis salinovolatilibus alcalinis, paucioribus acidis, sed iis viscosis, austeris, glutinosis, parci-

*Materia
è quâ
calculi
constan-*

parcissimis sulphureis. Qui chymicum humanorum Calculorum examen instituunt, rem ita se habere ultro deprehendunt; quanquam discrimen observatur in materiâ calculorum, qui in Renibus, Vesicâ urinariâ, Folliculo Fellis, Intestinis, & aliis locis reperiuntur.

Differunt inter se Calculi variè; etenim. 1. Alii sunt majores, minores alii. 2. Alii læves, glabri, alii asperi, angulati; adeoque figuræ multiplicis. 3. Alii albi, alii flavi, rubicundi, cineritii, aliusve coloris. 5. Alii in Renibus, alii in Ventriculo, Intestinis, Vtero, Pancreate, Vesicâ fellis & urinariâ, Cerebro, Pulmonibus, Articulis &c. geniti. 6. Alii in Pueris, alii in Adultis, Viris, Senibus producti.

Quomodo præsentia Calculorum in Renibus aut Vesicâ urinariâ cognosci queat, in sequentibus apparebit. Calculi verò reliquarum partium, cum rariores sint, signis adeo certis deprehendi nequeunt; equidem lancinantem, pungentemq; dolorem sæpe inferunt, sed cum hic etiam à muco salino-acri produci queat, certissimus præsentia Calculi index esse minimè potest. Omnis verò Calculus, ubicunque demum hæret, si major fuerit, funesta symptomata inferre potest, atque etiam frequentissimè solet.

In Curatione generali *Lithontriptica* commendare solemus remedia, de quorum tamen existentia meritò dubitamus; saltem qui durioris evaserunt texturæ Calculi, omnem respuunt substantiæ suæ contritionem, cum Remedia, qualiacunque demum

fuerint, vires suas ad Calculorum loca, integrè deportare nequeant: aut si quæ sunt talia, valdè acria, spirituosâ, corrosiva, Spiritus v. gr. acidi Salis, Nitri &c. eâ quantitate in corpus mittere non audemus, quali quidem necessarium foret ad operationem speratam obtinendam. Qui autem friabiles adhuc atque dissolubiles sunt Calculi, variis remediis conteri, & ad sabulum redigi solent vel possunt; unde diversa à diversis commendata, ac subinde in secretis habita fuerunt. Ejus verò conditionis talia omnia sunt, ut pro subjectorum varietate modò hæc modò illa felicius operentur. Sed & hoc notandum venit, in præscriptione *Lithontripticorum* cautè procedendum esse, ne si fortè conteri nequeat Lapis, per fibrarum irritationem commoveatur, sicque transire ob magnitudinem nesciens membranas, tubulos, nervosque circumstantes dilaceret, & hinc Inflammationem, Gangrænam, atque Convulsiones lethales exciter. Friabilem autem Calculum esse indigitatur, quando sabulum friabile interdum per Urinam excernitur. Si Catalogum *Lithontripticorum* heic inferere vellem, multa haberem scribenda, videantur Auctores de illis; communicabo autem, quæcunque in Praxi omnium potentissima atque efficacissima comperi: v. gr.

Decoctum Lithontripticum.

R̄. Radic. Bardan. Ononid.

Eryng. Saxifrag.

Apii, Rusc. ana. ʒiij.

Herb. Beccabung.

Heder. terrestr. ana. Mj.

Rut.

Rut. murar.
Pimpinell. saxifr.
Summit. Virg. aur. ana. Mß.
Baccar. Alkeken.
Juniper. ana. 3ij.
Semin. Fraxin.
Fenic.
Dauc. ana. 3iß.
Crem. Fri 3j.
Incis. & contus. coque per quadran-
tem horæ in
Aqu. fontan. ℥viii.
Colatura detur ad Vitrum. Dosis m.
ac v. 3ij. vel 3iiij.
Infusum lithontripticum.
℞. Radic. Eryngii.
Peucedan.
Asparag.
Cyclamin. ana. 3ß.
Herbar. Card. bened.
Verben.
Nast. cujuslibet rec. ana. Mj
Flor. Genist. Mß.
Baccar. Juniper.
Semin. Anis.
Petroselin.
Fenicul.
Lign. nephritic. ana. 3ij.
Salis Genist. 3j.
Incis. & contus. affunde Vini alb vet.
℥b. vj. m. ac v. hauriantur 3iiij.
Pulvis lithontripticus.
℞. Ossium s. Lapid Mespilor.
Lapid. Carpion. vel Percar. ppt.
ana. 3iß.
Milleped. ppt. 3j.
Lapid. Spong. ppt. 3ij.
Radic. Eryng.
Saxifrag. ana. 3ij.
Ocul. ʒ. ppt.

Semin Milii Solis.
Fenic. ana. 3iiß.
Sacch. cand. alb. 3ij.
M. f. Pulv. subt. d. ad Scat. Dosis m.
ac v. 3j. cum Infuso fol. Thee vel simili
alio.
Alius.
℞. Lapid. Mespilor.
Cochlear. cum testis ustar. & ppt.
ana. 3ij.
Semin. Nasturt. vel Petroselin.
Ocul. ʒ. ppt.
Testar. Ovor. Gallin. calcin.
ana. 3iß.
Θis Genist. 3ij.
Sacch. penid. 3j.
M. f. Pulv. subt. d. ad. Scat. Dosis
m. ac. v. 3ß. vel 3j.
Alius.
℞. Sanguin. Hirc. ppt.
Radic. Saxifrag.
Semin. Milii Sol.
Anis.
Ocul. ʒ. ppt.
Stercor. Columbin. ppt. ana. 3iß.
Sacch. cand. alb. ad pond. omn.
M. f. Pulvis subt. d. ad Scat. Dosis
3ß. ad 3ii. vel 3j. quotidie semel vel bis.
Tinctura lithontriptica.
℞. Balsam. Sulphur. terebinthin. 3ß.
Essent. Virgæ aur. 3ij.
Ononid.
Beton. ana. 3j.
M. d. ad Vitr. Dosis m. ac vesp. guttæ
20. ad 30. cum vehiculo convenienti.
Vel ℞. Olei stillat. Bacc. Juniper. 3ij.
Terebinth. 3j.
Misc. detur ad Vitr. Dosis gutt. 12.
ad 15. cum Vino Malvatico, vel alio Li-
quore conveniente.

Elixir

Elixir Nephro - cathartico - anodynū.

℞. *Radic. Rhabarb. elect.*

Saxifragiæ alb. ana. ʒiʒ.

Zingiber.

Galang. minor.

Calam. aromat. ana. ʒij.

Semin. Anis.

Fenic.

Dauc.

Agar. trochiscat. ana. ʒʒ.

Baccar. Juniper. ʒj.

Cinam. elect. ʒʒ.

Macis.

Croci oriental. ana. ʒʒ.

Mithridat. Damour. ʒij.

Laudan. opiat. ʒʒ.

Sacchar. cand. alb. ʒʒ.

Incis. & contusis affunde Spiritus Vini vel Cerasor. nigr. rectif. ʒviiij. Stent per aliquot dies in digestionem, postmodum filtrato Liquori adde Vini Malvatici optimi ʒxvj. Stent adhuc per octiduum in leni calore, postea filtra iterum, & usui asserva. Dosis Cochleare unum, duo vel tria ad summum per diem, purgat renes egregie, & nihilominus dolores nephriticos valde lenit. Elixir est mihi, plurimisque apud nos familiare.

CALCVLVVS VESICÆ est concretum lapidosum in Vesicâ urinariâ sensim ex materiâ tartareâ sive terrestri alcalino-salino fixâ productum, atque paulatim novarum particularum accessione augmentatum, induratumque.

Proximè hinc generatur à coagulo tartareo - viscido, alcalino - salino,

quod plerumque è Renibus in Vesicam per Vreteres detruditur, inibi que novarum particularum frequenti appositione, & adglutinatione in Calculum, primò quidem minorem, dein verò sensim majorem concrevit. Subinde etiam vel Calculus unus minor è Renibus delapsus in Vesicâ novo mucò obducitur, sicque in Calculum grandiorē evadit; vel plures minores, sive arenulæ cum Urinâ ad Vesicam deferuntur, & inibi per intercurrentem mucum in unum Lapidem coalescunt. Usque adeo ut talis concretio fiat nunc *lamellatim*, sicut in Calculis purè vesicalibus, ad quam non arenulæ renales, sed mucus vesicæ tartareus contribuit: nunc per *arenulas*, quæ jam in tubulis renalibus concreverunt, & inde ad Vesicam demissæ sunt. *Antecedens* causa est intemperies sanguinis tartarea \ominus ino-alcalino-mucosa, in quâ nimirum particulæ terrestres, crassæ, mucoso-viscidæ, & salino-alcalinæ spirit. p.n. abundant, atque à causis procataceticis adquisitæ cumulataeque fuerunt, inprimis à Victu, copiosas salas, terrestres mucosas, dyspeptas particulas in se fovent, & hinc malè in stomacho digestæ; à Vino itidem \mp reo, minus penetrante, utut aliàs satis generoso, atque spirituofo, quod multum calcis secum ferre dicunt. Quibus adjungimus Vitâ sedentariam, Somnum largiorem, Tristitiam frequentem, Venere nimiam, decubitus diuturnum in Arthritide præsertim, segnitiam in urinâ probè & sufficienter reddendâ, dispositionem denique hæreditariam.

Quod

Quod si minor calculus asperitate suâ sese intra mucum & fibras membranaceas Vesicæ infixit, tum inibi velut in nido dein immobilis recumbit, & adglutinatur, imò appositâ paulatim novâ materiâ tartareâ augetur, & grandescit non secus atque si mobilis fuisset.

Diagnosis.

Signa diagnostica præsentis Calculi Vesicæ ejusque mobilis varia sunt, & quidem si Lapis adhuc minor sit, frequens in Vretrâ pruritus, atque Dysuria producitur, imò inter mingendum sentitur, à Viris quidem in genitalis membri glande, à Fœminis autem in Collo Vesicæ plus minus acutus, pungens aut lancinans, subinde etiam obtusus dolor, ab extremitate Glandis in ipsam Vesicam tendens. Quando autem Æger Vrinam excernere cupit, prius semper membrum fricat aut mulget, quò sic Vrina melius & minori cum labore aut dolore profluat. Si Calculus dein augetur ac major redditur, tum Æger in Inguine aliquod velut pondus persentit, quod deorsum premit, ac simul dolorem quendam in Umbilico propter Vrachim Vesicâ communionem, producit. Vbi verò Calculus non omninò occludit Vesicæ collum, tunc Æger ad frequentem mictionem sollicitatur, etiam si sæpius parum, subinde prorsus nihil mingat, imò interdum Vrina etiam contra Ægri voluntatem guttatim non sine ardente dolore & cruciatu profluat: quamobrem virga non raro tenditur, ac insimul alvus ad deponendum incitatur. Vrina emissâ ferè semper mucum secum fert, Narium

mucosus, interdum & Puri similem, eumque majori vel minori quantitate, qui certissimum solet indicium Calculi vesicalis præbere. Quòd si Æger reclinato corpore jacet, tunc Calculo retro lapso Vrina melius emittitur. Evidentissimum tamè signum præsentis Calculi exploratione chirurgicâ habetur, quâ quidè Operator priores duos digitos Oleo inunctos unum post alterum in Patientis alvum intrudit, atque Vesicam versus placidè adigit, & hinc alterâ manu Inguinis regionem premit, hac enim ratione, si Calculus adest, durum quid sub digitis sentit. Hic explorandi modus in Junioribus & gracilibus certior est, quàm in Obesis, in quibus examen catheteris ope institutum felicius evadit, etenim instrumentum hoc in Vesicam leniter & circumspèctè intrusum, ac postea hinc inde versum, ad Calculum tanquam ad rem quandâ duram (si grandiusculus, mobilis ac liber est, atque ad Collum Vesicæ pondere suo delabitur) facilè allidit, hincq; sensibilem, licèt valde exiguum strepitum producit. Si exiguus fuerit Calculus, tum catheteri facillimè cedit, & ita apprehendi commodè nequit. Si autem adnatus sit internæ Vesicæ superficiei Lapis, tum per plures ibidem annos sine notabili incommodo latere potest; modò ne asper fuerit vel mobilis. Vbi verò idem incrementum considerabile fuit adeptus, & simul asperitate quadam vicinas quascunque nervofo-membranaceas fibras pungere, lancinare, atque sub leni corporis motu Vesicalem mucum defricare incipiat, pergat-

gatque, tum jam frequentes mingendi cruciatus, sæpè cum alvi tenesmo per consensum juncti, oboriuntur, atque in Vrinâ, quæ modò copiosior, & lenior, modò parcior & acrior cum difficultate & dolore, crebroque mingendi ardore profluit, copiam mucoso-purulenti humoris protrudunt. Immobilem hunc, adnatumque Calculum Vesicæ alius vix melius signis cognoscere licet, quoniam sæpissimè neque per digitorum intrusionem in Alvum, neque per Cathetrem in Vesicam immissum deprehendi potest. Cùm autem interdum *Scirrhus* orificii Vesicæ eadem cum *Calculo* symptomata producat, quæritur, quomodo hæc à se invicem dignoscantur? Resp. Difficile quidem hoc esse, sed tamen haud prorsus impossibile, etenim si Calculus immobilis adest prope orificium Vesicæ, aut etiam mobilis, tum ille per Cathetris intrusionem in Vesicam statim tangitur, atque ejus asperitas observatur, quale quid in Scirrho non contingit. Dein in Scirrho catheter difficillimè transmittitur per orificium vesicæ, in Calculo autem facilius, nisi sphincter Vesicæ inflammatus, aut convulsivâ quadam crispatione contractus fuerit. Denique in Calculo subinde Arenulæ prodierunt, dolorque acerbus pungens ut plurimum etiam per consensum ad Virgæ glandem sese extendit; in Scirrho autem symptomata hæc cuncta mitiora existunt.

Quantum ad *Prognosin*, Calculus major quàm ut Vrethram penetrare queat, si per felicem Lithotomiam

non eximitur, ad mortem usque cum frequentibus mingendi cruciatibus retinetur. Credimus autem, homines cum ejusmodi calculo, si asperitate suâ horrendos non pariat dolores, neque Collum Vesicæ crispando obturet, per 12. 15. aut plures annos vivere posse. Quando dictum Vesicæ collum ita constringitur, ut Ægri nullam planè Vrinam emittere valeant, tum intra paucos dies convulsi moriuntur. Si autem stranguria ex Calculo sphincterem Vesicæ perpetim lancinante, ferè continua fuerit, cum Vrinæ mucosæ parcâ & frequenti excretionem, tum Ægri sensim vel hydropicâ vel simplici Tabe cum Febri lentâ consumuntur ac moriuntur. Calculi minores interdum satis feliciter ac citra notabiles cruciatus per Vrethram excernuntur; sæpius verò, præsertim apud Viros in Virgâ obhærent, & immanes dolores pariunt, donec planè exierint.

Differunt Calculi Vesicales non secus ac renales inter se vario modo, nimirum ratione *duritie*, *figuræ*, *coloris* & *magnitudinis*. Imò etiam hoc necessarium est, ut sciat Chirurgus num Calculus in Vesicâ liber ac mobilis sit, num verò quod subinde contingit, internæ tunicæ Vesicæ adnatus. Ac si adnatus est Calculus, isque grandior, tum nec à Naturâ extrudi, neque etiam ullo artificio citra præsentissimum mortis periculum excindi potest.

In *Curatione* alia fiunt præservationis, alia curationis gratiâ. Præservationis ergo homines à Calculis munire possumus iis Remediis, quæ

Diætâ. coagulum tartareum sanguinis intercipere, & præcavere, vel præsens jam promptè dissolvere possunt. Vbi Vi-
tûs ratio in primis convenit, aromati-
cis constans moleculis, & salium fixo-
rum, atque particularum terrestrium
nullum proventum exhibens. Ab-
stinendum ergo ab omnibus valde aci-
dis, Ætis, fumo induratis; à caseo,
pastis farinaceis, ovis induratis, car-
nibus durioribus, &c. Cavendum sibi
ab otio, à nimia & re spiritus exhaurien-
te, à Vinis Freis & calcariis, à Cerevi-
siâ minus probè defœcatâ. E contra-
rio carnes teneriores, olera hortensia
spirituosiora, radices & plantæ anti-
scurbuticæ, Vinum album, tenue, ac
diureticum, vel Cerevisia probè defœ-
cata, clara, & amaricans, vel Deco-
ctum lene Radici, Filicis atque Ligni
Sassaphras vel Guajaci pro potu ordi-
nario per longum tempus usurpentur:
quibus modica corporis exercitatio, &
animus ad lætitiâ semper composi-
tus jungantur. Æstivo simul tempo-
re aliquoties dulcis Aquæ Balneis ho-
mo insideat.

Inter Remedia præservativa com-
mendamus vel *Juscula Herbis antiscor-
buticis* alteratâ, vel *Pulveres* ad con-
cretionem Calculorum in genere, re-
nâliumque in specie præcavendam
laudatos. *Acidulæ* quoque *Sualba-
censes* aut *Thermæ piperinæ* cum regi-
mine Diætæ exacto potæ insignem ef-
fectum præstant. Si coagulum jam
hæreat in Vesicâ, tum id per injectionē
*Liquoris lithontriptici Timæi à Gulden-
klée* resolveretur: præprimis si simul in-
ternè copiosus humor diureticus v.gr.

*Infusum folior. Thée & Betonic. Deco-
ctum Radic. Filicis, Onomid. Liquirit.*
&c. affatim hauriatur, utpote à quo co-
agulum illud magis dilutum & lique-
factum tanto felicius abstergi & excer-
ni potest. Interea subinde Æger five
per *Emulsionem seminis Violarum*; five
per *Syrupum de Spinâ cervinâ ad 3iβ.*
vel 3ij. cum *Aqu. Flor. Sambuc.* pur-
getur. Sed & *Tragema* seqq. quoti-
die capiatur:

℞. *Ocul. 3D. ppt. 3j.*

Semin. Anis. 3ij.

Nasturt. 3j.

Cinam. el. 3iβ.

Cubebæ.

Garyoph. ana. 3ij.

Pulv. fol. Sen. 3iij.

Ætis polychr. 3iij.

Sacch. alb. 3vj.

*M. f. Pulv. subt. d. ad scatul. Do-
sis 3j. quotidie.*

Vel *Elix. propr. Claud. cum Tinct.*
3 ii mixtum ad gutt. xx. in singulis
pastibus sumatur.

Præsente porrò ejusmodi coa-
gulo, aut m. si Calculus minor in Ve-
sicâ hæreat, jubendus est Æger, quan-
tum ipsius vires permittent, vel equi-
tare tantisper, vel pedibus aut in Rhe-
dâ iter conficere, vel sæpius etiam
Balneo Aquæ dulcis insidere, ac præte-
rea liberaliter potare, hincque à potu
Vrinam quantum potest, cohibere,
quo sic auctâ ipsius copiâ deinceps ipse
simul Calculus inter mingendum ex-
pelli possit.

Cùm verò postea Calculus Vre-
thram ingressus est, ac ibidem immo-
tus hæret, omni studio cavendum, ne

in

in Vesicam remeet, sed è contratio statim Patiens Balneo est immittendus, ac eidem haustus *Olei Amygd. dulc.* cum 20. aut 30. guttulis *Ol. Terebinth.* est propinandus, interea digitis ipse Calculus ad Virgæ glandem lubricatâ viâ protrudendus: In hunc finē nonnulli vel *Lac calidum* vel *Ol. Amygd. dulc.* aut *Rosar.* Vrethræ inspergere solent. Quâ ratione, si Calculus non admodum angulosus est, facile elicietur: si verò asper multum & angulo uno vel altero internæ canalis superficiei infixus obhæreat, tum per continuatum *Balnei usum*, simul & *Injectiones Lactis* aut *Decocti* cujusdam *emollientis* Vrethra lubricanda simul & expandenda venit, quo facto lapis tanto facilius, subinde velut in momento, extrudi solet.

Quòd si verò in Glandē nihilominus pertinaciter hæreat, tum aptis instrumentis canalus expandendus, & Calculus extrahendus, inque hunc finem necessitate urgente terebello fistulæ incluso prius terendus. Si tandem longiùs retro Glandem subsistat lapis, nec ullâ arte hinc eximi queat, tum ipsa Virga à latere ubi vasa sanguinea non multum jacent, est incidenda, interea simul filo stringenda Vrethra, ne remeet Calculus, & præputium ita extendendum, ut totam glandem tegat. Factâ autem incisione extrudendus atque eximendus est Calculus, cutisq; remittenda, ut incisum penem integrè contegat, sic enim consolidatio facilius evadet. Quo minùs a. Vulnus hoc in ductu Vrethræ carunculam, vel cicatricem incommodam post se relinquat, sicque Calculos forsan se-

cuturos in transitu præpediat, vel etiam Fistulam difficulter sanabilem excitet, consultum est tubulum quendam argenteum durante consolidationis tempore in Vrethrâ gestare, atque Vrinam per eundem mittere: ipse a. tubulus *Unguento diapompholygos*, cui parum *Balsami Peruviani* mixtum erit, illini debet. Loco Tubi *argentei* alii utuntur Tubulo *cereo*. Interim Vulnus tractandum est sicuti Vulnura Tendinum ac Nervorum, quemadmodum sub titulo de Vulneribus docetur.

Quòd si tandem Calculus major existat, quàm ut è Vesicæ orificio per Vrethram excerni & exprimi possit, tum ultimum liberationis remedium *Lithotomia* audit, quæ institui potest, si Æger non sit ætate valdè gravis, atque debilis, verùm si fuerit adolescens, aut in consistente ætate constitutus, boni insuper habitûs, à Cacochymia omni, præprimis etiam venereâ immunis. Si itidem Calculus in magnitudine non excedat, neque peculiari inclusus membranæ Vesicæ adhæreat: In hisce enim casibus tutiùs à Lithotomia obstinemus, quàm cum Agri pernicio eandem exercemus. *Lithotomia* a. duplici modo institui solet, nimirum vel *per apparatus Instrumentorum minorem* in Pueris, vel *per apparatus majorem* in Adultis.

Ad *apparatus minorem*, qui hodiernâ die non amplius instituitur, nisi in Pueris, non requiritur aliud quid, quàm cultellus incisorius utraque parte acutus, & exercitata Operatoris manus, peragiturque seq. modo: In-

Lithotomia apparatus minor.

vocato Summi Archiatri auxilio Puer, postquam ante aliquot horas *dimidium Laudani opiatum granum* cum *Aqu. flor. Til. & Syrupo Pæon.* hausit, & aliquot ante operationem dies per unum alterumve Purgans, nec non Clyisma reiteratum, benè fuit præparatus, tabulæ in hanc rem commodè adaptatæ imponitur, ita ut supinus jaceat, retro ipsum famulus stat, qui ejusdem axillas firmiter teneat; ad utrumque latus alii famuli hærent, quorum qui ad dextram constitutus est, Patientis manum subtus femur tractam teneat, alter verò à sinistris assistens similiter suâ dextrâ manu Patientis sinistram optimè custodire, aut subter femur firmiter continere, uterque verò simul femora Patientis diducere debet. Quo factò Operator digitum sinistræ manus in Intestinum Patientis rectum trudit, eoque lapidem versus anteriorem partem Vesicæ, sive ad Périnæum deprimat, dumque interea Minister adstans Virgam Patientis unâ manu in sublime attollit, alterâ verò Abdomen deorsum trudit, acutissimo cultello suo, quem juxta reliqua instrumenta & medicamina in parato habebit, Périnæum ad ipsum lapidem usque ita pertundit, ut simul & sphincterem Intestini recti, & musculum Vesicæ intactum prætereat; foramen hinc in Vesicam adactum eo usque ampliat, donec digito in anum intruso Calculum exprimere, aut forcipe cochleatâ, instrumento conductorio, vel cochleari extrahere queat. Hoc feliciter expedito Vulnus curatur, prout in sequentibus adnotatur. Inter operationis actum Ægroto subinde coch-

learia aliquot *Mixturæ antispasmodico-cardiacæ* exhibentur, Naribus verò modò *Spiritus Reginae Hung. sive Anthos*, modò *Balsamus apoplecticus* admoveatur.

Operatio per majorem apparatus hodie maximè usitata seq. in modum instituitur: Æger nimirum post imploratam divini Numinis opem & propinatum *Vini generosi* cum *Laudani opiatum grano*, vel *Theriaceæ celestis granis* 6. permisti haustum, præmissamque debitam, cum Venæsectione, Purgantibus, & Clysmate uno alterove institutam, præparationem Tabulæ nonnihil altæ linteis tectæ imponitur, hinc ad dorsum ejus sternuntur pulvinaria firmiora, quibus tum miser Patiens, tum famulus ipsi sustentationis gratiâ alligand⁹ insidere queat; postea femora Ægri diducuntur, ac à lateralibus Ministris assistentibus fortiter tenentur, ita ut Æger artus sub actu operationis movere, sicque Operatorem impedire nequeat, tibiæ verò retrorsum actæ cum ipsius manibus firmiter colligantur. His præmissis Ægro plura cochlearia *Mixturæ* alicujus *antispasmodico cardiacæ* propinantur, qualis esse potest, v. gr.

R̄. *Aqu. Flor. Til. Acac.*

Borrag. ana. ʒj.

Essent. Opii ʒss.

Syrup. Cap. ʒr. 3vj.

Confect. Alk. ʒj.

Ungul. Alc. ppt.

Dent. Apr. ppt. ana. ʒss.

M. d. ad Vitrum.

Vel R̄. *Aqu. fl. Consol. reg. omn. ana. ʒj.*

Cardiac. offic. 3vj.

Syrup.

Syrup. Pæon.

Semperv. ana. ʒß.

Conf. Hyac. c. ʒj.

Bezoard. min.

Matr. perl. ppt. ana. ʒß.

Cinnab. ʒ n. opt. ʒj.

M. detur ad Vitr.

Naribus frequenter *Balsamus apoplecticus* aliusve admoveatur, temporibusque illinatur vel *Spiritus Anthos*, *Anbaltinus*, aut similis cum linteolo. Vel etiam *Nodulus ex contusis Juniperi Bacis*, *Rutâ*, *Cinamomo*, *Garyophyll. ar.* concinnatus atque *Aceto rosaceo* intinctus Naso applicetur.

Operator verò ante omnia catheterem Vesicæ ita immittat, ut ejus curva extremitas Perinæum versus, ubi incisio est facienda, directâ existat, hinc catheterem Ministrò adstanti committit, eâ conditione, ut eundem ad dictum locum firmiter directum teneat, Operator hinc incisionem versus catheterem in Perinæo facit, eâ cum cautelâ, ne sphincter Ani aut Vesicæ discindatur, qualem discissionem postea Incontinentia urinæ aut fœcum alvinarum sequeretur. Attamen Vultus in Pueris proximè duos, in Adultis verò tres digitos transversos latitudine suâ exæquet, ne foramen nimis parvum evadat ad exitum Calculo concedendum. Incisione peractâ statim Operator intruso speculo foramen ipsius vulneris diducit, ita ut per illud instrumentis in Vesicam penetrare queat. Cathetere hinc è Virgâ exempto vel forcipem vel cochleare Vesicæ immittit, Calculumque sive unum sive plures commodo quocunque modo

extrahit. Priusquam hoc facit, digito in Vesicam adacto Calculi magnitudinem explorat. Quod si enim ille major sit quàm ipsum foramen, tum vulnus non speculo, propter dilationis fibrarum indeque facilè subsequentis convulsionis lethalis metum, sed incisione novâ est dilatandum, hinc forcipe cochleari aculeis intus instructâ lapidis diffractio tentanda, quod ubi succedit, frustra per partes eximenda, ac probè tandem attendendum, ne unus vel alter Calculus in Vesicâ relinquatur.

Quod si autem lapis magnitudinem Ovi gallinacei exæquet, & frangibilis non sit, tum Operatio minimè est suscipienda, quoniam ejusmodi Calculus foramen adeo amplum requirit, quale citra præsentaneum mortis periculum fieri nequit. Vel si operatio facta est, & Calculus ob sui molem extrahi nequeat, tum relinquendus est potius in Vesicâ, & curatio ita instituenda, ut cannulam Æger perpetim Vesicæ intrusam gestet, per quam Urina excerni queat. Operatione finitâ Æger refocillandus est Mixturis supradictis cardiaco-antispasmodicis, & Jusculis optimis. Sabulum dein omne, vel arenulæ, & sanguinis grumuli cochlearis, vel apti alius instrumenti ope adhuc eximi debent, sicque Vesica probè mundanda. Quando Lapis extractus est sabulosus, vel instar Pisolithi, tum plerumque indicium est, nullos alios adesse calculos; si autem politus ille fuerit, sive muco obductus, tunc certum Lithotomi signum esse credunt, ulteriorum

præsentium; qui proin omnes eximendi primâ statim vice, si Ægri vires permittant; si non ferunt, tum cannula Vesicæ immittenda, & postmodum operationis illa penitus est extergenda, deinceps cannula non amplius intrudenda, utpote quæ consolidationem & reunionem divisæ partis impediret. Ad hæmorrhagiam autem Vulneris sedandam ac ulteriorem præcavendam *linthea carpta Albumini ovorum* intincta, atque *Pulveribus adstringentibus* conspersa applicanda, probè attenenddo, ne *Vitriolū, Alumen*, aut simile acidum corrosivum permisceatur. Hinc plumaceolum, Emplastrum, atque compressum figuræ convenientis imponitur, ac denique hæc omnia aptâ deligatione & fasciatione sustinentur. Sedatâ sic Hæmorrhagiâ *Unguentum digestiv. Hildani* cum *Balsamo Peruviano* mixtum singulis deligationibus adhibetur, sed ita, ne quid in Vesicæ fundum delabatur; postea *Emplastrum v. gr. de Spermate Ranarum*, vel *Dialpalmæ*, aut *Album coctum* desuper imponitur, atque insuper applicatur fomentum, quale in Inflammationibus aliàs discutiendis usurpari solet. Nonnulli Chirurghi heic *Lardum cum herbis Scordii. Salv. Beton. Agrimon. Meliss. ut & Myrrhâ, Aloe*, ac *Thure*, *Vino* incoquunt, huicque Decocto immersa expressaque linthea calidè applicant. Quod si Vrina sex vel octo horis post Operationem molesta fuerit, tum Vulnus aperitur, & per illud effluere permittitur, hinc cannula ipsi Vulneri intruditur, ut per eam Vrina exire queat, quâ tamen

non nisi per biduum vel triduum utuntur, donec Vesica probè fuerit mundificata & extersa, postmodum rejectâ penitus cannulâ consolidatio *Balsamo Tolutano* vel *de Copaibâ* absolvitur. Post quamlibet deligationem femora sunt colliganda, ne eadem Patiens in somno fortè diducat, sicque Vulneris consolidationem impediatur.

In Fœminis etsi Vrethra brevior atque amplior sit, quàm in Viris, hincque minores Calculi & Arenulæ facilius excernantur, subinde tamen & illæ Vesicæ Calculo gravissimè molestantur, ita ut is, quando ob magnitudinem per ordinariam viam prodire nequit, *Lithotomiæ* auxilio similiter extrahi debeat. Instituitur autem hæc nunc per minorem, nunc per maiorem adparatum; in minore adparatu pauca adhibentur instrumenta, cum nulla heic incisio fiat; collocatur nimirum Fœmina in Sellâ quadam sublimi, posterius nonnihil recumbente, ita ut natis extremitati Sellæ insideat, hinc genua ipsius in altum, plantæque pedum ad nates sustinentur, diductis postea crutibus catheter exploratorius rectus, Oleo rosaceo vel Hyperici illitus ab Operatore per Vrethram in Vesicam Patientis leniter adigitur, Calculusque sic inquiritur. Cum autem Catheter dictus sinu instructus sit, velut itinerario, dilatatorium instrumentum ejus ductu in eandem Vesicam truditur, ejusque ope post extractum Catheterem Vrethra quantum fieri potest, expanditur, idque sine magnâ difficultate, quoniam satis dilatabilis est, præcipuè si ante operationem Fœ-

mina aliquandiu Balneo emollienti infedit. Dilatatâ sufficienter Vrethrâ instrumentum extrahitur, Operator-que hinc statim duos manûs sinistræ digitos, oleo probè perunctos, in Vaginam Mulieris, aut anum Virginis demittit, dextrâ autem manu Hypogastrium Patientis leniter comprimendo Calculum versus collum Vesicæ blandè protrudit, unde postmodum facile in dilatatam prius Vrethram, nisi grandis nimium fuerit, prolabitur. Quando autem Operator sic Lapidem in Vrethræ canali videt, tum hypogastrium Patientis Ministro cuidam adstanti premendum committit, ipse vero dextrâ manu prehensum unum retro Lapidem adigit, eumque sic extrudit. Hoc feliciter expedito Vrethræ regio tota per aliquot dies sæpè Oleo Rosarum, Verbasci, Violarum, & Axungia porcinâ, aut cervinâ est inungenda, simulque Decocto vinoso Herbarum Alliarie, vel Scordii, Betonic. Meliss. Sanicul. Chamomill. Melilot. Succin. Agrimon. Aneth. Absynth. aut similibus calidè fovenda, donec omnia sano statui sint restituta.

Operatio Lithotomiæ per maiorem adparatum in Fœminâ aliter non nihil quàm in Viro peragitur; nimirum eâ in situm consuetum adaptatâ atque ligatâ, exploratorius isque sinuosus catheter vel conductor per Vrethram in Vesicæ cavitatem mittitur, huic superingeritur Dilatatorium instrumentum, dumque huius ope dilatatio blandè facta est, lanceolâ angustâ, utrinque acutâ à dextris & sinistris incidendum est orificium externum du-

ctûs urinarii, idque nunc magis nunc minus pro diversâ Calculi latentis mole. Hinc lanceola vel scalpellum unâ cum dilatatorio extrahitur, atque de- nuò conductor unâ cum forcipe statim in Vesicam truditur, Calculusque unus, vel plures, si adfuerint, quærentur,prehenduntur & extrahuntur. Liberatâ sic & mundificatâ Vesicâ deligatur Vulnus, & ad consolidationem promoveretur, sicuti paulo superius in Lithotomiâ Virorum indigitatum fuit.

Non caret hæc operatio suis incommodis, dolorifica est, & ut plurimum Urinæ Incontinentiam post se trahit, dum fieri rarissimè potest sine fibrarum Vrethræ & Sphincteris dilatione aut discissione, ob quam dein Vesicæ orificium claudi amplius, vel clausum teneri nequit; fibræ enim rotundæ Sphincteris semel discissæ sanantur quidem, sed ita amplius uniri nequeunt, ut contractionem naturalem præstare valeant.

CALCVLVVS NARIVM est lapidosa concrefcentia materiæ muco-
so-terrestri, in glanduloso-tubulosâ Narium tunicâ collectæ; dolores tandem pungentes, atque lancinantes excitans. Genesin habet cum aliarum Partium lapidibus eandem, per paulatinam nimirum molecularum arenosarum accumulationem ex sanguine circulante, & earundem concretionem atque indurationem subsequentem. Molestus est in suo incremento hic Calculus, dumque prodire nequit brevi, lacerare tandem solet membranulas, quibus includitur, &

*Calculus
Narium.*

ita

ita exulcerare tunicam Narium, imò Ozænam producere valet.

Curatio.

Curatur nonnisi exemptione Calculi, cumque hæc sine membranæ & fibrarum dilaceratione fieri nequeat, statim post extractum lapidem inspergendum est *Vinum calidum*, in quo *Mel rosaceum*, *Myrrha*, *Aloë*, *Sanicula*, *Pyrola*, *Betonica*, *Ulmaria*, *Millefolium* decocta fuerunt. Postquam hoc aliquoties factum, Vulnusque probè extersum est, consolidatio promptè perficitur, si aliquoties *Balsamus vulnerarius* qualiscunque, vel *Peruvianus* cum *Oleo Hyperici* Naribus fuerit inditus.

Calculus
sub Lin-
guâ.

CALCVLVVS SVB LINGVA, est lapidosa concretio in tubulo quodam sublinguali salivali, vel intra membranulas ibidem sitas, ex materiâ terrestri & Sale alcalino-volatili paulatim congestis ac induratis genitus. Mirum quomodo hoc fieri queat? Sed res visa aliis, observataque à me ante viginti annos in Senatore quodam Civitatis nostræ, qui aliquandiu levem quandam sub Linguâ duritiem atque tumorem persensit, sed eum tamē, quousque parum incommodabat, minimè curavit. Dum autem postea increvit, tuberculumque valdè molestum evasit, sibi mederi molestiæ impatiens voluit, id quod Chirurgus solâ expressione Calculi perfecit, raritatem Affectûs valdè miratus, dum primo intuitu Scirrhum esse voluit, eumque in Cancrum abiturum fore metuit.

Causa, &
Curatio.

Concretio ejusmodi calculosa à salivalis Tubuli obstructione sæpè pro-

venit, unde saliva paulatim collecta, excussis particulis aquosis, concrevit, si plurimas particulas tartareas in sese habuerit, quales ex quotidiana Vinorum ingurgitatione, aliisque Diætæ vitiis adipisci potest. Nunquam & intra membranulas sub Linguâ sitas collectio & concretio humoris gelatinoso-tartarei & salino-alcalini fit. Nulla hinc superest alia curandi methodus, quam ut Calculus loco moveatur, & è Tubulo salivali valde dilatato, vel membranulâ, cui inclusus hæret, exprimatur; quod ubi factum est, statim *Oris collutio* cum *Decocto Herbarum Scabios. Brunell. Flor. Malvæ. arbor. Ligustr. Rosar. rubr. in Vino facto*, admixto *Melle rosaceo* aliquoties calidè instituenda, simulque locus eodem *Melle Rosarum* cum *Pulvere Myrrha & Cretæ rubræ* sæpè inungendus.

CALCVLI VEL TOPHI *PODAGRICI*, sunt calcariæ in Articulis digitorum manuum aut pedum factæ concretiones, de quibus sub Titulo de Arthritide actum.

CALCVLVVS VESICVLÆ FEL- *LIS* vel *aliarum etiam Partium* eandem quidem genesin habent, sed non pariter ita cognoscuntur, ac ea propter peculiarem curandi methodum hætenus non impetrârunt. Naturæ res minus probè cognita committitur, atque urgentibus interea symptomatibus remedia convenientia opponuntur.

CALCVLVVS RENVUM est concretum aliquod p. n. lapideæ duritiæ, intra

intra urinarios Renum tubulos, aut glandulas ipsas, à Prearum particularum viscido alcalino-salino muco co-hærentium collectione enatum.

Differunt inter se Calculi tales ratione *duritie*, *figuræ*, *coloris*, & *magnitudinis*. Ratione *duritie* Calculi sunt vel silicei & minimè friabiles, vel molliores & tantillum friabiles, aut saltem magis frangibiles. Ratione *magnitudinis* alius alio major. Respe-ctu *figuræ* maximè diversi sunt, repe-riuntur enim rotundi, oblongi, acu-minati, asperi, læves. Ratione tan-dem *coloris* alii sunt albicantes, alii ci-neritii, flavidiusculi, rubicindu. &c.

Affliguntur heic Glandulæ tubu-lique urinarii, nunc in uno tantum, nunc in utroque Rene; & quidem Af-fectus non Adultis tantum, sed & In-fantibus aut Pueris duorum vel trium, plurium vel pauciorum annorum con-tingit, quemadmodum hoc tum alio-rum, tum propria nos docuit expe-rientia.

Causa proxima est coagulum quod-dam viscido - Preum , intra tubulos renales collectum, quod constat ex pluribus terrestrioribus, & alcalino-salinis particulis, acido Θe fixo, & paucis aquosis atque Preis , inter se arctè & tenaciter junctis, quod è san-guine arterioso secretum renales tubu-los & porulos obstruit, ut adeo in ipso Sanguine materia Calculos proximè componens præexistat, atque eo de-ductæ sint è primis viis, in quibus Cibi assumpti non perfectè digeruntur, sed in Pream massam convertuntur. E *Causis procatarepticis* & maximè remo-

tis ad hunc Affectum contribuunt Vi-ta sedentaria, in primis decubitus supi-nus diuturnus, venus immodica, exer-tia mox à pastu instituta, Vinorum Preorum frequens & nimia ingurgi-tatio, Cibi succi Prei , Θsi , muco-vi-scidi, atque difficilis concoctionis: His adde hæreditariam dispositionem sanguinis ad Calculos producendos. *Diagno-sis.* Calculus Renum subinde diu latitat citra ullum incommodum, quando a. in motum adigitur, tum cruciatus in-de producuntur, dolorque Renum & Lumborum evadit plus minus inten-sus, ad Crus etiam lateris affecti, imò per pedem interdum sese protendens, ac stupore comitatus. Junguntur his frequentes Horrores, Nausea, imò Vo-mitus eo usq; durantes donec Calculus vel ad quietem promotus, vel è Rene per Vreterem in Vesicam depulsus fuerit. Quod si in hoc itinere fortè obhæreat, & Vreteris tunicas à se invicem disten-dat, tum Cruciatus maximè augmentur, & à primo loco semoti nunc aliam re-gionem obtinent, atque versus ingui-na, sub quibus Vesica hæret, tendunt. Contingit hinc frequenter, ut vel in momento Calculus procedat ulterius, & in Vesicæ cavitatem delabatur, quem motum Ægri non obscure per-sentiunt, Medicoque interdum referre nò runt. Sed aliquando diu in Vre-tere hæret Calculus, quando asperita-te suâ spasmodicam illius fibræ con-tractionem inducit, & sic etiam fre-quenter Urinæ transitum impedit: id quod propter communionem non ra-rò simul in opposito Rene & Vretere contingit. Resilit etiam aliquando

Calculus in Pelvim, si transire nequit, tumque dolores Lumborum similiter cessant. Quamprimum autem in Vesicâ sic Calculus hæret, eodem simul instanti Cruciatus omnes cessant, Aegerque se subitò quasi sanatum videt. Mitiô autem in hoc Affectu simul quandoque est laboriosa & ardens, Urina vel pauca in Paroxysmo ob Renum tubulos à Calculorum asperitate crispatis emittitur, eaque ut plurimum tenuis & clara, quæ tamen semoto non nihil Calculo iterum turbata, crassa, fabulosa aut mucosa cum aliquali ardore excernitur; & si asperitas Calculi Vasculum unum alterumve sanguineum dilaceret, sanguis simul cum Urinâ prodibit, tanto is copiosior, quanto majora vel plura vascula fuerint rupta. Dum itaque renales nervuli ac tubuli ab acrimoniâ Calculorum vel à fabulis punguntur, tenduntur & ita spasmo graviori vel leviori affliguntur, tum propinquæ partes nervoso-membranosæ simul afficiuntur, ac ita per consensum alia quoque non minus vehementia symptomata excitant; qualia sunt *Colica convulsiva*, & *hysterica*, tenesmus ani, præcordiorum anxietas, respirandi difficultas, Alvi constipatio, in Glande prurit⁹ & titillationis vel pruriginis alicujus doloris sensus, cum frequenti mingendi desiderio; retractio testiculi ad Os Pubis in latere Renis affecti.

Quomodo ab aliis doloribus discernatur Calculus.

Distinguitur tandè hic *Dolor nephriticus* à dolore *Colico*, quòd in Colicâ dolor sit acutissimus, & supra Renum tractum extendatur, in Calculo a. do-

lor in ipso Rene maneat fixus, ac subinde versus pubem & umbilicum cum spasmo intestinorû expandatur. Dolor colicus plerumque mobilis est, Calculi permanens. In Colicâ potius alvus, in Nephritide Urina cum alvo simul supprimitur. Dolor nephriticus stuporem in Crure producit, & per ureterem in Vesicam imò in glandem ipsam in Maribus tendit, in Colicâ non item. Tandè Colica in sinistro latere plerumque exacerbatur, ob Intestini Coli ibidem angustiam, in Nephritide autem dolor promiscuè modò in dextrum, modò in sinistrum latus extenditur.

Quoad *Prognosin*, Calculus Renum ^{Progn} magnus, nisi conteratur Aegrum mali latentis subinde inscium, ad mortem usque comitatur. Si autem inquietus sit & loco moveri conetur, dolorem valde acerbum affert, mortemque citò inducere valet, Gangrænam, Sphacelum, Convulsiones, subinde & Ischuriam immedicabilem post se trahendo. Vbi minor est & per Vreterem penetrare potest, tum nihilominus subinde una alterave hebdomada præterit, antequam in Vesicam transeat, indeque per Vrethram è corpore extrudatur. Laborem afferunt, & difficultatem sæpè magnam in transitu Calculi asperi & angulosi, minus autem laboriosi sunt læves qui lubricam superficiem, figuramque acutis angulis carentem obtinent. Calculus major & asper, vel plurimæ etiam arenulæ asperæ, non rarò exulcerationem & consumptionem renalis substantiæ, cum Tabe corporis totius inducunt.

Quan-

Quando Calculi sunt friabiles, tum plerumque plures adfunt, qui per parodos incertas novos dolorum paroxysmos cum novorum Calculorum transitu producant.

Curatio requirit methodum aliam in Paroxysmo dolorum, aliam extra ipsum. In Paroxysmo symptomata à Calculo uno pluribusve inducta dolorosa & convulsiva sunt compescenda, atque hinc quoniam nescitur, utrum Calculus sit magnus aut parvus, fortiter pellentia atque irritantia remedia non sunt præscribenda, utpote à quibus præsentem majorem Calculo lethalia excitarentur symptomata; sed conveniunt solum ea, quæ fibras irritatas demulcere, atque laxare, & sic vias Renum expedire ac lubricare possunt; unde *Clysmata*, profunt frequenter v. gr.

℞. Lact. bubul.

Olei Amygd. dulc. ana. ℥vj.

Chamomill. ℥ij.

Sacch. alb. vel Mell. rosat. ℥vj.

M. f. Clyster. tepidè injiciendus.

Vel ℞. Herb. Violar.

Parietar.

Puleg.

Aneth.

Flor. Verbasc.

Melilot.

Chamom.

Pæon. ana. M℞.

Semin. Lin. ℥vj.

Anis.

Bacc. Juniper. ana. ℥ij.

Incis. & contus. coqu. in q. s. Aquæ font. & Lact. Colatur. ℥j. adde

Mell. rutac.

Terebintb. vitell. ov. sol. ana. ℥℞.

Ol. Chamomill. ℥i℞.

M. f. Clyster tepidè inspergendus.

Profunt & ex emollientibus variis in Aquâ decoctis parata, & Terebintbinâ cum Vitello Ovi solutâ, Oleoque Meliloti & Amygdalarum permixta: v. gr.

℞. Decoct. Radic. &

Herb. emoll. ℥j.

Ol. Amygd. dulc. ℥ij.

Terebintb. vitell. Ov. sol. ℥℞.

M. F. Clyisma.

Si Plethora adsit, etiâ Venæsectio in brachio instituatur. Internè præscribuntur Syrup. anodyn. de Alth. Fernellii, Violar. de Liquirit. cum Ol. Amygd. dulc. & Spec. diatragac. frigid. v. gr.

℞. Syrup. Violar. de Alth. Fern.

Aqu. Portulac. Malv. ana. ℥j.

Ol. Amygd. dulc. rec. expr. ℥i℞.

M. d. ad Oll. sumatur cochleatim.

Vel ℞. Aqu. Portulac. Nymph.

Elixir. nephrit.

Syrup. de Liquirit. ana. ℥j.

Essent. opii liquid. ℥℞.

M. d. ad Vit. sumatur cochleatim.

Vel Emulsiones amygdalina cum Semin. frig. atque Papav. alb. affusâ Aquâ Parietar. Malv. Portulac. Chamom. &c. parentur, & haustibus frequentibus propinentur.

℞. Nucl. Persic. ℥ij.

Amygd. dulc. rec. exc.

Semin. Melon.

Cucum. ana. ℥i℞.

Papav. alb. ℥j.

Aqu. Malv. ℥iiij.

Parietar. ℥iiij.

M. F. l. a. Emulsio, d. ad Vit. & sumatur aliquot dosibus.

Vel ordinetur Decoctum nephro-catar-

eticum Foresti & mane ac vesp. ad ℥ij. vel iij. exhibeatur. Novimus aliquos, qui incipiente Paroxysmo statim manipulum *florum Chamomillæ* in *Aquæ fontan* ac *Vini alb. veteris ana.* ℥ij. fortiter coquunt, parum sacchari addunt, hinc per colum trajiciunt, atque bis vel ter de die cyathum unciarum quatuor vel plurium calidè, si fieri possit, exhauriunt. Optimè conducit quoque *Elixir nostrum nephritico-anodynum*, si de eo tria vel quatuor cochlearia plena per diem deglutiantur.

Quando autem hâc ratione crispatura sive spasmodica contractio fibrarum nervearum in Renibus aut Vreteribus est sublata, tum verò jam antinephritica remedia profunt, quæ paulo inferius commendatur in Curatione nephritidis extra Paroxysmum instituendâ: licebit enim tum ea in usum vocare, quæ aliqualem vim pellendi, maximè autem Calculos frangendi aut dissolvendi virtutem obtinent. *Externè* Lumborum regio bis vel ter quotidie inungatur *Oleo Scorp. Matth. Lini, Verbasco. Melilot. Chamom. Amygd. amar. è florib. Slotan. Petr. Semin. Hyoscyam. aut Papav. alb. expresso.* Vel *Cataplasmata*, aut *Epi-themata* simul *emollientia* ex *Herb. Petros. Cherefol. Malv. Meliss. Flor. Chamom. Melilot. Genist. Verbasco. Gal-lij lutei, Linariæ, Sambuc. Bacc. Juniper. &c.* cum *℥. visis* aut *Cochleis* contusis parata applicentur. Hinc *Æger* aliquoties *Semicupio* vel *Balneo Aquæ dulcis* imittatur, cui incocta sint *Vegetabilia emollientia.* Quod si his non obstantibus dolor acerbus urgere

pergat, subinde *Pilulæ de Styrace, de Cynogloss. aut Balsam. Gris tereb. vel Theriacâ cœlesti* exhibentur; ac interea etiam vel *Olei Terebinth. aut Pini guttulæ xx.* mane ac vesp. cum *Emulsione Seminum frigidorum* bis vel ter quotidie propinantur.

In *Dietâ* cum *Æger* crebrò vomat, præter Juscula diversa vix quicquam aliud admittet; caveat autem sibi inprimis ab acidis. Pro potu ordinario concedatur *Decoctum radic. Gramin. Herb. Malv. Heder. terr. Ficuum, Passul. major. exacinat. atque Hord. mund.* Vel *Emulsio* ex *Amygd. dulc. recent-excort. atque Seminibus frig. maj. cum Aquâ Portulac. Lactuc. Matr. aut Potu ordinari. paratâ* detur, vel solum *Decoctum Radic. Filic. cum triplo Rasur. Lign. Sassaphr. paretur, & pro ordinario potu concedatur.* *Æger*, si possit, etiam equum conscendat, & aliquandiu obequiter, ni Calculus credatur esse justo major; vel etiam sese exerceat obambulando, postquam haustum *Olei Amygd. dulc.* assumsit. Sunt qui Lumbos Inguina versus dorsum fricant linteis calidis, aut *Cucurbitulam siccam* Renibus applicant, dein paulo inferius, & rursus aliam atque aliam obliquè ad Inguina usque. Sed dolore summo urgente hoc remedii genus planè inutile est, si non noxium. In usu remediorum autem tandiu est pergendum, donec Calculus in Vesicam fuerit prolapsus, tum verò statim copiosi liquores diuretici sunt potandi, ut sic Calculus quoque è Vesicâ per urethram prodeat.

Extra paroxysmum *Æger* ab hoc Malo

Malo est præservandus, Calculos si qui adhuc adsint, frangendo, dissolvendo, expellendo, ac ita calculosam Renum dispositionem emendando, totamque adeo Massam sanguineam ab intemperie Θ so - Φ reâ liberando vel immunem præstando. Obtineri hæc possunt vel per usum *lithontripticorum* Remediorum; vel potu *Thermarum mineralium*, aut *Aquarum acidularum*, quas inter eminent *Macro-Sualbacenses* ceu omnium \sim uosissimæ; vel denique per frequentes haustus *Aquarum diureticarum* ex *Ononide*, *Raphano rustican*, *Plantag*, *Beccabung*, *Petroselin*, *no*, *Apio*, *Nast*, *Virg. aureâ*, *Trifol. fibrin*, *Flor. Sambuc*, *Baccis Alkekengi* & simil. destillatarum. Verno tempore *Succus Betulæ* per aliquot hebdomadas mane ad \mathfrak{z} vj. hauriri potest; vel eundem in finem *Lac asininum*, aut *serum Lactis caprilli* potetur; vel *Juscula Herbis nasturcinis alterata* per mensem integrum quotidie semel aut bis cum fructu capiuntur. Sub initium Maji haurire quoque licet secretum illud *Timæi à Guldenklee*, quod Renes validissimè expurgare, Calculosq; friabiles dissolvere observavimus, constat a. illud ex *Vino rubro*, *tenui*, *penetrante*, atque *Succo herbarum Anserinæ & Secalis frumenti* invicem mixtis, ac per triiduum mane ad \mathfrak{z} v. vel vj. potis. Singulis quatuordecim diebus ad minimum calculosi Homines de *Pulvere* quodam *antinephritico drachmam integram* cum *Aq. Fragorum* capiant, & hinc per unam vel alteram horam obequitent. Pulveres verò tales pluri mi pro secretis hinc inde habentur &

jaçantur, promiscuè compositi ex *Radicibus Pimpinell. Polypod. Saxifragiæ, Ononid. Eryng. Liquirit. Sigilli Salomonis, Galang. Zedoar. Raphani rustican. Vincetoxic. Gentian. cruciat. Helen. Angelic. Zingiber. Rhapontic.* è quibus etiam *Decocta in Vino albo*, vel *Cerevisiâ optimâ & clarâ* fiunt, sæpiusque potanda offeruntur; *Summitatibus Virg. aureæ, Hyperic. Centaur. minor*; *Seminibus Apii, Petroselin. Sesel. Milii solis, Genist. Nasturt. Anis. Fenic. Coriandr. Cepar. Dauci, Urticæ, Thlaspios, Baccis Juniper. Alkekeng. Laur. Cynosbati, vel harum granulis, Hederæ arbor. Lapillis Mespilor. Putaminibus Nucum jugland. avellandar. Ovorum gallinac. ablatâ pelliculâ intern. Lapidib. Malorum Persicor. aut Armeniacor. Macis, Nuce mosch. Cubebis, Cardamom. Spongiâ Cynosb. ppt. Garyoph. arom. Oculis \mathfrak{D} . ppt. Cochleis cum testis calcinat. Sanguine Cervi aut Hirc. ppt. Lepore juniore in Aceto suffocato, hinc in partes dissecto atque in Ollâ novâ terreâ probè coopertâ in Pulverem combusto, Salib. Abs. Onon. Fabar. Juniper. Nitro vitriolat. &c. plurimisque aliis, quæ variè composita à \mathfrak{z} j. ad \mathfrak{z} ß. in *Vino albo*, vel *Aquâ conveniente* exhiberi possunt per plures dies, vel singulis quatuordecim diebus aliquoties. Sequens mihi familiaris esse solet.*

\mathfrak{R} . *Lapid. Mespilor.*
Putamin. Nuc. avell. ana. \mathfrak{z} ij.
Nucl. Persicor.
Semin. Fenic.
Milii solis.
Nasturt.
Urtic. ana. \mathfrak{z} j.

Ocul. $\overline{\text{D}}$. ppt. z ij.

Baccar. Juniper. D iiij.

Macis.

Cinam. opt. ana. D ij.

Sacch. cand. alb. z ij.

Misc. f. Pulv. subt. d. ad Scat. Dosis D ij.

Alius magis compositus Pulvis inter nostrates usitatissimus, & virtute Renes extergendi laudatissimus, quo etiam ipsemet cum successu sæpius fuit usus, sequens est:

\mathcal{R} . Radic. Calam. aromat.

Helen. Liquirit.

Pimpinell. Zedoar.

Macis ana. z ß.

Herb. siccar. Plantag. aquat.

Card. bened.

Centaur. min.

Lingu. cervin.

Salvia nob.

Virg. aur.

Veronic.

Cinamom. opt.

Garyophyll. aromat.

Radic. Zingib. alb.

Galang. ana. z ij.

Semin. Anis. Cumin.

Fenic. Petroselin.

Rutæ. Urtic. ana. z iiij.

Baccar. Juniper. z vj.

Cubebæ. Cardam. ana. z iiß.

Fol. Senn. opt. mund. z iiß.

Rhab. elect. z iiij.

Sanguin. Hirc. ppt. z j.

Crem. $\overline{\text{F}}$ ri z vj.

Sacch. cand. alb. z xij.

M. f. Pulv. subt. d. ad scatul. Dosis z ß. ad D ij. vel z j. quotidie per aliquot dies; & quidem singulis alternis septi-

manis repetendo, usque dum Renes extersi creduntur. Laudatur etiam Pulvis lithontripticus Marchionum Badensium, cujus sequens nobis extat descriptio:

\mathcal{R} . Lapillorum Mespilor.

Crystall. $\overline{\text{F}}$ ri.

Trochisc. è specieb. diatrag. frig. ana. z j.

Radic. Liquirit.

Ononid.

Semin. Melon.

Milii solis ana. D j.

Genist.

Althææ,

Raphan.

Saxifrag. ana. D ß.

Ocul. $\overline{\text{D}}$. ppt. z j.

Sacch. cand. alb. z ij.

M. f. Pulv. subt. d. ad scatul. Dosis z j. Triduo ante novilunium & plenilunium bis vel ter fumatur cum vehiculo conveniente.

Aliis efficaces deprehensæ sunt sequentes Pulveres.

\mathcal{R} . Radic. Liquirit.

Semin. Melon. ana. z iiij.

Ocul. $\overline{\text{D}}$. ppt. z j.

Cinamom.

Nuc. moschat.

Cardamom.

Semin. Anis. ana. z j.

Sacch. cand. alb. z j.

M. f. Pulv. subt. d. ad Scatul. Dosis quotidie z j. vel D iiij. in Vehiculo conveni-

Vel \mathcal{R} . Herb. Fragar. cum Radic.

Saxifrag. cum Rad.

Semin. Milii Solis.

Petrosel.

Raphan. ana. z ß.

Lapill

Lapill. Mespilor. ʒij.

M. f. Pulv. subt. d. ad scatul. Dosis ʒß. ad ʒj. quotidie semel per 15. dies, Vere & Autumno.

Sunt qui in ingressu singulorum Pastuum octo vel novem avellanas Noces, rubrâ pelliculâ donatas, tantillo Mellis obvolutas præservativi loco comedunt. Alii non sine successu per integrum ferè annum in prandio, nonnunquam & cœnâ simul Vinum medicatum hauriunt: v. gr.

℞. Radic. Eryng. Ononid.

Gentian. cruc.

Saxifragiæ.

Rhabarb. Monach. ana. ʒiß.

Herb. Betonic. Absynth.

Capill. ♀r. ana. Mij.

Auricul. mur.

Lingu. cervin.

Summit. Virg. aur.

Centaur. min. ana. Mj.

Flor. Genist. Miß.

Bacc. Juniper.

Alkekeng.

Semin. Genist.

Fenic.

Dauc.

Apii. ana. ʒj.

Cinam. elect. ʒiß.

Rad. Galang.

Zedoar. ana. ʒß.

Incis. & contus. inde sacculo, cui superaffunde Vini albi veteris vel Cerevisiæ optimæ, & claræ, probè defæcatæ. Mensuras 40. vel 50. Dosis quotidie in pastu ʒiij. vel iijj.

Sequens Liqueur destillatus non inefficax quoque est;

℞. Fimi columbin. Mj.

Radic. Pimpinell. ʒj.

Summit. Virg. aur. Miß.

Semin. Anis.

Milii solis.

Baccar. Juniper. ana. ʒß.

Alkekeng. ʒij.

Incis. & contusis affunde

Vini albi veter.

Aceti Vin. per colum aut Chartam emporet. filtrat. ana. q. s. ad eminentiam quatuor digitor.

Stent per triduum vel quatrimum benè tecta in loco tepido, postmodum destilla. De Liquore destillato cochleare unum vel alterum quotidie assume, cum saccharo, si velis edulcoratum.

Vel ℞. Radic. Vincetox.

Galang.

Calam. aromat. ana. ʒß.

Semin. Melon. ʒvj.

Fenic. ʒiij.

Apii ʒß.

Cinam. elect. ʒij.

Garyoph. arom. ʒj.

Incis. & contusis affunde

Spirit. Ceras. nigr. ʒxvj.

Stent per octiduum in loco tepido, postea adde

Vini Malvatic. optim. ℥ij.

Sacch. cand. alb. ʒvj.

Stent adhuc per decem dies, dein Liqueorem filtra, & usui asserva. Dosis cochleare unum vel duo per diem.

Solent & Cineribus stipitum Fabarum, Ligni quercin. Juniperini, Herbar. Ononid. Virg. aur. Genist. similiumque additis Juniperi Baccis, & Seminibus Petroselin. Anis. sacculo inclusis Vinum album opt. affundere, & singulis pastibus

stibus cyathum eo repletū exhaustire. Multi frequenter assumunt *Balsamum Sulph. anisat. terebinthinat. vel Oleum Tereb. Baccar. Juniper. Pin. dest. vel Spiritum Terebinth. Baccar. Juniper. ad gutt. 10. 15. pluresve in Emulsion. Semin. frigid. major. aut alio Liquore conveniente, vel Jusculo.*

Tandem æstivo tempore usus Thermarum, sive Balneorum præservativi loco quoque commendandus venit. Lumborum regio autem probè testata semper esse debet nunc *Emplastro Norimbergensi Gruberiano, aut Oxycroceo, Diapalma, similive; nunc Pelle leporinâ vel Cati sylvestris.*

GALIGO OCVLORVM. *Vid. Oculorum Affectus.*

CALLVS CVTANEVS, *Vid. Cicatrix.*

CALLVS OSSIVM NIMIVS, *Vid. Fractura Ossium.*

CALVITIES, *Vid. Capillorum defluviū.*

Cancer.

CANCER, CARCINOS, CARCINOMA, est tumor durus, plus minus dolens, lividus, & subinde pluribus varicosis venis præditus. Vocatur etiam *Lupus*, quòd vicinas sensim carnes exedat, & *Noli me tangere*, quoniam acria medicamenta minimè tolerat. Nasci potest in omnibus ferè corporis nostri membris, in mammis præcipuè, labiis, oculis, collo, facie, pudendis, brachiis &c. Præcipuè autem glandulosa loca hujus diri Affectus subjectum evadere solent.

Locus affectus.

Differentia.

Differentiæ Cancris variæ notantur; etenim respectu Partis affectæ

alius *Mammarum*, alius *Labiorum, culi, Uteri* aut alius partis existit. Ratione *apparentiæ* alius *occultus* est, vel non *exulceratus*, alius *manifestus* si *exulceratus & apertus*. Ratione *Symptomatum* alius *maximè dolens* cum *Impothymiis* aut *Vigiliis nimiiis*, alius *mitis*, leviter dolens, vel etiam sine notabili dolore depascens. Ratione *temporis* alius *recens*, alius *inveteratus*, alius *lentè*, alius *citò prodiens*. Ratione *loci* alius *superficialis*, alius *profundus*; sicut & alius *magis unitus & concentratus*, alius *verò dispersus*. Respectu *magnitudinis* alius alio majore existit. Subinde & Cancer totum occupat corpus, sive plurimas similes glandulas, quemadmodum in *Elephantiasi*; aliàs verò unicam tantum partem glandulosam possidet.

Quoad *Diagnosin* Cancer oculi ab initio vix cognosci potest, quia tuberculum est exiguum, ut plurimum indolens, sub *Verrucæ* vel *Ganglionis* ideâ Aëgris imponens. Veruntamen ex sensu punctiōis, & oculi acerbi doloris post applicationem remediū emollientis conjecturari quidammodo ejus præsentia debet; imprimis si tandem in spongiosam vel fungosam abeat substantiam. Verior interim indicia & pathognomonica signa latentis Cancris sunt, quando tuberculo exiguo vixque conspicuo primùm emergit, hinc sensim ad *Pilum Avellanæ*, *Juglandis*, *Pomi minoris* majorisque magnitudinem crescit, atque sic denique in Tumorem mutatur inæqualem, tuberculis quibusdam exuberantem, rotundum, immobilem, pulm-

primitus cuti sanæ concolorem, sed in progressu obscure rubentem, cum dolore nunquam desinente atque noctu imprimis exasperari solito. Malo ulterius procedente varicosæ redditæ venæ, atro humore turgidæ, insignem colorem cœruleum aut variegatum producant; unde Tumor evadit suâ circumferentiâ & formâ *Cancrum*, non quidem *fluviatilem* sive *Astacum*, sed *verum* marinum referens, durâ veluti crustâ Cancrorum instar obductus, & parti subjectæ firmiter adhærens. Dolor proin Cancer in tenui suo principio exiguum & vix notabilem infert, unde negligitur, licet subinde quibusdam cutis punctationibus sese manifestet, tanquam acu factis, quæ verò postea unâ cum tumore augentur, atque inseparabiles fiunt. Si Cancer in procinctu est abiendi in Vlcus apertû, tum calor in Tumore est ingens, dolorq; pulsatorius valde pungens; Venæ in circumferentiâ maximè inflantur, & sese ita extendunt ut formam pedum *Cancri marini* repræsentent.

Exulceratum Cancrum, qui *Carcinoma* propriè dicitur, patefacit, si Cutis fibrillæ prorsus exeduntur, & rumpuntur, Vlcusque hinc fit maximè dolens, cavernosum, tuberculis & carunculis undique pronatis inæquale, sordidum item, ac pus copiosum perpetuò fundens, cum dolore continuo ardente; Dolor autem iste ita percipitur, ac si mille aciculis fibræ pungerentur. Attactu Tumor est durus & obstinatus, interdum etiam mollis: quæque ex illo indefinenter profluit materia, foetida est atque ichorosa,

fluida, subinde flavescens, subviridis, mox nigricans, quandoque saniosa, & cruenta: Labia Vlceris sunt crassa, prætumida, inversa, substantia reliqua Tumoris nonnihil corrupta & inæqualis evadit, quæ dum excrescit strias interdum exerit prominentes ac pendentes. Nonnunquam ob venularum aut arteriolarum erosionem larga sanguinis profusio contingit. Febris semper jungitur lenta, ob nutriendarum particularum corruptionem aut defectum, ex sanguinis turbatâ crassi derivandum: atque sic *Æger* paulatim tabescens post diuturnos cruciatus tandè perfectè consumitur & moritur. Vidimus aliquando hominem sexagenarium per decem pluresve annos Cancro faciei laborantem, Cancer iste primùm levissimo pruriente tuberculo Nasum occupavit, sed malè tractatus tandem exulcerabatur, ita ut natum inde Vlcusculum sine dolore sensim Nasum, Labia, superiorem Maxillam, Oculos, totamque adeo Faciem abominabili cum spectaculo depasceret, ac lentem denique mortem inferret. Verè hic *Lupus* fuit *exedens* quem nulla unquam remedia, imò ne ipsa adhibita Salivatio compescere & abigere poterant.

In *Causis* diri hujus Mali tradendis, non secus atque in definiendâ ipsius Curatione celeberrimi omnium seculorum Medici anxii defudârunt, sed impari cum felicitate. Veteres Artis nostræ Antistites Cancrum occulti veneni alicujus, vel atræ bilis effectum esse pronuntiârunt; Recentiores autem Medici à sale corrosivo

modò alcalino, modò acido, plus minus acri illum derivârunt. Fuit hæc nostra quoque hætenus opinio, dum religioni duximus tantis adversari nominibus, quanta fuerunt *Willisii*, *Sylvii*, *Ettmülleri*, *Wedelii*, *Dolæi*, aliorumve. Cùm autem in Praxi quotidianâ subinde conspiciendi occurrerint Cancri, latentes præprimis, in Hominibus aliàs sanis, temperie bonâ, sanguineâ ac minimè corrosivâ gaudentibus; cùm præterea observarem, Tubercula ejusmodi scirrhocancrofa diutissimè, per plures etiam annos, sine notabili dolore, sine exulceratione potuisse latere, quod aliàs humorum corrosivitati est contrarium; cùm cerneremus porrò, carnem in hoc Morbo non absumi & corrodi, sed potius augeri, increescere, & luxuriare; quando enim citra cruciatum atque dolorem partes sensim exeduntur, depascuntur, atque decidunt, non verum & genuinum arbitramur esse Cancrum, sed Vlcus potius phagedænicum, & exedens, sive Lupum depascentem: cùm denique ad animum revocarem, quamplurimos homines, succis acribus corrosivis præditos, utcunque datâ occasione ab hoc nihilominus Affectu immunes manere, atque Vlcera potius maligna, Inflammationes & Abscessus deletorios, quàm cancriferos Tumores adipisci, sicuti exempla Lue venereâ afflictorum, ac propter humorum corrosivitatem frequentibus Bubonibus, inflammatoriis magis quàm cancrifosis, laborantium testantur, dum interea alius, dulcedine succorum vitalium

instructus, tali morbo prehenditur, si similis fuit occasio nata. His inquam & aliis insuper probè consideratis, paulatim hanc sententiam dubiam pronunciare, ac tandem ceu planè erroneam deferere, remque alio longè modo, & quidem sequenti nobis imaginari cœpimus.

Nimirum supponere prius oportet, à pressione, tensione vel constrictione plus minus validâ membranarum & fibrillarum nervearum dolores varios, magis minusve acerbos oboriri, æquè ac à corporibus, vel corpusculis pungentibus, scindentibus, lancinantibus &c. Comprime enim, tende, stringe nervosarum fibrosarum fasciculum, mox acerbum inde dolorem excitatum iri comperies. Deinde negari nequit, quod multiplici experienciâ probatum, Cancros vix alibi, quàm in partibus corporis nostri glandulosis præcipuè externis excitari. Tertio quoque observatum, frequentissimam occasionem Cancri esse compressionem validam, contusionem aut ictum acceptum, vel duram contrectationem partis affectæ. Tandem sciendum, in Glandulis non tantum esse vascula sanguinea, sed etiam lymphatica atque nervulos, nervosque-membranaceas fibras acuto sensu præditas. Quibus præsuppositis dicimus, à durâ quadam contrectatione, contusione vel ictu, in Mammis, Testibus, aut aliis partibus glandulosis accepto, tubulos ita lædi, contrundi atque distorti, ut hinc in vasculis capillaribus Lympha qualiscunque subsistens in mucum convertatur viscidum, nu-

tritius-

tritiusque succus majori simul quantitate expressus ac parti assimilatus, Tuberculum primò exiguum, cuti concolor efficiat, diu sæpius ita manens, neque dolorem valdè notabilem afferens, si Lympha stagnans & coagulata nullam suarum particularum acrimoniam adeptæ fuerit, si itidem nervosæ fibrillæ non fuerint nimium compressæ aut distortæ. Quando autem corpuscula quædam salina plus minus acuta, utrinque scindentia, sive in lymphâ subsistente, sive in nutritio succo luxuriante extiterint, tum commotis subinde illis, vel etiam in fermentationis motum adactis, punctorius quidam pruritus, aut dolor in Tuberculo per sentitur. Major autem, sensibilior, isque continuus dolor punctorius, aut lancinans tensivus producitur, quando ab iisdem succis nervosæ fibrillæ, tubuli que capillares sanguineo-lymphatici, vel comprimuntur nimium, vel tenduntur atque distorquentur fortiter, adeo ut influus vel transiens perpetim liquor spirituosus, aut sanguineo-lymphicus obstaculum in suo motu inveniat, sicque potentius fibrillas suorum canaliculorum percellat; quæ dein sic præternaturaliter crispatæ & vibratæ, doloris continui sensum inferunt. Phænomenon tamen hoc minus contingit in exiguo adhuc Tuberculo, quàm verò in aucto jam Tumore, in quo succi valde acres redditi motum fermentationis cujusdam subierunt.

Augetur autem Tumor, quando sensim uberores particulæ nutritiæ per emollitos forsan ab impositis me-

dicamentis poros, antea distortos, aut laceratos, exprimuntur, & consueti more assimilantur; quæ dein si forsan occasione temperiei humorum circulantium acido-acris fixioris, acrimoniam adeptæ sint, tanto acerbiorum dolorem efficiunt. Dum autem hoc modo Partis affectæ fibræ elongantur, & quotidie crescunt, induranturque: vel dum simul lymphaticus humor exsudat aut extravasatur, fibrisque laceris ubique mucositæ suâ adglutinatur, tum non possunt non Vasa sanguinea, capillaresque in primis tubuli in ambitu circumcirca comprimi, ac ob sanguinem tardius decurrentem expandi & varicosa reddi. Hoc dum contingit, humores varii in Tumore stagnantes, pro diversâ Circulantis sanguinis constitutione acres redditi, perpetim simul fibras quascunque obvias arrodunt, unde insigniora vasa sanguifera veluti constringuntur, atque spasticis motibus aut vibrationibus crispantur, sicque motu sanguinis magis magisque impedito Varices quotidie majores redduntur, in longum veluti proserpunt, pedesque Cancrorum protensos exprimunt.

Quibus ita stabilitis facile est concipere, quam ob rem Scorbutici, Hypochondriaci, Melancholici, Lue venereâ laborantes, Mulierculæ itidem hysteriæ, & quibus Mensium fluxus crebrò supprimi solet; vel quibus Hæmorrhoides periodicè aliàs fluentes exsiccantur, facilius in hunc Morbum incidant. Potissimam verò ansam præbet Cancro, quando v. gr. mammae Mulierum aut Virginum à petu-

*Cur non
nulli præ
aliis huius
Malo
magis
obnoxii.*

lantibus Viris, five Juvenibus durius contrectantur; aut pectus generosorum Juvenum in Palæstris à pluribus gladiatorum ictibus duris percussum fuit. Ita & testiculi Virorum sub equitatione nimium compressi, aut aliâ injuriâ concussi, vel in Herniotomia negligentius habiti, eidem Malo obnoxii redduntur.

Quomodo
Cancer exul-
ceratur?

Tandem verò cum Tumor five per se plurium mensium, interdum & annorum spatio, five per imposita Emplastra, aut Cataplasmata emollientia adauctus valde est, simulque humores in eo qualescunque stagnantes sub actu quodam fermentationis aciores, imò corrosivi redditii fuerunt, tum sensim tubuli cutanei nimium expansi, aut etiam erosi suam unitatem vel continuitatem amittunt, dissiliunt, atque ita Tumorem ulcerosum reddunt, qui ex laceris undique vasculis purulentam, plus minus aquosam, interdum etiam cruentam, ut plurimum foetentem, saniem continuè fundit. Dolor tum acerbior redditur, quoniam sub hâc constitutione fibræ, membranulæque nervosæ magis lacerae redduntur, tenduntur, atque à succis elabentibus, aciditatem & acrimoniam ab admissione externi aëris longè majorem adeptis, continuè arroduntur, scinduntur, punguntur & crispantur. Labia Ulceris cancrofi callosa, atque dura evadunt, quoniam fibræ circum circa retroiliunt, sibi invicem arctius quotidie incumbunt, compactiusque applicantur. Foetet ut plurimum sanies effluens, quoniam in illâ particulæ sulphureo-sali-

no - volatiles plus justo exaltantur, aurasque externas subtilitate suâ jugiter exhalando petunt. Febris lenta, quæ Cancrum apertum comitatur, originem suam debet sanguinis turbationi, & succi nutritii corruptioni aut diminutioni. Color partis cancrofæ lividus aut cineritius producitur à sanguine capillares tubulos varicosos tardius penetrante, vel etiam à nutritio succo per acidum acre in substantia partis coagulato. Quandoque vermes in Cancro exulcerato apparent, sed rarò tamen, & illi certè non nisi ex ovulis Insectorum inter cibos comestis oriuntur.

Quantum ad *Prognosin* attinet, Cancer tantum non omnis in tenui suo principio haud difficulter extirparetur, modò tum ab Ægrotante curandus offerretur, tum à Chirurgo probè cognoscèretur; verum heic Iliacos intra muros peccatur & extra, Æger leviusculum quod habet malum parvi pendit in principio, ac licet postea Chirurgicam vel Medicam imploret opem, rarò tamen applicari statim solent convenientia remedia, quin potius Scirrhi instar attenuantibus atque solventibus dissipari tentatur; hâc autem methodo non solum oleum & opera perditur, sed & contrarius effectus, nimirum exulceratus Cancer excitatur, quo semel in apicem prodeunte Vlcus insanabile, ac simul maximè dolorosum, lentam, post longum temporis intervallum, cum hecticâ Febre mortem inducens; nisi maturè ferro extirpari perfecte queat. Inveteratus certè, magnus, & exul-

ceratur.

ceratus Cancer, nec non qui in profundis delitescit, malum est penitus desperatum, curationem omnem respuens. Vnde quibus occulti sunt Canceri, non curare melius est, curati enim citius interire, non curati autem longius vitam trahere faciunt. Hippocr. *Señ. 6. Aphor. 38.* Profectò si Cancer adhuc occultus est, neque fibræ carneæ nimium excrecere, atque nervos dolorificè admodum premere; neque salia corrosiva, si quæ adsunt, suum virus deleterium potenter exerere possunt. Si autem exulceratus est idem, tum fibræ dictæ jam ab affluente jugiter succo nutritio valde incrementum, atque ab aëre simul admissa Lympha cancrofi Vlceris vitata maximè exasperatur, ita ut hinc atrocissimi dolores, per totum quandoque corpus sese diffundentes, excitentur, quia plurimæ partes nervosæ simul in consensum trahuntur. Quin imò Cancer omnis, sive apertus sit, sive adhuc occultus, si latiores atque protensas magis radices habeat, quam ut manu simul comprehendi unicaque sectione tolli queant, cultro attingead⁹ non est, quoniam planius & latè admodum radice partibus subjectis, ut plurimum nobilioribus, insidet, hincque sine præsentaneo vitæ dispendio unâ cum parte, cui adhærescit, extirpari nequit. Qui verò minore circumscriptur ambitu, nec dum ad magnum incrementum accessit, sive occultus sive apertus fuerit, tam difficilis extirpatu non habetur, præsertim si nobili parti non insideat, neque magna vasa varicosa habeat, si etiam

tota massa sanguinea corrosivis salibus inquinata non existat.

In *Curatione* attendendum primò ad naturam Cancris; si *latens* is adhuc est, nec dum exulcerari paratus ac ferè recens, tum dissipantia remedia, interna & externa, in usum per aliquod tempus sunt vocanda, sudorque frequens eliciendus, etiam in Laconicis, si aliter fieri nequeat. Cùm autem plerunque tali remediorum genere parum proficimus, palliativa tantùm cura adhiberi solet, talis certè, quâ occulti ejusmodi Cancris exulceratio præcaveri queat. Obtineri hic scopus non rarò potest, quando *Cataplasmata* ex *Herbis recentibus Cicutæ, Solani, Scabiosæ, Geranii Robertiani, Herniariæ, Nicotianæ, Plantaginis, Chelidonie majoris, Aristolochiæ rotundæ veræ, Foliis Sabinae, Rutæ, Sigilli Salomonis cum radice, & similib⁹* parata, in principio Morbi diligenter imponuntur. Adduntur his cum fructu *Cancris fluviales vivi* in Mortario plumbeo contusi. *Merda* sive *Fæces humanæ* impositæ, *Urina hominis destillata*, & applicata sæpissimè, non contemnendum effectum præstant. His adde remedia omnia saturnina externa, quæ sub Pulverum & Emplastrorum formâ omnium commodissimè usurpari possunt. Ita præstans judicamus esse sequens.

R. *Plumbiusti & loti*

Cera alb. ana. ʒj.

Olei rosat. ʒiij.

Croc. orient. ver. pulv. ʒj.

Fol. Solani pulverisat. ʒiij.

Misc. & contunde invicem in Mor-

tario calente per quatuor horas cum pistillo plumbeo, & hinc statim applica.

Amalgama Plumbi & Argenti vivi diligenter admotum vires etiam præstat excellentes in temperando vel edulcorando acido, hincque augmento Cancris præpediendo. *Ranæ virides* dant *Unguentum & Oleum* in hoc morbo bonum; vide *Sennert*.

Interne aliquoties corpus venit purgandum, idque sequentibus *Pilulis*, vel alio remedio simili:

℞. *Extr. Helleb. nigr.* ℞.

Mercur. dulc. opt. ℞j.

Essent. Myrrh. q. s.

M. f. Pilulæ num. 12. Inauratæ sumantur mane omnes unâ vice, stomacho jejuno, cum regimine *Diætæ*.

Deinceps si corpus est plethoricum, *Venæsectio* in brachio vel pede venit administranda. Hinc interne in Pulvere commendantur remedia ex *Millepedibus*, *Viperis*, *Serpentibus* ppt. *Sale volatili* *Fuliginis*, ꝑn. *diaph.* *Bezoard.* *miner. lunari*, *joviali*, *specifico stomachico* *Poter.* *Radicibus Carlinæ*, *Ulmariæ*, *Saccharo Saturni*, *Camphorâ*, *Lacte Lunæ*, & similibus.

Quod si mobilis fuerit talis Cancer occultus, tum incisâ Cure Cancer totus cum radice extrahendus venit, hincque rescindendus, radix *Cauterio* actuali exurenda, vel *Tincturâ amarâ Aloës &c.* destruenda, sicque *Vulnus* persanandum more consueto.

Curatio
Cancris
exulcerati.
Diætæ.

In *Curatione* Cancris exulcerati quoad *Diætam* Aër immunis sit ab omni impuritate, & copiosâ materiâ subtili refertus. Cibi & Potus eligantur sale volatili oleoso, alcalinis-

que particulis turgidi, vitentur hinc omnia viscida, acida, terrestria faleq; fixo corrosivo prædita, loco *Vini* bibatur semper vel *Decoctum traumaticum*, vel *Infusum foliorum Thee*, aut *Potus granorum tostorum Caffè*, *Decoctum Lignorum*; profunt hic etiam *Acidulæ Sualbacenses* aliæve minerales, largius quandoque haustæ.

Quoad *medendi Methodum* attendendum inprimis, ut ratione *indicationis præservatoriæ* salino-acris vel corrosiva, si quæ adest, intemperies massæ sanguineæ, per diuturnū remedium absorbentium atque præcipitantium alcalinorum usum emendetur & corrigatur. Ratione a. *Indicationis curatoriæ* prospiciatur partim de Remediis, scilicet Ulceris quam optimè præcipitantibus atque eluentibus, hinc & ratione *Indicationis mitigatoriæ* dolorem sedantibus. Quocumque igitur in loco Cancer extiterit, in principio *Curationis* lenitivum aliquod ex *Syrupo de Cich.* cum *Rhab.* vel *Fl. Persic.* aut *Flor. Acac.* ad ℥ij. vel iij. exhibere convenit.

Vel ℞. *Mercur. dulc. opt.* ℞j.

Extr. Hell. nigr. ℞.

Cum *Ess. Myrrh. f. Pil. no. 13. d. ad ch.* & sumantur mane pro dosi, aliquoties si opus videbitur iterandâ.

Postea interne statim mane ac vespere propinabuntur vel de *Aquæ destillat. Cochlear. Numular. Solani, Plantag. Beccabung. Nasturt. aquat. & hort. Trifol. fibrin. Ulmar. Apii hortensis* aliusve *antiscorbuticæ* ℥vj. vel viij. Vel de *Jusculo Herbis* similibus alterato ℥bj. Vel de *Decocto Lignorum* cyathus

unus

unus cum *Essentiæ Gramin. Parnass.* atque *Trifol. fibrin.* 3j. Æstivo tempore singulis matutinis commendamus mensuram dimidiam *Acidularum Sualbacensium* cum *Tinctur.* ʒnii. gtt. xxx. vel xl. sic per 5. vel 6. hebdomadas indefinenter continuando. Vel

R̄. *Elix. Propriet. Clauder.* 3ij.
Tinct. Corall. 3iβ.

M. d. ad. V. Dosis 20. guttæ m. ac. vesp. cum Aqu. Solan.

Prodest etiam diuturnus usus *Salium volatiliū oleosorum* qualliumcunque cum *Tincturâ* ʒnii. *Corall.* atque *Croc.* Vel *Pulverum alcalinorum & absorbentium ex Ocul. ʒ. Cochl. ppt. C. C. ust. ʒnio diaph. Bezoard. min. ʒ r. Cinn. nativ. vel ʒnii, Antihæct. Poter. Camph. Sacch. ʒni, & similibus.*

R̄. *Ocul. ʒ. ppt.*
Corall. rubr. ppt.
ʒn. diaph. ana. 3ij.
Sacch. ʒn. 3β.
Cand. alb. ʒij.

Camphor. ʒj.

M. F. pulv. subt. d. ad ch. Dos. singulis trihoris 3β. cum Decoct. Agrimon. & radic. Ulmar.

Quin imò nec ipsum *Terebinthinae* atque *Succini Oleum* ad gtt. xxx. aut xl. quotidie cum *Emulsione Semin. frig.* in usum vocatum formidari debet. Si dolor nimis urgeat, dabuntur interdum *Pilulæ* aliquot è *Theriaca celesti* ad gr. v. vel vj. aut de *Styrace calamita* ad gr. jx. cum *Camphoræ* gr. iij. *Martialia* quoq; remedia minimè sunt contemnenda, qualia existunt *Diaph.*

ʒial. Croc. ʒis aperit. Vitriolum ʒis & Tinctura ʒis aperit. Quibus adde *Elix. Mumia Clauder.* vel propr. sine acido cum *Essentiâ traumaticâ* qualicunque permixtum.

Externè videndum num *Cancer* Externa
Cancr
exulce-
rati cu-
ra. *Chirurgicâ manu per rescissionem* extirpari possit: quod si enim hoc possibile, (licet rarius cum euphoriâ succedat, plerisque Ægris hinc morientibus, nisi *Cancer* minor fuerit,) tum non est expectandum, donec virus cancrosum cum sanguine fuerit plenè communicatum, sed citò & tutò *Cancer*, sive digitis, sive transmissâ acu atque filo prehensus, incisorio cultro radicitus est exscindendus, & si quæ arteriolæ majores fuerint simul dissectæ, sequens inde *Hæmorrhagia* igniti ferri & liquoris pulverisque styptici applicatione sistenda, tandem deligatio pro affecti loci naturâ est accommodanda; interea ipsi Ægro frequenter *Mixturæ cardiacæ*, *Juscula*que optimè refocillantia sunt offerenda. Si *Cancer* extirpari nequeat, tum palliativa solùm cura instituenda, remediis lenioribus externis, non neglecto tamen interiorum usu. In hunc finem omnibus aliis palmam præferunt *Unguentum Saturninum* cum *Camphorâ* *theriacalis camphoratus*, *Essentia è Lignis*, *Geranio robert.* *Aloë*, *Thure*, *Myrrhâ*, & *Mastiche* extracta ac stupæ inspersa. Profunt & *Lotiones* cum *Aquâ phagedænica*, *U Vini camphorato*, *Essentiâ traumaticâ*, *Absynthii*, *Colocynthid.* *Balsam. peruv.* *Aqu. Reg. Hæng.* & similibus institutæ. Sunt qui *Cochleas*, *Bufones*, *Ranas aquaticas*, *Cancros*.

Cancros fluviales comburunt, pulverifatosque Mellis rosaceo & succo folior. Solani aut Tabaci permiscunt & applicant. Alii Vegetabilia recentia v. gr. Geranium robert. Polytrichon, Cherefolium, Solanum, Cochleariam, Cicutam, Plantaginem, Persicariam, Poma putrida, & similia, Essentiis supra dictis conspersa, Ulceri cancroso m. ac vesp. imponunt. Imò multi sine ullo metu in desperato hocce casu confugiunt ad extremum Remedium, nimirum vel Ξrium sublimatum aut precipitatum corrosivum, vel Butyrum $\frac{1}{2}$ nii, vel Pulverem Adanki sic dictum, qui in confectione Aquæ Polonicæ aut Aquæ phagedænicæ fundum petit. Inprimis si permisceantur Pulveres ex Cochleis aut Bufonibus ustitis, vel absorbentibus aliis. Ita extant apud Practicos seqq.

*Rx. Plumbi in tigillo fusi ℥viii .
Mercurii vivi ℥iiij .*

Probè invicem commixtis ac in pulverem redactis adde Mercurii vitæ correct. & optimè, dulcificati ℥℔ .

Ab igne tandem remotis admisce statim

Agarici petræi ℥j .

Croc. ℥tis per se calcinati

Magist. Marcasit.

Æris $\frac{1}{2}$ nii correct. ana. ℥ij .

Fiat super marmorem pulvis impalpabilis mane ac vesp. cancroso Ulceri inspergendus.

Vel Rx. Æris $\frac{1}{2}$ nii optimè dulcificati.

$\frac{1}{2}$ n. diaphoret opt.

Sacchar. Saturni.

Mercurii per se precipitat. aa. ℥iiij .

Lapid. calamin. ppt.

Tut. ppt. ana. ℥ij .

M. f. Pulv. subtiliss. eodem modo usurpandus. Alii usurpant Arsenicum cum Nitro fixatum, rursusque probè dulcificatum, vel Quintam Essentiam Arsenici in Petri Joh. Fabri Myrothecio spagir. descriptam: vel Oleum $\frac{1}{2}$ nii Basilii Valentini: vel Panaceam solutivam alcalinam, cum Magisterio Saturni permistam.

CANIS rabidi Morsus est Vulnus à rabioso iratoque Cane quacunque in corporis parte inflictum & varia paulatim symptomata gravia, nisi promptè succurratur, post se trahens.

Symptomata a. ea præcipuè sunt Dolor, Inflammatio, Febris, Convulsiones, Anxietates, Respirandi difficultas, Hydrophobia, &c. Quæ omnia originem debent non tam Vnitati membrorum, per vulnerationem solutæ, quàm inprimis Salivæ rabidi Canis intra Vulnus immissæ, Saleque suo volatili plus minus acido & feroci, sive sanguini venoso circulanti communicatæ, sive m. in nervosas fibras dilaceratas impulsæ. Hæc enim Saliva particulis suis maximè disproportionatis, & simul velociter agitatæ Sanguinem ingressa, laticis hujus naturalem crasin statim turbare incipit, hincque ulterius sub motu circulationis penetrando totalem dissolutionem molitur, & quidem particulas humorum à se invicem separando, salinas præcipitando, serosasque in fluorem adigendo; Vnde fit, ut sæpe

citra

citra Convulsiones, aut alias Mentis læsiones, *Hydrophobia* cum *Asthmate* & maximis *præcordiorum* *Anxietatibus* enascatur, sanguine nimirum in vasis pneumonicis plerisque stagnante, ita quidem ut Homo à liquidorum assumptione ac deglutitione maximè abhorreat, sibi que de suffocatione inde accelerandâ metuat; etenim Hydrophobi plerumque minore cum labore solida quàm liquida deglutiunt. Quando autem saliva rabiosi animalis communicatur spiritibus in nervorum dilaceratione, tum impetuosum in illis, valdeque inordinatum motum excitat, ac paulo post deliria, convulsionesque lethales producit, nisi efficacibus remediis talia symptomata præcaveantur. Tandem si quietum manet in Vulnere Venenum salivale, tum diu ibi latitare potest, antequam in apicem prodeundo deleterios Affectus suscitet. A Chirurgis verò peritis idem Venenum ut plurimum statim educitur, aut ita præcipitatur ac invertitur, ut postliminò nequeat ullam læso Homini noxam inferre.

Causa itaque *proxima* Morsus non est nisi ipse Canis rabiosus vel iratus mordens; pro hujus autem dentium profundiore aut minùs profundâ in corpus hominis immissione Vulnus nunc majus nunc minus, nunc superficialium & cutaneum, nunc etiam profundius infligitur. Hoc a. Vulnus pro partium diversitate differt, aliud enim est nervosum magis, aliud cutaneum, musculosum, &c.

Causæ verò symptomatum sunt sequentes, & primò quidem *Hydro-*

phobia, quæ non est nisi metus & horror omnium liquidorum, ipsiusque aëris liberioris, cum magnâ anxietate, respirandi difficultate, vigiliis & inquietudine, producit à sanguine intra pneumonica vasa stagnante, sicq; Pulmonis totius inflammatione. Stagnatio a. illa sanguinis ortum debet turbationi atq; dissolutioni, inductæ à Veneno salivali per morsum rabidi Canis vel aliùs Animalis admissio, quod dum suo motu impetuoso situm particularum sanguinis maximè immutat, simul etiam laticem humorosum ita disponit, ut per Vascula minima amplius circulari & transire nequens, undique obhærere & stagnare cogatur. *Anxietas* maximè inducitur ab aëris sufficientis defectu, dum enim vascula Pulmonis à sanguine stagnante multum distenduntur, Vesiculæ simul angustiores redditæ aëris sufficientem quantitatem admittere nequeunt. *Metus* & *horror* adest liquidorum propter imaginationem depravatam, quâ Ægri credunt, se ex admissione talium rerum necessariò suffocatum iri. Depravatur ista imaginatio à Sanguine animalium præternaturali quidem, sed certâ ratione determinato motu intra Cerebri medullam: motum verò istum excitare solet molesta admodum irritatio nervorum pneumonicorum in angustatis Pulmonis vesiculis. *Sitiunt* hinc tales Ægri propter salivæ spissitudinem, indeque oriundam palati siccitatē, sed tamen ob prædictas causas bibere non audent. *Inquietudo* his connexa perpetuo Sanguinem animalium influxui impetuo-

so adscribenda venit. Tandem suffocantur ægri bidui aut tridui spatio, quoniam intra hoc temporis intervallum circulatio sanguinis totaliter inhibetur.

Diagnosis.

Signa diagnostica quod concernit, Morsus ipse Canis rabidi per se facile cognoscitur, imò & scitur haud obscure, utrum Vulnus duntaxat sit cutaneum, aut profundius, & ad musculos, nervos aut ossa penetrans. Vulnus autem tale symptomata post se trahit varii generis, superius ex parte allegata, quorum præcipua cum sint *Hydrophobia* & *Rabies canina*, hinc & taliū Affectuum signa potissimum enodanda veniunt. Cognoscitur *Hydrophobia* exinde, quòd Ægri maximâ semper anxietate torqueantur, ac subinde toto corpore tremant, membrorumq; spasmodicâ calcitrationem patiantur: quod fractâ & quasi tremulâ voce sæpius loqui teneantur: quòd horreant aquas liquidaque omnia sibi propinata, imò & liberum aëris usum. Æger mentis satis est compos, etiam si maximè inquietus sit, & præ anxietate nesciat, quò se vertat; solida quæ sunt, aut crassioris consistentiæ, deglutire nonnihil facilius potest quàm liquida; sitit continuè, sed potum deglutire nequit, nisi cum præsentaneo suffocationis discrimine; Vigiliis excrucietur perpetuis; Tussim etiam habet siccam, ac respirandi difficultatem singulis horis majorem; pulsus adest tremulus, inordinatus, celer & frequens; Facies maximè rubet, aut etiam præ insigni stagnatione sanguinis livet; Cor tremit & palpitat; Uri-

næ sunt turbidæ ac paucæ; alvinæ excretiones vel nullæ vel parvæ. Atque hæc symptomata omnia sequuntur rabiosi Animalis venenum, sanguini duntaxat, & non solum immediatè communicatum. Quòd si autem idem venenum in dilaceratos nervos fuit admissum, tum Æger mente tandem capitur, delirus & rabiosus redditur, hincq; obvios quosque invadere atque mordere studet; febricitat dein simul, liquidâ horret, cæterisque symptomatibus *Hydrophobiæ* prehenditur.

Prognosis hoc habet, quòd Vulnus à Cane rabido inflictum, si non sit profundum, neque etiam venenum fuerit aut solum sanguini communicatum, curari utcunque possit, modò ipsæ venenatæ particulæ è Vulneribus probè & perfectè eluantur & exterminentur. Nisi hoc fiat, solet contingere, ut post unum, duos, pluresve menses, aut etiam años, in Vulnerere curato relictæ veneni particulæ exaltentur, in apricum prodeant, & postquam sanguinis aut solum laticem subierunt, *Hydrophobiam* aut *Rabiem lethalem* suscitent, quales si oboriuntur Morbi, intra tridui aut quadridui spatium Homines vulneratos suffocant, & è medio tollunt. Quòd si eveniat, ut talis Homo rabiosus alium Hominem similiter impetat ac mordeat, tum & hic vulnerat⁹ morbo simili infestari & vitam miserè finire potest.

In *Curatione* Vulnus statim vel *Urinâ*, vel *Lixivio* quodam, aut *Spiritu Vini camphorato*, *Essentiâ theriacali*, *Aquâ muriaticâ*, aut solum *theriacali camphorâ*

camphorato eluendum. In hunc finem, qui falsi Maris sunt Accolæ, ab Animalibus rabidis morsos statim falsæ Aquæ immittere solent, quâ ratione, ob Vulnerum elotionem & venenatæ salivæ dilutionem aut præcipitationem, Homines citius curantur, & felicius ab *Hydrophobiâ* præcaventur. Post elotionem Vulneris statim vel *scarificari* potest locus affectus, vel *Vesicatorium* aliquod imponi, quò sic tanto certius omne venenum extrahi queat. Hoc facto devenire licet ad *digestiva* ex *Mell. rosac. Theriacâ, Ois,* aut *Cochl. ustis, Unicorn. foss. Mastich. Myrrhâ,* atque *Essent. Aloës* concinnanda, & singulis deligationibus imponenda, desuper applicando semper *Empl. Diapalm. vel magnet. Ang. Sal.* Sed Vulnus ita tractandum est, ne citò nimis sanetur & Cicatrice obducatur. Quòd si Inflammatio simul præsens sit, eadem discutiaturo imposito *Fomento* ex *Spiritu Vini camphorato, Spiritu carminativo* quocunq̃ue, *matricali Blancardi, Aq. Calc. viv.* aliisve in Inflammatione commendatis. Internè statim valida *diaphoretica* & *alexipharmaca* sunt exhibenda, v. gr. *Potio* componi poterit ex *Aq. Flor. Samb. Card. ben. Succ. Burs. pastor. cum Mixt. simpl. & nio diaph. Bezoard. min. Ocul. O. C. C. Spiritu* quocunq̃ue *volatili theriacali, &c.* A Vino est abstinendum, ejusque loco *Decoct. anti-febr. diaphor.* præscribendum; *Alvus* respondeat; *Animi passiones* fugiendæ; ab *acidis Ois*que *Cibis* maxime desistendum.

CAPITIS DOLOR, vid. *Cephalalgia.*

CAPITIS HYDROPS, vid. *Hydrocephalus.*

CAPILLORVM DEFLUVIVM est affectus cutaneus, quo pili Capitis aliarumve partium defluunt. Vocari solet aliàs *Alopecia*, ac si in capite contingat, *Calvities*, *Area*, aut *Ophiafis*.

Pars affecta quidem est Cutis totius corporis pilosa, sed imprimis tamen ea, quæ in Capite existit. *Pars affecta.*

Pro *Causâ proximâ* adgnoskitur succus acris, radices pilorum in poris cutaneis erodens. Ad cutim autem præcipitatur talis humor ab internis partibus per circulationem sanguinis ex arteriis. Hinc in Febribus hecticis, ubi massa sanguinea acrior est reddita, ut & in Febribus malignis, Cephalalgiis item longioribus, in Tinea Capitis & Leprâ aut Elephantiasi, Affectus hic est frequens. *Externæ* etiam causæ subinde accedunt, prout sunt *Remedia psylotra*, quæ capillorum Defluvium procurant. Quandoque etiam conformatio pororum cutaneorum Capitis apud nonnullos talis est, ut inde pili emergere & prodire nequeant; hinc aliqui vel solâ Naturâ ad Calvitiem sunt dispositi. *Causa proxima*

Quoad *Prognosin* ipsa Calvities nihil peculiare denotat: neque etiam post arduas Febres obtingens Pilorum defluvium aliud quid dicit, quàm radices pristinorum Capillorum esse intortas, exsiccatas, novosque succedentes pilos suo priores loco excutere; *Prognosis*

cutere; non secus atque in Pueris notamus ante septimum annum primos dentes à novis succrescentibus extrudi. In Hecticis contingens pilorum defluvium mortis prodromus esse solet.

Curatio.

In *Curatione* notandum, Calvitiem nativam esse incurabilem. Quod verò aliàs à succis acribus, sive post morbos malignos, sive extra morbos internos, per defectum succi nutritii, capillorum Defluvium obtingit, curari illud, vel etiam præcaveri potest, si ante omnia *purgans* aliquod præscribamus, hinc verò externè *Lixivium* adhibeamus ex *Absynth.* *Abrotano*, *Nicotian.* *Capill.* $\frac{1}{2}$ *ris Lavend.* *Organ.* *Alth.* *Melilot.* juxtaque simul *Oleum myrtinum* & *absynthinum* cum *Cinere Apum* aut *Muscarum* inungamus. Sunt qui *Emplastrum* è *Muscis* contritis, *Terebinthinâ* cum *Vitello Ovorum* solutâ & cineribus *Limacum* loco prius panno aspero fricato applicant. Profunt & in *Linimentis* *Olea Juniperi*, *Spicæ*, *Succini*, *Axungiae Cuniculi*, *Cervi*, ut & *Cinis cortic. Avellanarum*, *Cinis* item *Murium* cum *Melle*, *Pinguedo* è *Ranis viridibus coctis*, præmisso *Lixivio* ex ipsarum *Ranarum cineribus*; quale remedium non solum in Leprosi, sed & in Aurifabris ab Argento vivo calvis factis, capillos producere valet.

CARBVNCVLVS, vid. *Anthrax.*

CARCINOMA, vid. *Cancer exulceratus.*

Cardialgia.

CARDIALGIA, vel CARDIOGMVS est magna anxietas præ-

cordiorum cum dolore ut plurimum gravativo vel distensivo Ventriculi, oriunda ab orificiorum illius, subinde & Diaphragmatis muscutorum spasmodicâ contractione.

Quanquam autem stomachi orificia, tam superius quàm inferius, maximè heic affici videantur; anxietas tamen simul præsens, eaque non rarò cum respirandi magna difficultate conjuncta, indicium præbet, ipsum Diaphragma quoque per consensum affici atque convelli.

Plura hinc existunt Symptomata, quæ hujus Morbi præsentiam indicant; inter signa autem pathognomonica recensentur dolor circa regionem Ventriculi gravativus, nonnunquam rodens ac tensivus, ac simul dorsi regionem inter scapulas, ubi Oesophagus affixus est, occupans; anxietas præcordiorum magna, cum respirandi difficultate plus minùs graviter affligens, ut subinde Ægri ferè metuant suffocari. His junguntur nunc hæc nunc illa simul accidentia, velut sunt distensio regionis Ventriculi, quando à flatibus, neque supra neque infra erumpere valentibus, nimium expanditur; nec non Anorexia, Nausea, Vomitus, Vertigo, Ructus, Singultus, Lipothymia, Convulsio. Durat malum quandoque per unam vel alteram tantum horam, nonnunquam per plures etiam dies: quando scilicet remedia minùs convenientia in usum adhibentur, vel bona medicamina tardius operantur.

Producitur hæc gravis Affectio immediate non nisi à spasmodicâ fibra-

brarum Stomachi nervearum corrugatione, quâ ejusdem ambo orificia plus minùs arctè constringuntur, ac ita exitum flatibus, utrinque forsan erumpere nitentibus, præcludunt: unde fit, ut non rarò ab iisdem vaporibus flatulentis Stomachus admodum distendatur; vel etiamsi hoc non contingat, saltem nervosa tunica illiusdem dolorificè crispetur seu contrahatur, hincque simul vicinos musculorum Diaphragmatis, Pulmonis aut Thoracis villos nerveos in consensum trahat, unde respirationis organa in suo statim motu naturali impediuntur. Quando autem hæc spasmodica crispatio usque ad medium Ventriculi procedit, tum simul nausea & vomituriendi conatus, imò Vomitus ipse, si Oesophagus laxetur, subsequuntur. Corrugatio ista nervorum originem ferè debet humori alicui acido-austero-acri, qui sub cruditate pituitoso-viscosâ delitescens fortè tunicis Ventriculi obhærescit, easque continuè suâ arrimoniâ arrodit. Tanto autem certius ejusmodi humor suum effectum producit, quando simul fortè ab assumpto Cibo aut Potu inconveniente ad talem turgescientiam fuscitatur, sub quâ illa salia acria fortiùs in nervosos tubulos impingi possunt. Colligitur Ventriculi cruditas tum à cibis dyspeptis ac flatulentis, in partem acido-austera ac flatulentam haud difficulter abeuntibus, tum ab animi pathematibus enormibus, tum à motu vel quiete corporis nimia, aliisque causis procatarepticis, chylicationis negotium valdè perturbantibus.

Tandem Venena assumpta, Bilisque ardens in Ventriculum effusa, ob particularum acrimoniam rodentem hoc malum simul excitare valent.

Quoad *Prognosin*, Malum hoc *Prognosis* minimè est contemnendum, etsi enim absolutè quidem non sit lethale, attamen, si diutiùs duret, atque convulsionem post se trahat, vel Ægrum brevi suffocare, vel funestum alium Affectum producere valet. Diu tamen non durat, modò remedia debita statim à Medico perito quærantur & in usum vocentur. Febris acutis & Dysenteriis malignis, Variolisque superaccedens hic Affectus, cum ardore præprimis & singultu, funestus est, atque vel cum convulsionibus, vel cum syncope ad mortem terminatur. Si Ventriculus Lumbicis simul scateat, lethale quoque indicium præbet. Si Febris absit, & Ventriculus à materia causticâ non fuerit inflammatus, tum periculo res vacat, exhibito enim vomitorio malum plerumque tollitur, utcunque etiam periodicum extiterit. Mutatur quandoque in Febrim quartanam, observante Horstio *lib. 1. Obs. 13.* etiam in *Tertianam Febrim*, teste Dolæo; & ex nostrâ observatione non rarò in *Ictericum*, cujus tum prodromus existit.

In *Curatione* hujus Morbi si absue- *Curatio* rit Febris, statim præparans aliquis pulvis vel per se, vel sub formâ Boli exhibeatur, qui materiam Ventriculi morbificam incidere, ejusque acrimoniam invertere, ac præcipitare queat; unde sæpiùs Cardialgia vel in momento tollitur, præsertim quando

carminativo - anodynum Remedium
statim usurpatur, quale est v. gr.

℞. Ocul. ☉. ppt.

‡ n. diaph.

⊖ is Absynth. vel Aneth. vel
Cent. min.

Cinnab. nat. opt. ana. gr. vj.

Ol. stillat. Carv. gutt. ij.

Laud. opiat. gr. j.

M. f. Pulv. subt. d. ad ch. pro dosi
statim exhibendâ. Vel

℞. Conchar. ppt.

Ebor. ppt.

Corall. rubr. ppt.

⊖ is Rutæ ana. gr. v.

Flor. Sal. arm. hæmat. gr. iij.

Ol. stillat. Menth. gutt. ij.

Laud. opiat. gr. j.

M. f. Pulvis pro dosi. Vel

℞. Elect. diascord. Frac. vel

Theriac. Andromach. 3j.

Ocul. ☉. ppt. 3j.

⊖ is Centaur. min. 3℞.

Ol. stillat. cortic. Aur. gutt. iv.

M. f. cum Saccharo Bolus statim su-
mendus.

Simul tamen *Mixtura* quædam
antispasmodico - carminativa, quæ &
Spiritus nimium concitados compe-
scat, & Fibras irritatas demulceat, co-
chleatim subinde exhibenda venit;
v. gr.

℞. Aqu. Hyssop.

Fœnicul. ana. 3j.

Ocym.

Puleg. ana. 3℞.

Syrup. Cortic. Aurant.

de Menth. ana. 3iij.

Liqu. Nitr. fix. 3ij.

Spir. Sal. arm. anis. 3℞.

Essent. Opii liquid. 3℞.

Elæosacch. Anis. 3i℞.

M. d. ad Vit. Singulis semihoriis co-
chleare plenum exhauriatur. Vel

℞. Aqu. Meliß.

Fœnic. ana. 3j.

Matricar.

Cinam. ana. 3℞.

Syrup. aperit. Minder. 3vj.

Essent. carminat. Wed. 3j.

Spirit. Nitr. dulc. gutt. xij.

‡ n. diaph. 3j.

Cinnab. ‡ n. opt. 3℞.

Elæosacch. Fœnic. 3ij.

M. d. ad Vit.

Si Fœmina fuerit *Hysterica*, *Mixturis*
ejusmodi permiscenda venit *Essentia*
Castorei, Vel *Tinctura Castorei* cum *Salis*
armoniaci parata ad 3℞. vel 3ij.

Præmissis his *Vomitorium*, ab-
sente Febre aut Stomachi excoriatio-
ne inflammatoriâ, præbemus, v. gr.
in Adulto

℞. Crem. Fri 3℞.

⊖ is polychrest.

Rutæ ana. gr. iij.

Cinnab. nat. opt. gr. jv.

Tartari emet. gr. ij. vel iij.

Ol. stillat. Carv. gutt. ij.

M. f. Pulv. subt. d. ad ch. pro dosi,
mane jejuno stomacho sumendâ.

Vel ℞. Crem. Fri gr. xij.

⊖ is Card. bened.

Bezoard. min. ana. gr. jv.

Gum. Gutt. gr. 4. vel 5.

Fri emet. gr. j.

Ol. stillat. Mac. gutt. ij.

M. f. Pulv. subt. d. ad ch.

Vel ℞. Syrup. emet. Ang. Sal. vel

Oxyfacch. emet. Lud. 3℞.

Aqu.

Aqu. Fœnic.

Cinam. ana. ʒij.

M. d. ad Vit. & exhibeatur pro dosi matutinâ.

Vel *R̄. Rad. Ipecacuan. ʒij.*

Pulveris. subtil. d. ad chart. pro dosi.

Tale Vomitorium in malo urgentissimo, etiam nullo præmisso præparante dari, ejusque operatione propemodum finitâ Mixtura quædam superius descripta cochleatim propinari, vel sequens Cardiaca præscribi potest.

R̄. Aqu. Fœnic.

Borrag.

Meliss.

Syrup. Capill. ♀. ana. ʒj.

Confect. Alk. ʒij.

Matr. Perlar. ppt.

Ocul. ʒ. ppt. ana. ʒj.

Cinnab. ʒ n. corr. ʒʒ.

Essent. Succin. ʒj.

Elæosacch. Aurant. ʒj.

M. d. ad Vit.

Externè Stomachi regio inungi bis vel ter quotidie debet Unguento vel Balsamo stomachico. v. gr.

R̄. Unguent. pomat. ʒiij.

Ol. nucist. expr. ʒiʒ.

Stillat. Fœnic. gutt. xij.

Chamom.

Carv. ana. gutt. viij.

Balsam. peruv. ʒij.

M. d. ad Ollam.

Vel *R̄. Bals. Peruv. ʒj.*

Solve in Spirit. Ceras. nigr. q. s. & adde Essent. Carminat. ʒiʒ.

M. d. ad Ollam.

Post illinitum calidiusculè stomachū

Sacculus anodyno - carminativus desuper adhuc ponatur, sed calefactus, postquam prius regio stomachi papyro tecta fuerit. Sacculus componatur ex *Baccis Juniper. Herbis Mentb. Puleg. Ocymi, Matric. Meliss. Chamomill. Seminib. Fœnic. Cumini, Anethi, Avenæ.*

Quando Vomitorium exhibere non audemus ob varia impedimenta, tunc reliqua nihilominus medicamina præparantia & carminativa locum habent. Imò tum etiam citra præparantem Pulverem vel Bolum, damus Mixturâ quandam carminativo-antispasmodicam superius descriptam, addendo solum decem guttas *Essentiæ Opii liquidæ.* Vel certè mediam partem ejusmodi Mixturæ statim unâ vice hauriendâ concedimus, reliquam verò portionem cochleatim propinamus. Sed inter hæc *Clysmâ* aliquod infundi curamus Ægroti alvo, factum ex decoctione plantarum emollientium & carminativarum, addendo *Electuarii lenitiv. ʒj. Mell. rosac. vel rutac. ʒvj. & Olei Chamom. ʒij. vel iij.*

Ad præservationem Mali *Vinum medicatum* præscribendum venit *purgans*, quale quidem in Affectionibus stomachi præscriptum invenitur.

Si Morbus hic Febri malignæ supervenerit, tunc reliquis in hac præscriptis remediis ulterius *cinnabarina*, ut & *Pulverem viperinum, Cranium hum. ppt. Ungul. Alc. ppt. Dent. Hippopot. ppt. Ægagropil. ppt. & similia* permiscemus:

CARI-

CARIES, Vid. *Ossium Caries*.

*Excre-
scentia
carnea.*

CARNEA EXCRESCENTIA est solidæ carneæque substantiæ in Vlceribus plus minùs sordidis, aliisque casibus à luxuriante succo nutritio facta generatio.

*Pars
affecta.*

Pars affecta est varia, vixque datur aliqua, in cujus Vlceribus sordidis tales excrescentiæ generari haud possint. Excrescit autem caro diversimodè, etiam in partibus aliàs sanis apparentibus, sed sub variorum Tumorum nominibus ejusmodi Excrescentiæ tum veniunt. Heic verò tantum considerantur, quæ in Vlceribus fiunt.

*Differen-
tia.*

Pro varietate Causarum autem nunc *magis* nunc *minus* *solida*, *dura*, *crassa* aut *mollis* evadit, hincque simul varia nomina sortitur, ut modò appelletur *Caro luxurians*, sicubi rubicunda ac mollis ex Vlcerum profundo efflorescat: modò *laxa* & *spongiosa* dicatur, quando Fungi alicujus colorem aut consistentiam induit: modò tandem *callosa excrescentia* audiat, si colore plus minus albicante aut purpureo compareat.

Causa.

Efficit hoc malum ut plurimum Succus nutritius in Vlceris cavitatem justo majori quantitate admissus, & sensim, quandoque citò admodum coagulatus; ita enim ex Vlcere Meningum, & fracto sive vulnerato qualitercunque Cranio, interdum unâ nocte fungosa Caro magnitudinis notabilis excrescit. Quandoque etiam medicamenta externa pingua, oleosa, minusque convenientia, incautè applicata, atque hinc cum Succo nutrit. Vl-

ceris in substantiam talem per interveniens aliquod coagulum acidum mutata, Intumescentiæ tali carnosæ ansam præbent. Hinc pro varietate allabentium è sanguine humorum varietas etiam Excrescentiæ producit. Si spongiosa & rara sive tenera est Excrescentia, signum est, plures particulas sulphureas cum acidis & terrestribus esse combinatas, & ab intervenientibus nonnullis alcalinis dilatatas. Si autem durior nonnihil & crassior fuerit caro, tum plures Θ ino-acidas cum terrestribus conglutinatas esse indicium præbet.

Signa hujus Affectûs diagnostica non admodum requiruntur, cum quilibet in re Chirurgicâ tantillum versatus luxuriantem excrescentemque carnem putridam à verâ dignoscere queat: ipsa verò Excrescentia propemodum est signum Vlceris sordidi, acidis Θ ibus cum Γ reis corruptis crassis permixtis referti.

Hinc in *Prognosi* dicendum est, Excrescentiâ carnosam facile post se trahere Vlcus sinuosum, & in Fistulâ mutari, imò ad Os penetrare, illudque corrumpere & cariosum reddere posse.

Quare in *Curatione* pro generali regulâ sive cautelâ hoc teneri debet, oleosis & pinguibus remediis *Ulcerata* talia non esse tractanda, cum ex illis subinde vera Excrescentiarum materia & origo procedat. Quin vix apparebunt tales Fungi aut Carnes luxuriantes, nisi Chirurgus imperitus vel incautus pingua applicuerit. Omnis autem cura eo est dirigenda, ut quicquid luxuriat cautè absumatur; id

id quod *Cauteriis potentialibus*, non tam salino-acidis, quàm alcalinis, & sulphureo-aromaticis, vel balsamicis acribus, bis vel ter quotidie applicatis aut inspersis, obtineri potest. In hunc proin finem commendari cum fructu & usurpari consuevit *Essentia Myrrhæ, Aloës, Radicis Aristolochiæ, Chelidonii, Gentianæ* cum *Spiritu Vini camphorato* aut *Trisato* extracta, atque diligentissimè cum linteis carptis applicata, superim ponendo *Emplastrum Diapalma*, vel *album coctum*, vel *sticticum Croll.* vel *Opeteldoch*, aut simile, quod minus tenaciter adhæreat, porosque cutaneos non obstruat. Sunt qui *Unguentum Ægyptiacum Melli rosaceo* permistum adhibent, quibus alii etiam addunt *pulverem Radicum Gentianæ Imperator. Angelicæ, Pyrethri, Aristolochiæ rot. veræ, succi Euphorbii, Caryophyllorum arom.* Imò & *Cineres Tabaci*, *Bufonum* aut *Cochlearum* haud infeliciter in usum trahuntur. Placet aliis *Aqua phagedænica*, quâ Excrecentiæ in deligatione prius lavantur, antequam carpta linteorum fila sive sicca, sive etiam *Essentiæ traumaticæ* amaræ intincta applicentur. Neque contemnenda est *Aqua viridis* à pluribus tantopere decantata, quæ concinnatur ex decoctione *Aluminis crudi* ac *Viridis æris ana. ʒij. in Vini albi ʒxviij. ad quartæ partis consumt.* colaturæ admiscendo *Spiritus Vini ʒj. in qua prius Camph. ʒj. sit soluta.* Labia Vlcenum callosa quandoque etiam scarificari possunt, si dictis remediis non emolliantur & in naturalem statum reducuntur. Sed hoc denique est notan-

dum, Excrecentias fungoso-molles cathæretica salino-corrosiva non tolerare, sed felicius atque citius aromaticis acribus dissipari, v. gr. *Caryophyll. arom Radic. Angelicæ, Euphorb. Imperatoricæ &c. Essentiâ Aloës, Myrrh. Carnoso-solidas* ac duriores autem, si modò dictis dissipari nequeant, corrosivis magis abigi vel consumi debere. In leviori Vlcenum vel Vlcenum carnis luxurie Chirurghi vulgariter, nec sine successu inspergere solent *Alumen* aut *Vitriolum ustum*, vel *Mercur. præcipitatum rubrum* aut *album.*

CARNOSITAS NIMIA, vid.

Corpulentia nimia.

CARO LVXURIANS VVLNERVM ET VLCERVVM, vid.

Carnea Excrecentia.

CARTILAGINIS XYPHOIDIS PROLAPSVS seu PROCIDENTIA est ejusdem depressio versus interiora, à causis nunc externis nunc internis ortum ducens.

Procedentia Cartilaginis ensiformis.

Affecta pars est *Cartilago Xyphoides* sive *ensiformis* quæ sterni extremitatem supra Ventriculum constituit.

Subjectum.

Causa hujus Affectûs est, quicquid eandem cartilaginem sive extus deprimere, sive intus retrahere valet. Deprimitur extus ab ictu, casu, aliisque gravioribus contusionibus: sic autem depressa simul premit Stomachum, eumque irritando frequenter ad Vomitum stimulat. Intus subinde à Tussi, Convulsionibus, & epilepticis motibus retrahitur. Nonnunquam etiam à salis humoribus ita siccatur, ut intorqueatur per se versus Stomachum.

Causa.

Imò quandoque ab ipsa nativitate Vitium hoc contractum est.

Facile vel ex solo intuitu cognoscitur, symptomata tamen etiam varia post se trahit. Etenim cibus cum aliquo dolore deglutitur; nausea post captum cibū copiosiorē frequens, quandoq; & vomitus ipsi ingruunt; ab assumptis etiam pondus & gravitas stomachi sentitur; appetitus sensim minuitur; subsequuntur quandoque Cachexia & Atrophia; extus in scrobiculo Cordis cavitas major reperitur, & ubi digitis locus comprimitur, simul stomachus dolore pungitivo aut gravativo afficitur.

Prognosis

In *Prognosi* hoc tenendum, depressionem Cartilaginis hujus fortiolem non solum stomachum perpetim lacerare, atque ad nauseam, ructus, vomitusque invitare, sed & nisi pristino statui naturali restituatur, paulatim vel Jcterum, vel Cachexiam, vel Atrophiam lethalem inducere.

Curatio.

In *Curatione* eo valde est adnendum, ut Cartilago illa mucronata sive ensiformis extrorsum vertatur vel exprimatur, quod omninò sit externis magis quam internis remediis. Et quidem, si provenit ab ictu aut contusione, tum nil melius est quam ante omnia Inflammationem, si quæ adest, profligare remediis suo loco indigatis; hinc verò *Emplastrum contra Rapturam*, aliudve *maximè tenax*, aut frequenter *Cucurbitulam magnam* line scarificatione applicare, hac enim ratione paulatim Cartilago adduci & extrahi potest. Sed insimul fasciis commodis thorax est involvendus;

Æger etiam subinde ponderosam manibus rem attollat. Si Vulnus adsit, illud prius debito modo sanabitur. Quod si humores \ominus si ac visceri intus ad hoc Vitium contribuerunt, simulque Atrophie principium inducant, tum Curatio tota melius non inchoabitur, quam *Remediorum antipeccicorum* præscriptione, atq; simul interea exterius *Emplastrum tenax* aliquod applicabitur.

CARVS est somnus profundus cum sensûs, motûs atque imaginationis insigni læsione, ab impedito Spirituum animalium influxu, tensioneq; nervoli generis per totum corpus valde imminutâ oriundus.

Afficiuntur hinc propriè & generaliter omnia Sensuum & Motûs Organa, in specie tamen affliguntur principia Nervorum in basi Cerebri existentium.

Causa proxima ferè est tensio generis nervoli, ab impedito Spirituum animalium influxu multum debilitata. Contingit hoc à secretionem Spirituum eorundem insufficiente, hincque conniventia aut lapsu tubulorum medullosæ Cerebri substantiæ. Prohibetur autem vel minuitur Spirituum generatio ob causas antecedentes *remotiores* & *procatarticas*, lentorem nimirum Massæ sanguineæ, extravasationem vel stagnationem aliqualem Lymphæ aut Sanguinis in corticali substantiâ Cerebri; Caco-chymiam pituitosam, Ventriculi digestionem depravatam, hincque Chylum pituitosum crassum enatum, Crapulam frequentem, fumos Carbonum arden-

ardentium haustos, Vapores potuum fermentescentium, in primis Musti vinosi; nimium odorem Croci, Hyosciami, Cynoglossi, ac similibus Narcoticorum; fumum Tabaci; Ærii halitus; contusiones aut concussiones Capitis; Remediorum narcoticorum abusum.

Cognoscitur ex somno adeo profundo, ut Æger vix & non nisi cum magnâ difficultate excitari queat, etiamsi pungatur, concutiatur, aut aliâ ratione vigilis reddi tenteretur: & si tandem evigilet, vix tamen aperire scit oculos, ad interrogata utcunque respondet, sed in pristinum statim relabitur somnum. Sensus externi ferè stupent & torpidi sunt, interni verò à suo munere utcunque cessant; Morus quoque animalis si non est totaliter ablati, saltem valdopere imminutus & languidus; Respiratio tamen manet illæsa; Febris nulla adest. Cumque Carus æquè à sanguine ac pituitâ in Cerebro nonnihil extravasatâ aut stagnante, hincque tubulosam Cerebri substantiam premente oboriri possit, specialius signa sunt tradenda. Et Cari quidem à sanguine provenienti indicia sunt plethora & color faciei rubicundior ac floridior. Signa autem Cari à pituitâ sunt temperies aut intemperies pituitosa, faciei itidem color albicans. Differt hinc Carus ab Apoplexiâ forti exiguo admodum gradu, in Caro enim Respiratio salva manet, quæ in Apoplexiâ plus minus offenditur: in Caro membra subinde retrahuntur, in Apoplexiâ simile quid non fit: tandem in Apoplexiâ forti profundior existit sopor, & respiratio

stertorosa paulatim evadit, usque adeo ut proximus sit Cari in Apoplexiam transitus. Distinguitur etiam à Lethargo ratione Febreos, cui Lethargus plerumque supervenire solet cum delirio dum interea Carus plerumque sine Febre existit. Dein in Lethargo somnus non ita est profundus, Hominesque ad interrogata, licet ineptè respondent, in Caro autem vix expergeunt, & ad interrogata difficiliter, sed appositè tamen respondent. A Catalepsi sive Catoche differt Carus, quod in hoc oculi sint firmiter clausi, Homoque somno obfopitus ac immobilis jaceat, in Catalepsi autem oculi plerumque sint aperti, ac Homo eo in statu permaneat, in quo fuit deprehensus. A Syncope tandem dignoscitur, quod in hac pulsus sit vel nullus, vel vix perceptibilis, in Caro autem pulsus existat penè naturalis.

Quoad *Prognosin* Carus à causis *Prognosis* externis manifestis oriundus facilius curatur, quàm qui ab internis suam originem trahit; hic enim etiamsi tollatur semel, tamen subinde recurrit, tandemque in Apoplexiam transit. Sic etiam Carus Febris ardentibus & malignis superaccedens lethalis esse solet.

In *Curatione* ad causas est atten- *Curatio.* dendum, etenim qui Carus crapulam aut vaporem quendam malignum pro sui causâ agnoscit, finitâ crapulâ sive per Venæsectionem sive per *spirituosa Remedia antapoplectica* intus exhibita, aut exus applicata facile tollitur. Si est à vapore maligno, tum corpus hominis effereendum est à loco, unde talis vapor

vapor exhalat, in aërem liberum, ventisque salubribus perflatum. Si est à contusione, casu, ictu, &c. tum statim Venæsectio administrabitur, Clyster acris unus & alter, è decocto cephalicorum paratus, injicietur, ac extus Sacculi ex Herbis cephalicis compositi, Vinoque albo incocti, Capiti toti applicabuntur, subindeque noviter calefient. Naribus dein Spiritus volatiles admove-
 veri, nuchæ, vertici aut brachiis Vescicatoria applicari, ac intus Mixturæ antapoplectica ex Aquis Betonicæ, Chamomillæ, Florum Tiliæ, Nasturtii, cum Spiritu Cochlear. Liquore C. C. succinato, Tincturâ Castor. cum Spiritu Sal. arm. paratâ, ac similibus exhiberi possunt; v. gr.

R̄. Aqu. Flor. Til.

Beton. ana. ʒiβ.

Spirit. Cochlear. ʒij.

Syrup. de Cinam. ʒβ.

Tinct. Cast. cum Spir. Sal. arm. par. ʒβ.

Cinnab. ʒn. opt.

Bezoard. min. ana. ʒj.

M. d. ad Vitr. sumatur cochleatim.

Quod si verò Carus est à causis internis, sive sanguine sive pituitâ, eam prorsus Curationem requirit, quam in Apoplexiâ indigiravimus; inprimis si absit Febris, purgantes Pilulas cum ʒrio dulci, nonnihil fortiores, exhibere convenit, Venæsectione, si opus videbitur, præmissâ. Dein mane ac vesp. xx. guttulas de ʒe quodam volatili oleoso, vel de Ligu. C. C. succinat. aut Tincturâ Castor. cum Spiritu Sal. arm. paratâ, cum Aqu. Betonic. Meliss. &c. exhibemus, intercalando Mix-

turam quandam diaphoreticam spirituosam - antapoplecticam.

R̄. Aqu. Meliss.

Vitæ Matth.

Ulmar. ana. ʒj.

Syrup. de Beton. ʒvj.

ʒis volat. C. C. depurat. ʒβ.

Spod. ex Ebor. ppt. ʒij.

M. d. ad Vitr. sumatur cochleatim.

Vel R̄. Tinct. Castor. cum Spirit. Sal. arm. par. ʒij.

Aqu. Cinnam. c. Vin. dest. ʒvj.

M. d. ad V. M. ac Vesp. Cochleare plenum capiatur.

In Diætâ profunt omnia, quæ ʒe volatili antiscorbutico pollent, illudque in se obtinent, majori vel minori quantitate in cibo potuque sumta.

CATAPHORA, seu Coma somnolentum est Sopor nimius & præternaturalis, ubi ʒgri perpetuò in somnum inclinantes frequenter profundè satis dormiunt, sed non ita difficulter tamen expergeferi possunt.

Afficiuntur heic principaliter vel glandulæ substantiæ Cerebri corticalis, vel ipsum Cerebri meditullium.

Quod Signa concernit diagnostica, Affectus hic præsens esse dicitur, quando ʒger diu profundeque dormit, & quidem non raro hiant etiam ore: quando haud difficulter expergefit, sed brevi iterum pristino somno indulget. Differt à Caro non nisi gradu, etenim in Cataphorâ ʒgri expergefati statim sermones Adstantium percipiunt, & ad quæsitâ haud inconcinne respondent; in Caro autem difficilius expergefati, ad ea quæ dicuntur mi-

nus

nus perfectè attendunt, ac etiam vix respondent. A *Lethargo* distinguitur, quatenus hic ferè symptoma est & productum Febris continuæ cum delirio conjunctæ, *Carus* autem sine delirio atque Febri ut plurimum hominem affligit.

A *Syncope* discernitur quoad pulsum & faciei conditionem, quæ in *Cataphorâ* satis naturaliter se habent; in *Syncope* autem pulsus ferè nullus, atque facies mortuo similis observatur. A *Somnolentiâ* discrepat, quòd in hac minor sit gradus soporis, Hominesque inclinent quidem in somnum, sed profundè tamen haud dormiant. A *Comate Vigili* tandem, quòd in hoc perpetua sit propensio in somnum, ac eapropter Homo ad dormiendum sollicitetur, sed dormire tamen nesciat.

Causa proxima hujus Soporis est Spirituum animalium influxus in organa Sensuum ex parte prohibitus. Ad quod contribuit vel obstructio tubulorum glandulosorum Cerebri, vel eorundem compressio, vel denique Spirituum animalium impedita generatio, quæ omnia contingunt eo modo, quo in præcedenti Affectu indigita- vimus. Contribuunt etiam huc lubinde Vermes, Vteri suffocationes, aut etiam Phlogoses febriles; unde non rarò Febris alicujus continuæ symptoma esse solet.

In *Prognosi*, tenendum per se hunc Affectum non esse exitialem; sed talem reddi posse, si aliæ intervenerint graviores causæ, in primis aliqua Febris maligna, obstructio Cerebri indies

aucta, & similia; hac enim ratione apoplectici insultus, vel convulsiones subsequi possunt. Si Somnolentia hæc oritur à partibus aliis quàm Cerebro vitiato, tum per se nihil periculi ostendit vel portendit.

In *Curatione* huic potissimum indicationi est satisfaciendum, ut viscidum sanguinis serum, è quo Spiritus animales extricari sufficienter & secer- ni vel transcolari nequeunt, corrigatur; quod obtineri potest primò per Remedium aliquod vacuans ac per inferiora purgans, v. gr.

R̄. *Mass. pilul. e Succin. Craton.*
Extr. Cathol. ana. ʒß.
Cinnab. nat. gr. viij.
Resin. Jalapp. gr. iij.
Ol. stillat. Anis. q. s.

F. l. a. Pilul. no. xij. pro dosi.

Vel R̄. *Extr. pilul. coch.*

Mass. pilul. marocost.
Mercur. dulc. opt. ana. ʒß.
Resin. Scamm. gr. iij.
Ol. still. Rorism. q. s.

M. f. Pilul. num 15. pro dosi matut.

Dein si Plethora aliqualis animadvertatur in Ægroto, simul sine ullo metu Vena secabitur in brachio alterutro, ubi quidem Medicus adstans præceperit. Postmodum ea in usum trahantur, quæ ☉-pituitosam & viscidam massam humoralem attenuare, atque fluxibiliorem reddere valent, quemadmodum existunt ☉ia volatilia oleosa, *Tinctura Succini*, *Spiritus Viperar.* C. C. *Sal. arm. urinosus*, *Spiritus Cochlear.* *Tinct. Castor. cum Spiritu Sal. arm. parata*, *Essent. Zedoar. &c. sub dosi xx. gtt. m. ac vesp. capienda.* In-

fusum folior. Thee, vel decoctum Coffee largiter quotidie haustum maximè prodest. . Potest & *Vinum medicatum purgans* pro lubru exhiberi. Neque hic contemnimus *Tragemata cephalica*, è variis *Aromatibus* & *pulvere cephalicarum herbarum* concinnata; v. gr.

Rx. *Rad. Apii.*

Aspar.

Carlin. ana. ʒij.

Herb. Meliss.

Agrimon.

Scab.

Flor. Paralys.

Semin. Nasturt.

Dauc. ana. ʒij.

Cinam. acut.

Cubeb. ana. ʒiʒ.

Sacch. alb. ʒviij.

M. f. Pulv. subt. d. ad scat. Dos. ʒij. man. ac vesp.

Novimus, qui maximo cum fructu aliquot noctibus insequentibus sub horam somni *specierum aromaticarum rosatarum* & *foliorum Senae pulverisatorum* ana. ʒj. cum *Aq. Flor. Tiliae* felicissimè sumserunt,

Externè capilli Capitis abradantur, simulque *Cucupha cephalica* Vertici ejus imponatur, aut *Emplastrum* è variis *Gummis* & *Aromatibus* concinatum raso capitis Vertici applicetur: Quandoque *Clysteres acres* cum fructu injiciuntur: *Vesicatoria* Nuchæ aut etiam Pedibus applicentur, ac *Medicamenta errhina*, leniterque *sternulatoria* usurpentur.

tium corporis omnium immobilitas, cum mente attonitâ & sensuum omnium ablatione, salvâ tamen manente respiratione, ac pulsu, à Spirituum animalium aut fibrarum motricium nervearum rigiditate, vel cessante motu oscillatorio propemodum ortum trahens. Differt hinc ab omnibus aliis Affectibus soporosis in hoc, quòd ut plurimum membra Catalepticorum sint immota, Ægrique partes in eo statu & situ permaneant, in quo primitus sint à morbo prehensa.

Pars affecta est vel *primaria*, nimirum Cerebrum; vel *secundaria*, totum Corpus, quatenus omnes ejus partes ob Cerebrum affectum immotæ evadunt.

Signa diagnostica eaque *pathognomonica* sunt subita Sensûs ac Motûs in toto corpore voluntarii cessatio, ita ut Ager, dum hocprehenditur Affectu, eam membrorum figuram vel posituram retinere observetur, qualem ipso invasionis momento habuit; hinc notantur Homines, si vigiles antea fuerint, plerumque apertis oculis, ac palpebris rigentibus, sedentes aut stantes existere, etiam manus hoc illove modo exponectas & quasi rigidas habere, aut saltem imotas tenere; quanquam non rarò ab adstantibus aliis hominibus flecti queant, sed flexæ dein suo iterum in situ persistunt; quoniam mens attonita nullam vim in musculos exercere valet. Statuam hinc viventem, sensu motuque arbitrario carentem non male dixeris. Quandoque audiunt aut vident aliquid, atque antea tempore insultûs actorum recordan-

Catale-
psis.

CATALEPSIS, CATOCHVS est subita ac penè momentanea par-

cordantur, plerumque verò nihil percipiunt. Reperti sunt, qui deglutiebant, quicquid ori ingerebatur; imò novimus, qui impulsi utut nescientes incedebant. In plerisque verò membrorum rigiditas inflexilis notatur. Respiratio & pulsus apud omnes naturaliter ferè habent. Affectum periodicum, ac incertis periodis ultra tres annos durantem in Pastore Verbi Divini observavimus.

Causa proxima seu immediata est Spirituum animalium in omnes nervos expansorum, imò ipsarum fibrillarum immobilitas, & quasi congelatio, quam nonnulli attribuunt humori austero & quasi ☉lico, originem nervorum circa principium medullæ spinalis veluti constringenti: alii verò ☿ri narcotico adscribunt, Spiritus figenti; alii flatibus aut humoribus Spirituum laticem conglutinantibus, vel certè motum vibrantē oscillantemve fibrarum omnium motricium subito cohibentibus adscribunt. Hinc inter *Causas antecedentes & procatacticas* recensentur. v. gr. profundæ meditationes, terror subitaneus & ingens, spiritus narcotici, animalium spirituum latici quomodocunque permixti, quales quidem sensim ex malâ diæta sanguinis massæ infundi possunt. Inprimis autem, qui fulmine percussi sunt, taliprehenduntur Affectu, & ut plurimum inde exanimantur, quatenus Spirituum animalium motus partim à fragore ingentis tonitru, partim ab exhalatione fulminis ☿icâ adeo sistuntur & figuntur, ut nunc statim omnium partium Corporis

rigor & immobilitas subsequatur. Contribuunt etiam ad huncce Morbum intemperies melancholica, amor vesanus, vina generosiora largius pota, Spiritus vini nimio opere haustus, cerevisia crassa minimè defæcata, ira vehemens, moeror atque terror excessivus.

Quod *Prognosis* attinet, Affectus hic pro lethali est judicandus, tanto id magis, si in excellentiore gradu hominem invaserit, nisi enim promptè ad se revocentur Ægri, tum sensim coagulari sanguis circa cor incipit, mortemque subitam plerumque inducit. Morbus ipse rarus est, sed aliquando tamen observatus est citò accessisse & citò iterum evanuisse. In gradu debiliore contingens malum, adhuc curabile existit, præsertim in Juvenibus.

In *Curatione Clysterem* ante omnia commendamus *acrem & emollientem*, hinc verò *Mixturam antapoplecticam* ex *Aquis cephalicis & cardiacis* cum *Spiritibus volatilibus* concinnatam, cochlearim exhibemus, extusque ea applicamus omnia, quæ in Convulsionibus, vel in Apoplexiâ applicari consueverunt. v. gr.

℞. *Aqu Beton. Roris mar.*
cortic. Aurant. ana. ℥i℥.
Spirit. cephal. Deckers.
carmin. Sylv.
antipar. Amstel. ana. ℥℥.
Tinct. Cast. ʒj.
Ocul. ☿. ppt. ʒi℥.
Sal. volat. succ. ʒj.
Syrup. Majoran. ʒj.

Misc.

*M. d. ad Vitr. & infundatur co-
chleatim.*

Meminimus etiam, nos aliquan-
do naribus inspersisse *Succum Apii* vel
Betæ cum *Spiritu Sal. arm. Urinos*. Cu-
jus loco tamen insufflari poterit *Pul-
vis sternutatorius ex Nicotianâ, Majo-
rana, flor. Lilior. convallium, Salviâ,
Semine Nigellæ* atque *Castoreo* compos.
Vertici capitis, nuchæ, pectoriq; appli-
cantur. linthea *spiritui Vini camphorato*
immerfa, frequenterque repetantur.
Extra ipsum morbi insultum *Infusum*
laxativum, vel *medicatum Vinum pur-
gans cephalicum* præscribatur: *Vena*
quoque, si opus videbitur, *secetur*, ac
tandem optima *Diæta* inculcetur.

Catar-
acta.

CATARACTA vel **SVFFVSIO**
est Visus paulatina ablatio atque cæci-
tas, ab Humoris aquei spissitudine sive
crassitie, sæpius & pelliculâ in eodem
inter Pupillam & Humorem crysalli-
num enatâ, originem trahens.

Subje-
ctum.

Vt adeo *Pars affecta* in genere qui-
dem Oculus, in specie autem Humor
ipsius aqueus dici mereatur.

Causa.

Causa proin cæcitatâ hujus proxima
est vel ipsius Humoris oculorum aquei,
inter Pupillam & Humorem crysalli-
num siti, crassities præternaturalis, ra-
diorum visivorum ab externis objectis
reflexorum transitum præcludens;
vel etiam pellicula quædam in ipso
humore aqueo à condensatis particu-
lis glutinosis & crassioribus enata, at-
que corneæ tunicæ pupillæque ante-
rius obtensa, similis hinc cum priori
causâ effectum producens. Ad Cau-
sas has conferunt particulæ crudio-

res, terrestres ac viscidæ, diu in san-
guine collectæ & circumfluentes, tan-
demque per varios porulos in Oculum
præcipitatæ. Accusatur etiam sæpè ip-
sua quosi Humoris exsiccatio, orta ab
exercitato plus nimis circa res subtiles
Visionis sensu, & hinc quiete crebriore
particulis humoris ejusdem concessâ.
Hinc lucubrationes nocturnæ fre-
quentiores, Venus intempestiva & im-
modica, Crapula quotidiana, usus con-
tinuus ciborum crassioris succi, tristi-
tia atque mœror excessivus, subtilia
manuum opera sine intermissione tra-
ctata, & similia ad producendum
hanc Visionis labem sæpenumero
concurrunt.

Signa diagnostica sunt vel Suffu-
sionis incipientis, vel ejusdem confirma-
tæ: etenim non simul & in instanti
Affectus hic mortalibus obtingit, sed
paulatim formatur & augetur, tan-
demque biennii circiter spacio ad ma-
turitatem devenit, hoc est, eam con-
sistentiam, sub quâ per operationem
pellicula deponi potest, acquirit. In
principio autem Visus solet hebetari,
& variæ res, sicut muscæ, nebulae, ara-
nearum telæ, aliaque similia oculis
frequenter videntur obversari, ut hinc
Ægri non semel magnopere incom-
modentur. Dum verò Malum auge-
tur, Homines frequentius tanquam
per nebulam conspiciunt, hinc paula-
tim omni visionis claritate ablatâ ob-
scuritas inducitur, in quâ Ægri tan-
quam per nebulam conspicientes ob-
jecta à se invicem non discernunt, do-
nec tandem Visionis sensatio penitus
aboleatur, Homoque nil præter ali-
qualem

qualem luminis externi perceptionem reliquum habeat. Ratione *Coloris* suffusio est nunc *albicans*, nunc *fusca*, nunc etiam aliûs obscuri coloris: Quod si verò nigricet pupilla Oculi, neque ulla planè Luminis externi sensatio adfuerit, ipsa que præterea Pupilla post oculi fricationem qualitercunque institutam non dilateretur, quod in verâ Suffusione contingere solet, tum Cœcitas hæc propriè non *Cataracta*, sed potius *Gutta serena*, in quâ Oculis utcunque serenis, maximè clavis ac pellucidis existentibus, Homo tamen ne vel tantillum luminis percipit, appellari consuevit, ab optidorum Nervorum obstructione unicè dependens, ac utrumque simul Oculum, plerunque confestim & uno actu occupans; cum ordinaria Suffusio non utrumque simul, sed alterutrum prius Oculum, ac demum postea alterum quoque adoriatur.

Perfecta Suffusio ea demum venit dicenda, quando Homo visu omni in Oculo affecto privatur, nullumq; prorsus objectum externum percipit ac discernit; etiamsi, dum Oculi bulbum cum propriâ palpetrâ aliquandiu fricamus, animales hinc Spiritus copiosius influant, atq; Pupillam aliquantillum dilatent, id quod certissimum indicium esse solet, *Cataractâ* Oculum affici.

Quando Affectus hic alterutrum Hominis Oculum affligit, tum non sine ratione metuit, ne alter quoq; sensim infestetur, plerunque enim hoc ita contingere solet. Quod si Humor aqueus non sit nimium crassus, neq; pellicula intus Pupillæ obfusa sit valde tenax, tū

Affectus adhuc curabilis, Visio que per depositionem, à peritissimi Operatoris manu instituendam, reparabilis existit. Si autem crassiorem nimis humorem eundem esse deprehendamus, si itidem pellicula valdè dura, atque prorsus inveterata existat, tum non adeo certò pristinum Visum vel polliceri, vel sperare possumus. Vbi tandem non nisi principium *Cataractæ* adest, tum ejusdem progressum præcavere licet.

In *Curatione* proin ad principium, progressum & perfectionem hujus vitii est attendendum: etenim in *Cataractâ incipiente*, quando Visus adhuc constat, ac subinde tantum leviter obscuratur, vel sæpius corpuscula quedam nigricantia oculis obvolitare videntur, tum semel atque iterum Corpus est *Pilulis Grialibus* cum *Oleo destill. Fœniculi* purgandum; v. gr.

Curatio.

℞. *Extr. catholic.* ℥j.
Cinnab. ḡn. opt. ℥ss.
Resin. Scamm. gr. iij.
Ol. still. Fœnic. q. s.

M. f. *Pilulæ num.* 15. dentur pro
dosi matutinâ. Vel

℞. *Mass. Pilul. maroc.*
Extract. panchym. Croll. ana. ℥ss.
Merc. dulc. opt. gr. 12.
Resin. Jalapp. gr. iij.
Ol. stillat. Anis. q. s.

M. f. *Pilulæ num.* 13. Inauratæ sumantur mane jejuno stomacho cum regimine *Diætæ.*

Hinc verò statim *Fonticulus* brachio lateris affecti incidendus, vel *Setaceum* nuchæ applicandum. Freqventia etiam

Cc

Pedi-

Pediluvia cum incoctione *Herbarum cephalicarum* paranda, & pluribus insequentibus noctibus in usum vocanda sunt. Intus hinc diu multumque vel solum *Feniculi Romani Semen massicetur*, vel etiam *Tragema opthalmicum* è *Radic. Pæon. Valerian. Chelidon. major. Angel. Petasit. Anemon. Herb. Majoran. Euphras. Salv. Rutæ. Sem. Fœnic. Dauc. Bacc. Junip. Cardam.* atque *Sacch. parat.* quotidie bis vel ter capiatur. Interim Visus ad subtilia opera studiaque severa, imprimis nocturna, minus applicetur. Quod si Massam sanguin. nonnihil bilioso - viscidam observemus, æstivo tempore *Acidularum* bonarum usum suadebimus. Si verò pituitosam magis eandem minusque acrem deprehendamus, tum potius usum *Thermarum* quarundam nitroso - sulphurearum commendamus. Præterea capilli capitis deradantur, & capillamentum gestetur. Vfus Tabaci modicus concedatur. Cucupha etiam, si opus videbitur, aliquandiu gestetur, è cephalicis maximè composita. Linthea denique *Spiritui Anthos, Fœnicul. Anis. Vini camphor. Cephalico* cuicunque immersa singulis noctibus calidè applicentur. In augmento præter usum quotidianum *Seminis Feniculi Romani* aut *Bacc. Junip.* & aliquoties repetitam purgationem, nihil penitus est tentandum, sed expectandum eò usque, donec Cataracta fuerit perfecta & matura. Dum autem jam matura est Suffusio, unicum superest remedium, Deposito nimirum ejusdem, per Operationem chirurgicam præstanda, quæ post exhibitum *Purgans,*

atque *Clysterem* unum aut alterum emollientem injectum, expeditur perforatione tunicæ Corneæ factâ in angulo exteriori pone Pupillam cum acutissimâ chalybeâ Acu in hanc rem adaptatâ. Perforatio est ita instituenda, ut acus semper juxta Pupillam adigatur, sicque per ipsam Pupillam transparenere possit. Cum autem sufficienter eadem est intrusa, tum omni modo pellicula ab ipsâ Pupillâ est avellenda, atque vel deprimenda, vel, si possibile fuerit, discerpenda: in quo actu tamen benè cavendum, ne vel Humor crystallinus, vel alia interna pars Oculi ab acu perforetur & lædatur. Postquam hinc pellicula sufficienter est depressa atque avulsa, tum Acus est extrahenda, statimque *Collyrium* conveniens, ex *Aquâ Plantagin. Chelidon. majoris, & Euphras.* cum *Tutiâ ppt.* compositum, calidiuscule est instillandum, tandemque *Epithema* ex *Croco, Albumine Ovor. Aq. Plantag. & Tutiâ* tepidè applicandum, sicque deligatio per plures dies continuanda, donec Vulnus inflitum perfanatum esse notabimus. Quod si in operatione Ager lumen videat, & persentiat, signum est bonum redituri Visus: si verò nullum lumen percipiat, tum spes Visionis ulla fieri nequit. Post operationem in obscuro semper teneatur conclavi Ager usque ad Vulneris curationem, postea autem sensim est lumini assuefaciendus, quoniam subitum lumen si admitteretur facile Visum omnem simul perderet. Recuperato autem per operationem Visu perspicilla aut conspicienda convexa in usum sunt trahenda, & opti-

ma quæque inter hæc feligenda. Tandem diu adhuc vel supradicto *Tragmate* Ager, si poterit, uti, vel *Feniculum Romanum* diligenter manducare debet. Verno & autumnali tempore Vinum medicatum purgans bibet. Interea subinde Cucurbitulas cum scarificatione admittet. Diætam convenientem exactè observabit.

CATARRHVS, Κατάρρως, ex κατὰ & ῥέω, fluo, composita voce, latine *Defluxio*, in genere denotat omnem lymphæ vel feri cujusdam vitiosi stagnationem aut extravasationem, in parte vel membranosa vel glandulosa cum dolore, aliisve symptomatibus contingentem. Cum igitur plurimæ sint partes, in quibus ejusmodi lymphæ stagnatio vel exundatio produci solet, *Catarrhus* certè earum respectu multiplex existere debet; meminit tamen antiquitas non nisi quatuor specierum, quarum *prima*, per excellentiam dicta *Catarrhus*, est Lymphæ salso-acris copiosa molestaque è Cerebro in fauces defluxio; *secunda* nomine *Gravedinis* vel *Coryzae* insignita, est feri similis è mucoso-glandulosa tunica in Narium cavitatem profusio copiosa: *tertia* nuncupata *Raucedo*, Βράγχος, lymphæ est salso-acris in asperam arteriam effluxio: *quarta* denique *Rheuma* fuit appellata, quando serum plus minus copiosè in pectus vel pulmonum angulos ruebat. *Schola Salernitana* rem sequentibus versiculis expressit:

Si fluat ad pectus, dicatur Rheuma Catarrhus.

Si ad fauces Branchos, ad nares esto Coryza.

Sed præter has species adhuc plures aliæ, simili modo in aliis partibus productæ, notantur, quæ suis quoque peculiaribus ferè singulæ nominibus efferruntur. Referri profectò huc possunt soporosi Affectus omnes, *Cephalalgia*, *Hemicrania*, *Ophthalmia*, *Otalgia*, *Odontalgia*, *Asthmata*, *Tusses*, *Stupores*, *Dolores rheumatici*, *Arthritici*, *Pleuritides*, *Peripneumonia*; &c. de quibus omnibus suo loco agitur.

Inprimis verò *Catharrhus suffocativus* hic considerandus venit, qui Affectus repentina est eaque maxima respirationis offensio, quâ Homines, nisi adhibita impedire id valeant remedia, intra breve temporis spatium quasi strangulati vel suffocati moriuntur; à constrictione vel compressione bronchiorum oriunda. Ut adeò subjectum ejus propriè Pulmo cum asperæ Arteriæ ramificationibus existat.

Quemadmodum autem in genere *Catarrhus* omnis produci solet ab humoris, ut plurimum seroso vel lymphatico-salsi plus minus acris, acidi resoluti, hincque magnitudinem, figuram & motum particularum suarum præternaturalem adepti, stagnatione, extravasatione in parte glandulosâ aut membranosa; vel effusione quoque in partem aliquam cavam, veluti sunt Fauces, Nares, Vesiculæ Pulmonis, Gula, Ventriculus &c. ita in specie *Catarrhus suffocativus* originem trahit nunc à copiâ feri fluidioris, in vesiculas dictas pneumonicas, aut bronchia repentino motu effluentis,

Catarrhus suffocativus.

Ejus subjectum.

Causa.

& aëris introitum præpedientis, sicut in Excellentiss. quodam viro notavimus; nunc ab exstillatione lymphæ cujusdam acido-acris, bronchiorum fibrillas constringentis, atque spasmodicam sic crispationem, sive contractionem eorundem arteriæ asperæ ramulorum, non secus atque vesicularum pulmonalium producentis; nunc à sanguinis intra vasa pneumonica tardiore decursu, tandemque subitaneâ stagnatione, bronchiorum tubos comprimente, & ita aëris sufficientis ingressum sufflaminante; ut hinc *Apoplexia pneumonica*, si velis dici queat, eo quòd instar Apoplexiæ aliàs à sanguine in Cerebro stagnante provenientis excitetur. Stagnat verò, aut saltem tardius decurrit sanguis, quando vel crassus & lentus nimis, aut acidus, acris aufterusve redditus est, fibrillas vasorum adstringens; vel quando vasa sanguinea pulmonis ab incumbente nimîâ pinguedine validè comprimuntur in valdè obesis, quale exemplum Dolæus in *Praxi* attulit; vel denique, quando à subtili quodam veneno maximè dissolvente ita fluidus redditur, ut hinc per extremitates vasorum Pulmonis capillarium copiosè effluens vesiculas istius partis oppleat, & ita tandem spiritum omnem cum horrendis anxietatibus, imò convulsionibus ipsis, & horrore liquorum intercipiat. Annon licebit etiam dicere, periodico veluti Catarrho suffocativo excruciarî, quibus in Hydrope pectoris, à sero intra cavitatem aliter utram vel utramque thoracis effuso, Pulmonis vesiculæ per vices magno-

pere & aliquandiu comprimuntur aut constringuntur adeo, ut singulis momentis suffocari metuant.

Quibus indiciis Catarrhorum singulorum præsentia cognoscatur, prolixius heic exponere nil attinet, cum pleræque species illorum suis peculiaribus locis explicentur. Quod si verò Lympha in variis Capitis glandulis collecta obhærescat, & sensim cumulatâ stagnet, tum *Catarrhus* erit propriè *cephalicus*, copiosâ sternutatione, gravitate obrusove dolore capitis, hebetudine sensuum, & exspuitione interdum copiosiore salivæ falsæ, tenuis aut viscidæ, vel etiam muci maximè frigidi in palatum labentis, sese cognoscendum præbens. Hinc Catarrhum duplicem admittere solent, *calidum* unum, *frigidumque* alterum. *Calidus* acris est, falsus, amarore oris, interdum sternutatione crebriore, pruritu partium variarum, sensu caliditatis quodam, oculorum & faciei rubedine, capitis dolore, febriculâ etiam ut plurimum conjunctâ sese prodens. *Frigidus* autem Catarrhus ex sensu frigiditatis partium, utcunque dolentium, ex salivæ crassitie & visciditate, facie pallidâ, Febris absentiâ, Urinâ crudâ, virium languore, sensuum aliquali torpore, doloris sensibili augmento, si sub stragulis plumaceis membrum teneatur, patet. Dividere etiam liceat *Catarrhum* in *sanguineum* à sanguine, & *serosum* à lymphâ stagnante oriundum; nec non in *salsum*, *insipidum*, *dulcem*, *acrem*, cum vel sine Febri.

Catarrhus suffocativus in specie cognoscatur ex eo, quando quis ferè subito

Subitò maximam adipiscitur respirandi difficultatem, sine Tussi, vel cum Tussiculâ quadam siccâ, quando Ægrotans non nisi erectâ ferè cervice, fenestris januisque apertis spiritum, cum stertoroso etiam sono, ducere cogitur, quando respiratio singulis prope modum horis difficilior redditur; quando sudor ubicunque modò frigidus, modò calidus è cute profluit. Si à stagnante sanguine circa Cor Malum producitur, facies etiam maximè rubet; si verò magis à lymphâ acri vel copiosâ, pulmonis branchia implente aut comprimente, aut eadem constringente ortum trahat, facies magis pallet, ac sensim cadaverosa redditur. Interdum nausea simul adest, si cruditates acres viscidæ in Ventriculò adsint, aut lymphæ copia ejus cavitatem impleverit, fibrillasque nerveas motu ita lacestat, ut motu suo in contrarias plagas determinantur. Adest hinc etiam maxima pectoris angustia & anxietas, cum metu suffocationis perpetuo, quale quid in Cardialgiâ non adest. Malo denique augmentum capiente inquietus valde redditur Æger, locum continuè mutare cupit, ut levamen quoddam inveniat, vires paulatim amittit corporis & animi, tandemque, nisi auxilium & levamen exhibita remedia asserant, quietus evadit, ac velut somno sopitus sensim animam efflat. Differt tamen à Syncope, ab Apoplexiâ & soporosis quibus cunque Affectibus, eo quòd in his omnibus sensus motusque voluntarius amittatur, & respiratio tantopere mox non affligatur, in Catarrho

autem hoc vigiles sint, maximeque anxii homines. A Cardialgiâ item dignoscitur, quoniam in hac quidem anxietas subinde maxima adest, sed respirandi tamen actio non adeo præpedita. Ab Hydrope pectoris in tantum differt, quod in hoc respirationis negotium sæpius offendatur, sed iterum dein liberius reddatur.

Varium proin Catarrhi sortitutum eventum, prout ipsimet diversi sunt, atque à Causis plus minusve gravibus aut contumacibus producti. Plerique hinc Catarrhi, si apoplecticos & suffocativos excipias, periculosi adeo atque lethales non sunt, sed tamen subinde nihilominus diuturnitate suâ admodum molesti; quemadmodum id in speciebus Catarrhorum singulis indigitarum deprehenditur. Suffocativus Catarrhus plerumque lethalis est, nisi statim in principio causa mali potenter fuerit debellata & dissipata; atque Homines inde paucarum dierum si non horarum spacio velut strangulati vel suffocati moriuntur. Affligit autem magis Homines obesos, sanguineos, catarrhosos, & aliàs propter obesitatem thoracis spiritum liberrimum haud ducetes. Imò, qui ab Animali rabido fuerunt demoriti, si venenum in vulnere acceptum non fuerit probè dissipatum, tandem post plurimum sæpè mensium annorumve spatium, Catarrho etiam suffocativo sanguineoprehenduntur, ac inde brevi temporis spacio suffocantur.

In Curatione proin Catarrhorum indicationibus diversis est satisfaciendum

dum ; nimirum quantitas nimia feri vel sanguinis, evacuantibus, aut Venæsectione diminuenda, stagnatio talium humorum vel profusio solventibus medicaminibus dissipanda ; crassities atque visciditas, attenuantibus & incidentibus corrigenda, acrimonia vel aciditas edulcorantibus atque absorbentibus emendanda, fluiditas denique nimia incrassantibus tollenda. Quibus si satisfacere poterimus scopis, ipsa mox symptomata qualiacunque mitigabuntur, si non perfectè statim tollentur.

Quando proin quis Catarrho qualicunque seroso afflictus sive in faucibus, sive in collo, sive in membro hoc aut illo molestos dolores & cruciatus percipit, huic suasores sumus, ut si quidem Febricula simul adfuerit continua, statim *Clysmatis* ope primas sibi vias eluere curet, illud autem parari poterit ex *Decocto Radicum Apii, Asparagi, Cichor. Lilior. alb. Aristoloch. Alth. Scorzonæ, Vincetox. Angelic. Herbar. Majoran. Malv. Atriplic. Alliar. Scord. Parietar. Meliss. Salv. Ocy-mi, Menth. Origan. Summit. Absynth. Abrot. Anethi, Thym. Lavend. Roris-mar. Flor. Anth. Calend. Chamomill. Spic. Melilot. Genist. Baccar. Laur. Junip. Semin. Anis. Dauc. Fœnic. Aquileg. Nasturt. Lin. Cannab. cum admixtione Electuarii lenitiv. aliusve purgantis, nec non Olei Olivæ. vel similis, Mellis ac Salis. Alvo lubricitato ac eloto mox, si sanguis sufficiens in corpore fuerit, æstumque conceperit, Venæsectio in brachio vel pede instituat, vel saltem Cucurbitulæ cum scari-*

ficatione dorso applicentur. Deinceps verò ulterius adhuc corpus à copiâ serosarum particularum purgante quodam hydragogo liberetur, quod sequentibus aut similibus fieri poterit.

℞. Muß. Pilul. è Succin. Crat.

Extract. diacartham vel

Pilul. aurear. ana. ℞.

Resin. Jalapp. gr. iij.

Mercur. dulc. opt. vel

Cinnab. ꝑn. corr. ℞.

Essent. Succin. q. s.

M. f. Pilul. num. 15. Inaurat. sumantur mane pro dosi cum regimine diætæ.

Vel ℞. Syrup. Ros. sol. compositi cum Rhab. A. & S.

Flor. Persi. ana. ℥j.

Elect. è Succ. Rosar. ℥ij.

Aqu. fl. Sambuc. 3x.

Fœnic. ℥ij.

M. f. Potio, detur ad Vitæ, sumatur mane una vice.

Hiscæ præmissis solventia atque diaphoretica interna & externa sunt adhibenda, ad stagnantem humorem dissipandum. Juvant in hunc finem *Decocta Lignorum Guajac. Sassafr. Santal. Juniper. Radicum Chinæ, Sarsaparill. Ulmar. Carlin. Apii, Ireos flor. Vincetox. Aristol. Helen. Scill. Herbar. Agrimon. Scabios. Betonic. Meliss. Sani-cul. Pyrol. Chamædr. Card. bened. Calaminth. Hyssop. Salv. Veronic. Semin. Anis. Fœnic. Baccar. Juniper. v. gr.*

℞. Radic. Apii vel Aristol. rot.

Chin. vel Sarsapar.

Vincetox. vel Enul. ana. ℥℞.

Calam. arom. ℥ij.

Herb. Agrimon.

Betonic.

Beton.

Hepat. nob.

Card. bened. ana. Mj.

Rasur. Lig. Saffaphr.

Guajac. ana. 3iij.

Semin. Fenic. 3ij.

Incisa & cont. coque in Aqu. font. Mensuris duabus cum dimidiâ ad quartâ partis consumptionem, de Colaturâ ostmodum mane ac vesperi uncia tres semuncia Syrupi de Jujub. aut Farsar. hauriantur.

Loco Decocti Infusa prodesse possunt, ad modum Infusi folior. Thee parata & quotidie bis calidè ad quatuor pluresve uncias hausta. Ad Infusa autem talia sumuntur cum fructu Radices Sarsaparill. Chin. Calam. arom. reos flor. Caryophyllat. Carlin. Folia & Herbæ Thee, Chamædr. Beton. Veronic. Frisol. fibrin. Meliss. Beccabung. Narturt. aquat. Hepat. nobil. Scab. Heder. terr. Cumque sudor subinde productus maximè juvet ad dissipationem Catarrhorum, si dicta hætenus non sufficere deprehenduntur, Potiones sudoriferæ præscribentur, compositæ ex Aquis destillatis Agrimonie, Carlin. Ulmar. Card. bened. Fumar. Scabios. Sambuc. Elect. diascord. Fracast. Theriac. Androm. Mithrid. Damocr. Roob. Sambuc. Juniper. C. C. phil. ppt. Ebor. ppt. Antimon. diaph. Bezoard. Min. Dente aprin. ppt. Cinnab. nativ. vel ♀ nii opt. Ocul. ☉. ppt. Salib. volat. C. C. Ebor. Succin. & similib. v. gr.

℞. Aqu. Hed. terrestr.

Ulmar.

Scabios.

Beton. ana. 3vj.

Spiritus Lign. Guajac. 3j.

Elect. diasc. Frac.

Roob. Juniper. ana. 3ß.

½ n. diaph. 3j.

M. f. Potio detur ad Vitr. pro dosi.

Vel ℞. Aqu. fl. Sambuc. 3iß.

Cherefol. 3j.

Fumar. 3vj.

Mithrid. Damocr. vel

Theriac. Androm. 3ß.

Salis volat. C. C. gr. v.

Ocul. ☉. ppt.

Ebor. phil. calcinat. ana. 3ß.

Misc. f. Potio detur ad Vitr. pro dosi.

Quando dolor in parte urget valde, cum dictis hætenus admiscemus anodyna vel opiata; v. gr.

℞. Aqu. Beton. 3j.

Salv.

Origan. ana. 3ij.

Syrup. fl. Tun. 3ß.

Essent. lign. 3j.

Opii Liquid. gutt. 8.

Cinnab. ½ n. corr. 3ß.

M. detur ad Vitr. sumatur pro dosi.

Externè, ubi opus erit, discutientia calida applicentur, quem in finem Sacculi ex Radicib. Angelic. Imperator. Herbis Absynth. Aneth. Matricar. Abroton. Meliss. Calaminth. Beton. Menth. Origan. Florib. Sambuc. Chamomill. Baccis Lauri, Juniper. Seminib. Aneth. Angelic. Cumin. Carv. Dauc. Napi & similibus concinnari possunt, hinc Vino incoqui, exprimi, & calidè applicari. Loco horum sacculorum alii Lintea tantum Spiritui Lumbric. terr. Formicar. Anthos. Vini camphorato, vel cephalico, vel carminativo aut matriculi cui-
dam

dam calenti immergunt, expressaque admovent. Ante talium applicationem pars quoque calentibus pannis leniter fricari potest. Sunt qui etiam *Olea carminat.* v. gr. *Chamomillæ, Absynth. Aneth. Mentb. Laur. Juniper. Pin. Lumbricor. Scorpion. Matthiol. e Florib. Slotan. & simil.* inungunt.

Quandoque sicca magis profunt, ita enim *Lintea fumisata* ex accengo qualicunque *Pulvere fumali*, & calidissimè sæpius applicata vim dissipandi excellentem obtinent. *Pulverem fumalem* componere licet ex *Foliis Mentb. Meliss. Origan. Ocym. Solani, Nicotian. Majoran. Beton. Salv. Floribus Sambuc. Chamomill. Calendul. Lil. Convall. Stæchad. Lavendul. Bacc. Juniper. Mastich. Oliban. Succin. Storac. calam. Ladan. Seminib. Anis. Fœnic. Carv. Cumin. Dauc. Rasur. Lign. juniperin. & simil.* Quin ex iisdem rebus, vel ex *Seminib. Cicer. Aven. Tritic.* addito *Sale communi tosto*; vel ex *Cineribus* qualibuscunque *Sacculi* replentur, & hi dein siccè calefacti loco dolenti, ubi fluxio adest, applicantur; locus verò prius semper mollibus calidisque linteis aut pannis fricari, imò simul vel *Spiritu* aliquo lavari, aut *Oleo* quodam, uti supra monitum, prius inungi poterit. Si neque hæc scopo satisfaciunt, confugiendum erit ad *Emplastrum diaphoreticum Myns. de Cicut. de Bacc. Laur. de Ranis Vigon. cum duplo Mercurii*, similisve impositionem. Desuper semper cum fructu tandem applicari iussimus *Pellem leporinam vel felinam.*

Si *Catarrhus* fuerit cum *Febre* intensiore conjunctus, cum fructu statim injicimus *Clyisma emolliens* atque detergens; vel si nauseabundus fuerit stomachus emeticum propinamus blandum; postmodum Venam brachii vel pedis alterutrius secari curamus; atque deum præscribimus intus quidem diaphoretica, mane, vesperi & noctu sumenda; extus verò applicamus ea, quæ supra fusius indigittavimus, quæque & in hoc casu profunt maximè.

In *Catarrho suffocativo* si statim fueris accersitus, sine morâ *Clyisma acriusculum* incidens, emolliens atque detergens inspergi curabis, Venam hinc brachii aut pedis mox aperiri, atque notabilem sanguinis quantitatem pro *Ægrotantis* viribus admittentibus effluere permittes. Si dein simul *Ventriculum* saburrâ vitiosorum cruditarum repletum deprehendas, vomitorium mox præscribes, quod sæpè ruentem ad aliquod membrum lympham vel sanguinem quasi revellere aut avertere potest: v. gr.

℞. Fri Glat. gr. vii.

emet. gr. j.

Gutt. Gamandr. gr. iiij. vel v.

Θis volat. Succin. gr. iiij.

Sacch. rosat. gr. vj.

M. f. Pulv. subt. d. ad ch. sumatur statim pro dosi. Vel Radicis *Specacuanæ* pulvis ad 3℞. vel ʒij. exhibetur.

His præmissis accedendum est ad incrassantia, absorbentia & antispasmodica; sed quæ tamen sanguinis circulationem minimè impédiant.

℞. Ol.

℞. Ol. Amygd. dulc. rec. expr. ℥i℔.
 Axung. canin. non vetust. ℥℔.
 Spermat. Cet. rec. ℥i℔.
 Essent. Croc.
 Lignor. ana. ℥℔.
 Diacod. Montan. ℥vj.

Misc. detur ad Fictile, de quo sæpe cochleare plenum capiatur.

Vel ℞. Looch. de Pulmon. Vulp.
 Syrup. de Juzjub.
 Heder. terrestr. ana. ℥vj.
 Anodyn. ℥℔.
 Aqu. Veron. ℥ij.
 Hyssop. ℥j.
 ☉is volat. Oleos. Sylv. ℥j.

Misc. detur ad Vitr. sumatur frequenter cochleatim.

Vel ℞. Oxymel. helleb. Gesner.
 Syrup. de Farfar. ana. ℥i℔.
 Spir. antasthmatic. Michaël.
 Balsam. ☿r. tereb. ana. ℥j.
 Aqu. Solan. ℥ij.
 Essent. anodyn. Dan. Lud. ℥j.
 Misc. detur ad Vitr. singulis bihoriis cochlearia duo exhibeantur.

Vel ℞. Mellis rosac. aut
 Oxymel. squillit.
 Syrup. de Erys. Lob.
 Olei Olivar. opt. ana. ℥i℔.
 Specier. diair. simpl. ℥j.
 Aqu. Hyssop. ℥j.
 Essent. Lignor. ℥iiij.
 Misc. detur ad Fictil. sumatur sæpius per cochlearia.

Vel ℞. Millep. vivos grandes, num.
 20. vel 30.
 Contusis affunde

Aqu. Hyssop.
 Vini generos. ana. ℥i℔.

adjice Croc. orient. ver. ℥℔. stent per horam in loco tepido, postmodum exprime, & addito Saccharo rosato propina pro dosi subinde repetendâ.

Vel ℞. Gumm. ammoniac. ℥ij.
 Solv. in Aqu. Hyssop.
 Veron. ana. ℥j.
 Colatis adde Theriac. cœl. gr. iiij.
 Syrup. de Erys. Lob. ℥iiij.
 Tinct. Cast. cum Spirit. Sal.
 armon. par. ℥j.
 Essent. Croc. ℥℔.

M. detur ad Vitr. & sumatur pro dosi sæpius iterandâ.

Denique qui Catarrhis sunt obnoxii, quibus humoralis massa admodum est serosa, & salino vel salso-acris, quibus capitis vertex ut plurimum frigidus existit, qui debiliori sunt fibrarum stomachicarum & intestinalium tono, quique adeo ad vomendum & ad diarrhœam sunt proclives, illis præservatoria quædam Cura venit præscribenda. Suademus proin his, ut frequenter, quantum vires permittent, sudent, & quidem in Laconico, ut singulis propemodum mensibus dosim Massæ Pilularum marocostinar. aut de Succino Craton. aut hydropticar. Bont. aut Extract. panchymagog. Croll. assumat. Verno & autumnali tempore etiam Vinum medicatum purgans est proficuum: v. gr.

Cura Catarrhorum prochylica.

℞. Radic. Angelic.
 Caryophyllat.
 Calam. arom. ana. ℥iiij.

Dd

Herb.

Herb. Betonic.

Chamædr.

Summit. Cent. min. ana. Mj.

Absynth.

Abroton.

Amarac. ana. Mß.

Baccar. Laur. 3ij.

Semin. Fœnic.

Aquileg. ana. 3ij.

Flor. Stæch. Arab. pij.

Fol. Sen. opt. mund. 3j.

Agar. trochisc.

Rhab. elect.

Radic. Helleb. nigr. ana. 3ij.

Cortic. Winter.

Θis Rutæ ana. 3ij.

Incisis, contusis atque in nodulo ligatis affunde Vini albi Veteris Mens. 1 $\frac{1}{4}$ sive Libras quatuor pond. civ. Aquæ ferventis 1b. Hinc quotidie mane cyathus exhauriatur.

Si quis Sanguinis quantitatem sufficientem obtineat, absoluto ad medium Vino medicato Venam Brachii sibi curabit aperiri, atque septem vel octo uncias sanguinis emitti.

Intermedio tempore serum sanguinis acre mitigabunt, copiosumque diminuent etiam sequentia diuretica, absorbentia, diaphoretica, &c. alternatim usurpabilia, diversis sub formulis, ne fortè nauseam pariant: v. gr.

℞. Essent. Succin.

Beton. ana. 3ij.

Ambr. gryf. 3j.

M. d. ad Vitr. Dosis m. ac vesp. gutt. 2. cum Infus. fol. Thee & Meliß. vel cum Aqu. Beton. aut cum Jusculo farin.

Vel ℞. Essent. Lign. Sassafr. cum Spirit. Serpill. par. 3ß.

Ess. Chamædr. 3ij.

Ol. stillat. Majoran. vel

Rorismar. 3ß.

Misc. d. ad Vitr. Dosis gutt. xx. cum vehiculo convenienti.

Vel Essent. Trifol. fibr.

Catarrhal. ana. 3ij.

Aqu. Cinam. cum vin. dest. 3j.

M. d. ad Vitr. Dosis 30. guttæ m. ac vesp. horâ ante pastum.

Vel ℞. Radic. Helen.

Calam. arom. ana. 3iß.

Galang.

Cyper.

Zedoar. ana. 3ß.

Herbar. Beton.

Meliß.

Majoran.

Salv.

Trifol. fibrin.

Card. bened.

Hepat. nob.

Summit. Absynth.

Rorismar.

Cent. min. ana. Miß.

Florum Calendul.

Primul. Ver.

Rosar. rubr. ana. Mj.

Cinam. elect. 3iß.

Cubeb.

Macis. ana. 3ß.

Incisis, contusis atque sacculo inditis affunde Vini albi Veteris Mensuras 24. vel 30. aut

Cerevisiæ optimæ, claræ, generosæ ac benè defæcat. Mensuras 25. vel 30.

Singulis dein mensis sive pastibus uncia quatuor cum cibis hauriantur.

Vel

Vel ꝛ. *Conserv. Rosar. rubr.* 3vj.
Amarac.
Flor. Anth. ana. 3ß.
Nuc. Indic. condit. 3iß.
Condit. rad. Acor. 3iiij.
Specier. diamb.
aromat. rosat. ana. 3ß.
Succin. alb. ppt. 3j.
Syrup. de Beton. q. s.
M. f. Elect. d. ad Ollam; dosi m. ac
vesp. vel semel de die magnitudo nucistæ.
 Sunt qui solam *Conservam Beton-*
nic. aut *Flor. Aurant. Flor. Primul. ve-*
ris, Flor. Anth. Summit. Majoran.
Thym. Folior. Melissæ, & sim. mane &
 noctu lambunt per longum tempus.
 Prodest & *Tragema* sequens, vel non
 absimile:

ꝛ. *Specier. diatr. santal.*
diamb. ana. 3iß.
Rasur. Ebor.
Corall. rubr. ppt.
Succin. alb. ppt.
Terr. sigillat. ana. 3ij.
Japonic. 3ß.
Flaved. Cort. aurant.
Pulver. fol. Meliss.
Majoran.
Semin. Fœnic. ana. 3j.
Cardamom.
Cubeb. ana. 3ij.
Sacchar. alb. 3iiij. vel. 5.
Misc. f. Pulv. subtil. d. ad scatul.
Dosis quotidie ad 3ij.
Infusum fol. Thee, Betonic. Cha-
mædr. Trifolii fibr. Radic. Calam. arom.
Caryophyll. Ligni Sassafr. Quajac. &c.
 nonnihil fortius factum, & quotidie
 semel potum itidem *Catarrhos* arcere
 potest.

Externè Cucupha, ex *Herbis ce-*
phalicis, Gummatibus & Aromatibus
concinata, in capite perpetim gestari
 debet. *Capilli capitis* deradendi, at-
 que *capillitium* gestandum. *Vertici*
 subinde illini potest *Oleum stillat. Bac-*
car. Juniper. Succin. Rutæ, Lavendul.
Majoran. Thymi, Fonticulus in brachio
 vel pede sinistro excutetur, & continuè
 gestetur. Subinde *Fumus* optimi *Tab-*
baci fugatur, imò *errhini,* vel etiam
sternutatorii Pulveres naribus mode-
 ratè immittantur. *Friktiones capitis*
 & *dorsi* frequentes cum *linteis calen-*
tibus mollibus instituantur.

In *Diætâ Aër* humido-frigidus
 diu nunquam frequentetur. *Cibi* non
 sint serosi nimis, sed exhibeant nutri-
 mentum balsamicum optimum. Pro
Potu ordinario bibendum est *Vinum*
rubellum, rubrum scilicet *Vino albo,*
 vel *Aquâ bonæ notæ* nonnihil dilu-
 tum ceu saluberrimum. *Alvus* respon-
 dere debet quotidie naturâ vel arte. Et
Corpus exercendum est probè. *Æstivo*
 tempore *Thermarum,* imprimis *Plum-*
bariensium Lotharingiæ, Badensium Hel-
vetiæ, Carolinarum Bohemiæ, Wisba-
densium Wetteraviæ, similesve aliæ
 conducunt, debito cum *Regimine*
Diætæ usurpatæ.

CEPHALÆA à κεφαλή, *Caput Cephalææ*
 derivato nomine, est *Capitis dolor*
 diuturnus, inveteratus, per plures
 menses, imò & annos, nunc majore,
 nunc minore cum vehementiâ du-
 rans, & vel continuè, vel per perio-
 dos, ut plurimum incertas, hominem
 affligens.

Ter. af-
filiis.

Afficiuntur nunc sub Cranio Membranæ sive Meninges Cerebri, nunc supra Cranium hærens membrana, *Pericranium* dicta, vel superjacentes aliæ. Dolor hic nonnullis ita consuetus est, ut etiamsi non continuè daret, levi nihilominus de causâ redeat. Alioquin *inveteratus* est, & modò utramque, modò alterutram, tantùm partem Capitis occupat. Si utramque occupet, *Cephalæa*, si alterutram duntaxat, *Hemicrania* vocatur, de quâ suo loco.

Causa.

Producitur verò iste morbus à causâ aliquâ continente perpetuâ, quemadmodum sunt, v. gr. Scirrhus aliquis sub cranio aut supra illud enatus, item Lapillus, Vermis, stagnatio Pituitæ viscidioris in variis tubulis, unde membranæ vel comprimuntur molestè, vel distenduntur; vel punguntur, & lacerantur, aut roduntur. Sic & quando à causâ quacunque v. gr. à vitio quodam conformationis nativo, aut à depressione Cranii angustati sunt tubuli Cerebri, ut Sanguis vel Lympha ægrè admodum transire queat, tum itidem ab iisdem tubulis distensis, hincque spasmodicè simul crispatis variis membranis nerveis dolor ille fixus excitatur. Si verò Lympha aut Sanguis, sæpè justò crassior, non nisi lento gradu tubulos illos transmeare potest, tunc itidem Cephalæa sive dolor frequenter recurrit. Tandem spina Cranii ab accepto vulnere aut contusione subtus meningi infixa, continuè pungendo Cephalæam excitat. Sic & qui durum admodum & crassum habent Cranium,

in quo Suturæ omnes per arctissimam coalitionem oblitteratæ sunt, quibus itidem Cranium simul & membrana investiens corroditur, prout in Luevenereâ; aut quibus congestio quædam est facta humoris viscidii, indurati circa Cranium; quibus denique ex contusione aut vulnere Cranium difforme est redditum, his frequentes quoque dolores Capitis, mutatâ temperie aëris obtingunt.

In *Cephalæa* dolor vel perpetim sine intermissione affligit, dum et si interdum mitior evadat, mox tamen iterum acerbior redit; vel aliquando penitus remittit, & per intervalla, tanquam per *paroxysmos*, revertitur, eosque nunc *regulares* & *ordinatos*, certis diebus vel hebdomadis, mane, sub meridiem, aut vesperi recurrentes, atque plurium vel pauciorum horarum spatio durantes; nunc *irregulares*, incertis temporum intervallis redeuntes, prout qualiscunque causa vel levissima externa occasionem dederit. Quandoque dolor hic sub Cranio suam sedem unicè habet, sicque ab attactu externo neutiquam exacerbatur, & hinc dici potest *Cephalæa interna*. Qui verò dolor extra Cranium in membranis obhæret, contactu ingravescit, & *Cephalæa externa* dici poterit. Hæc interdum ab internâ originem habet, adeoque cum illâ simul excruciat. Extus verò nunc utrumque, nunc alterutrum tantùm latus capitis afficit; nunc etiam instar Clavi infixi unum locum capitis veluti perterebrat, *Clavi* nomine peculiari eapropter veniens. Nonnunquam

quam & nodos in Cranio protrudit, sicut in Lue venereâ. Si Cephalæa est à *Spinâ osseâ* Cranii, tunc præcessit Vulnus, vel Contusio insignis, dolorque sentitur pungens. Si est à *Vermē* aliquo in Vesiculâ quadam incluso, tunc dolor observabitur lacerans, rodens, nunc mitior, nunc gravior, nunc etiam prorsus cessans, quando scilicet Vermiculus quiescit. Si est à *Calculo* productus, asperitate suâ rodente, aut pungente, tunc dolor lancinans, ac perpetuus sentitur, sine magnâ remissione. Si provenit à Tumore quodam scirrhuso, tum dolor sentitur gravans, obtusus, intensior etiam, quando ab exercitatione corporis sanguis æstuat. Si ortum ducit ab Humoribus crassis ac viscidis, tunc periodicus magis est dolor, ac multum varians. Qui denique ab humoribus acribus, salinis, acidis corrodentibus, scorbuticis aut venereis provenit dolor, ex acerbitate ejus majore, lancinatione ac velut trebratione insigni cognoscitur; præcesserunt etiam signa Scorbuti, vel Luis venereæ.

In *Prognosi* tenendum, quod Cephalæa à Calculis, Vermibus, aut Scirrhuso proveniens penè sit immedicabilis, & hominem plerumque ad mortem usque comitetur. Imò Vermis, si incre scat, Delirium quoque aut Maniam post se trahere valet. Si tamen fortè contingat, ut Vermis emoriatur, tunc Æger à dolore quoque liberatur. Quando Cephalæa, ab humoribus aut etiam à Tumore quodam in Abscessum erumpente, producta fuit, tum curatur, quamprimum Ab-

scessus extra Cranium erumpere potest. Quæ denique Cephalæa à malâ Cranii conformatione, sive nativâ sive adventitiâ, ortum trahit, curationem similiter omnem respuit.

In *curatione* Cephalææ, quæcun-
que demum ejus causa sit, ad nihil attenditur aliud, quàm ut dolorem quovis possibili modo tollamus. Vbi igitur spina ossea Cranii perpetuò Meningem pungit, ibi nullum superest remedium præterquam *Trepani applicatio*, eo ipso in loco, aut quam fieri potest proximo, ubi dolor punitivus sentitur, instituta; quâ operatione factâ commodis Instrumentis spina dicta extrahi debet, hincque Vulnus tam Ossis, quàm Cutis superstratæ debitâ ratione sanari. Hæc autem *Trepanisatio*, non secus ac similes aliæ Operationes chirurgicæ in Chirurgiorum de hac Materiâ expressè scriptis libris fusius docentur, omnium optimè verò ex frequenti inspectione addiscuntur.

Quando autem *Scirrhus* ac Tu-
mor aliquis pituitosus Cerebri in culpâ est, tum ante omnia *Pilulæ purgantes* cum *Mercur. dulc.* exhibebuntur, & subinde repetentur. Dein per longum tempus usurpabuntur ea, quæ inviscatam Lympham resolvere paulatimque volatilifare possunt; quem in finem conducunt *Infusa Herbar. Thee, Beton. Hyssop. Meliss. Trifol. fibr. Cochlear. Beccabung. Thym. Amarac. Salvo. Chelidon. major.* aliarumq; blando sale volatili oleoso gaudentium. imò & harum ipsarum *plantarum Essentia*, cum *Spiritu Cochleariæ* atque

Curatio.

Cephalæa à Scirrhuso

Serpilli aut *Meliß.* extracta, vel *Sal. Vol. C. C. Succin. Viper. Ebor.* ad gr. 6. quotidie; vel etiam *Essent. Trifol. fibrini, Nasturt. Betonic. Plantagin. aquat. Hyperici, Tinctur. Pæon. Castorei cum Spirit. Sal. armon. par. Succin. ♀ nii, ♂ tis aperitiv. Spiritus Cochlear. Sal. arm. urinos. C. C. vol. aperitivus Penoti, Sal. vol. oleos. Sylv.* vel simile aliud, in usum trahi possunt, dosi quotidianâ guttularum 20. ad 30. Sunt qui & ex ipsis *Thee foliis* cum *Spiritu Vini* aut *Serpill. Anth. &c.* extrahunt *Essentiam*, & cum fructu ad gutt. 30. frequentissimè in Capitis obstructionibus usurpant. Æstivo tempore profunt *Thermæ Fabariens. Helveticæ*, aut *Plumbariæ Lotharingiæ*, similesve aliæ per Europam notæ tam in *Potu* quàm in *Balneo*. Neque verno tempore contemnimus *Juscula Plantis antiscorbuticis*, aliisque sale alcalino-volatili blando gaudentibus alterata, ac per plures hebdomadas hausta. Si *Pulveres* quis desideret, protinus *Lunâ* decrescente commendamus *Pulverem pro Botio* sive *Strumis*, cujus 3j. singulis quis noctibus capere, ac sequente dein mane semper *Infusum fol. Thee* aliarumque *Herbarum* super haurire potest. Externè aliquid heic præstare valent *Sacculi* ex *Herbis cephalicis* parati, *Vino rubicundo* incocti, hinc expressi, & calidè sæpius applicati, quos tamen ante applicationem adhuc *Spirit. Anth. Meliß. vel Vini camphorata*: adspargere licet.

Cephalæa
à tubulo-
rum ob-
structione.

Quibus *Cholericis, Scorbuticis* aut *Melancholicis* Cephalæa obtingit à frequenti obstructione Tubulorum cere-

bralium, his melius non datur remedium, præter *Acidularum*, vel etiam *Thermarum Piperinarum, Embsensium* aliarumve, non secus atque *Succorum & Aquarum* ex *Herbis antiscorbuticis* destillatarum, potum, cum bono regimine diætæ debito tempore usurpatum. Autumno tamen & Hyemè profunt quoque vel *Essentiæ cephalicæ Succini, Betonic. Thee, Majoran. Roris marin. Trifolii fibrini* vel *Tincturæ Corallor. ♂ nii, Spirit. Theriacalis camphoratus*, & simil. ad guttas 15. 20. vel 30. mane ac vesperi usurpatæ; vel *Infusa* dictarum *Herbarum*. Sed & necesse est quandoque corpus blando Cathartico expurgare, ac ubi sanguinis quantitas adest, Venam secare, vel etiam Cucurbitulas cum scarificatione dorso applicare.

Si *Vermes* in culpâ hæere credantur, usus longus & diuturnus *Aquarum* ex *Herbis Matricar. Centaur. minor. Abroton. Absynth. Card. bened. Semin. Plantag. Santonic. Rut. destillatar.* vel *Succorum* è *Plantis Nasturcinis* expressorum quàm optimus est, quotidie de illis aliquot uncias capiendo. *Essentiæ* item *Seminis Cynæ* ac *Tanaceti* ad 3j. vel 3j. quotidie data multum conducit. *Suctio Fumi Tabaci* frequens & heic non contemnenda, inprimis si *Semen Cynæ, Anisi, Storax calamit. & Cinnabar. Nicotianæ* permista fuerint. Tandem & purgans aliquod cum *Mercurio dulci* sæpius exhibendum.

Calculus verò in Cerebro hærens nullo inde deturbari potest remedio quin ad mortem usque Hominis ibidem hærebit, nec multum levamini quoa

oad dolores concedet. Cephalæa dem à Cranii depressione, vel aliâ alâ conformatione Capitis, nativâ adventitiâ, non secus atque à Cra- ni & Periostii corrosione in Lue ve- vereâ inveteratâ proveniens, vix iam, quàm palliativam admittit uram, nisi Cranium elevare, vel Cute- cisâ humori corrosivo exitum pro- curare, cariem & corruptionem Cranii- que Pericranii debitis absorbentis- us emendare atque perfanare velis.

Tandem Diæta hominibus Ce- phalæâ laborantibus quàm maximè necessaria est; in quâ non solum ani- mi Passionum insigne moderamen ten- dendum, sed & Aër temperatus, Ex- ercitia corporis modica, Vinum album enue, vel Cerevisia probè defœcata, tenuis & pellucida, Cibi itidem opti- ni succi ac concoctu faciles sunt se- genda. A veneris usu quoque ab- tinendum.

CEPHALALGIA, ex κεφαλή, caput, & ἄλγος, dolor, compositâ vo- ce, est dolor vel tristis sensatio mem- branarum Capitis partium minùs diuturna, juncta plerumque cum vi- giliiis, aliisque incommodis, ortum de- dens diversis causis, fibrillas membra- rum nervosas plus minus graviter ædentibus, & continui solutionem molientibus.

Afficiuntur in hoc Morbo nunc Meninges Cerebri, nunc membranæ & tunicæ variæ extra Cranium sitæ, etiam quæ Suturas ipsius penetrat. Si autem membranæ istæ vel in medio Cranio, vel per totum caput dolent,

morbus propriè *Cephalalgia* audit; ubi verò sive in Fronte tantùm, sive in Occipite, sive in dextro aut sinistro so- lùm latere membranæ afficiuntur, tunc *Hemicrania* appellatur.

Cùm autem Dolor ille nunc *grava- tivus*, nunc *obtusus*, nunc *pungens*, *lan- cinans*, *terebrans*, aut *pulsans*, vehe- mentior vel remissior sit; variæ quo- que illius *causæ* erunt. Principalis *Causa*, tamen, est obstructio canaliculorum quorundam, sive lymphaticorum, sive sanguiferorum, inducta ab humo- ribus crassis, lentis, viscidis, modò ægrè transeuntibus, modò ibidem quoque stagnantibus; atque vel acrimoniâ nimium pungendo, vel quantitate ni- mis expandendo &c. molestam sen- sationē, ac fibrillarum nervearum præ- ternaturalem tensionem sive crispa- tionem excitantibus. *Pulsans* hinc dolor non nisi sanguini æstuanti & crasso est adscribendus, arterias ad for- tiorem pulsationem stimulant, ac inde etiam difficilius per capillares canalicu- los transeunti, ut proin fortiore pulsu opus sit ad eundem transmittendum: atque talis dolor nunc febricitantibus, nunc aliis etiam contingit, qui vel in aëre æstuante, flante multum vento aquilonio, vel in aëre frigido-humido diu admodum versati sunt; vel acri sanguine præditi vehementem corpo- ris exercitationem instituerunt; vel odorem quendam valde gravem & adversum naribus exceperunt; vel Inflammatione & Abscessu Cerebri la- borant, vel denique generoso sese ob- ruerunt Vino, eoque admodum tar- tareo, minùs penetrante ac diuretico,

Dolor

Dolor verò *pungens*, *lancinans*, aut *terebrans* oritur à stagnantis cujusdam lymphæ particulis salino-acidis, acribus & rodentibus. *Obtusius* tandem *gravansque* pituitæ stagnanti minus acri attribuendus venit, illisque imprimis contingit, in quibus communia Narium, Aurium vel Palati emunctoria suis non defunguntur muniis, secretoque humori liberum exitum, propter aliqualem in tubulorum extremitatibus contingentē obstructionem, denegant. Sic & Capitis Vulnere, ictus atque contusiones graves, Alvi constipationes, Mensium aut Hæmorrhoidalis fluxûs periodici suppressiones, Somnus & Vigiliæ immoderatæ, Ira atque Terror vehemens, dolorem quoque non rarò post se trahunt. Nec infrequens est idem in Lue Venereâ, Scorbuto, Febribus continuis atque ardentibus.

Differentia Doloris Capitis.

Differentia tamen adhuc aliæ quædam Capitis dolorum sunt notandæ, à diversis procul dubio causis oriundæ; etenim Dolor est vel *idiopathicus*, cujus proxima causa in ipso capite hæret; vel *sympathicus*, qui propter nervorū & membranarum consensionem excitari solet à causis extra caput hærentibus, v. gr. in Ventriculo, Intestinis, Utero, quarum partium fibræ nervosæ, si ab humore acidò-austero, acri, crudo, vel à bile, vermib⁹, aut flatib⁹ lancinantur, crispanturve, non rarò per consensum etiam fibras Meningum Cerebri affligunt, indeque tristem in animâ sensationem producant. Respectu magnitudinis dein etiam dolor nunc *vehementior*, nunc *mitior*; & ratione alia-

rum circumstantiarū, modò *brevis* modò *diuturnus*; modò sub Cranio tens; modò partes extra Cranium occupans; modò *cum* modò *sine* febris affligens; modò *periodicè*, modò *sine* regularibus periodis homini molestus.

Capitis Dolor omnis ex ægrotantium querelis cognoscitur. Verùm cum differentes istius causæ existant, partesque capitis diversæ laborent, hæc certè indicia probè veniunt examinanda. Quod si proin dolor extra Cranium versatur, tum Cutis compressione augetur: acerbior verò longè est cruciatus, quando pericranium læditur, quàm quando fibræ membranarum cutanearum & panniculi carnis offenduntur. Quando contumaciter perseverat dolor, externoque attacko non exacerbatur, tum partes sub Cranio sitas magis affici judicandum est. *Punctorius* dein dolor fibras à salino-acidis acribus particulis irritari indicat. *Gravante* cum faciei pallore, somnolentiâ, sensuum hebetudine, & segnitie dolorem producit obstructio, aut compressio vasculorum maximè lymphaticor. à crassitie & lentore seri sanguinei oriunda. Sanguinis crassi & astuantis difficilem per arteriolas minores transitum, imò & incipientem stagnationem inflammatoriam indicat dolor *pulsatorius*, cum majori vel minori totius calore hominem afficiens. Si dolor fuerit *lancinans*, ac rodens, tum salia vel acida vel salsa acria, subinde scorbutica, malum producere indicantur. Si *terebrans* extiterit, tū sal salis acre fixum in culpâ ferè est. *Tensivus* denique dolor cum vertigine & libili-

aurium

Aurium ferè junctus flatulenti humoris præsentiam indigitat. *Idiopathicum* porrò dolorem esse significatur, quando nulla extra caput pathemata corpus divexant. *Sympathicus* autem, & quidem à vitio stomachi, cognoscitur, quando frontem magis occupat, quando itidem ructus, nausea, vomitus, singultus, anorexia adfunt. A Vermibus proveniens dolor ex signis præsentium lumbricorum judicatur, nec ita continuus is est, sed cum oris fœtore, aliquali vertigine, & velut rei cujusdam viventis, inque abdomine rodentis vel morsicantis sensu conjunctus. Vterus si fuerit in culpâ, dolor magis in occipite existet, mensium fluxus segnis aut suppressus erit. Si dolor fuerit acerbus, cum calore totius mordaci, inquietudine, vigiliis, amore oris, colore faciei citrino, siti, nausæâ, urinâ magis tinctâ, bilem in ventriculum profusam, saliaque humoralis massæ oleosa nimis exaltata esse notatur. Vbi dolor contumax est, vel cum reciproco frigoris & incallescenciæ sensu frequentius redit, ibi lymphæ certè crassa, viscida & acidio-austeriuscula in motu suo per canaliculos sæpè impeditur. Si dolor fixus semper, immobilis, terebrans, medicaminum quorumvis efficaciam respiciens existat, cum sopore quandoque junctus, sed sine febris, tum vel Scirrhus, vel Calculus, aut simile quid sub Cranio hæere judicandum. Si frequens est, à levi interdum causâ, v. gr. motu corporis vehementi, vini generosi haustu, aëre nunc frigido, nunc fervido, odore ingrato &c. irri-

tabilis Cephalalgia, signum est, vitium aliquod conformationis in Capite, vel Intemperiei in sanguine latere; hinc enim est, quòd nonnulli vel à naturâ Cephalalgia sint obnoxii.

Si *Prognosis* spectes, dicendum quidem, Cephalalgiam, quando simpliciter sine comite alio Affectu morbo-
so Hominem affligit, nullum vitæ discrimen portendere; sed si Febris malignæ jungatur, eam periculosam facit. Si citra Febrim Hominem inassuetum cum aliquali Vertigine, & pulsu vehementi ac magno, inclinatione quoque ad soporem, & vigilias reciprocas, affligat, tum ferè solet prænunciare Apoplexiam. *Quibus bene valentibus Capitis dolores derepente contingunt, statimque voce deficiunt, & stertunt, intra dies septem pereunt, nisi Febris eos prehenderit: Hippocrat. Sect. 6. Aphor. 51.* Ita sympathicus Dolor minus diu durat, quàm idiopathicus; & qui causam minus fixam habet, citius quoque transit.

In *Curatione* statim attendendum, num *sympathica* vel *idiopathica* existat Cephalalgia. Sympathica à Ventriculi cruditatibus biliosis aut pituitosis oriunda emeticum statim exhibendum indicat: v. gr.

R̄. Cremor. Fri gr. xij.

Θis Amarac.

Cinnab. † n. opt. ana. gr. iij.

Fri emet. gr. ij.

M. f. Pulv. subt. d. ad chart. pro dosi cum jusculo capiendâ.

Vel R̄. Radicis Asar. vel Ipecacuann. gr. 25. ad 30.

Salis essential. Acetos. gr. vj.

E e

Olei

Curatio
Cepha-
lalgia
sympa-
thica à
crudita-
tibus sto-
machi.

Olei stillat. Mac. gutt. j.

*Misc. f. Pulv. subt. detur pro
dosi.*

Vel R̄. Aqu. bened. Ruland. ʒB. ad ʒvj.

Cinam. cum Vin. dest. ʒvj.

Borragin. ʒB.

Syrup. Capill. ʒr. ʒij.

M. detur ad Vitr. sumatur unâ vice.

Præmisso vomitorio stomachica mox
ordinabuntur remedia, qualia possunt
esse seqq. v. gr.

R̄. Elix. propr. Claud. ʒB.

Essent. Succin.

Absynth.

Zedoar. ana. ʒj.

*M. detur ad Vitr. Dosis m. ac. v. horâ
ante pastum 30. vel 40. gutt. e cum
Jusculo vel Vino.*

Subinde post pastum etiam cochle-
are unum alterumve plenum *Elixiris*
vitæ Matthioli, vel *Spiritus Ceras. ni-*
gr. Liqueoris Roris Solis, *Vini Malvati-*
ci, *Hispanici*, aut *Hungarici* hauria-
tur, ad digestionem ventriculi robo-
randam. Aut certè *Infusum fol. Thee*
& *Betonic. cum Cortic. Citr. vel Aurant.*
& *Caryophyll. arom. vel Decoctum gra-*
nor. Caffee tost. calidè bibatur.

ab acido
nimio
stomachi

Si acidi multum in Stomacho hæ-
reat, à vinosis ac spirituosus sulphure-
is est abstinendum; *Decoctum Ligno-*
rum lene pro potu ordinatio biben-
dum, & Pulvis absorbens, acidum
validè destruens per plures hebdoma-
tas usurpandus: v. g.

R̄. Rasur Ebor. ppt.

Ocul. ʒ ppt.

Corall. alb. ppt.

ʒ n. diaph.

Lact. Lun. ana. ʒij.

Semin. Anis. ʒj.

Cinam. opt. ʒB.

Sacch. rosat. tab. ʒiB.

Misc. f. Pulv. subt. d. ad Scatul.

Dosis m. ac. vesp. ʒj. cum Infus. fol. Thee.

Ubi cruditates viscidæ & crassæ
existunt, absente nausæ & vomendi
desiderio, catharticum erit præscri-
bendum, præmisso tamen uno vel al-
tero præparante, ex *Sale Absynth. Ma-*
joran. Betonic. Centaur. min. cum Pul-
vere Cinamon. Caryophyll. Calam. aro-
mat. vel ex Tinctur. ʒn. Betonic. Co-
rall. ʒe volat. oleos. & simil. concin-
nando. Purgans hinc esse potest se-
quens, vel simile:

R̄. Radic. Jalapp. ʒj.

Scammon. ʒrat. gr. iiij.

Crem. ʒri ʒB.

Ol. stillat. Roris m. gutt. ij.

M. f. Pulv. subt. d. ad ch. pro dosi.

Vel R̄. Syrup. Ros. solut. comp. cum R.

A. & S. ʒij.

Confect. Hamech. ʒij. ad ʒiiij.

Aqu. Beton. ʒj.

Fenic. ʒij.

Cinnam. ʒj.

M. f. Potio detur ad Vitr. pro dosi ma-
tutinâ.

Purgato corpore supra dicta stoma-
chica in usum trahi poterunt: vel

R̄. Specier. dianth.

Imperat. ana. ʒiB.

Pulv. fol. Majoran. ʒij.

rad. Cal. arom. ʒj.

Aron. ʒB.

Rasur. Ebor.

C. C. phil. ppt. ana. ʒiiB.

Arcan. duplic. ʒB.

Sacch. alb. ʒiiij. vel v.

M. f.

M. f. Pulvis subt. d. ad scat. Dosis m. ac vesp. ʒj. ad ʒij. cum Pane tosto & Vino macerat.

In Cephalalgia à Vermibus & Cruditatibus Intestinorum oriunda Clyisma statim ordinetur v. g.

R̄. Radic. Angelic.

Lil. alb. ana. ʒʒ.

Herb. Violar.

Betonic.

Ocym.

Chamædr.

Alth.

Flor. Chamom. ana. Mj.

Stæchad. Mʒ.

Bacc. Juniper.

Semin. Carv. ana. ʒij.

Incis. & contus. coq. in s. q. Aqu. fontan. Colaturæ ʒʒj. adde

Mellis rutac. ʒj.

Olei Olivar. ʒij.

Θis Geimm. ʒʒ.

Misce f. Clyster tepidè injiciendus, atque etiam pro re natâ repetendus. Vel simplex Clyisma ex solo Lacte bubul. cum Melle & Butyro injici poterit, quod Vermes alliciet in Alvum.

Postea laxans quoddam exhibendum, v. g.

R̄. Syrup. de Cichor. cum Rhab. ʒij.

Elect. è Succ. Ros. ʒʒ.

Aqu. Gramin.

Fenic. ana. ʒvj.

Mercur. dulc. opt. gr. xv.

M. f. Potio d. ad Vit. pro dosi.

Vel R̄. Radic. Gramin.

Scorzoner. ana. ʒj.

Cortic. rad. Mor. ʒʒ.

Rhab. elect.

Fol. Sen. opt. mund. ana. ʒij.

Semin. Anis.

Santonie. ana. ʒʒ.

Crem. Fri ʒj.

Cinam. elect. ʒʒ.

Incis. contus. atque in nodulo ligatis affunde Aqu. fontan. q. s. stent per noctem in loco calido, postridie mane bulliant parum; hinc Colaturæ ʒʒʒ. adde Syrup. flor. Persic. ʒʒ. Detur ad Vit. pro dosi matutinâ. Quod si Infusionis hujus ʒvij. addas Syrupi flor. Persic. ʒj. tum duas habebis doses, binis vicibus mane sumendas cum successu haud infelici.

Laxato autem sic Corpore proderit Elixir propr. Clauder. cum Essent. carminat. Wed. permistum. Vel Aqua physogona, aut Matricar. Absynth. Abroton. Aneth. Centaur. min. cum Tincturâ Absynth. Zedoar. & Opii Langel. mixta, ad aliquot cochlearia quotidie exhiberi poterit. Exterius verò Abdomen simul Oleo Anethi, Menth. Chamomill. Balsam. Peruv. inungetur, & Sacculus, è carminativis paratus calidè applicabitur. Vinum quoque aut Cerevisia medicata laxans heic prodesse potest, è Radicib. Gentian. Carlin. Scorzoner. Petasitid. Calam. arom. Angelic. Cichor. Cortic. rad. Mori, Herb. Matricar. Meliss. Aneth. Abroton. Absynth. Card. bened. Marrub. alb. Cent. min. Seminib. Lupuli, Santon. Dauci, Fenic. Foliis Senæ, Radic. Rhab. el. Hellebor. nigr. Mechoacann. Agaric. trochisc. Cinamon. opt. Θe Absynth. &c. composita.

Si ab irritatis Uteri membranis aut nervis Dolor capitis fuerit natus, tum Clysmata profunt, aliquoties iteranda.

Cephalalgia ab Vtero.

da, & parata è Decocto Radic. Imperator. Valerian. Menth. Alth. Herbar. Alth. Puleg. Malv. Meliss. Mercurial. Matricar. Rutæ, Artemis. Flor. Chamomill. Calendul. Stæchad. Arab. Semin. Fœnicul. Aneth. Cumin. Baccar. Laur. Juniper. Internè autem quotidie dabitur Tinctura Succin. Croc. $\frac{1}{2}$ nii. Castor. cum Spir. Sal. armon. parat. Elix. uterin. Croll. Essent. Castor. Trifol. fibrin. Cortic. Aurant. Puleg. vel simile, cum Aquâ quadam appropriatâ, v. gr. Matricar. Meliss. Salv. Chamomill. Card. bened. Calamintb. Si Mensium fluxus non respondeat, etiam Venæsectio in brachio aut pede administrabitur, vel Cucurbitulæ cum scarificatione dorso applicabuntur. Balnei quoque usus tum erit proficiuus, sive Thermarum sulphureo-aluminosarum.

Cephalalgia idiopathica cura.

Quæ Cephalalgia idiopathica à Lue venereâ, vel Scorbuto originem trahit, non melius, quàm hisce Affectibus extirpatis curabitur. Vide Titulos de Lue venereâ & Scorbuto.

à spinâ, calculo, vermicibus, scirrhus.

Quæ à spinâ ossæ, calculo, vermicibus, aut scirrhus quodam tumore originem ducit, curationem admittit sub præcedenti titulo de Cephalæâ expositam.

à Lymphæ stagnatione.

Quando autem Capitis dolor à feri vel lymphæ viscido-acris stagnatione in tubulis Cerebri provenit, tum ante omnia digestivi pulveres aliquot dabuntur, parandi ex Ocul. $\overline{\text{O}}$. ppt. $\frac{1}{2}$ nio diaph. Diaphor. Jial. Bezoard. miner. Radic. Aron. Salibus Absynth. Card. bened. Helen. Amarac. Beton. Crem. Fri, Fro Glat. Θ e polychrest. &c. v. gr.

R $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$ n. diaphor.

Θ is polychrest. ana. 3ß.

Beton. vel

Cent. minor.

Fri Glat. aa. gr. xij.

M. f. Pulv. subt. d. ad ch. pro 2. dosibus.

His præmissis purgans exhibebitur mercuriale, cui scopo inservient Mass. Pilul. è Succ. Craton. Marocostin. Fear. Quercetan. Extract. Panchymag. Croll. Catholic. Pilul. coch. Rhabarb. Hellebor. nigr. aut similibus cum Mercurio dulci vel Cinnabari $\frac{1}{2}$ n. correct. v. gr.

R $\frac{1}{2}$. Extract. cathol. vel panchymag. Mass. Pilul. marocost.

è Succ. Crat. aa. gr. vij.

Resinæ Jalapp. gr. ij. vel iij.

Cinnab. $\frac{1}{2}$ n. corr. vel Mercur. dulc. opt. 3ß.

Ol. stillat. Rorismar. q. s.

Misc. f. l. a. Pilulæ num. 15. Inauratæ dentur pro dosi. Si Ager respuat Pilulas, earum loco Pulvis concedetur, vel Bolus, v. gr.

R $\frac{1}{2}$. Conserv. fl. Beton.

Anth. ana. 3ß.

Radic. Jalapp. 3j.

Scamm. $\frac{1}{2}$ rat. gr. iij.

Mercur. dulc. opt. gr. xij.

Crem. Fri gr. vj.

M. cum Sacch. f. Bolus d. ad ch. pro dosi.

Purgato corpore Infusum fol. Thée per aliquot hebdomadas m. & vesp. hauriendum, simulque capienda quædam Essentia cephalica, v. gr. Betonic. Thée, Anth. Majoran. Galang. Trifol. fibrin. Succin. Betonic. Ambr. gryf. Spir. Coch-

Cochlear. Sal. armon. Tinctur. Antim. Co-
all. ☉ volatil. oleos. Sylv. v. gr.

℞. Essent. Succin.

Beton. ana. ʒij.

Ambr. gryf. ʒiʒ.

M. detur ad Vitr. Dosis 25. ad 30. gutt.

m. ac vesp.

℞. Essent. Trifol. fibr. ʒiiij.

Anth.

Thée ana. ʒiʒ.

Tinct. Corallor. ʒij.

- Aqu. Cinam. cum Vin. destill. ʒiiij.

M. d. ad Vitr. Dosis m. ac v. 25. gutt.

℞. Specif. ceph. Mich. ʒiʒ.

☉ is vol. Viper. aut C. Cerv. ʒʒ.

M. f. Pulv. subt. div. in 6. dos. equ.

d ch. sumantur m. ac vesp.

℞. Spir. Cochlear. ʒij.

Liqu. C. C. succ. ʒj.

Aqu. Cinam. cum vin. dest. ʒj.

M. d. ad Vitr. Dosis m. ac vesp. gutt.

5. cum Aquâ Betonic.

Externe dolenti Capitis loco fre-

quenter calidè applicandum venit spi-

rituosum quoddam Epithema, con-

tinuandum è Spirit. Anbaltin. Lum-

bric. terrestr. Formicar. Melissæ. Lil.

onvall. Vini camphor. Ceras. nigr. An-

bos, Meliss. Juniper. cephalico qua-

cunque, antapoplectico, & ante-

leptico, Tinctur. Castor. cum Spir.

alis arm. par. Vel miscebitur Aqua

betonic. Salvæ, Meliss. Rosar. cum A-

cto destillat. & Spirit. Serpilli, hinc-

que linteam mixturæ calefactæ im-

mersum, iterumque expressum sæpi-

s applicabitur.

Vertici Capitis atque Temporibus

lini potest Oleum destill. Baccar. Ju-

pp. Succin. Rut. Nuc. mosch. Rorismar.

Lavendul. Majoran. Salv. Ocym. Me-
liss. Cinamom. cum Balsam. Peruv.

Nuchæ & Brachiis in malo pertina-

ci Vesicatoria applicantur: imò & Ver-

tici capitis raso Emplastrum rubificans

imponitur ex Seminib. Eruc. Sinap.

Radic. Raphan. rustic. Pyreth. Aceto ac

Fermento componendum. Vel Empla-

strum tenax è Tacamahacâ, Colophonio,

Balsamo Peruv. Semine Sinapi &c. con-

fectum applicatur. Clysmata quoque

acria, è decocto Plantarum cephalica-

rum & emollientium parata, & itera-

tis vicibus injecta salutaris effectu non

carent.

Tandem Cucurba, è Foliis Amara-

ci, Serpilli, Calaminth. Ocymi, Me-

liss. Florib. Anth. Stæch. Arabic. Pri-

mul. ver. Rosar. rubr. Betonic. Styrace

calamit. Benzoin, Oliban. Mastich. Mac.

Cinamom. Rasur. Lign. Santal. citr. Rho-

dii, aut similibus composita in Capite

gestetur.

Quod si à contusione, ictu aut vul-

nere accepto dolor excitatus sit, statim

Vena brachii secabitur; hinc Clysmata

emolliens atque detergens infundetur;

& quotidie m. ac vesp. cuspis cultri

plenus Pulveris ad casum Augustan.

cum haustu Decocti alicujus traumati-

ci exhibebitur. Extus Vulnus, si quod

adeat, consueto more deligabitur;

aliàs verò ad sanguinis circulationem

restituendam, laceratas & crispatas

fibras demulcendas Sacculus herbaceus

Vino incoctus frequenter calidè applica-

bitur; si Vinum haberi nequeat, sal-

tem Aquæ incoquetur cum admistio-

ne Passular. major. & tantilli Salis tar-

tari. v. gr.

℞ 3

℞. Herb.

Cephalal-
giâ à
Contusio-
ne, Vul-
nere.

℞. *Herb. Beton. Miiij.*

Absynthii.

Meliss.

Scabios.

Card. bened. ana. Mj.

Majoran.

Summit. Marrub. alb. ana. Mß.

Lavendul.

Rorismar.

Flor. Calend.

Primul. Ver. ana. pij.

Baccar. Juniper. 3iij.

Passul. major. exac. 3j.

Θis ʒr. 3j.

Incis. & contus. tenuiter insuantur duobus sacculis interpassatis, ut quam primum unus refrixit, alter in parato haberi, & applicari calidè queat.

Loco Sacculi tamen alii Lintea Spiritui Vini camphorato, vel Spiritui aliqui cephalico, in quo simul Gummi ammoniacum solutum fuerit, calefacto immergunt, exprimunt, & calidè apponunt. Atque sic pergunt, usque dum dolor cessaverit, nullaue amplius humorum stagnatio metuenda sit.

Cephalalgia ab æstu sanguinis, vel inflammatione.

Quod si denique Cephalalgia, sive externa sive interna, ortum debeat Inflammationi, aut æstui sanguinis crassioris, per vascula arteriosa ægre transeuntis, cum vel sine Febri, tum statim quidem alvus, si segnis aut constipata extiterit, Clysmate emolliente eluatur; hinc statim Venæsectio instituetur, ac deinceps Potiunculæ diaphoreticæ nonnullæ dabuntur, sequentem vel similem in modum:

℞. *Aqu. flor. Sambuc.*

Hed. terr.

Succis. ana. 3vj.

Syrup. de Nymph. 3ß.

Elect. diasc. Frac.

‡ n. diaph. ana. ʒj.

Cinnab. ‡ n. opt.

Nitr. ‡ niat. ana. gr. v.

M. f. Potio, d. ad Vitr. sumatur pro dosi, pluries si opus est reiterandâ.

Vel ℞. *Aqu. Betonic.*

Endiv.

Lactuc. ana. 3j.

Syrup. Capill. ʒr. 3ß.

Spirit. Nitr. dulc. vel

Mixtur. simpl. gutt. 15.

Bezoard. min.

Specif. Ceph. Mich. ana. ʒß.

Misc. d. ad Vitr. pro dosi.

Loco Potionis Mixtura cochleatim sumenda præscribi poterit: v. gr.

℞. *Aqu. Verben. 3j.*

Scabios.

Vlmar.

Syrup. Rub. id. ana. 3vj.

Tinct. ‡ n. vel Corall. 3ß.

Ebor. ust. ppt.

Specif. cephal. Mich. ana. ʒj.

Misc. d. ad Vitr. singulis triboriis aliquot cochlearia assumantur.

Juxta hanc Mixturam etiam Pulveres diaph. aliquot dabuntur:

℞. ‡ n. diaph.

Specif. cephal. Mich. ana. ʒj.

Nitr. ‡ iat. gr. vj.

Camphor. gr. iv.

M. f. Pulv. subt. div. in 2. dos. æqu. m. ac v. exhibendas, atque etiam porro iterandas pro rei exigentiâ.

Vel ℞. *Bezoard. miner.*

Pulv. Viper. ppt. ana. ʒj.

Θis vol. C. C. aut

Suc-

Succin.

Cinnab. $\frac{1}{2}$ n. opt. ana. gr. v.

Sacch. ros. tab. $\mathfrak{D}\mathfrak{B}$.

M. f. Pulv. subt. div. in 2. part. equ.
ad ch. m. ac v. dandas.

Usurpentur etiam, si Febris adfuerit, antifebrilia alia. Externè verò temporibus illinatur, æstuante sanguine, Unguentum de Alabastr. vel populeum cum Oleo expr. Semin. Hyosc. Papav. alb. ac Nuc. mosch. Vel applicetur calidè fronti Epithema ex Aqu. Solan. Rosar. Nymph. Beton. Chamomill. Melilot. Hed. terr. Verben. Scab. Portulac. Semperviv. cum Alb. Ovor. Aceto Rosar. sambucin. rutac. Vel Rutæ, Semperviv. & Heder. terr. Herbæ recent. cum Baccis Juniper. contusæ, atque Aceto rosaceo conspersæ, calidiuscule apponentur. Vel Aquas Puleg. Verben. & Rosar. cum Albumine Ovor. probè commisce, calefac, & immersum linteum sæpè applica. Addere licet Spiritum Vini camphor. vel Acetum rutac. cum Croco pulverisato. Vel solve Sal commune, Nitrum, aut Alumen in Aquâ fontan. aut destillatâ aliquâ superiore, calefac, & immersum linteum appone, quamprimum fuerit siccatum, denuò madefiet. Vel sequens proderit Emulsio:

Rx. Aqu. Verben.

Ros. alb.

Solan.

Nymph. ana. 3ij.

Semin. Cucum. 3ß.

Cucurb. excort.

Nucleor. Persic. ana. 3ij.

M. f. l. a. Emulsio, cui adde

Acet. rosar. 3iß.

Detur ad Vitrum, & applicetur calidè.

Rx. Nucl. Persicor. 3ß.

Semin. Lactuc.

Papav. alb. ana. 3ij.

Aqu. Verben.

Succis. ana 3iiij.

M. f. l. a. Emulsio, cui adde

Aceti rutac.

sambuc. ana. 3vj.

Nitr. purif. 3iß.

M. d. ad Vit. & usurpetur ut supra.

Vel Rx. Unguent. popul. aut

de Alabastr. 3ij.

Ol. express. Nucist.

Semin. Papav. alb. ana. 3i.

Opii Aceto soluti 3j.

M. f. Unguent. d. ad Oll. Temporaque eo ter quotidie inungantur.

Vel Rx. Unguent. rosac.

de Hyoscyam. ana. 3iiß.

Olei Nucist. express. 3j.

Sem. Hyosc. expr. 3ß.

Land. opiat. $\mathfrak{D}\mathfrak{B}$.

Cinnab. nativ. opt. 3ß.

$\frac{1}{2}$ n. diaph. 3ij.

M. f. Unguent. d. ad Pyxid. utere ut supra.

Vel Rx. Aqu. Rosar.

Beton. ana. 3vj.

Olei rosar. 3j.

Album. Ovor. 3ß.

Misc. d. ad Pyxid. pro Oxyrrhodino calidè sæpius applicando.

Vel Rx. Olei Chamomill. 3ij.

Violar.

Nymphææ.

Semin. Papav. alb. expr.

Cucum. expr. ana. 3ij.

Axung. Canin. 3ß.

Cinnab. factit. 3j.

M. f.

M. f. Liniment. d. ad Pyxidem. Tempora hinc sæpius illo inunge.

Alii Baccas Juniperi, Nucleos Persicorum, Myrrham, Olibanum, Gummi arabicum, Semen Melonum, Papaveris albi & Hyoscyami invicem contundunt, Aquâ Rosar. Nymphææ, Portulac. Solani, aut simili aliâ continuè irrorant, donec inde pulmentum fiat, quod dein linteis inductum tepidè Temporibus sæpius admovent. Sunt qui Micam panis, Lutum, Farinam Hordei, Limum, Bolum armenat. & similia cum Oleo rosaceo. Aquâ verben. Majoran. Meliss. Ocym. Pulegii, & Albumine Ovorum in Pultis formam contundunt & commiscent, sicque applicant. Vel conquassa Albumen Ovi cum Oleo Lil. albor. Verbasc. aut Olivarum & Sale communi, & coque dein parum, hincque cum linteis appone. Nonnulli Olibanum, & Mastichem pulverisunt, pulverem hunc dein cum Spiritu Vini, vel Spiritu Anthos aut Lilior. convall. & Albumine Ovi in formam Linimenti commiscent, & in usum non sine successu modo superiore trahunt.

Sic & Plantis pedum revulsionis gratiâ cum fructu sæpè Cataplasmata admovent, ex Foliis Quercûs, Hyoscyami, Solani, Sempervivi majoris, Salicis, Foliorum & Capreolorum Vitis, Mercurialis, Lactucæ, Portulacæ, Parietariæ, Pulegii, Radicibus Cepar. Allii, Lil. albor. Farinâ Avenæ, Hordei, Baccis Juniper. Sale commun. & similibus, invicem contusis, & tantillo Aceti madefactis composita.

Si autem Dolor capitis citra Febrim aut æstum Sanguinis magis à viscidâ stagnante pituitâ, plus minus falsâ, originem trahat, tum externè spirituosâ magis resolventia atque discutientia profunt, atque in hunc finem Vertex & Tempora sequentibus vel similibus inungi possunt:

Rx. Olei expr. Nuc. mosch.

Axung. Anat. vel Anser. ana. ʒij.

Balsam. Peruv. ʒj.

Ol. stillatit. Thymi.

Lavendul. ana. ʒj.

Rut.

Chamomill.

Majoran.

Succin. ana. ʒß.

Misc. d. ad Pyxid.

Vel Rx. Olei Nucis mosch. expr. ʒij.

stillat. Rorismarin.

Meliss.

Salv. ana. gutt. xv.

Garyophyllor. gutt. vj.

Zibeth. gr. iiij.

Misc. d. ad Pyxid.

Sunt qui Spiritum Anhaltinum, Melissæ, Serpilli, Anthos, vel alium quemcunque cephalicum una cum admixtis Aromatibus paratum, Spiritui Formicarum, Liquor. C. C. succinato, Tincturæ Castorei cum Spiritu Salis armoniaci paratæ, commiscent, & frequenter Vertici capitis, aut Fronti cum linteis tepidè applicant. Alii Pulverem Radic. Zedoar. Imperat. Angelic. Cyperi, Cubebar. Macis, Zingiberis, Piperis albi, Cinamomi, aliorumve Aromatum cum Aquâ fontan. Pulegii, Calaminth. Origani, Meliss. & Vino macerant parum, dein in formam

Pul-

Pulmenti redigunt, & tepidè admovent. Non rarò profuit *lotio Capitis* aliquoties instituta cum calente *Lixivio*, in quo etiam *Absynthium*, *Ane-
thum*, *Chamædrys*, *Chamæpitys*, *Ab-
rotonum*, *Melissa*, *Ocymum*, *Impera-
toria* & *Angelica radix*, *Hederæ folia*, *Baccæ Juniperi*, *Lauri*, *Piper*, *Zingi-
ber*, *Flores Chamomill.*, *Salviæ*, ac simi-
lia decocta fuerint. Alii Capillos in
vertice Capitis deradunt, & *Cataplas-
ma* imponunt *rubificans*, aut etiam
vesicatorium, cujus virtute occultè
volatili ac penetrante viscida & stag-
nans pituita resolvi atque discuti po-
test. *Cataplasma* sequentem in modum
componere licet:

℞. *Semin. Sinapi albi recent.*

*Ficuum pingue. tenuiter inciso-
rum, per noctem in Vino mace-
ratorum, hinc ad pulmenti for-
mam contusor. ana. ʒß.*

Myrrh. elect.

Mastich.

Oliban. ana. ʒij.

Misce invicem cum tantillo Vini in
formam pultis, quæ linteo induc-
ta Vertici imponitur, & ita per tres plu-
resve horas relinquitur, donec rubo-
rem aut vesiculas in cute excitaverit.

Vel ℞. *Tamabac.*

Myrrh. elect. ana ʒj.

Semin. Eruc.

Staphid. agr. ana. ʒij.

Cantharid. pulver. ʒß.

*M. f. Pulv. subtil. qui cum Terebinth.
& Cerae q. suff. in Emplastr. Oleo stillat.
Succin. Caryophyll. Lavendul. Rorismar.
aut Thym. irroratū redigitur, ac Tempo-
ribus, aut etiam Vertici capitis per plu-*

res vel pauciores horas imponitur.

Errhina dein, *Sternutatoria*, *Apo-
phlegmatismi* quoque in usum trahun-
tur; totum Caput linteis calidis, ali-
quando etiam Pulvere fumali imbu-
tis, frequenter tegitur. Quin & *Cu-
cuphæ* simul gestari possunt, v. gr. se-
quentes, aut similes:

℞. *Radic. Ireos florent. ʒiß.*

Cyper. rot. ʒij.

Summit. Amarac.

Thym.

Rorismar.

Mari. ana. ʒß.

Flor. Stæchad. Arab.

Primul. ver.

Salv.

Semin. Nigell.

Rutæ, ana. ʒj.

Styrac. Calam. ʒj.

Benzoin.

Thuris masc.

Succin. flav.

Tacamahac. ana. ʒij.

Caryophyll. arom.

Nuc. mosch. ana. ʒß.

*M. f. Pulvis grossus Pileolo insuendus
pro Cucuphâ.*

Conveniunt & in hoc casu *Pedilu-
via*, parata ex *Herbis Betonic. Cha-
mædr. Sideritid. Lavendul. Chamæpit.
Origani, Serpill. Menth. Salviæ, Bac-
cis Juniperi, Cineribus vel Sale commu-
ni, Furfure & simil. in Aquâ simplici
decoctis; quibus calentibus pedes us-
que ad furas ante somni tempus per
dimidiam horam immittuntur.*

CEREBRI CONTUSIO, vid.
Contusio Cerebri.

F f

CERE-

*Cerebri
Inflam-
matio.*

CEREBRI INFLAMMATIO,
est tumor Membranarum Cerebri ma-
ximè dolens & ardens, cum subse-
quente ut plurimum Phrenitide, ra-
rius Abscessu, orta à stagnatione
sanguinis acido-acris in tubulis Me-
ningum.

*Pars af-
fecta.*

Etenim non nisi hæ Cerebri mem-
branæ afficiuntur, atque tenuissimæ
earum propagines, quæ Cerebri an-
fractus & mæandros subeunt.

Causa.

Gignitur autem Inflammatio hæc Ce-
rebri, quodcumque in sanguine
latitantes copiosæ particulæ salino-
acidæ, austæræ, fixæ, acres, primò
quidem crasin humorum turbant, de-
inceps verò in angustissimis tubulis
Cerebri paucioribus vel pluribus ob ir-
regularem particularum suarum figu-
ram, magnitudinem aut motum ob-
hærent, ac sensim numero adauctæ
Sanguinem subsistere & stagnare fa-
ciunt, sicque Tumorem inflamma-
torium producunt, tamdiu duran-
tem, donec vel Sanguis stagnans pri-
stinæ circulationi restituatur, vel ex-
travasatus idem Abscessum, aut So-
porem lethalem; vel etiam Sphace-
lum funestum excitet. Rarius per se
hoc malum producitur, sed plerum-
que Febrim continuam & ardentem
comitatur; vel tanquam causam sub-
sequitur.

*Diagno-
sis.*

Cognoscitur Affectus haud difficul-
ter ex ipsâ relatione Ægri, quando
hic in principio statim conqueritur de
intensissimo, eoque ardente & pul-
sativo Capitis dolore, ei simili, qua-
lem aliàs in Inflammationibus per-

sentire solemus. Sed insimul hanc
Inflammationem ut plurimum præce-
dit rigor febrilis, cum subsequente
æstu atque Febri continuâ ardente,
sequitur dein etiam plerumque deli-
rium seu Phrenitis, cum vigiliis, in-
quietudinibus, siti, aliisque symp-
tomatibus vehementibus atque peri-
culosis.

Affectus periculi plenus, utpote *Pro-*
qui vel in Abscessum Cerebri lethale-
lem, vel in Apoplexiam fortissimam,
Lethargum, imò Gangrænam &
Sphacelum ipsum mutatur. Si verò
benè cum Ægro agitur, sensim sta-
gnans causa morbifica circulationi pri-
stinæ restituitur, Inflammatioque
omnis, unâ cum Febri conjunctâ pau-
latim minuitur, atque tandem planè
extinguitur.

In *Curatione* huic unicè Indicationi *Cur-*
satisfaciendum, ut stagnans in Cere-
bro humor quantocyus resolvatur,
atque discutiatur, sicque circulatio
sanguinis ibidem restituatur, id quod
fieri potest, si statim in principio *Ve-*
na, sive Brachii sive Pedis aperiatur,
ac sufficiens sanguinis quantitas ex-
trahatur; præmisso, si opus videbi-
tur, *Clysmate* aliquo emolliente ac de-
tergente, ex decocto *Malv. Alth. Portu-*
lac. Cichor. Lactuc. Mercurial. Violar.
Plantag. Majoran. Chamomill. &c. pa-
rato: v. gr.

Rx. Rad. Alth.

Lil. alb. ana. ℥℞.

Herb. Malv. Plantag.

Agrim.

Heder. terr.

Violar. ana. Mj.

Flor.

Flor. Chamom.

Melilot. ana. Mß.

Sem. Fenic.

Dauci, ana. ʒij.

Incis. & contus. coque in s. q. Aqu.
font. Colatur. ʒxij. adde

Elect. bened. ʒvj. Sal. gem. ʒj.

Ol. Rosar. ʒij.

M. f. Clysma statim injiciendum.

Postea verò confestim intus quidem
propinanda sunt diaphoretica tam fixa
quàm volatilia, omnibus aromaticis
aut ʒreis particulis exuta, utpote quæ
Inflammationem magis augere va-
lent.

Itaque commendantur Aqu. destil-
lat. flor. Sambuc. Cichor. Vlmar. Portu-
lac. Lactuc. Endiv. Fumar. Scabios. Ver-
ben. Hed. terrestr. Card. bened. Card.
Mar. Succis s. Syrupi Citr. Rub. id. Vio-
lar. purpur. Mixture simpl. D. Ludov.
Spiritus volatiles rectificati, & ʒia
volatilia puriora C. Cerv. Viperar.
Lumbric. terr. Ebor. Sanguin. human.
Urinæ, ʒis armoniac. C. C. phil. ppt.
Viperar. spinæ ppt. Ebur ppt. Cinnab.
nativ. l. ʒ n. corr. ʒ n. diaph. Bezoard.
min. Dens Apri vel Hippopotami ppt.
Sanguis Hire. ppt. Mandibul. Luc. Pisc.
ppt. Nitr. ʒ niat. Lapis bezoard. ori-
ent. vel occident. ver. &c. E quibus
vel Potiunculæ vel Julepi, vel Pulve-
res præparari atque componi possunt,
diligenter usurpandi: v. gr.

R̄. Aqu. Card. ben.

flor. Samb.

Succis. ana. ʒij.

Syrup. Rub. id. ʒj.

Mixt. simpl. ʒiiij.

Bezoard. min.

Cinnab. nat. opt. ana. ʒij.

Ebor. ppt. ʒß.

M. d. ad Vit. sumatur 2. vel 3. dosibus,
spatio 12. horarum.

Vel R̄. Aqu. Hed. terr. ʒij.

Endiv.

Vlmar. ana. ʒj.

Syrup. Limon.

Acetosell. ana. ʒvj.

Ebor. ppt. ʒiiß.

Lapid. bez. occid. ver. ʒß.

M. d. ad Vit. pro 2. dosibus.

Vel R̄. Aqu. Scabios. ʒij.

Verben.

Portulac. ana. ʒiß.

Syrup. Violar. ʒj.

ʒis volat. Viper. ʒß.

ʒ n. diaph. ʒß.

Misce d. ad Vit. Capiatur duabus
dosibus, & repetatur aliquoties. Inpri-
mis hoc in casu satisfacit pulvis ex
ʒ n. diaph. Cinnab. nativ. opt. Nitro
ʒ niat. & Camphorâ compositus, &
aliquoties cum vehiculo convenienti
exhibitus.

R̄. ʒ n. diaph. ʒj.

Nitr. ʒ iat.

Cinnab. nativ. opt. ana. gr. vj.

Camphor. gr. iij.

M. f. Pulv. subt. d. ad ch. pro dose
pluries repetendâ.

In usu talium remediorum tamdiu
pergendum, donec Inflammatio dis-
cussa fuerit; sed ubi discuti inceptit,
fixiora magis, quàm volatilia sunt ex-
hibenda.

Externè Pili capitis deradendi, hinc Cura exo-
terna.
Pullus gallinaceus, vel Columba viva,
per medium dissecta, adhuc calens
Capiti imponatur, ibique per 3. aut
plures

plures horas relinquatur. Postea verò *Epithemata* alia *spirituosa* applicentur, ex *Spirit. Lil. convall. Anth. Ceras. nigr. Vini camphorato, Serpilli, Rore mineral. Spirit C. C. volatil. Lumbric. terrestr.* & similibus parata. Si à primâ *Venæsectione* in Brachio institutâ parum levaminis sentiat Æger, tum *raninæ* quoque *Venæ* sub *Lingua* incidenda.

Tandem symptomatibus qualibuscunque ita est occurrendum, ne primaria Morbi indicatio impediatur. Quando Inflammatio in Abscessum muratur, nullum superest remedium, nisi fortè ex Trepanificationis operatione, si modò sciri possit, sub quâ parte Cranii Abscessus lateat, ut ibi dein Perforatio institui, pusque emitti queat. *Dieta* eadem præscribenda, quæ in Phrenitide aut Febri malignâ commendari solet.

*Cerebri
Vulnus.*

CEREBRI VVLNVS, est solutio continui in substantiâ Cerebri facta à re quadam, vel instrumento caput graviter lædente, atque per Cranium penetrante. *Cerebrum* est viscus illud supremi Ventrìs in nostro corpore, Cranii ossibus undique conclusum, atque è diversis partibus constans; ambiunt illud duæ membranæ, *Meninorum* appellatione donatæ, quarum exterior, crassior atq; firmior *dura Mater*, interior autem, subtilior, tenuior, minus firma, ac tenerior *pia Mater* vel *Meninx* nuncupatur. Substantia ipsa in corticem, ciner tium, sive glandulosum, atque medullam albam, huiusque cavitates & varia corpora di-

stinguitur. Tota jam hæc Cerebri moles *Vulneribus* etiam obnoxia est, quæ quidem variis accipere modis potest; etenim vel per contusionem spina inferioris tabulæ Cranii decussa *Meningibus* infigi; vel ictu globuli sclopetarii substantia Cerebri quacunque demum in parte transfodi; vel eadem gladio incidi ac dividi, subinde etiam portio quædam illius planè amputari potest. Singulorum exempla non pauca inter militantes occurrunt; in quibus Cranium simul, qualicunque etiam modo, frangi, perforari, findi, interdum & planè discindi atque mutilari solet.

Cognoscuntur hæc Vulnera ex intuitu haud difficulter, ubi simul patescet, quo loco Cerebrum sit læsum, Vulnusne grande vel parvum, profundum vel superficialium existat? An in loco futurarum Cranii, vel extra illas contigerit? Denique quonam instrumento Vulnus inflictum sit? Equidem omne Vulnus Cerebri, utut non nisi membranas ipsius attigerit, maximè periculosum est pronunciandum, non absolutè tamen lethale dicendum; quandoquidem in aliquibus talia Vulnera utcunque feliciter sanata esse Medicorum observationes testantur. Quod si tamen medulla Cerebri profundè læsa sit, neque effusus in illud sanguis exitum habere queat, Vulnus absolutè lethale dicetur. Quæ autem Vulnera corticem solum Cerebri attigerunt, & è quibus extravasatus atque congruatus sanguis per Cranii rimam prodire potest; ubi denique nulla gravis contusio si-

mul

mul facta fuerit, periculum adeo magnum non est, modò Vlnus rectè tractetur.

Novi ipsemet hominem, qui ex substantiâ Cerebri aliquid perdidit, & nihilominus sanitati fuit restitutus; sed rari sunt nantes in gurgite vasto. Certè qui acrem habent, acidam, salfam, scorbuticam, venereâ Lue infectam Massæ humoralis dispositionem, ex accepto tali Vlnere plerunque intereunt; tanto id certius, si post adquisitionem hanc plagam in frigido, humido, vel in æstuante maligno aëre coactus Homo fuit aliquandiu adhuc morari; eo enim tempore Atmosphæræ miasmata acida acria ad cerebrum penetrare, allabentes succos corrumpere, eosque maligno acore, vel acrimoniâ inficere potuerunt. Vlnerebus dein ejusmodi facilè accedunt Gangræna, Sphacelus, atque Convulsionem lethales.

Si curare proin velis tale Vlnus, cavebis tibi statim ab unctuosorum qualiumcunque impositione, utpote à quibus vel fungosæ substantiæ cita excrefcentia, vel Gangræna atque Sphacelus accelerabuntur. Sed ante omnia Vlnus in externâ cute est dilatandum immisso linteo carpto vel sicco, vel prius *Spiritu vini rectificato*, in quo *Gummi ammoniacum* & *Aloës* nonnihil solveris, imbuto; desuper applicabis *Emplastrum diapalma*, vel *diachalciteos* atque *de Betonicâ*, tandemque impones *Sacculum Herbis Betonicæ, Salv. Meliss. Scabios. Card. bened. Lavendul. Rorismar. Florib. Primul. ver. repletum*, vinoque incoctum, sæ-

pius calefaciendo, ubi refrigerari inceperit. Dilatatum si fuerit sufficienter Vlnus, ipsa fractura Cranii erit examinanda, per quam effluere debet, quidquid subtus delitescit humoris extravasati. Quando effluere nequit, tum diu expectandum non est, quin confestim eximatur, si quid spinarum in fracturâ hæret, ut sic porta pateat ad humorem, aut corruptam etiam substantiæ Cerebri portionem emittendam. Si spina nulla adsit, aut eximi nequeat, Trepani ope Cranium juxta vel prope Fracturam erit perforandum, & sic è foramine facto emittere licebit, quidquid corrupti hæret sub Cranio; simulque hamulis, aliisve instrumentis facilius spinæ extrudi, vel extrahi poterunt. Immittentur dein in deligatione, quæ Vlnus Cerebri extergere, paulatimque consolidare valent. Itaque *Linteola* semper imponent *Melli rosaceo*, cum *Spiritu Vini rectificato*, atque *Essentiâ Aloës, Myrrhæ, Radic. Aristol. rot. Gentian. Garyophyll. arom. permixto* intincta, desuper applicatis linteis carptis siccis, ad Cranium integendum, impositoque *Emplastro de Betonic. de Gratiâ Dei*, aut *Diapalm.*, ac denique sacculum herbaceum superius jam descriptum ulterius calidè admovendo. Ejusmodi deligatio est continuanda, donec Cerebrum à naturâ fuerit consolidatum, quod quidem facile ex hoc cognoscetur, si nullus amplius humor plus minus laniosus aut purulentus effluet. Hoc igitur tempore Cranium, ejusque fissuræ ac foramen non nisi siccis linteis fi-

lis obtegendum, Emplastrumque superius aliquod desuper imponendum, usque dum carne omnia, vel recenti sensim cute claudantur.

Interea intus per aliquot hebdomadas *Decoctum traumaticum* propinabitur cum *Essentiâ Succini*, *Betonic.* ac *Virgæ aureæ*. *Pulvis* etiam *diaphoretico-antispasmodico-absorbens* subinde dabitur, compositus ex *Vngul. Alcis ppt. ʒn. diaph. Oculis ʒ. ppt. Corall. rubr. ppt. Ebor. ppt. Dente Apri ppt. Cinnab. nat. vel ʒn. opt. Terrâ sigillat. Succin. alb. ppt. Diaphoret. ʒial. aut lunari, vel similib⁹*. Alvus quotidie naturâ arteve per Clysmata aut Suppositoria debet respondere. Ab omnibus animi Pathematibus vehementibus abstineat Ager; Motus corporis ei placidus sit; Somnus tranquillus, nec nimis longus; *Vini* aut *Cerevisiæ* facilè acescentis potum fugiat, ejusque loco *Decoctum ras. C. C. Fol. Betonic. & Agrimon. bibat.* Subinde & *Infusum fol. Thée, Betonic. Chamædr. ac Chamæpit.* in deliciis habebit. Cibi omnes euchymi sint atque eupepti, nec tamen & his nimis indulgeat.

Cerebri
Fungus.

CEREBRI FVNGVS, est ex-crescentia carnea, mollis, spongiosa, rubicundi vel cineritii, aliusve coloris, è substantiâ aut membranis Cerebri laceratis, per affluentem copiosum succum nutritium, illico concrescen-tem, sensim ad magnitudinem notabilem, vel extra rimam aut foramen efflorescens, atque consolidationem impediens.

Impeditur hic Fungus facilè, si supra dicta externa spiritiuosa diligenter

applicentur: sed si affuerit, paulatim diminuetur, ac tandem planè discutietur, sicubi cum vel sine *Spiritu Vini rectificat.* *Pulvis* ille *Fabr. Hildani*, vel similis è *Radicib. Angelic. Imperator. Meu. Calami aromat. Cyper. long. Jr. Florentin. Summit. Amarac. Rorismar. Aloë, Myrrhâ, &c.* compositus, quotidie bis inspergatur, & solito hinc in Cerebri Vulneribus more deligerur.

CHEMOSIS, χήμωσις, à χήμη *Ch* biatus, est species Inflammationis Bulbi oculorum, in quâ albicans tunica Adnata, supra nigram aut cœruleam Corneæ & Pupillæ tunicam intumescit, valde rubet, atque insigni dolore prurituque molesta est, ita ut Homo palpebras adducere, oculumque tumentem claudere nequeat. Hujus ergo generatio atque cura in *Ophthalmiâ* exponetur.

CHIRAGRA, χειρᾶγρα, qu. ἡ ἄγρᾱ τῆς χειρὸς, *captura manûs*, ea est species Arthritidis, quæ manuum articulos occupat. Vid. *Arthritis*.

CHIRONES, χειρῶνες, ἀπὸ τῆς χειρὸς, à manu derivatâ voce, sunt pustulæ manuum certæ, de quibus vide titulum de *Sironibus manuum*.

CHOIRADES, χοιράδες, à χοῖρος, & *Porcus*, deducto nomine, sunt tumores glandularum Colli, Vid. *Scrophulæ*.

CHLOROSIS, vid. *Febris alba*.

CHOLERA HYMIDA, Cholera morbus, Passio cholericæ, Febris catoria, est frequens atque immoderata

tata humorum crudorum , varii coloris & consistentiæ, in primis aquofo-bilioforum , per superiora & inferiora reiectio , cum torminibus ventris, præcordiorum anxietate, vigiliis, fiti, Febri , aliisque symptomatibus vehementibus conjuncta. Græcis *χολέρα ἀπὸ τῆς χολῆς*, à Bile, nuncupatur.

Partes affectæ sunt Ventriculus, & Intestina, quorum fibræ perpetim à causâ morbificâ ad utrumque motum, superiora & inferiora versus, sollicitantur. Imò nidus , sive focus hujus passionis in Duodeno ferè esse videtur, ubi Bilis & Succus pancreaticus per eum quisque ostium confluere solent.

Producitur Morbus proximè ab humore qualicunque alcalino, vel salo-acri, leniter corrosivo, fibras nervosas Pylori atque Intestini duodeni deo fortiter irritante rodente & continuè crispante , ut illæ hinc versus utramque plagam contractæ contenta primarum viarum, qualiacunque adierint, per gulam æquè ac per alvum expellant. Humores illi acres, naturam Venenorum vel mercurialium aut arsenicalium, vel emeticorum gualium, aut helleborinorum adepti, *nunc* intra humorum laticem sensim gignantur, atque cumulantur, donec tandem occasione qualicunque arreptâ massam sanguineam turbent, fundant & irritatione in poris bilariis, venticulâ Fellis, Glandulis intestinalibus atque pancreaticis factâ, bilem atque serum acriusculum copiosè in intestinum Duodenum ac Ventriculi cavum

præcipitent : *nunc* ab intempestivâ, ac velut suppressâ gravissimâ Irâ per spirituum motum tumultuarium, indeque contingentem profusionem largam Bilis ac Succorum lymphaticorum acriorum redditorum proveniunt : *nunc* denique ab assumptorum alimentorum laxâ admodum particularum suarum cohæsione præditorum , corruptione intra primas vias producuntur. Itaque assumpta Venena, Purgantia & Emetica fortiora, Alimenta in primis viis faciliè corruptibilia, atque in nidorem biliofo-serosum convertibilia, qualia sunt Fructus horæi, Pruna, Cerasa acida, Cucumeres, Cucurbitæ, Melones, Ficus, Mala Persica, Armeniaca, Fungi terrestres, Pisces saliti, Ova Barbi & Lucii piscis, Edulia alia sale plus justo condita, Potus denique Vinî penduli, acescentis, Cerevisiæque malæ notæ, sive novellæ, Aquæ gelidæ, seri Lactis frigidi, ad producendum hunc dirum Affectum aptissima sunt. Nimirum gignitur sic in Sanguine aliquod sal acre, subtile, volatile, Veneni naturâ & efficaciam præditum, quod Massam dein sanguineam ita fundit, ut serum ejus liquefactum, non secus atque Bilis justo plus soluta copiosè per Glandulas hepaticas, pancreaticas, & stomachico-intestinales in Duodenum præcipitentur, ubi dein cum allabente chylo, & pituitâ intestinali in liquamen sordidum, nidorosum mutati tales humores acrimoniâ suâ fibras tunicarum & glandularum fortiter stimulando excretionem illam copiosam

produ-

producunt. Sed & idem sal talium humorum acre malignum, quoniam nervosis fibris adeo intensum est, simul varia alia symptomata graviora, propter nervorum crispationem excitat; Anxietatem videlicet præcordiorum, Vigiliis, Lipothymias, & alia plura superius recensita. Jungitur ut plurimum Febris maligna, si ab internâ præprimis causâ malum fuerit productum; si autem ab assumptis fructibus, ac cibis in Ventriculo corruptis ortum duxerit, tum Febris ejusmodi ut plurimum abest.

Diagnosis.

Affectus hic facile ex crebris dejectionibus *ἀνα καὶ κατὰ* contingentibus cognoscitur. Præcedit tamen illum nunc ira immoderata ac suppressa cum insigni odio aut tristitiâ, nunc assumptum Venenum, nunc usus alimenterum ineptorum. Affligit plerumque subito idque cum continuâ Febri, inflatione aut tensione maximè dolorosâ hypochondriorum, præcordiorum anxietatibus, vigiliis, jectione corporis, inquietudinibus, siti, pulsu celeri ac frequenti, interdum parvo & languido, vomitu atque dejectione variorum succorum, in primis feri flavidiusculi plus minus acris, turbidi, particulis luteolis interspersi. Quicquid assumitur, paulo post per vomitum & alvum rejicitur. His interveniunt quandoque deliquia animi, cum sudore frigido, in primis in fronte, Vires tandem maximè prostratæ comparent.

Prognosis

Quoad *Prognosin* tenendum, Affectum hunc, si sponte citra causam manifestam oritur, ac in principio

Febris malignæ apparet; vel si assumptum quaecunque potens Venenum pro causâ habet, periculi esse plenum, utpote qui intra tres, quatuor vel quinque dies, subnatâ in Intestinis Gangrænâ hominem interimere solet. Si verò intra primum aut secundum diem cessat, si in declinatione Febris cum euporiâ accedat, vel si ab assumptis cibis proveniat, tunc salutem pristinam citò promittit. Recidivat facile Morbus, nisi cautus fuerit & Medicus & Ægrotans. Si mitiora fuerint symptomata, spes etiam aliqua salutis superest.

Quantum ad *Curationem* spectat, in principio statim convenit *Vomitorium*, si Morbus evidenter ab assumptis fuerit ortus, ex *Aqu. bened. Ryland.* vel *Syrup. emet. Angel. Sal. cum Aqu. Cinam. & Burs. pastor. v. gr.*

Rx. Syrup. emet. Ang. Sal. ʒiiiß. flor. Tunic. ʒiß.

Aq. Bugloss. ʒiij.

Cinam. ʒj.

Misce d. ad Vitr. pro dosi.

Vel *Rx. Crem. Fri. aut*

Θis Eß. Card. ben. vel

Absynth. gr. viij.

Cinnab. nativ. opt.

Θli ʒis ana. gr. iv.

Friemet. gr. ij. vel iij.

M f. Pulv. subt. d. ad ch. sumatu pro dosi. Vel saltem *Rhabarbarum* i substantiâ ad ʒj. cum *Crem. Fri*, *Θ Absynth* & *Oleo Nucistæ dest.* exhiberi potest. Deinceps plurima *Aqua tepida*, aut etiam *Lac bubul.* copiosè & frequenter hauriri debet. Imò conducit quoque *Potus* qualiumcunque *Acridula*

dularum largus, vel *Seri Lactis capril-*
li aut *vaccin.* cum *Saccharo rosaceo.*
 Qui novit *semunciam Salis polychrest*
 cum largo haustu *Ptisanae* ordinariae
 epotare, citò ab hoc malo liberatur;
 præcipitatis nimirum sic salibus cor-
 rosivis. Juxta hæc etiam commen-
 dantur *Stomachi & Intestinatorum* fi-
 bras nimis irritatas demulcentia, v. gr.
Essentia Croci, Myrrhæ, Absynthii, Mu-
miæ, Zedoar. Galang. Calam. arom.
Succin. Card. ben. Bistort. Ambr. Ca-
techu, Spirit. theriac. camph. ad gtt. 20.
 vel 30. m. ac vesp. danda. Vel *Pul-*
veres largire absorbentes, edulcorantes,
 & alexipharmacos; v. gr. *Ocul. ☉ ppt.*
Corall. rubr. vel alb. ppt. Ebur. ppt.
 ☿ n. *diaph. Bezoard. min. Mastich.*
Myrrh. elect. Unicorn. fossil. Bol. armen.
Terr. sig. Diaph. ♂ t. Croc. ♂ is aperit. Vi-
triol. ♂ is, qualia vel per se, vel cū Elect.
Diascord. Mithridat. Damocr. aut The-
riacâ Andromachi exhiberi, vel etiam
 cum *Conserv. Ros. rubr.* in *Electuarii*
 formam redigi, & per frequentes cu-
 spides cultri capi possunt. Pro speci-
 fico habentur *Crystalli alb. ppt. cum*
 ☉ *Centaur. min. Nuc. mosch. & tan-*
 tillo *Laudani opiat.*

Quando Morbus à causâ internâ,
 sive humore quodam acri maligno ci-
 tra causam externam manifestam fuit
 productus, simulque, quod fieri solet,
 Febris maligna comitem se præbeat,
 tum neque vomitorio, neque purgan-
 ti locus est, sed ea in usum vocanda,
 quæ temperandi, invertendi, præci-
 pitandi, per sudorem aut urinam pel-
 lendi virtute gaudent, alexipharmaca,
 diaphoretica, absorbentia, diuretica,

acrimoniam humoris maligni destru-
 entia; quibus denique anodyna atque
 fibras irritatas demulcentia sunt ad-
 denda. Statim igitur in hoc casu
 exhibeantur, v. gr. *Mithridat. Damocr.*
Theriac. Andr. Elect. Diascord. Frac.
Orvietan. Confectio. Hyacinth. ☿ n.
diaph. Bezoard. miner. Diaphor. ♂ iale,
 ☿ *vial. Specific. stom. Poter. Dens Hip-*
popot. ppt. Unicorn. foss. aut marin. ppt.
Terr. sigill. Bolus Arm. ppt. Ebur. ust.
ppt. Corall. rubr. vel alb. ppt. Crystall.
alb. ppt. Pulv. bezoard. Senn. ☉ li-
xiviosa Absynth. aliave, Lapis Bezoard.
orient. vel occident. ver. Pulvis Viper.
ppt. Theriac. cælest. Laud. opiat. Es-
sent. Opii Langel. Acetum Bezoard.
Syrupi aut Succi aciduli, Spiritus the-
riac. camphorat. Tinctur. antiphthis. Es-
sentia Catechu, aliave styptica, quibus
 convenientia vehicula sunt miscenda,
 v. gr.

℞. *Aqu. Burs. past.*

Card. bened. ana. ℥i℞.

Puleg. ℥℞.

Elect. Orvietan. vel
diascord. Frac.

Liqu. Nitr. fix. vel

Terr. fol. ☿ri ana. ℥ij.

Spir. theriacal. camph. ℥℞.

☿ n. *diaph. ℥ij.*

Syrup. Corallor. ℥vj.

Misc. d. ad Vitr. sumatur duobus
haustibus spacio sex vel octo horarum.

Vel ℞. *Aqu. Plantag.*

Portulac. ana. ℥i℞.

Menth. ℥℞.

Syrup. Cydon. ℥j.

Conf. Hyac. inc.

Corall. rubr. ppt. ana. ℥℞.

Gg

Diaph.

Diaph. Jial.

Essent. Catechu ana. ℥j.

Theriac. cœlest. gr. vj.

M. d. ad Vitr. Exhibeatur duabus vel tribus dosibus spacio 12. horarum.

Vel ℞. Conf. Ros. rubr. ℥ij.

Menth. ℥j.

Mithrid. Damocr. 3℔.

Bol. Arm. ppt.

Unicorn. mar. ppt. ana. 3℔.

Lap. bezoard. or. ver. gr. iij.

Laud. opiat. gr. j.

M. f. cum Sacch. Bol. d. ad ch. sumatur pro dosi, & quotidie semel, si opus videbitur, repetatur.

Interea Pulvis simul alexipharmacus usurpetur:

℞. Pulv. bezoard. Senn.

℥n. diaph.

Unic. fossil. ana. 3℔.

Θis Cent. min. 3℔.

Rotul. Berber. 3ij.

M. f. Pulv. subt. d. ad ch. singulis triboriis cuspidis cultri plenus capiatur.

Vel ℞. Bezoard. miner.

Crystall. alb. ppt.

Terr. sigillat.

Ebor. ust. ppt.

Pulv. radic. Tormentill.

Croc. ℥t. adstring. ana. 3℔.

Laudan. opiat. gr. jv.

M. f. Pulv. subt. d. ad ch. Usurpetur ut superior; idque cum Aquâ Scabios. Succis. Galeg. Lactuc. Endiv. & Syrup. de Agrest. vel Berber. Rub. id. aut Corallor.

Vel ℞. Conf. Ros. rubr. 3vj.

fl. Tunic.

Menth. aut

Puleg. ana. 3℔.

Condit. Cydon.

Roob. Ribium. ana. 3ij.

Conf. Hyacinth. 3j.

Specif. stom. Poter.

Bol. Arm. ppt.

Dent. Hippopot. ppt. ana. 3℔.

Theriac. cœlest. gr. xij.

Syrup. acetos. Citr. q. s.

M. f. Elect. d. ad Oll. singulis biboriis magnitudo nucistæ. capiatur.

Vel ℞. Conserv. de Fumar. 3j.

Roob Cydon. 3℔.

Theriac. Androm. 3j.

C. C. ust. ppt.

℥n. diaph. ana. 3iij.

Syrup. de Menth. q. s.

M. f. Elect. d. ad Oll. sumatur ut superius.

Si Pilularum forma magis arri-deat, tum

℞. Extract. Bistort. vel

Tormentill.

Theriac. cœlest.

Θli ℥t. ana. 3℔.

Lap. bezoard. occid. ver. gr. vj.

Cum Essent. Mumie, Myrrh. aut Catechu q. s. fiant. Pilul. num. 20. Inaurat. d. ad Scatul. sumantur decem pro dosi, & post sedecim horas iterum decem, cum Julepo Citri.

Novimus, quibus sequens Pulvis maximè profuit:

℞. Pulv. Viper. ppt. ℥ij.

fol. Menth.

℥n. diaph. ana. ℥j.

Vitriol. Martis

Myrrh. elect. ana. 3℔.

Laud. opiat. gr. iij.

M. f. Pulv. subt. div. in 4. doses æqu. mane ac vespere capiendas cum Aquâ.

Aquâ Scorzonerae, Polygoni & Menth.

Tinctura bezoardica, Mixture simplex Danj. Lud. *Tinctura antiphthis.* *Tinctura* ¶ *ris Oli*, *Liquor stypticus* blandus qualiscunque, ob vires adstringentes & diaphoreticas, similiter commendantur ad gutt. 20. vel 30. quotidie semel aut bis exhibita. Ita & *Solutio Corallorum cum succo Limonum aut Citri* prodest.

Externè in omni Cholera totum Abdomen inungi debet *Oleo Nucist. express.* *Ol. Chamom. Mastich. Cydonior. Myrtin. Rutæ, Hyoscyam. expr. Sem. Papav. alb. express. Ol. dest. Macis, Nucistæ, Menthae, Salviae, Carvi. &c.* v. gr.

Rj. *Olei Chamom. 3vj.*

Scorp. Matth. 3ij.

Nuc. mosch. express. 3iß.

still. Menth.

Carv. ana. 3ß.

Balsam. Peruv. 3ij.

M. d. ad Oll. Inunctio ter de die repetatur calidè.

Vel *Emplastrum de Crustâ Panis* Abdomini imponatur, aliudve simile euporiston ex *Cydoniis Vino rubr. incoct.* *Crustâ panis tostâ, Nuce mosch. Mastiche, Thure, Herb. Menth. Florib. Chamom. &c.* paretur. Aut

Rj. *Emplast. de Ladan. Croll.*

Gumm. Tacamahac. ana. qu. satis.

Malax. cum Balsam. peruv. ut fiat Emplastrum, quod regioni Stomachi & Umbilico cum successu imponitur. Vel

Rj. *Spirit. Anthos aut Ceras. nigr. camphor. 3ijj.*

Theriac. Andromach. 3j. vel 3ij.

Misce & confestim ad scrobiculum Cordis applica.

Vel *Frustum Panis tostî Vino Malvatico* aut alii generoso immergitur, hinc *Pulvis Nucis mosch. Garyophyll. arom. Cinnam. Galang. Zedoar. Tormentill. Mastich. &c.* adspergitur, & ita calidè regioni Stomachi applicatur.

In Cholera à vehementiore Purgante natâ statim *Theriaca* ad 3j. vel 3iß. cum *Aqu. Plantag. & Menth.* vel haustu *Vini rubr.* danda. *Pulvis* etiam sequens confert.

Rj. *Radic. Tormentill.*

Terr. sigill. ana. 3j.

Nuc. mosch. 3ß.

Laud. opiat. gr. iij.

M. f. Pulv. subt. div. in 2. dos. æqual. ad ch. Dentur spatio 24. horarum, cum Vino rubro, vel Vino Absynthites.

Externè superius comendata profunt vide etiam titulum de *Hypercatharsi.*

In Cholera ab assumpto qualicunque Veneno nil melius, quàm frequenter *Lac bubulum simplex*, aut *chalybeatum* cum *Terrâ sigillatâ, Corall. rubr. ppt. Unicorn. fossil. & tantillo Sacchari* propinare: vel statim haustus *Olei Olivarum*, aut *Amygd. dulc.* aut *Aqu. muriat.* aut *Lixivii*, cum $\frac{1}{2}$ n. *diaph. Theriac.* vel *Mithridatio* detur, & reiteretur.

In Dietâ profunt *Juscula hordeacea*, vel *avenacea*, frequenter & largiter hausta. A *Vino* abstinendum loco autem ejus *Decoctum Ras. C. C. Herb. Agrimon. Scabios. Sanicul. Tormentill. Card. bened. &c.* concedendum. Vel etiam *Aquæ still. Bursæ pastor.*

flor. Plantag. Borrag. Endiv. &c. bibantur. Ira pestis.

*Cholera
furiosa.*

CHOLERA SICCA vel **NOTHA** est flatuum crebra per gulam & alvum rejectio, cum Abdominis inflatione, murmuribus ventris, vagis doloribus hypochondriorum & lumborum, nonnunquam & Lipothymiis conjuncta. Vnde colligitur, & heic præcipuè Venter atque Intestina affici, quoniam in his partibus flatus maximè gigni, colligi & tumultuari solent.

Pars affecta.

Causæ.

Gignitur autem hic Morbus non nisi à copiâ particularum aërearum è variis Cibis & cruditatibus flatulentis per Liquorem stomachicum acidiorum, indeque corruptam vel debilitatam digestionem, elicitarum, suaque dein vi elasticâ canalem Intestinorum expandentium, & quâ datâ portâ, superiora, ac inferiora versus, erumpentium. Verùm sciendum, subinde aërem aliquandiu intra Ciborum particulas, aut etiam cruditates viscidolentas compressum latitare posse, usque dum poris adaperitis, vel laxioribus redditis, libertati suæ restitutus undiquaque sese expandere, evagari, aut intra Liquorem quendam viscidum bullas excitare queat. Affectus hinc est apud Hypochondriacos haud infrequens, præsertim quando flatulentis Cibis, Leguminibus, Oleribus hortensibus, Carnibus durioribus, Caseo, Vino pendulo, Musto, Cerevisiâ crassâ, ac similibus sese saginârunt. Si quis fortè Ova Formicarum cum Cibis comedit, similiter tali flatuum eruptione molestat.

Facile cognoscitur Morbus hic ex ructibus & crepitibus Ventris crebro erumpentibus, ut & ex Abdominis doloribus vagis, colicis, murmuribus, atque inflatione.

Per se autem tam periculosus non est atque Cholera humida; sed negligenter habitus tandem in Tympanitidem lethalem mutari, vel saltem frequenter Cordis imbecillitates, ac Lipothymias post se trahere potest.

Curatio tota absolvitur exhibitione Remediorum carminativorum. Ante omnia igitur dari potest purgans ex *Radic. Rhabarb. cum Mercur. dulc. Crem. Fr. atque Ol. dest. Carvi*, vel *Cortic. Aurant. v. gr.*

R. Rhab. elect. 3ß.

Crem. Fr. gr. vj.

Mercur. dulc. 3ß.

Resin. Jalapp. gr. jv.

Ol. dest. Carv. gutt. ij.

M. f. Pulv. subtil. d. ad ch. pro dosi matutin.

Vel R. Spirit. Anis. 3j.

Juniper. 3ß.

Magist. Jalapp. gr. viij.

Solutis lento igne adde

Syrup. Flor. Tunic. 3iß.

Aqu. Cinam. 3j.

M. detur ad Vitr. pro dosi matutinâ.

Imò etiam unus vel alter Clyster injiciatur ex *Decocto Radic. Imperat, Valerian. Vincetox. Angelic. Herb. Meliss. Matricar. Menth. Mercurial. Aneth. Absynth. Abroton. Chamomill. Origan. Serpill. Semin. Dauc. Anis. Fœnicul. Carv.* Dein intus quotidie exhibebitur Oleum aliquod destill. carminativum; velut *Anisi, Carvi, Cumini, Chamo-*

Chamomill. Menth. Rut. Meliss. ad gutt. 8. 10. vel 12. Item Spirit. Ois armon. anisatus aut fœnicul. Sal volatile oleos. Sylv. Ligu. C. C. succin. Elix. Vitæ Matth. Elix. propr. Claud. Essent. Zedoar. Galang. Absynth. Tinctur. Castor. cum spiritu Ois arm. parat. ad gutt. 18. vel 20. pro dosi. Quæ quidem cum Aqu. Trifol. fibrin. Cochlear. Meliss. Menth. Matricar. Apii Maced. Nasturt. aquat. & similibus exhibita haud pœnitendum effectum præstant; v. gr.

R̄. Aqu. Meliss.

Puleg.

Fœnic.

Chamom. ana. ʒiʒ.

Elect. Diascord. ʒj.

Spir. Sal. arm. anis. ʒij.

Essent. Castor. ʒj.

Corall. rubr. ppt. ʒiiij.

M. d. ad Vitr. sumatur cochleatim. In longiore malo etiam Panacea solutiva alcalina per 8. vel 10. dies cum Oleo still. Anis. dabitur. Vel quotidie m. ac v. propinari possunt, v. g. Juscula Succis Herbarum nasturcinarum & carminativarum alterata: Imò ipsæ Aquæ inde destillatæ valdè profunt. Quæ verò ex Fimo Equorum avenâ saginatorum, Nasturt. aquat. Cochlear. Becabung. Fumar. Cherefol. Fœnicul. recens destillatur Aqua, quotidie bis ad ʒij. exhibita Malum omne citò discutit. Cholerici æstivo tempore bibant Acidulas, Melancholiæ obnoxii verò Thermas fabarienses Rhætiæ, Embsenes, aut Plumbarias Lotharingiæ.

Extus Abdomen frequenter inungatur Oleo destill. Anethi, Cumin. Carvi, Absynth. Chamom. Menth. Ro-

rismarin. Rut. Pulegii, quæ Unguent. de Hyoscyam, Oleo Nucist. express. & Axungia caninâ, vel anserinâ excipi possunt. In Dietâ fugiantur omnia, quæ flatus progignere valent; è contrariò sumantur Cibi facilioris digestionis, benè aromatizati, imò & nasturcinis quoque herbis ac radicibus, sale volatili eminenti turgidis alterati. Pro potu autem inserviat Vinum album vetus generosum aut Cerevisia optima. Post singulos pastus vel Ros solis, vel Elixir vitæ Matth. vel similis spirituosus Liquor aut Vinum Malvat. Hispanic. Hungaricum, Creticum ad aliquot Cochlearia bibatur; vel Tragema post pastum usurpetur.

Dietâ.

CHORDAPSVS. Vid. *Ileus.*

CHOREA vel **SALTUS S. VITI**, *Chorea S. Viti.* Morbus S. Viti, vel S. Modesti aliis, Paracelso *Chorea lasciva*, est insatiabilis atque propemodum invita, imò insana cupiditas saltandi, à determinatâ quadam, eaque indefinente fibrillarum medullaris Cerebri substantiæ nervearum vellicatione & commotione proveniens, unde Mens perpetim ideas saltandi agitat, sicque corpori motus subsultorios, tantum non continuos, imprimit. Dicitur *Chorea*, χορεία, ἀπὸ τῆς χορῆς, quod in Comœdiis saltantium & canentium multitudinem denotabat; & S. Viti *Chorea* vel *saltus*, à sancto quodam hujus nominis Viro, quem fabulæ antiquorum docent imprecando hunc Morbum Hominibus dedisse, & invocatum dein iterum abstulisse. Ita Phil. Camerarius *Horar. succis. Cent. 2. cap. 81. refert*, in monte

prope *Ravensburgum*, Sueviæ oppidum, à Vito nomen habente, monstratum adhuc suo tempore fuisse Sacellum, ad quod antehac singulis annis tripudiantium turba, velut Divo illi sacrificatura, accurrerit, ut ejus ope per continuos ferè saltus à morbis liberaretur. Similis Sacelli in Vlmenfium finibus *S. Vito* dicati, ad quod singulis annis Mulierculæ prurientes saltaturæ spe sanationis confluerint, Georg. Horstius meminit *Lib. II. Observ. 45.*

Cupiditas vel *desiderium* saltandi dicitur hic Affectus, quoniam inclinatio mentis constans adest ad saltationis actum. *Insatiabile* est desiderium, quamdiu fibrillarum in Cerebro nervearum vellicatio certa durat, id quod diu subinde contingit. *Insana* est cupiditas, quia mens simul ob eandem causam malè ratiocinando laborat, dum inconcinnis & lascivis sæpè gestibus suum Homines corpus exagitant. Saltûs autem vel saltationis cupiditatem esse hunc Affectum vel ipsæ Ægrotantium gesticulationes docent.

Differentia.

Differentias admittit varias hic Saltus, etenim 1. alius est *continuus*, qui vel sine intermissione à principio usque ad finem morbi durat, vel aliquando per inevitabilem dormiendi necessitatem interpellatur: alius est *periodicus*, qui per certa aut incerta temporum intervalla recurrit, qualis fuit illa Mulierum apud Horstium *loc-cit.* qualisque ferè est omnium *Tarantismo* laborantium, ut adeo *Tarantismus* huc omnino queat referri, tanquam species saltationis peculiariter à

Tarantismus.

Tarantularum ictu originem trahens. 2. Alius est *idiopathicus*, à causâ in Cerebro hærente, læsaque phantasiâ proveniens; alius est *sympathicus*, à vitio sanguine aut viscere quodam læso productus. 3. Alius est *universalis*, totum corpus exercens, alius *particularis*, brachia vel pedes tantum occupans, mereque convulsivus. 4. Alius est *naturalis*, à causis naturalibus excitatus, alius *contranaturalis*, à Diabolo vel Sagis per incantationem homini immissus. 5. Alius est merè *invitus & convulsivus*, ubi homines citra voluntatem sua flectere membra coguntur, alius est etiam *voluntarius*, quando homines nescientes unde ad continuè saltandum stimulantur. Voluntas tamen heic subinde perversa est.

Quando igitur corpus Hominis in Morbo hoc saltare nequit, nisi musculi omnes, membra diversimodè flectentes, ad reciprocas contractiones & relaxationes, sive tensiones & restitutiones assidue incitentur; necesse prorsus est, causam quandam adesse debere, quæ vel per se Spiritus animales sive fluidum nerveum urgeat ad dictas illas fibrarum muscularium tendentias ac relaxationes præstandas; vel determinatos in medullaribus Cerebri fibris motus instituat, unde Anima ideam sibi fingat corpus perpetuo tripudio exercendi. Causa ejusmodi dici potest Sal quoddam volatile, peregrinum, in sanguine collectum, atque tali configuratione præditum, sub quâ non solum quendam in humoribus orgasmum excitare, sed & fibrillas

las membranoso - nerveas in musculis Artuum, Cerebrive medullâ, certâ quadam, & jucundâ quidem eâ, titillatione afficere, hincque cogitationes vel ideas saltandi firmas in Animâ excitare queat. Salia ejusmodi peregrina vel colliguntur occultè & paulatim ex semine corrupto, & acri, aut ex usu Rerum nonnaturalium in Sanguine; vel immittuntur per incantationem; vel à moribus ictibusve Tarantularum imprimuntur. *Tarantula* verò species est Aranei cujusdam marini, in Apuliâ Italiæ Provinciâ copiosè provenientis, nomenque adepti à *Tarento* Oppido, ubi Hortulanis & Agricolis infensum animalculum existit; Græcis *Φαλαγγιον* audit. Araneus autem est nostratibus Araneis vel triplo major, caput exiguum, & crura ex utroque latere quatuor obtinens, quorum singula tribus internodiis constant.

Imminere hunc Affectum ferè significant risus frequens sine ratione, gesticulationes ridiculæ, inquietudo ac titillatio ferè continua Artuum. Præsentem indicant infatiabilis Saltandi pruritus cum frequentissimâ, si non perpetuâ, corporis agitatione subsultoriâ, per ipsa etiam cibationis momenta continuante; ubi Homines dies noctesque ad plantarum usque pedum excoriationem saltant, sicut Platerus *Observ. Lib. 1. cap. 3.* notavit in Muliere, quæ Basileæ per aliquot hebdomadas saltavit. Huic signo pathognomonico dein junguntur varii generis symptomata, modò hæc modò illa, videlicet alienatio

mentis, dolor, pruritus aut titillatio nervorum, quandoque Vertigo, contumaces Vigiliæ, Priapismus aut Tentigo, interdum etiam Febris, Surditas, visus Hebetudo, Lipothymia, Dysorexix, ac Dyspepsia, Musicæ appetitus, clamor, cantus, feminis profluvium, Nausea, materiæ pallidæ, nigræ, rubræ, viscidæ, crassæ, vitellinæ, quandoque instar telæ Araneorum vomitio; alvus nunc dura, nunc fluida; sudor interdum frigidus; urinæ parvæ vel nullæ, ut plurimum aquosæ & crudæ, cum filamentis seminis permixtis in exitu.

In specie Tarantismus indicant prægressus Tarantulæ ictus, cupiditas saltandi pertinax, desiderium Musicæ, atque harmonici chordarum numeri; quibus pathognomicis Morbi criteriis dein adhuc alia symptomata veniunt jungenda; v. gr. frigus circa genua, lumbos & scapulas, dolor assiduus, tremor membrorum, pallor faciei, vigiliæ; oculi plorantes & cavi; venter inæqualiter elevatus; tumor lenis totius ferè corporis, stupor, risus, ac ploratus reciproci. Qui Tarantismus à Choreâ S. Viti curiosè separant, illi nobis videntur entia citra necessitatem multiplicare.

Non vacant periculo hæc mala, nisi in tempore medicamentis debitis succurratur: ex Tarantismo tamen pauci vel nulli moriuntur; quando tamen vel plures simul ictus, vel graviores & profundiores eos aliquis accepit, tum is in discrimine versatur. Diutius durat malum, si venenum parcius atque segnius fuerit: citius Juvenes quàm Senes convalescunt. Si

con-

conjuncta existat Febris, tum citius à malo liberantur Ægri. Frequens in Apuliâ morbus est *Tarantismus*, sed rarus ubique *Saltus* existit *S. Viti*, unde tam pauca apud Auctores memorantur ejus exempla.

Curatio.

Si curare proin velis Homines ejusmodi malo laborantes, in eo totus eris, ut titillationem illam nervulorum molestant, à quâ proximè venit necessitas saltandi, coërceas maturè, pacatumque fibrillis atque spiritibus motum restituas. Obtinebis scopum hunc, sicubi *laxantem* in principio *Ptisanam* aliquoties propinaveris, quæ quidem sequens esse poterit:

℞. *Radic. Gramin. Scrophular.*

Scorzoner. ana. ʒiib.

Fol. Sen. opt. mund. 3x.

Pulp. Tamarind. 3vj.

Semin. Anis.

Coriandr. ana. ʒij.

Incisa & contus. coqu. in q. s. Aquæ fontan. Colaturæ ℥bj. adde

Syrupi Viol. purpur.

de Nymph. ana. ʒib.

Misc. d. ad Vit. & exhibeatur tribus vel quatuor haustibus matutinis.

Inter hæc, si Sanguinem Ægrotantis ex pulsu forti ac magno deprehenderis in statu aliquo turgescentiæ existere, sine morâ Venæsectionem in Brachio institues, & sanguinis quantitatem Viribus proportionatam extrahes. In Tarantismo autem ab eâ abstinebis, quoniam Venenum acceptum magis in Sanguinem eâ administratâ transfret. Quin potius iêto loco statim *Cucurbitulam cum vel sine sca-*

rificatione ad extrahendum Venenum applicabis. Imò *Vesicatorium* quoque à nonnullis admoveatur, ut ejus beneficio Venenum ab iêtu acceptum tanto efficacius eliciatur. Idem facit *Ignis actualis*. Applicabitur deinceps *Unguentum digestivum* ordinarium cum *Myrrhâ*, *Aloë*, *Sale Fri*, *Theriaca*, ac *Melle rosaceo* permistum; addes quoque pro lubitu *Spiritum theriacalem camphoratum*, aut *Theriacam* ipsam. Si *Tarantulam* araneam habere possis, protinus eam contusam applica.

Deinceps internè conveniunt vel *Tinctura Antimon. Corallor. Succini. flor Aquilegiæ*, *Tinct. ʒtis cydoniata*, vel *tamarindinata*, vel *balsamica*, *Essentia Fumar. Lignor. Pæon. Anagallid.* vel *Spiritus-theriacalis camphoratus*, cum *Spiritu* aut *Sale volatili Viperarum*, ad gutt. 20. vel 30. bis quotidie datus. Predest & usus *ʒn. diaph. Bezoard. miner. Terr. sigill. Pulv. Panon. rubr. Cryst. alb. ppt. Viperar. ppt. Diaphoret. ʒial. ac ʒvial. Pulvis cachecticus Quercetan. cum Cinnab. ʒn. opt. C. C. vel Ebur s. igne ppt.* His adde *Theriacam*, *Mithridatium*, *Electuarium Orvietan. vel Diascordium Fracast.* Quibus tandem *Opiatâ* pro rei necessitate miscere possumus. Pro potu *Acidulæ* profunt, vel *Decoctum Rad. Acetos. Gramin. Hordei integr. & Passular. minor.* Tandem *Musica*, & quidem certis tonis vel sonis instructa, præstantissimum remedium censetur. De illâ verò consulatur *Athanas. Kircherus* in *Libro de Magnete*, ubi prolixè & eruditè hanc materiam pertractavit. Cica-

CICATRIX, *Callus cutaneus*, *Tyloma*, vel *Tylos*, Τύλος, est eminentia quædam vel crassities Cutis, nunc per se nascens, nunc è coalescentiâ labiorum Vulneris vel Ulceris producta, reliquæ cuti concolor, vel subinde magis alba. Quod si talis eminentia insensibilis sit, vicinam cutim parum vel nihil excedat, cutisque non nisi crassior aut durior reddita fuerit, cum aliquo velut stygmate læsionis præteritæ, tñ simpliciter *Cicatrix* appellatur. Si autem cutis magis elevata existat, dura & crassa, tum *Callus* vocatur *cutaneus*, ad distinctionem à *Callo osseo*, qui in Fracturis ossium non rarò enascitur.

Cicatrix illa reliquâ cute albidior ac solidior sine pilis semper est, & modò exiguum, modò amplius in sese spatium complectitur; subinde extra cutis superficiem plus minusve assurgit, interdum cuti profundius inhæret, aut ei æqualis existit, atque faciem duntaxat albæ maculæ refert. Hæc *Cicatrix* si cutis superficiem in facie præprimis excedat, quandoque deformis est, & hætenus medelam apud formositatis studiosos exposcit. Ortum verò habet quælibet *Cicatrix* ex Ulcere vel Vulnere quodam, dum sensim ejus labia per affluentem succum nutritium coadunantur; quod si proin talis succus vel propter nimis laxam deligationem, vel propter emollientis continuè Balsami aut Unguenti applicationem luxuriat, tum *Cicatrix* inde magna, atque deformis quoque nascitur.

Callosa hinc est propemodum omnis *Cicatrix*, sed *Callus* tamen non

Cicatricem tantum sub se comprehendit, verum etiam duram, incrassatam, insensibilem, atque supra cutim sæpè multum elevatam Epidermidem significat, quæ nunc amplum, nunc breve membri alicujus spatium occupat; sicuti videre est in circumferentiâ volæ manuum, & plantæ pedum, apud Rusticos, Opificesque varios. *Callus* autem talis generatur à frequenti eaque forti compressione, aut attritione partium, unde fordes cutaneæ in cuticulâ remanentes, sensim exspirantibus subtilioribus particulis, crassescunt, atque in solidam substantiam concresecunt, quæ vel ideo insensibilis existit, quoniam nervosis fibrillis destituitur. Quod si nimis crassus fuerit ejusmodi *Callus*, tum non rarò solet aliquam Cuti molestiam, subinde & pungitivum dolorem conciliare, præprimis, quando nimium durus evasit.

Calli generatio.

Cicatrix deformitatem quandam, aliudve incommodum procreans, vel *emollientibus ac detergentibus* sensim remediis, præprimis autem quotidiana affriktione *Foliorum recentium Verbasci, Solani, Consolidæ majoris, Parietaræ, Eupatorii, Florum Papaveris, Liliorum, & Fabarum* tollitur, atque discutitur: vel *cathæreticis* paulatim exeditur, simul *Emplastro diapalmæ*, aut *diachalciteos*, aut *diasulphuris Rulandi*, cum arctâ nonnihil ligaturâ applicato. *Cathæreticum* esse potest vel affricatio *Lapidis infernalis*, aut *Butyri 3 nii*, aut *Lapidis caustici*; vel *Unguentum* aliquod blandè erodens, ex *Axungia Thymalli piscis, Vul-*

Curatio Cicatricum.

pis, Calce vivâ, Cineribus Tabaci, Borace Venetâ, Testis Ovorum aut Cochlearum combustis, Semine Erucæ, vel Sinapi, Camphorâ, &c. compositum. Profunt denique & ea, quæ in Clavis atque Verrucis extirpandis commendari solent.

*Callorum
curatio.*

Calli cutanei in manibus aut pedibus ex operibus sive attritione enati, si nullam afferant molestiam, hactenus non auferuntur; aut etiam, dum opera manualia & pedum exercitia aliquândiu intermittuntur, vel moderantur, per se minuuntur, atque evanescunt, emollitis sensim, atque per sudorem aut transpirationem fortiorum, consumptis particulis cuticulæ inspissatæ. Ac certè hâc ipsâ ratione etiam illi, qui molestiam in incessu & operibus manuum afferunt, curari solent: vel ea simul in his adhibebuntur media, quæ validè emolliunt, id quod *Balnea Aquæ dulcis* cum incoctione *Plantarum emollientium* atque *extorum Animalium*, nec non *Inunctiones* cum *Axungiiis* vel *Unguentis* præstant. Ab radi etiam solet ejusmodi crassa cuticula, sicubi Balnei calentis ope satis emollita fuerit:

CIRSOCELE, vid. *Hernia varicosa.*

*Clausura
Oris.*

Spasmodica.

CLAVSVRA ORIS, est valida Maxillæ inferioris ad superiorem appressio, ita ut homo eam flectere, sicque os aperire neutiquam possit. Affectus spasmodicus subinde, atque in Convulsione universali frequens, sed etiam aliquando ex variis casibus peculiaris. Ita enim ante aliquot annos vidimus quendam Fabrum ferra-

rium, cui ex accepto ictu globuli sclopetarii in Metatarso pedis sinistri, in quo tendines & membranæ interosseæ graviter fuerunt dilaceratæ, Musculus temporalis ita convulsus fuit, ut inde per plures hebdomadas Os clausum habuerit, neque hoc aperire, aut vi quadam instrumentorum adhibitâ, diducere potuerit, nisi summo cum temporum sinistrorum dolore, metuque Convulsionum universalium lethali. Duravit autem hic Spasmus Maxillæ ultra mensis spatium, eo usque, donec calcei & tibialis frustula è Vulnere, cui pertinaciter inhæserunt, à naturâ excussa fuerint, quæ aliàs profundè inter tendines sita nullo artificio citius extrahi poterant. Quamprimum autem ultimum frustulum unâ cum pure prodierat, vel in eodem instanti aut momento Spasmus ille cessavit, & Os denuo aperiri potuit.

Neque triennium elabitur, quo Juvencula quædam, honestissimi Civis Filia duodecennis, postquam per aliquod tempus Febri erraticâ laborasset, tandem periodico Capitis dolore affligi cœpit, qui quidem præcisè horâ octavâ vespertinâ cum imbecillitatibus Cordis, atque pertinaci Oris clausurâ, crotaphitæque Musculi indolente spasmò, Filiam ita invasit, ut loqui protinus, ob motum Maxillæ amissum, nesciverit, nec nisi parum liquoris inter Dentes ori ingerere, hincque deglutire potuerit. Duravit hoc malum ultra sex hebdomadas, & quidem unusquisque paroxysmus ab octavâ vespertinâ usque ad quartam sequen-

sequentis diei horam matutinam, quâ Aëgra iterū os aperire, loqui, edere atque bibere potuit, simulque à Cephalalgia liberata fuit, sese extendebat.

Mirabilius exemplum ejusdem Affectūs hęc adhuc habemus in formosissimâ Negoriorum famigeratissimi Filia, quintum & decimum ætatis annum jam prætergressa, quæ tali periodicâ oris clausurâ, quotidie à quartâ vespertinâ usque ad tertiam matutinam sine dolore ullo durante, jam per triennii spatium laborat, simulque pedes retro ad nates usque firmiter contractos ita habet, ut nullâ hætenus arte, nullis remediis iterum flecti potuerint. Multi sunt, qui per incantationem hoc malum Filia inflatum esse sibi persuadent. Interim crura non in instanti, sed sensim, & quidem aliquot hebdomadarum spatio, nates versus retro tracta fuerunt, citra notabilem qualemunque dolorem, quo etiam & nunc caret.

Subinde dentitio difficilis temporalem quoque musculum convellit, atque ita Os maxillam validè adducendo claudit. Eundem effectum, sed sine spasmo tamen producit Tumor plus minus grandis atque durus Gingivarum, aut Buccarum, præprimis non longè à juncturâ excitatus, unde maxilla, saltem absque dolore maxime notabili diduci flective haud potest. Vidimus & Aphthas graviores, Ulceraque Gingivarum cum tumore & stagnatione Lymphæ contingentia Oris diductionem impedivisse.

Difficilis proin hic est Morbus, quem certè curare non poteris, si causam genuinam ignoraveris, tollitur enim per se, quamprimum causam ejus abstuleris. Quando itaque manifesta est causa, eam quantocyus auferre studebis, & sic os aperietur. Si occulta fuerit eadem, aut malum per incantationem inductum, tum remedium vix superest ullum, præterquam Divini Numinis auxilium, indeque accedens incantamenti qualiscunque dissipatio.

CLAVI PEDVM, vid. *Verruæ*.

CLAVVS, vid. *Cephalæa*.

COECITAS, vid. *Oculorum cecitas*.

COELIACVS FLVXVS, Cæliaca Affectio, Passio, Diarrhœa chylosa, est frequens alvi dejectio, in quâ assumpta alimenta, utcumque digesta & dissoluta, unâ cum excrementitiâ materiâ dejiuntur. Affectus Pueris quàm Adultis familiarior, in quo nunc Hepar cum ductibus cholidochis, nunc Pancreas, nunc Vasa lactea, aut Glandulæ Mesenterii patiuntur.

Etenim Fluxus hic contingit, quandoque Chylus, Ventriculi digestionem plus minus perfectè elaboratus, in Intestinis tenuibus vel plane non secernitur à materiâ fœculentâ, & sic per vasa lactea transire haud potens, cum ipsis è corpore fœcibus prodit; vel etiam si segregetur, attamen per vasa lactea aut glandulas Mesenterii præternaturaliter angustatas & obstructas non transmittitur.

Hh 2

Non

Non secernitur Chylus propter inertem vel deficientem bilem aut succum pancreaticum, hi enim liquores ad dictam segregationem sunt maximè necessarii. Inertes evadunt isti liquores, si ob qualemcunque causam volatilitate, activitate, subtilitate & nativâ crassi suarum particularum privantur. Deficiunt autem planè, cum Hepatis aut Pancreatis glandulæ scirrhusæ evaserunt, vel cum tubuli atque ductus eorundem Viscerum à calculis, vel ab austeritate, mucositate, aut visciditate humoris constringuntur obstruunturve. Unde in Ictero flavo atq; Atrophîâ talis Fluxus est communis. Non transmittitur atque distribuitur Chylus per vasa lactea, aut glandulas Mesenterii, quando hæ viæ, oscula ve illarum in Intestina hiantium, à chylo crudo, austero, aut mucosissimo viscido adstringuntur, constipantur vel obstruuntur; quando itidem dictæ glandulæ scirrhusæ redduntur. Contribuunt itaque huc frequens corporis refrigeratio, voracitas insignis, sive intempestiva aut immodica ciborum, utcunque eupseptorum ingestio, creber etiam dyspeptorum usus; Potus liquorum minùs spirituosorum, acidorum, aut gelidorum largus; Ira, aliave Animi pathemata vehementiora.

Diagnos.
lis.

Cognoscitur hic Morbus haud difficulter ex inspectione eorum, quæ ex alvo Ægrotantis plus minus copiosè prodeunt. Si porus cholidochus est obstructus, ita ut Bilis nulla transeat, vel si Bilis iners est, tum excrementa alvina albicantia, pallida

aut grysea projiciuntur. Si Pancreatis glandulæ aut tubuli obstructi scirrhusive sint, tum umbilicalis regionis interanea, (fortiter contacta) reperientur dura, alvique fœces tinctæ una cum chylo albicante vel gryseo separatim excernentur. Si denique oscula Vasorum lacteorum mucositate, & obstructa fuerint, tum excrementa alvina similiter bile tincta notabuntur, atque tantillum flavescent, vel chylus segregatus cum fæcibus hinc inde confusus tantum apparebit. Adsunt præterea subinde ructus cum aliquali Abdominis tensione, appetitus satis constat, sed sitis plerunque simul urget propter salivæ paucitatem aut crassitatem.

Non contemnendus est hic Fluxus, si diutius persistat, etsi enim sine tenesmo contingere soleat, paulatim tamen corpus, ob nutrimenti penuriam emaciat. Neglectum imprimis malum durare solet, & radices firmiores agere. Subsequitur etiam aliquando Cachexia, si nempe seroso-aquosiores tantum, & non limul balsamico-gelatinosæ chyli particulæ intra Vasculorum lacteorum oscula admittantur. Quæ Passio coeliaca ab induratis Mesenterii glandulis, vel à coalitu osculorum Vasorum chyliferorum, vel à Cicatricibus intestinalis canalis post Dysenteriam oritur, pro incurabili habetur. Quæ itidem à Scirrho Hepatis, vel Calculo porum biliarium obstruente provenit, sanitatis spem nullam promittit.

Quod Curationem attinet, si Fluxus provenerit ab inertîâ & visciditate

ditate Bilis, ductum cholidochum obstruentis, ea remedia conducunt, quæ in Ictero flavo commendantur. Si verò à muco oscula vasorum chyli-ferorum infarciēte, aut Glandulas etiam Mesenterii obstruente oriatur, mucum talem pituitosum incidentia, attenuantia, abstergentia, & expurgantia in usum vocari debent, quibus dem superaddenda aromatica, blandè acria, amaricantia, Ventriculi chylicationem perfectam redintegrantia, sicque muci adeo viscidi generationem impediētia. Ante omnia proin blandum emeticum est dandum, illudque etiam pro re natâ iterandum; hunc in finem Pueris quidem concedimus *Trochiscos* nostros *pædocatharticos*, quorum numerus pro dosi æquabit numerum annorum ætatis; vel in fortiori complexione unico *Trochisco* superabit, ita ut v. gr. puero 4. annorum quinque *Trochisci* dentur mane comedendi, aut si ita nolint, prius in pulverem redigendi. Adultioribus damus *Pulverem radice Afari* ad 3ß. cum *Cremore Fri* & *Oleo still. Mac.* vel *Anis.* Vel

℞. *Crem. Fri* gr. vj.
Mercur. dulc. opt.
Sacch. rosat. ana. 3ß.
Fri emet. gr. ij.
Ol stillat. Fœnic. gutt. ij.

M. f. *Pulv. subt. d.* ad cb. pro dosi matutin. cum regimin. dietæ capiendâ.

Si Vomitorio locus non est, saltem Catharticum exhibebitur; ubi Infantes quidem aut Pueri sument *Infusum Radic. Ireos flor. Rhabarb. el. Apii, Fol.*

Sen. mund. Semin. Anis. Fœnic. Cinam. el. & Cremor. Fri, Melle vel Saccharo edulcoratum. Vel *Panacæam solutivam alcalinam* ad 3ß. quater vel pluries mane capiant. Adultis verò exhibebuntur aliquoties *Pilula purgantes cum Mercurio dulci*, vel *Vinum medicatum laxans*, aperiens & detergens concedetur.

Purgato corpore profunt *Succi Plantarum antiscorbuticarum*, tantillo *Sacchari* edulcorati, atque è *Plantagine aquat. Trifolio fibr. Nasturtio* qualicunque, *Cochlear. Beccabung. Urticâ urent. Cherefol. Chelidonio minore*, expressi filtratique, de quibus Adulti quidem duas, Pueri verò unam tantum unciam mane ac vespere haurient. *Juscula* quoque iisdem *Herbis alterata*, & quotidie semel vel bis hausta eundem effectum præstare possunt. Vel dabuntur gutt. 10. ad 30. *Tincturæ* ½ n. ʒtis aperit. *Salis Fri, Si Martis, Corallor. cum Nitr. parat. Essentiæ Galang. Zedoar. Cinamom. Garyoph. Absynth. Elixir propr. Clauder. cū, vel sine acido par. Liq. Nitri fix. vel Terr. fol. Fri, Spirit. Salis armon. anisat. vel fœnic. Sal volat. oleos. Sylv. Spirit. Cochlear. Aqua Cinam. cum vino destill.* Sequentibus etiam *Pulveribus* magno cum fructu uti solemus:

℞. *Radic. Ireos flor. Aron. Specif. stomach. Poter. Corall. rubr. ppt. Dent. Apr. ppt. Unic. marin. ppt. ana. 3j. Ois volat. C. C. vel Fulig. 3ß.*

Semin. Anis. ʒj.
Sacch. cand. alb. ʒj.
M. f. Pulv. subt. d. ad. Scatul. Dosis
m. ac. vesp. ʒj. ad ʒij.
Vel ʒ. Pulv. fol. Trichoman.

Nasturt. aquat.

Pilosell. ana. ʒj.

radic. Zedoar. ʒj.

Ebor. phil ppt.

ʒ n. diaph. ana. ʒij.

Diaph. ʒial. aut ʒvial. ʒj.

ʒis Juniper. vel

Arcan. dupl. Myns. ʒj.

Seminis Fœnic. ʒß.

Sacch. cand. alb. ʒiß.

M. f. Pulv. subt. d. ad Scatul. Sum-
matur uti prior cum vehiculo conve-
nienti.

Adulti etiam Infusum Herbarum
aperientium bibent, v. gr.

ʒ. Radic. ʒ. aperient.

Cichor. ana. ʒij.

Herb. Agrimon.

Meliss.

Card. bened.

Capill. ʒ r. ana. Mj.

Summit. Absynth.

Cent. minor. ana. Mß.

Semin. Anis.

Fœnic.

Bacc. Junip. ana. ʒij.

ʒis Cichor. ʒj.

Incisis, contusis, & sacculo inditis
affunde Vini alb. opt. ʒviiij.

Postea mane ac vesp. bibatur hau-
stus unciarum quatuor.

Externa.

Externè totum Abdomen ter quo-
tidie inungatur Axungia Anat. Capo-
num, Anserum, aut Butyro, in qui-
bus prius decoxeris Radices Cichorii,

Herbas Card. bened. Beton. Salv. Fu-
mar. Scabios. Meliss. Serpill. Nasturt.
Flores recent. Bellid. min. Melilot. &
similia.

In Dietâ pro potu ordinario ce-
dat Decoctum Radic. Gram Scorzonæ
Irid. Flor. Liquir. Rasur. Lign. Guajac.
Sassaphr. Semin. Anis. Fœnic. Cinam.
Balneum Aquæ dulc. vel mineral. hei-
quoque convenit. Cibi dabuntur
moderatâ quantitate, stasisque tem-
poribus, eupepti & euchyli, blan-
do sale volatili præditi. Somnus mo-
deratus esse debet. Corpus exercea-
tur blandè quotidie. Alvus libera sit
semper. Animi passiones modum nullo
tempore excedant.

Quæ denique species Cœliaci Flux-
us supra in Prognosi immedicabiles
pronunciatae fuerunt, illæ palliativ-
vam tantum curam requirunt, jux-
ta Symptomatum varietates institu-
endam.

COLICA FLATULENTA

est dolor Intestinatorum vagus, plus
minus acerbus, à Flatibus membra-
nas distendentibus oriundus. Colica
vocatur ab Intestino Colo, in quo fre-
quentius hospitatur. Græcis dicta
Ὀδύνη vel Διαθροσικωλική, Passio
vel Dispositio colica.

Pars affecta sunt Intestina in pri-
mis crassa, in quibus conclusi flatus
exitum non inveniunt membra-
tendunt, ac per cellulas Coli decurrunt.

Producitur autem dolor ille va-
gus, dum aëreæ particulæ, acido-
viscidis cruditatibus conclusæ ac in-
volutæ, suâ virtute elasticâ undique
ex-

expansionem sui liberam & sufficientem moliuntur, dumque eam non adipiscuntur, sicque exitum nullum inveniunt, Intestina distendunt, distendendoque fibrillas nerveas moleste ac dolorifice dilacerant, vel spasmodice crispant. In crassis Intestinis magis hospitatur malum, quoniam inibi particulæ aëreæ à feculentis plus liberatæ felicius expandi, hincque intra validius extensas Coli cellulas coerceri possunt. Quando enim Fibræ cellularum nimis extenduntur, tum motu suo peristaltico privantur, sicque transitum contentis haud permittunt. Ita enim & excrementa obdurata in cellulis Coli vel Intestino recto flatibus liberum transitum denegant. In Herniâ autem intestinali, dum flatus elapsi in Scrotum, Intestini portionem tendendo valide constringunt, colicus similiter, tandemque & iliacus Dolor excitari solet. Occasionem hisce doloribus frequentem præbet Aer frigidus, cutaneas primùm tandem & intestinales fibras constringens, sicque pituitam intestinale in crassans, atque acrem acidam reddens, ad producos hinc flatus aptissimam præbent & Cibi acidi, austeri, flatulenti, præsertim si potus frigidus minusque spirituosus super ingestus fuerit; tristitia & mœror; lucubrationes nocturnæ frequentes; meditationes statim post pastum; refrigeratio extremorum nimia; excrementorum ac flatuum retentio diuturna; quies corporis nimia; somnus denique excessivus.

Quoad *Diagnosin*, si Colica à solis flatibus originem trahat, in cellulis

Coli subsistentibus, tunc dolor plerumque vagus est, per canalem Intestini transiens, & nunc inguina, nunc hypochondria petens, si verò circa Umbilicum magis vagatur Dolor, tum signum præbet, in tenuibus magis Intestinis causam mali divagari. Subinde jungitur aliqualis Diarrhœa, & excretio spumiformium tenuium excrementorum; præcessit subinde refrigeratio ventris & artuum nimia, vel Cibi flatulenti fuerunt aliquoties comesti. Si Colica à fecum durarum subsistentiâ originem trahit, tunc adest ventris constipatio, dolorque partim in uno loco obhæret, partim etiam vagus est. Si ab Herniâ, tum oculis se se conspiciendum præbet malum.

Differt à *Colicâ nephriticâ*, quæ principium sumit à lumbis, & hinc versus hypochondria atque umbilicum extenditur. A *Colicâ spasmodicâ & biliosâ*, quod hæc non ita vaga, sed magis in loco aliquo fixa, atque aliàs longè vehementior, cumque spasmodicis nervorum intestinalium contractionibus juncta sit. Tandem à *Colicâ uterinâ*, quod hæc solum Fœminas, & eas quidem hystericasprehendat.

In *Prognosi* Colica flatulenta non est statim dicenda periculosa, potest tamen, malè curata aut prorsus neglecta, in alios morbos periculosiores mutari, veluti sunt Convulsiones, Ileos, Tympanites, Cholera sicca, Animi Deliquia.

Quamprimum itaque Homo tali dolore prehensus est, *Clysmâ* statim admit-

Prognosis

Curatio

admittet *carminativum*, ex Decocto Radicum *Angelic. Imperat. Galang. Lil. alb. Valerian. Scorzoner. Herbarum Aneth. Abroton. Menth. Matricar. Meliß. Calaminth. Mercurial. Puleg. Organ. Hyssop. Card. bened. Florum Chamomill. Melilot. Seminum Aneth. Dauci, Cumin. Carvi, Anisi, Angelicæ, Fenic. Ammeos, Bacc. Juniper. Lauri in Jussculo carniū, vel Aqu. font. paratum, admiscendo Mel rosac. vel Rutac. cum Oleo violar. Lil. alb. ac Sale. Clysma ejusmodi etiam pro rei exigentiâ reiterari debet. Sunt qui Fumum Tabaci per fistulam coriaceam ano immittunt, non sine successu. Postea verò extus quidem totum Abdomen inungi sæpè potest Oleo Aneth. Chamomill. Rutæ, Sem. Hyoscyam. Papav. alb. cum admixtis Oleis distillatis Anisi, Carvi, Meliß. Macis, Angelic. &c. Post inunctionem imponetur lintheum quadruplicatum sæpius calefactum. Vel Sacculus è carminativis compositus, interpassatus, ac vino maximè calenti immersus, Abdomini applicetur, antequam refrigerit, semper iterandus. Interdum siccè Abdomini, prius inuncto, magno cum calore impositus plus valet. Sunt qui Opercula terrea probè calefacta cum lintheaminibus parti affectæ imponunt, & quandoque renovant. Alii iterum benè habent ex Sacculis Avenâ repletis, & siccè, sed calidè admodum ventri applicatis. Inprimis studebitur, ut pedes semper calidi sint, quia eorum refrigeratio multum contribuit ad Mali augmentum.*

Tandem intus ordinabuntur remedia flatus potenter discutientia simul ac fibras nervosas irritatas demulcentia, & quidem sub formâ nunc Essentiarum, nunc Decoctorum, nunc etiam Mixturarum, quæ inter commendantur multiplici usu Sal volat. oleos. Sylv. Spirit. Sal. armoniaci. anis. vel fœnicul. Essent. Zedoar. Angelic. Galang. Cortic. Citr. vel Aurant. Myrrh. Absynth. Aneth. Quibus admisceri potest etiam Essent. Croci, aut Opiliquid. ad dolores tanto potentiùs mitigandos.

R̄. Æis vol. oleos. Sylv. ʒiij. vel Spir. Æis armon. anis. ʒij.

D. ad Vitr. Dosis gtt. 20. cum Vin. vel Jussculo vel Aqu. Fenic.

Vel R̄. Essent. cort. Aur.

Zedoar.

Absynth.

Elix. propr. s. acid. ana. ʒiʒ.

M. d. ad vitr. Dos. m. ac v. gtt. 20 vel 25.

Vel R̄. Essent. Angelic. ʒiʒ.

Galang. ʒj.

Croci. ʒʒ.

M. d. ad vitr. Dosis à gutt. 20. ad 30

Pro Mixturis inserviunt præter modò dictas Essentias, Aquæ destillatæ Meliß. Card. ben. Ulmar. Scorzoner. Menth. Puleg. Matricar. Chamomill. Anethi, Marrub. alb. Syrup. de Absynth. Cortic. Aurant. vel Citri, de Cinnamonom. quibus addere licet quoq; ad spicula cruditarum acida absordenda Pulveres Oculor. ʒ. ppt. Ebor. ppt. Unicorn. fossil. Corall. rubr. vel alb. ppt. ʒ n. diaph. Bezoard. min. Matr. Perlar. ppt. v. gr.

R̄. A.

℞. *Aqu. Betonic.*

Meliss.

Scorzoner. ana. ℥j.

Puleg. ℥℞.

Syrup. de Cinam. 3vj.

Corall. alb. ppt. 3j.

M. d. ad Vitr. Cochleatim usurpetur.

Imò subinde *Oleum dist. Carvi, Cumin, Anis. Rorismarin. aliudve ad gutt. x. vel xij. Cum Jusculo carnis exhibitum valde juvat.*

Vel ℞. *Aqu. Fœnic. ℥i℞.*

Card. ben.

Cherefol. ana. ℥j.

Syrup. de cortic. Aurant.

Capill. ♀r. ana. 3ij.

Ol. still. Carv.

Anis. ana. gutt. vj.

Ocul. ̄. ppt. 3j.

Sacch. alb. 3ij.

M. d. ad Vitr. sumatur cochleatim.

Rustici hunc in finem cum fructu usurpant *Oleum distill. Juniperi, vel Spiritum Ceras. nigrorum, vel etiam Balsamum ̄ris anisat. Quibus addere licet Elixir Vitæ Matth. Aquam phlogonam, aut similem quandum Aquam stomachicam, ex Aromatibus, Seminibus carminativis, Corticibus Citri vel Aurantior. cum Spiritu Vini & Saccharo paratum. Denique si cruditates in primis notentur viis, audacter per inferiora expurgentur, dando vel Infusum Rhabarbari, vel Potionem ex Syrupis purgantibus cum Aquâ Chamomill. & Cinnamom. factam; vel deniq; Rhabarb. in substant. cum Mercur. dulci. v. gr.*

℞. *Syrup. de Cichor. cum Rhab. 3ij.*

Elect. è succ. Ros. ℥i℞.

Aqu. Meliss.

Fœnic. ana. 3vj.

M. f. Potio d. pro dosi ad Vitr.

Vel ℞. *Rhab. elect. 3i℞.*

Merc. dulc. 3℞.

Crem. ̄ri gr. vj.

Scamm. sulphur. gr. iij.

Ol. still. Carv. gutt. ij.

M. f. Pulv. subt. d. pro dosi.

Si feces sint induratae, ac in aliquâ Coli cellulâ immotæ obhæreant, tunc Clysteres emollientes sæpius reiterandi sunt; imò Æger Balneo Aquæ dulcis, cui Herbae emollientes atque carminativæ incoctæ sint, immittatur. Locus dein Abdominis dolens frequenter Oleo Menth. Chamomillæ, Verbasci, Anethi, illinatur; imò & Sacculus ex Herbis carminativis atque emollientibus paratus, Lactique incoctus, Abdomini sæpius applicetur. In Malo pertinaciori cum Jliacus jam incipit Affectus, citra hæsitacionem propinari potest Mercurius vivus ad ʒ℞. cum Syrupi Ros. solut. s. 3ij. vel 3iij. & Aqu. Cinam. bugl. 3iij.

Quod si autem Lumbrici lati, alique vermes ad flatulentam Colicam contribuunt, tunc curatio Vermium instituitur. Si denique Hernia omentalis vel inguinalis in causâ sit, extus supra jam dictæ inunctiones atq; fomentationes cū Sacculis, inprimis cū fascicul. Fili linei in lixivio cocti, & calidè applicato instituantur; intus verò maturè Infusum Fol. Senæ cum Rhabarb. Semin. Anis. vel Carvi, ac ̄e Absynth. propinabitur.

Extra Paroxysmum colicum præ-
servationis gratiâ æstivo tempore qui

Extra
Paroxis-
mum.

Cholerici sunt, *Acidulas*, vel *Serum Lactis caprilli*, cum fructu bibunt: qui verò phlegmatici aut Melancholici existunt, *Thermas Plumbarienses*, *Piperinas*, *Embsenses*, *Carolinas* aliasve potare, simulque calentibus ejusmodi Aquis in Balneo uti cum fructu possunt. Memini me olim per plures annos singulis mensibus semel aut bis tales dolores colicos passum, indeque tandem potu *Tbermarum piperinarum* sive *Fabariensium*, Balnei que usu penitus, per Dei gratiam liberatum fuisse, Reliquis anni temporibus per aliquot hebdomadas in usum trahi potest *Essentia* v. gr. *Cort. Aurantior. Cinnamon. Zedoar. Galang. Calam. arom. Myrrh. Absynth. Castor. Angelic. Carminativ. Wedel. Sal volatile oleosum Spirit⁹ Cochlear. Spirit. Salis armon. anisat. aut fœnicul. ac simil. quæ m. ac vesp. ad guttas 20. pluresve cum *Aqu. Meliss. Card. bened. Mar. Fœnic. aut* alio vehiculo misceri solent.*

Colica
Neph-
ritica.

COLICA NEPHRITICA est Dolor ventris plus minus acutus, à lumbis incipiens, & utrinque anteriora versus epigastrium atque umbilicum ad mesenterium usque pergens. *Nephriticus* dicitur, quia ἀπὸ τῶν νεφρῶν, à Renibus læsis suum trahit ortum.

Pars af-
fecta.

Hoc in Morbo primariò quidem Abdomen patitur, sed primò tamen Ren unus vel alter affectus sive læsus existit, atque per consensum simul plexus nerveos mesenterii affligit.

Causa.

Producitur autem ejusmodi Dolor, quando vel mucilaginoso-vilci-

dus & acris humor, vel etiam sabuloso-crassa materia, in Renum tubulis obhærens, sui quadam asperitate & acrimoniâ nervosas laceffit fibras, atque hæc postea suam dolorificam sensationem, per nervorum, plexûs videlicet renalis & mesenterici maximi, communionem, ad usque regionem Abdominis mediam, sub quâ Mesenterium latet diffundunt & propagant. Spasmodica autem est heic crispatio talium nervorum, unde tormenta Ventris acerbissima evadunt, alvus adstringitur, Venter convulsus vomitu omnia rejicit.

Cognoscitur exinde, quòd eos maximè affligat, qui Nephritidi, vel Calculo Renum sunt obnoxii; quodque dolor solius Abdominis non sit, sed suas in Lumbis radices agat: quòd Urinæ simul sint crudæ, nonnunquam tenues, aliàs crassa ac viscidæ; quod interdû Egri simul nauseam habeant, aut vomitum Nephriticis familiarem; quæ symptomata tamen in aliis minimè observantur. Appetitus simul prosternitur, somnus perturbatur, Febricula accenditur, sitis excitatur, quandoque & difficultas mingendi succedit.

Quoad *Prognosin*, Morbus hic magis molestus quàm periculosus est habendus, neque adeo facilè in pejorem mutatur Affectum, nisi malè tractetur. Nephritis semper est, sed in minore gradu juncta, & ipsamet occasionem Colicæ tali passioni simul præbet, si nimirum illi in Renibus nervuli affliguntur, qui communionem cum variis Abdominis membranis obtinent.

In

In *Curatione* Nephritidis ratio est habenda, eā enim sublatā, simul per se Colica ista tolletur. Quamobrem primò quidem *Clysmata emollientia* atque *detergentia* injiciantur, ex *Decocto Radicum Alth. Lilior. albor. Raphan. Herbar. Malv. Parietar. Portulac. Fragar. Cherefol. Petrosel. Seminum Dauc. Cumin. Baccar. Juniper. Alkekeng. &c.* cui post colaturam admisceri debet *Terebinthina vitello Ovor. soluta*, *Oleum Lilior. alb. Violar. Malvæ, Chamomill. Mel mercuriale aut rosaceum*: v. gr.

℞. *Radic. Petrosel. Apii.*
Lil. alb. ana. ʒß.
Herb. Alth. Parietar.
Malv. Cherefol. ana. Mj.
Flor. Chamomill. Miß.
Bacc. Juniper.
Semin. Carvi ana. ʒij.

Incis. & contus. coqu. in s. q. Aqu. font. colatur. ʒxj. adde
Olei Violar. Chamom. ana. ʒj.
Tereb. Vitell. Ov. sol. ʒvj.
Mell. rosac. ʒß.

Misc. F. Clyster tepidè injiciendus.
Hinc & *Lumbi* cum *Abdomine* frequenter inungantur *Oleo Chamomill. Semin. Hyoscyam. expr. Scorpionum Matth. Lacertar. Alth. Philosoph. Verbasc. Aneth. &c.* Intus verò exhiberi potest *Emulsio* ex *Seminibus Violar. purpur. Melon. Pepon. Nucl. Persicor. cum Aqu. Portulac. Fragor. & Cinna- mom. v. gr.*

℞. *Nucl. Persic. ʒij.*
Semin. Melon. Cucum. ana. ʒiß.
Violar. ʒiij.
Aqu. Fenic.

Portulac. ana. ʒiij.

F. l. a. Emuls. cui adde

Syrup. de Alth. Fern. ʒiß.

Aqu. Cinam. ʒß.

M. d. ad Vitr. pro tribus dosibus.

Imò ipsum *Semen Violarum* ad ʒß. pro dosi in *Emuls.* adsumi potest, quo & *Alvi & Renum viæ* tanto felicius expedian- tur, atque detergentur. Aliàs etiam prodest *Decoctum helcocatharcti- cum Foresti*; vel *Infusum Fol. Senæ cum Rhabarb. Radic. Petrosel. aut Apii, Se- min. Anis. Fenicul. Sale Ononid.*

℞. *Radic. Apii. Fenic.*
Rhab. elect. ana. ʒj.
Fol. Senæ mund. ʒß.
Semin. Fenicul.
Crem. Fri ana. ʒj.

Incis. & contus. d. ad Nadul. qui co- quatur in Aqu. font. q. s. Colatur. ʒiij. adde Syrup. Viol. ʒvj. sumatur pro dosi. Tandem ulterius durante malo *Æger Balneo*, vel *Semicupio*, cui *Herbæ emol- lientes* sint incoctæ, aliquoties immit- tatur, externæque inunctiones conti- nuentur. Intus verò *Eclegma Nephri- tico anodynum* per cochlearia propina- bitur ex *Syrup. de Alth. Fernel. Papav. alb. Capill. veneris, aperitiv. Minderer. Violar. purpur. cum Aqu. Fragor. Por- tulac. Lactuc. Ononid. Oleo Amygdal. dulc. rec. expr. Ocul. ʒ. ppt. Milleped. ppt. & simil.* Quibus denique adde *Essentiam* vel *Pulverem Virgæ aureæ, Tincturam ̄is Fri, Martis aperitiv. Corallor. Essent. Opii, Theriacam celest. Pilulas terebinthinat. Spiritum Tere- binth. Elixirium quoddam nephriticum blandè spirituosum, quale nostrum*

est,

est, & quotidie dosis trium, quatuor, vel quinque cochlearium dari potest.

*Colica
humoro-
sa &
spasmo-
dica.*

COLICA HUMOROSA & SPASMODICA, est Dolor Abdominis in aliquo loco magis fixus, & vehemens à fibrarum intestinalium aut plexuum Mesenterii nerveorum, spasmodicâ contractione, ac valdè dolorificâ tensione, originem trahens.

*Pars af-
fecta.*

Afficitur in humorosâ Colicâ ut plurimum Cellula una vel altera intestini Coli, cum fibrillis ejus nervosis, utpote maximè sensibilibus: rarius affliguntur Intestina tenuia. In Colicâ spasmodicâ autem plexus nervosi Mesenterii etiam in fontibus Intestinis patiuntur.

Causa.

Quando igitur humores acres acido-corrosivi, mucoso-serosi, aut simul biliosi in Intestinis cumulati, feculentæ Coli saburræ tenacitatem conciliant, atque interea pauciores particulæ aquosæ adsunt, quæ diluendo prædictorum acrium humorum activitatem invertunt aut mitigant, tum contingit facilè, (quâ demum exterius datâ occasione) ut portio ejusmodi saburræ vitiosæ in globos sensim coacta, aut in gluten velut conversa, intra hanc illamve Coli Intestini, præprimis ubi ligamenti quibusdam Hypochondriorum Visceribus adnatum est, cellulam obhæreat ac subsistat, sicque non solum transitum excrementis denegando Alvi constipationem inducat, sed & spiculis suis admodum acutis fibrillas nervosas pungat, crispet, atq; dolorificè contrahat, unde cellula magis contracta an-

guustior redditur, atque fœcibus debitum transitum intercipit. Dolor verò talis in loco affecto fixus manens, suâ vehementiâ atque diuturnitate non solum spasmus Intestinorum excitat, sed & motum eorundem peristalticum subinde inversum, sive Ileum, imò sæpius planè Convulsiones universales inducit, indeque non rarò Parhesin manuum post se relinquit, in quâ Homines manus atque harum digitos flectere probè, movere, aut quid eis prehendere firmiterque tenere nesciunt.

Cùm autem diversitas adsit dolorum & cruciatuum in hac Colicâ, *perterebrans* quidem & *immobilis dolor nunc* à materiâ glutinoso-acidâ & acri, cellulis Intestini Coli pertinaciter affixâ; *nunc* à durioribus fœcum scybalis, quæ iisdem Cellulis interdum firmiter inhærescunt, & ita *Colicam stercorariam* efficiunt; *nunc* à pituitâ quadam frigidâ & acri salino-viscidâ in Hypochondriacis non rarò fibrillas intestinorum graviter affligente, producitur. *Pungitivus* verò dolor simili humori acido-salino viscido, sed acriori, fibrillas Intestinorum velut acu quadam pungenti ortum suum debet. Dolor *tensivus* ac velut *disrumpens* in Colica flatulentâ magis notatur, dum à flatibus merè provenit. Dolor *gravans* à copiâ humoris visceridi minus acris, in tenuibus Intestinis ut plurimum collectâ excitatur. Quandoque & Tumores vel Abscessus Mesenterii latentes hunc quoque dolorem producunt. Dolor varius, nunc *rodens*, nunc *pungens*, aliusve, humori falso-

salso-acri muriatico, vellicanti ac rodenti debetur, subinde & à Vermibus intestina mordentibus producitur. Dolor denique *pulsans* ab arteriarum intestinalium aut mesaraicarum spasmodicâ tensione, sanguinis tardioris decursu, indeque sæpius sequente inflammatione, fit.

Convulsiva Colica, in quâ dolores *lancinantes, lacerantes, vagi*, aut *fixi, maxime acerbi*, cum *Intestinorum* velut *inversione* conjuncti existunt, spasmodicæ intestinalium membranarum, aut plexuum Mesenterii nerveorum tensioni, unde venter quandoque introrsum trahitur, aut etiam tympani valde expansi instar induratur, ortum debet. Equidem in omni Colicâ spasmodici quid adest, in specie tamen hic convulsionis ejusmodi specialis indicia deprehenduntur. Dum verò intracanalem Intestinorum causa talis mali non existit, consequens erit, extra illum in Mesenterio, vel alibi hæerere humorem v. gr. austero-acrem, plexus nerveos valde lancinantem, qui tale quid post se trahat. Huc igitur referre licet non solum *nephriticam* supra descriptam, sed & *uterinam Colicam*, hystericiis Fœminis familiarem; imò Dolores quoque post Partum affligentes.

Subinde radices adeo firmas capit ejusmodi Colica, ut difficillimè extirpari queat, atque hinc acceptâ levissimâ occasione è causis procatacticis de novo Hominem excruciet. Sæpius hinc recurrunt talia ventris Tormina, atque pro diversâ causæ morbificæ agitatione Abdomen nunc ten-

ditur atque expansum nonnihil induratur; nunc in umbilicali regione introrsum trahitur; nunc in epileptica quoque pathemata mutatur malum. In Hypochondriacis, Scorbuticis ac Hystericiis Colica talis non infrequens est, fomitem nata à viscido & tenaci humore, parti alicui Mesenterii aut Vteri impacto, sed ita tamen, ut à levissimâ causâ in motum adactus circumjacentes fibrillas nerveas adortatur, rodatur, pungatur, aliove modo spasmodicè percellatur, aut crispetur.

Colicis proin doloribus hætenus recensitis ansam præbent diversissimæ causæ antecedentes & procatactice, quæ acres in visceribus humores, bilem, lympham, aut pituitam intestinalium acido-austera & acrem reddere valent. Aer hinc frigidus-artus Hominis diu lambens; Cibi salso-acidi, & austeri, glutinosi, fructus horæi facile fermentescibiles, Olera hortensia sale condita, Cucumeres, Melones, pingua cum superingesto potu frigido, aut alio facile accrescente, Pisces saliti, Cerevisia novella crassa, Vina austera, acida, non defœcata, pendula, aliique potus inprimis glaciati, Musta vinacea aliave copiose hausta; subita refrigeratio corporis æstuantis ac sudantis; Ira vehemens; Tristitia crebra; Terror subitaneus ac magnus; Febres malè curatæ, in quibus acris humor morbificus ad Intestina præcipitatus est; Purgantia vehementiora assumpta; Vermes, Calculi, Inflammationes, Abscessus Intestinalium; Iliaca passio, & similia alia Dolores ejusmodi colicos inferunt.

Diagnosis.

Affligit hinc Colica inprimis Cholericos, Scorbuticos, Hypochondriacos, alios, pessimâ Diætâ utentes. Dolor si humorosa est Colica, in dextro vel sinistro Hypochondrio, ubi Colum alligatur, quandoque & aliis hujus Intestini locis & incipit, & usque ad morbi finem manet; in principio lenis est, sed paucarum horarum spatio ferè intoterabilis redditur. Alvus est constipata ut plurimum; Nausea, Vomitusque post aliquot dies subsequuntur, Sitis inextinguibilis; Inquietudo, Vigiliæ perpetuæ; Appetitus adest nullus. In Colicâ convulsivâ dolor est lacerans, torquens, valde acerbus, ut plurimum fixus, à lumbari regione plerunque incipiens, hinc ad interiora pergens, Mesenterium ac intestina tenuia valdè crispans, & convellens; succedunt non rarè contracturæ aliorum viscerum dolorosæ; atque his cessantibus superveniunt etiam interdum Convulsiones artuum, sive Parheses, quibus disparentibus dolores intensi Abdominis redeunt. Alvus sæpè adeo pertinaciter constricta & clausa est, ut Clyisma nullum applicare, imò ne specillum quidem intrudere valeas. Urinæ excernuntur magis pallidæ, quàm tinctæ, copioso sedimento præditæ, quale quid in reliquis Colicæ speciebus non observatur.

Prognosis.

In Prognosi hoc tenendum, Colicam pituitosam & stercorariam, ab humoribus Intestinatorum oriundam, curari non ita difficulter posse. Convulsiva autem Colica, quo pertinacior existit, quoque magis complicata ha-

bet symptomata, eo periculosior habenda venit. Supervenire enim post plures paroxysmos solet nunc Iliaca passio, nunc Epilepsia, nunc Parhesis; nunc Atrophia, nunc Mesenterii Inflammatio aut Abscessus: Raucedo Colicæ accedens plerunque deleterium est signum. Diarrhœa autem superveniens ut plurimum salutarem Morbo eventum conciliat.

In Curatione Colicæ humoralis statim ab initio Paroxysmi Alvus Clystere uno vel altero est sollicitanda, qui componi debet ex emollientibus, demulcentibus atque detergentibus, v. gr. *Alth. Malv. Mercurial. Portulac. Nasturt. aquat. Beccabung. Plantag. Cochlear. Trifolio fibrin. Fumar. Flor. papav. rhead. Verbasc. Chamom. Melilot. Semin. Carvi, Lini, Cannab. Cumin. Fol. Senn. &c.* invicem Urinæ incoctis, atque colato hinc liquore cum Oleo rutaceo, rosaceo, Melle Mercurial. &c. Tereb. vitell. ovi solut. &c. permixt. Postmodum etiam intus Laxans aliquod est exhibendum ex Infuso *Fol. Senn. cum Rhabarb. Radic. Scorzonæ. Petasitid. Pæon. Semin. Anis. Fœnicul. Dauc. &c.* Absynth. Vel Panacæa solutiva alcalina per dies quatuor aut plures, quotidie ad ʒiſſ. capiat, manè, sub vesperam autem guttæ decem Olei destill. Carvi cum jusculo capiantur. Si inde Alvus succedat, benè est, & Ager statim liberatus à malo erit, nec ulteriore nisi præservativo remedio opus habebit, quale est Serum Lactis cum incoctione *Herb. Bell. min. Beccabung. Trifol. fibrin. Plantag. Vrtic. urent. Chelidon. major.*

ac minor. Cochlear. Apii Macedon. Nasturt. Cherefol. Borrage. Fumar. Sanicul. Vel subinde haustum *Aquæ* ex iisdem *Plantis destillatæ* capiet.

Quando autem *Alvus* à primis ejusmodi remediis ritè in usum vocatis minimè obediens evadit, malumque adeo de horâ in horam deterius redditur; tum verò *Clysmata* sunt plura paulatim injicienda ex media parte *Lactis bubuli* vel *caprilli*, & mediâ *Olei Lil. alb.* additis aliquot unciiis *Succi Herb. Betæ, Beccabung. aut Bliti recentis*, & admixto simul *Melle* vel *rutaceo* vel *rosacéo*. *Æger* etiam, nisi æstus aliquis febrilis jam repugnet, *Balneo Aquæ dulcis* ex decoctione *emollientium & carminativorum* per aliquot horas immittatur; postmodum locus *Abdominis* dolens frequenter *Oleis anodynis Chamomill. Anethi, Scorpion. Rut. Verbasc. Meliloti &c.* calidè inungatur, superimposito semper *Sacculo* ex *carminativis & emollientibus* *Herbis* composito, *Lactique* decocto. Intus a. frequenter haustus *Seri Lactis caprilli* cū *Succo Tamarindor. vel Herbâ Acetosæ* coagulati concedatur, cui tamen prius *Herbæ* quædam *nasturcinæ* superius indigitatæ decoquantur. Si *Lactis Serum* adversum sit, integrum quoque *Lac* dari potest, in quo eadem *Herbæ* prius bullierint, & tantillum *Sacchari* solutum fuerit; quale quid in primis convenit, quando induratae in *Colo Intestino* feces hærent. Cùm autem pauci *Lac* sine molestiâ commodè ferant, ejus loco melius præbebitur unus vel etiam alter haustus *Olei Olivarum* optimi cum *Aquâ Paludapii & Saccha-*

ro, ad emolliendas vias, demulcendasque fibras insigniter irritatas. Interdum optimò cum successu aliquoties integra drachma *Spermatis Ceti recentissimi* in *Jusculo* soluta; vel uncia integra *Axungia caninæ*, aut etiam plus cum *Jusculo* assumitur. Juxta hæc tamen oportet simul, post evacuatam alvum, ordinare *Mixturam* quandam *cardiaco-anodynâ* per *cochlearia* hauriendam, ex *Aquâ Borrage. Bugloss. Fl. Til. Apii Maced. Rosar. flor. Acac. Naphæ, Puleg. Menth. Meliss. Consol. regal. Taraxac. Symplo. Viol. Fl. Tunic. Pæon. Tinctur. Castorii* & *Sal. arm. parat. Essent. Croc. Opii liquid. Ocul. S. ppt. Ol. Tr. per. deliq. Confect. Alk. & simil. v. gr.*

R. *Aqu. Cherefol. ʒiʒ.*

Chamomill.

Fenic. ana. ʒvj.

Elect. diascord. ʒij.

Syrup. de Absynth. ʒij.

Bezoard. min. ʒʒ.

Essent. Galang.

Castor. ana. ʒj.

M. d. ad Vitr. Propinetur cochleatim. Novi etiam quendam optimè salvatum ex ʒʒ. *Pulveris polychresti* cum *athletico* haustu *Decocti rad. Liquirit, Hord. & Anis.* assumtâ, unde alvus egregiè fuit soluta, & *Æger* velut intra horæ spatium sanitati restitutus.

Si verò quis non formidet *Succos Plantarum nasturcinarum*, tum ei cum fructu propinari possunt ex *Herbis recentibus Mercurialis, Malvæ, Betæ, Nasturt. aquat. vel hortens. Cochleariæ, Apii Macedon. Trifol. fibrin. &c.* expressi, filtrati, *Saccharoque*, si placet, *edul*

edulcorati, de quib⁹ semper duæ unciae m. ac v. capbiantur pro dosi. Vel etiam *decoctum Meliss. Pulegii, Absynth. Chamom. Mercurialis* aut *Malvæ* cum aliquot succi è reliquis plantis expressi unciis pluries hauriri potest. Alius semet aliquando feliciter restituit propriæ *Urinæ* adhuc *calentis* potu, superingestâ *Theriacæ Andromachi* integrâ drachmâ, unde Spasmi intestinorum egregiè fuerunt dissipati. Pro specifico denique remedio habetur *Infusum Hippenteron*; nimirum sumuntur aliquoties quatuor vel plures *boli Fimi* ex Caballo *avenâ* probè nutrito, iis superaffunditur *Aqua flor. Acac. ad ʒiv. Aqu. Menth. ad ʒß.* post quadrantem horæ succus exprimitur, & *Julepo rosaceo* edulcoratus propinatur, quotidie per aliquot dies repetendo, usque ad notabilem Mali extirpationem. Vel dabitur seqq.

Rx. *Elixir. propr. Claud. ʒij.*

Essent. Castor.

Zedoar. ana. ʒij.

Opii liquid. ʒß.

Misc. ad Vitr. Dentur m. ac v. 25. ad ʒo. gutt. pro dosi cum vehiculo conveniente.

Quod si tandem non obstantibus hisce remediis Ager perpetim malè habeat, alvus constipata remaneat; imò quicquid ore assumitur, sive solidi sive fluidi, statim iterum per vomitum rejiciatur, hacque ratione jam *Iliacus* incipiat *Affectus*, tum nisi Aegrum intra aliquot dies Convulsionibus & Intestinorum Sphacelo interire velis, citra hæsitacionem, non obstantibus, quæ fortè jam subinde erupe-

runt, Spasms propinare debet bis *Mercurii vivi* benè purgati tßß. v. etiam plus, cum *Syrupi Violarum ʒi & Aqu. Cinnamom. ʒß* Atque licet hinc *Mercurius* non statim intra horam unam vel alteram per alvum rejiciatur, prodibit tamen etiam intra xiè demum quintâ vel sextâ die, si interea *Clysmate* uno vel altero Alvum sollicitaveris, tandemque & *Infusum fol. Senæ* semel vel iterum exhibueris modo supra allegato: notandum enim maximè, statim ab haustu *Mercurii* omnem sedari vomitum, ut, quicquid postea superingeritur, in corpore maneat, neque per vomitum amplius rejiciatur. Hâc ratione plures jam curatos atque sanitati pristinæ restitutos vidimus; sed alios tamen etiam observavimus, in quibus *Mercurius* ob validiorem Intestinorum constipationem penetrare nesciens, tandem post septimam diem salivationem instituire incepit, mortuo interim brevi Aegro. In Rustico quoq; *Mercurius* ante & post mortem per Umbilicum foràs è corpore penetravit. Apud omnes tamen idem *Mercurius* haustus statim omnes sedavit dolores.

Si Ager à malo est liberatus, tum præservativi loco vel *Acidulas*, vel *Theamus Piperinas*, *Plumbarias*, aliasve bibat cum regimine Diætæ, imò subinde aliquot doses *Tincturæ ʒnii* cum *Essentiâ Croci & Castorei* in *Aquâ Mellissæ* vel *Menthæ* assumat: quin & *Aqua è Nasturtio*, *Solano*, *Apio Macedonico*, *Cochlear.* *Meliss.* *Plantag.* *Rap rusticano*, *Trifol. fibrin.* *Apio selino*, *Bo ragine*, & *Fimo equino destillata* interdum

dumque ad ℥iv . hausta, egregium est præservativum.

In Diætâ fugiantur omnia salita, acida, fumo indurata, maximè flatulenta; vitentur Ira, Corporisque nimiae refrigerationes.

In Colicâ spasmodicâ undecunque profectâ, etiam hystericâ, aut hypochondriacâ nullum Purgantibus locû dabis, sed Clysmâ tamen unum vel alterum anodyno-emolliens atque demulcens injicere poteris; v. gr.

\mathcal{R} . Herb. 5. emoll.

Solan.

Meliss.

Flor. Chamomill. ana. Mj .

Baccar. Juniper.

Semin. Aquileg.

Carv. ana. ℥ij .

Lini ℥℥ .

Incis. & contus. coqu. in $\text{f. qu. Aqu. commun.}$ vel $\text{Lactis bub. Colatnr. ℥x.}$ adde

Olei Amygd. dulc. rec. expr. ℥i℥ .

Mellis rutac. ℥vj .

Essent. Castor. ℥j .

$\text{M. f. Clyster tepide injiciendus, \& aliquoties, si opus videbitur, repetendus.}$

Vel injici potest solum Lac bubulum cum Oleo Amygdal. dulc. atque Chamomill.

Intus convenit Mixtura sequens, aut similis.

\mathcal{R} . Ol. Amygd. dulc. rec. expr. ℥i℥ .

Aq. fl. Til.

Vin. Hungar. Hispanic. aut Malvat. optim.

Syrup. de Poeon. ana. ℥℥ .

Essent. Castor. gutt. xv.

Opii liquid. gutt. ix.

Misce, sumatur uno haustu.

Sunt qui Aquam Vitæ Matthioli, Aquam Vitæ juniperinam, Liquorem Melissæ, Menthæ, aut Pulegii spirituosum & Saccharo edulcoratum commendant. Ab ejusmodi spirituosiss tamen abstinendum est, sicubi febri- les adfuerint phlogoses, atque in hoc casu tutius & citius juvant Pulveres alexipharmaco-antispasmodici, v. gr.

\mathcal{R} . Pulv. Pannon. rubr. ℥j .

$\frac{1}{2}$ n. diaph.

Vngul. Alc. ppt. ana. ℥℥ .

Laud. opiat. gr. iii. vel iv.

$\text{M. f. Pulv. subtil. div. in 4. doses æqu. ad ch. m. ac vesp. sumendas.}$

Vel \mathcal{R} . Pulv. Viperar. ppt.

Bezoard. miner. ana. ℥ij .

Unicorn. marin. ppt.

Cinnab. $\frac{1}{2}$ n. corr. ana. ℥j .

Laud opiat. gr. iiij.

$\text{M. f. Pulv. subt. div. in 4. part. æqu. m. ac vesp. sumend. cum Aqu. fl. Til. Fœ- nic. aut Solani.}$

Vel \mathcal{R} . Ebor ust. ppt. ℥j .

Dent. Apr. ppt.

Ægagropil. ppt.

Castor. ppt.

Corall. rubr. ppt. ana. ℥℥ .

Laud. opiat. gr. iv.

$\text{M. f. Pulv. subt. div. in 6. dos. æqu. ad ch. m. ac vesp. sumend.}$

Si Alvus interea constipetur denuo, vel Clysmate expedienda, vel exhibito intus laxante remedio blando sollicitanda venit; in quem finem modò Decoctum Herbar. recent. Malvæ Mercurialis, & Flor. Ros. damascenarum &c. ad uncias quinque vel sex aliquoties propinatur; modò Panacea

Kk

sola-

solutiva alcalina ad ʒj. vel ʒiʒ. quotidie semel per triduum aut quatrimum exhibetur.

Postmodum, ubi Dolores colici nondum cessant, ea ulterius præscribi debent, quæ acidum acre destruerent aut emendare, simulque irritatas fibras demulcere, ac à spasmodica tensione liberare valent. Itaque mane ac vesperti haustus sequentis Decocti propinabitur.

℞. Herbar. *Veronic.*

Scabios.

Folior. Sclarea.

Menthæ aquat.

Flor. Chamomill. ana. Mj.

Semin. Fœnic. Pæon.

Radic. Gentian. ana. ʒij.

Zedoar. ʒiʒ.

Incis. & contusa coque in Aquæ fontan. Mensuris duabus ad quartæ partis consumt. Colatura detur ad Vitr. Mane ac vesp. cyathus unciarum quinque vel sex exhauriatur.

Prosuut & sequentes Liqueorum mixturæ guttatim sumtæ, v. gr.

℞. Lique. C. C. succinat.

Tinct. Castor. cum Spirit. Olib. arm. ppt.

Spir. theriacal. camphor. ana. ʒij.

M. detur ad Vitr. Dosis m. ac v. guttæ 15. ad 25. cum Aqu. Chamomill.

Vel ℞. Salis volat. oleos. ʒij.

Essent. Castor. ʒj.

Opii Langel. ʒʒ.

M. d. ad Vitr. sumantur m. ac vesp. gutt. 20. ad 30. cum Aqu. fl. Til. & Pæon.

Vel ℞. Aqu. Chamomill.

Solan. ana. ʒiʒ.

Puleg.

Syrup. Capill. ♀ r.

de Pæon.

anodyn. ana. ʒʒ.

Essent. Succin.

Castor.

Carmin. Wed. ana. ʒʒ.

M. detur ad Vitr. Singulis trihoris cochleare plenum capiat.

Vel ℞. Aqu. Meliss.

Card. Mar. ana. ʒiʒ.

Menth.

Syrup. de Absynth. ana. ʒʒ.

Theriac. celest. ʒʒ.

Essent. Castor. ʒʒ.

Veronic. ʒiʒ.

Bezoard. min. ʒʒ.

Misc. d. ad Vitr. sumatur per cochlearia frequenter, blandum hinc sudorem expectando.

Infusum aut destillatum Hippenterorum specificè heic prodest, & sæpius dicto citius omnem dolorem auferit, v. gr.

℞. Bolor. fimi Caballi avenâ nutriti recent. num. 4.

Affunde Aqu. Chamom.

fl. Acac. ana. ʒiʒ.

Stent per bichorium in loco tepido, postmodum exprime liquorem, adde

Essent. Castor. ʒʒ.

Spir. theriacal. camphor. ʒj.

Syrup. de Ment. ʒij. vel Elæosacch. Cort. Aurant. ʒij.

M. d. ad Vitr. & hauriatur pro dosi.

Vel ℞. Destillat. Hippenter. ʒvj.

Essent. Carmin. Wedel. ʒj.

Opii Langel. ʒʒ.

Syrup. de Semperviv. ʒvj.

M. d. ad Vitr. Exhibeatur tribus dosibus,

bus, spatium 16. vel octodecim horarum.

Si *Pilulæ* magis arrideant, dari poterunt seqq.

R. Extract. Pæon.

Castor.

Theriac. Cælest. ana. ʒß.

Cinnab. ʒ n. opt. ʒj.

Ol. stillat. Menth. q. s.

M. f. l. a. Pilulæ num. 40. Consperf. pulv. Cinam. d. ad scat. sumantur decem, duodecim, pluresve pro dosi.

Quod si *Radices Gentianæ, Pæoniæ, ac Petasitid. cum flor. Chamomill. & sumitat. Absynth. in Aquâ & Vino* probè decoquas, hinc *Decoctum* per colum trajicias, ejusque tres vel plures uncias m. ac v. bibas, admisto si lubebit *Elæosaccharo Angelic. Cort. Aurant. Anis. Zedoar. aut Menthæ*, citò etiam ab hoc *Dolore* liberaberis.

Externè Abdomen inungi potest bis quotidie *Axungia Castorei, Anatum, Vulpin. Oleis Chamomillæ, Aneth. Menth. Laurin. Semin. Hyosc. aut Papav. alb. expr. cum Oleis destill. Anis. Chamom. Fœnic. Carv. Cumin. Succin. Rutæ, Angelic. Galbanet. Paracels. de-* super imponendo frequenter *Linteum* probè calefactum cum papyro, ne *Olea* statim à linteis absorberi queant. Sunt qui *Emplastrum carminativ. Sylvii* cum *Emplastro de Cicutâ aut Bacc. Lauri* applicant. Denique *Fomentationes* Abdominis prodesse possunt, quando videlicet *Radices Angelic. Imperator. Mutellin. Levistic. Herbæ Aneth. Abroton. Menth. Meliss. Puleg. Absynth. Flores Chamomill. Sambuc. Pæon. Baccæ Lauri, Juniperi, Semina Anis. Fœnicul. Cumin. Carv. &c. invicem incisa &*

contusa Sacculo indimus, hunc dein *Vino* incoquimus, exprimimus, & calidè *Abdomini* applicamus, sæpius renovando.

COLVMELLÆ MORBI, vid. Gargareonis Affectus.

COMA SOMNOLENTVM, vid. Cataphora.

COMA VIGIL, Τυφμανία, Coma vigil. ex *Τύφος* fumus, astus, arrogantia, & *μανία*, furor, compositâ voce, est Symptoma Sensuum internorum, quo *Æger* perpetuò quidem ad somnum ducendum inclinatur, oculosque claudit, sed tamen ob inquietudinem Spirituum continuè insomniis turbatur, sicque profundius dormire nescit.

Causa hujus Morbi est serum quoddam mucilaginosum acre, copiosius ad glandulas Cerebri delatum, hincque spirituum animalium sufficientem transcolationem præpediens, unde Spirituum penuria, ac ita dormiendi cupido, imò somnus ipse enascitur. Cum autem idem Serum acrimoniâ quadam subtili ac penetrante fibrillas Cerebri nerveas continuè simul titillat ac vellicat, tum hæ sic præternaturaliter agitatae suum, quem fovent, liquorem spirituosum ad motum irrequietum incitant, sicque ansam turbulentis insomniis, & interrupto variè somno præbent. Rarissimè hoc Symptoma solum affligit, sed plerumque soboles est Febreos plus minus malignæ, unde & expergefacti tales *Ægroti* ut plurimum delirant nonnihil.

Diagnos-
is.

Quod si proin *Diagnosin* spectes, in hoc Morbo Ægri continuè dormire gestiunt, atque hinc ipsis semper oculorum palpebræ collabuntur quas diu apertas haud retinere nōrunt. Verūm licet ita per aliquot momenta partes externæ dormiant, statim tamen iterum propter insomnia turbulenta vigiles redduntur, & inquieti sunt; moxque in pristinum Somnum relabuntur. Interea Febris continua ut plurimum simul Homīnem tenet, in quā mens sibi crebrò non constat, sed à præternaturali tam spirituum quàm fibrillarum cerebri medullarium motu ad perversas cogitationes, delirasque actiones incitatur.

Prognosis

Quod *Prognosin* concernit, certè huic Affectui parum est fidendum, utpote qui plerunq̃ue malignam pro comite vel causâ Febrim habet, aut talem post se trahit, si nondum adest, atque hinc in Lethargum, Phrenitidem aut Apoplexiam lethalem degenerare vel terminare solet.

Curatio.

In *Curatione* proin feliciter instituendâ ratio primaria est habenda Causæ tam proximæ, quàm antecedentis; æstus febrilis mitigari ac planè extinguī, viscositas sanguinis incidi, ejusque acrimonia salina volatilis demulceri, sicquē naturalis ipsi crasis ac motus restitui debet. Itaque ante omnia unus alterve Clyster emolliens, detergens atque evacuans est injiciendus, v. gr. paratus ex *Decocto Herbarum & Radicum emollient.* ut & *Betonic. Salv. Meliss. Puleg. Aneth. Radic. Pyrethr. Imperator. Flor. Calendul. Cheiri, Semin. Carvi, Napi, Cochlea-*

ria, Fol. Senn. mund. Colaturæ hinc permisceatur aliquid de Oleo Rutæ, Castor. Camphor. Aneth. Melle Mercu- rial. Electuar. diacatholic. Post Clysmatis operationem, ad Venæsectionem in Homine sat sanguinis habente devenire licet; & demum ea in usum vocanda, quæ absorbere & edulcorare, vel simul acria salia per diaphoresin è latice sanguineo expellere possunt. Tale quid præstant tum Pulveres Corall. rubr. ppt. Pannon. rub. Cinnab. ꝑ n. vel nativ. Diaph. ꝑ vial. vel Lunare, Ebur ppt. C. C. phil. ppt. Dens Apri vel etiam Hippopotam. ppt. Nitrum ꝑ iat. Arcanum dupl. ꝑ n. diaph. Unicorn. fossil. &c. tum Liquores diluentes ac temperantes, v. gr. Aquæ, Portulac. Malv. Meliss. Ulmar. Agrimon. Acetos. Succ. Lactuc. Endiv. Quibus adde guttatim m. ac. v. sumendas Essentias Castorei, Succini, Betonic. Anthos, Salvolat. Viperar. Succin. C. Cerv. Ebor. Tinct. Castor. cum Spiritu Salis armon. parat. Elix. propr. s. acid. vel Clauderi, Spirit. theriac. camph. Si fortè abest Febris, malumque à saburrâ vitiosorum humorum productum fuerit, tum statim in principio dare oportet Vomitorium, v. gr.

℞. Rad. Asar. gr. 27.

Crem. Fri. gr. vj.

Cinnab. ꝑ n. corr. gr. iiij.

Θis volat. Succ. gr. iij.

M. f. Pulv. subt. d. ad ch. sumatur pro dosi.

Si verò nulla talium stomachi cruditatum signa adsunt, tum Vinum potius medicatum præscribi potest, per epicrasin corpus purgans, compone-

tus

tur autem illud ex *Radicibus aperientibus Vincetox. Apii, Caryophyll. Herb. discutientibus, & cephalic. Agrimon. Scolopend. Hepat. nobil. Marrub. alb. Thee, Beton. Major. Rorismar. Sumit. Absynth. Aneth. Flor. Cheir. semin. Anis. Fol. Senn. Rad. Rhab. opt. Helleb. nigr. ☉ Cichorii, Cortice Winteran. Externe sæpius naribus admovebitur Rutarecens, spirit. Anth. vel alius Apoplect. qualis etiam cum Essent. Succin. vel Castorei, ut Spiritu Lumbr. terr. Salis arm. theriacali camphorat. Tinct. Castor. cum Spiritu Salis arm. parmixtus, vertici atque temporibus frequenter calidiusculè imponi potest. Denique Febris ipsa maligna, vel qualiscunque adfuerit, suo modo curanda est.*

COMBVSTIO, vid. *Ambustio.*

COMEDONES, vid. *Dracunculi.*

CONCEPTIO DEFICIENS, vid. *Sterilitas muliebris.*

CONCVSSIO CEREBRI, est Morbus solutæ unitatis, quo partes Cerebrum constituentes & proximè involventes à violentâ quadam externâ causâ ita commoventur, ut naturalis inter illas unio plus minusve tollatur, sicque interni & externi earum tubuli lædantur.

Causa itaque nulla est, nisi violenta & externa; nimirum modò Instru-
mentis his illisve caput Hominis concutitur; modò lapsus varii ex alto, cum capitis allisione gravi ad rem duram contingunt, modò denique ictus ab Hominibus, Equis, aliisve

Brutis accipiuntur, indeque moles Cerebri concutitur.

Etsi hinc causa mali externa suffici-
cienter à Medico per relationem Ægri
vel Adstantium cognita habeatur; ul-
teriùs tamen læsum seu concussum es-
se Cerebrum indicant subsequentes vo-
mitus, deliquia animi, vertigo, stu-
piditas, somnolentia, deliria, torpor
sensus, motusque musculorum
imbecillitas. Quibus interdum jungi-
tur sanguinis per nares, os & aures
effluxus.

In Prognosi morbus hic non est le-
vis dicendus, quando enim stupidi-
tas cum somnolentiâ, aut aliquali si-
mul delirio continuat, signum præ-
bet rupturæ vasorum atque hinc ex-
travasati humoris in Cerebro, qui
paulatim cumulatus subinde & putre-
factus, Phrenitidem, Soporem vel Le-
thargum & Apoplexiam lethalem
post se trahit. Quando autem Sen-
sus & Motus omnes perfectioni suæ
restituuntur, atque somnolentia om-
nis abest, tunc nihil hætenus mali
aut periculi exinde metuendum ve-
nit.

In Curatione ad impediendam ex-
travasationem, aut si quid jam extra-
vasatum est, resorbendum ac diffi-
pandum, *Venæsectio* confestim est ad-
ministranda, eaque etiam, si opus
videbitur, postridie repetenda. Post-
modum statim dosis vel *Spermatitis Ceti*
recentiss. vel *Sanguin. Hirc. ppt. ad ʒj.*
vel *Pulveris contra Cas. ad ʒj. ʒij. vel*
ʒnii diaphoret. cum Oculis Cancror. a-
naticâ portione sociati ʒß. cum Juscu-
lo Carnium, vel Infuso fol. Thee alia-

rumque *Herbar. traumaticarum* exhibetur, & pluries, urgente necessitate, reiteretur. *Clyisma* etiam unum vel alterum in principio ad eluendas primas vias injiciatur, cui inservire potest *Decoctum Radic. & Herb. emollient.* cum *Salviâ*, *Calaminth.* *Majoran.* *Chamædr.* *Betonic.* &c. admixto etiam *Melle rosaceo*, *rutaceo*, aut *violaceo* cum *Oleo anethin.* & *vulpino.* Neque intermittenda *Decocta traumatica* ex *Radic. Caryophyllat.* *Vincetox.* *Herbar. Beton.* *Sanicul.* *Alchymill.* *Vinc. pervinc.* *Millefol.* *Pyrol.* *Ulmariæ.* *Gratiæ Dei.* *Flor. Calendul.* *Bell. min.* & simil. quæ cum tertia parte *Vini albi* & duabus tertiis *Aquæ fontan.* paranda, de quibus dein quotidie m. ac v. cyathus exhauriatur plenus. *Externè* mox capilli *Capitis* deradantur, atque sæpius *Spiritu Vini camphorato* caput lavetur calidè, super imponendo semper *Sacculum cephalicum* ex *Betonicâ*, *Chamædr.* *Rore marino*, *Ocymo*, *Lavendula*, *Serpillo*, *Veronicâ*, *Salviâ*, &c. concinnatum, inque *Vino albo*, coctum & expressum. Quod si autem *Vulnus* simul adsit, tum illud consueto more deligabitur, atque in *Sacculorum* usu nihilominus continuabitur. Quando proin ab omni sic malo liberatus creditur *Æger*, per aliquod tamen adhuc tempus raso *Capite* impositum gestabit *Emplastr.* *Oxycroceum*, vel de *Betonicâ* ac *Baccis Lauri.*

Dietâ.

In *Dietâ* ab omnibus acribus, acidis, salis, & aromatizatis nimium cibis abstinendum, neque in principio mali quidquam, præter *Juscula*,

concedatur, sive *hordeata*, sive *avenacea*, aut *carnea* demum illa fuerint. *Loco Vinibibatur* vel *Cerevisia tenuis*, non *acida*, vel *Decoctum C. C. rasp.* *Agrimon.* *Betonic.* cum *passulis.* *Potus* quoque *Thée* frequens in hoc malo utilis est. Ab irâ, aliisque vehementioribus *Animi commotionibus* desistatur. Si *Febricula* continua superaccedat, tum *Pulveres diaphoretici*, cum aliquâ similis efficaciz *Mixturâ* antifebrili cochleatim hauriendâ, ordinabuntur, sicuti in *Febrium* continuarum curatione præscripsimus.

CONDYLOMA est morbus magnitudinis auctæ, sive *Excrementia* carnis callosa in digitis manuum atque pedum, præsertim verò circa anum & pudenda muliebria prominens, & nunc mollis ac indolens, nunc dura, prurienteque, vel etiam ardente dolore molesta. *Κονδύλωμα* vocatur à *Κόνδυλος*, *Articulus*, quoniam articuli in morem quasi prominent.

Differt à *Verrucis*, quod hæc aliam plerumque figuram habeant, nullum dolorem inferant, ac promiscuè per cutim totius corporis enasci soleant; *Condylomata* verò articuli in modum rarius in digitis manuum atque pedum, frequentius verò circa anum & pudenda mulierum gignantur. A *Clavis* distinguuntur eadem loco affecto & formâ externâ, quippe in illorum superficiè sæpius punctum aliquod nigricans hæret, è quo, tanquam ex oculo materia sebacea crassa quandoque excluditur; cum

Condy-

Condylomata tale quid non fuggerant; præterea *Clavi* non rarò magnâ sui parte citra dolorem & sanguinis profusionem excindi possunt; secus feres habet cum *Condylomatibus*. A *Ficubus* tandem discernuntur *Condylomata*, quatenus hæc prominentiora sunt, & colorem cum reliquâ cute communem habent. *Ficosæ* autem excrescentiæ latiores ac minùs prominentes, præterea quoque colore fusco aut nonnihil livido præditæ existunt.

E quibus jam *Signa Condylomatum diagnostica* quisque per se haurire potest. Contingunt nimirum tales Excrescentiæ subinde in claustris magis, quàm in sinu pudendorum muliebrium, non secus atque in podice utriusque sexûs, & quidem cum tuberositate, vel eminentiâ inæquali: nascuntur etiam sensim, non subito, ac ut plurimum non nisi quandam cum aliquali pruritu molestiam, sed &, sicubi Inflammatio desuper accedat, simul dolorem ardentem cum rubore inferunt.

Producuntur Condylomata ut plurimum à Succo nutritio nonnihil crassiore, viscidiorè, & quasi caseoso reddito, copiosiusque in affectâ Parte cumulato, vel ibidem per externam quandâ compressionem, aliamve occasionem coacto, ita ut ejus particulæ justâ volatilitate destitutæ, per transpirationem exhalare nequeant, sed omnes necessariò ibi subsistere, atque propter intercurrentes particulas salinas acido-fixas plus minus indurari cogantur.

Quorum igitur *Massa sanguinea* talibus referta est salibus, iis vel ab equitatione, vel à sessionibus diuturnis, ani cutim valdè comprimentibus, vel à levibus contusionibus, *Condylomata* haud difficulter enascuntur, pro salium minore vel majorè acrimoniâ plus minus dolentia. Imprimis autem gigni solent per impurum concubitum cum Hominibus Lue ♀ reâ laborantibus, ubi virus istud venereum externè partes pudendas lambens, illarum poros suâ volatilitate subit, inque glandulis subcutaneis, aut vicinis partibus aliqualem corrosionem excitat, sub quâ succus nutritius postea majori copiâ affluens talibus excrescentiis formandis ansam præbet. Ut adeo *Condyloma* aliud *venereum* & *malignum*, aliud *benignum* dici queat.

Prognosis. Parum vel nihili hic curatur Affectus, nisi vel dolore inflammatorio, vel pruritu molestus esse incipiat. In deteriorem morbum vix degenerat, nisi fortè corrosiva ab impuro coitu salia ibi fuerint collecta, quæ dein vel Inflammationem & Abscessum malignum, vel cancrosum tandem Ficum post se trahere valerent.

In *Curatione* eo est maximè adnoscendum, ut viscositas & acrimonia humoris *Condyloma* producentis incidatur, attenuetur, edulcoretur, atque discutatur. Hunc in finem convenit *Purgans* aliquod præmittere, cum *Mercurio dulci*, v. gr.

℞. *Extract. cathol.* gr. xii.

Maß. Pilul. tartar. Qu. gr. viii.

Mer.

Mercur. dulc. opt. ℥℔.

Ol. stillat. Succin. q. s.

Resin. Jalapp. gr. iij.

M. f. l. a. Pilulænum. 15. dentur ad ch. Sumantur mane jejuno stomacho pro dosi, & aliquoties reiterentur.

Postea statim Condyloma, nisi malignum & venereum fuerit, quotidie bis *Succo Ranunculi*, vel *Chelidoniae majoris*, *Verbasci*, *Cochleariae*, cum *Spiritu Salis armon. permixto* tantillum foveatur; atque hinc *Ceratum* ex *Cerâ viridi* factum applicetur; cui permisceri quoque potest *Calx viva*, & *Mercur. dulc.* Vel *Emplastrum* componatur ex *Colophon. Pice*, *Terebinth. Cerâ viridi*, *Lithargyrio*, *Flor. Sal. armon. Mercurio vivo vel dulci*, & *Camphorâ*. Fieri etiam possunt *Cataplasmata* aut *Fomentationes* ex *Herbis* recentibus contusis, vel in *Vino rubro*, *Lixivio*, *Aquave Calcis viv. decoctis*, *Thymi*, *Verbasci*, *Scrophulariae*, *Parietariae*, *Mercurialis*, *Rutæ*, *Sabinæ*, *Aristolochiae*, *Sigilli Salomonis*, *Thapsi barbati*, *Solani*, *Nicotianæ*, *Libanotidis*, *Barbareæ*, &c. Vel *Radices Scrophular. Pentaphyll. Aristoloch. rot. Rha-pontic. Bacc. Laur. Stercus ovillum* & similia in *Aceto* & *Aquâ* decoquantur, spongiaque decocto calenti frequenter immersa applicetur. Vel *Fimus columbinus*, *anserinus*, aut *caprillus* cum *Cineribus sarmentorum Vitis*, *Floribus Aris*, *Lapide calaminari ppt. Minio*, *Tutiâ ppt. Aloe*, *Thure*, *Mercurio præcipitato*. Pulvere item *Fol. Sabinæ*, *Radicum Scrophular. Aristoloch. rot. ver. Imperator. Hermodactyl.* permisceatur, ac ita applicetur cum *Melle*.

Hisce nihil proficientibus, ad corrosiva est deveniendum; atque hunc in finem extrema cuticula Condylomatis decussatim incidatur, hincque globulus ex *Mercurio præcipitato corrosivo* cum *Terebinth. aut Mucilag. Gumm. Tragac. applicetur*, ac per 8. horas relinquatur; postmodum simplex digestivum Unguentum tamdiu applicetur, donec excitata crustula vel abscesserit planè, vel separari inceperit. Tum verò *Mercurius præcipitatus ruber* pluribus deligationibus, ad absumendas Condylomatis reliquias applicetur, etiam citra digestivum, immixtis solum filis linteis carptis, ac superimposito *Emplastro Diapalma*, vel de *Lapid. Calaminari*, vel *Diachylo simplici*, vel *Oleum illud causticum* ferè indolens *Plateri* diligenter illinatur; quod ita parandum esse scripsit:

Rx. Ol. Laterum opt.

Mastich. Gumm. Arab. pelluc.

Tereb. clar. aa. ℥iij.

Pulverisata misce, destill. per Alembicum vitreum: quod extillat, incorporetur cum cineribus Hederæ arbor. reiteretur hinc destillatio, Oleumque prædiens servetur ad usum. Si totum Condyloma est consumptum, locus illius adhuc aliquoties lavabitur *Decocto* quodam traumaticarum *Herbar. in Vino vel Aquâ Calcis facto*, tandemque *Cicatrix Emplastro Diapalm.* sensim inducetur.

Quod si Condyloma ad Inflammationem tendat, discutientibus quidem remediis, inprimis *camphoratis* sicque fomentatione cum *decocto Herbar.*

bar. resolyentium, *camphoratum Spiritum* admiscendo dissipatio est tentanda, si verò discuti nequeat, sed in Abscessum vergat, maturantia, sicuti in Abscessu monetur, sunt adhibenda, hinc Vlcus detergentia, atque Cicatricem tandem promoventia applicanda.

Condyloma *malignum* vel *venereum* intus quidem postulat aliquoties assumendas *Pilulas purgantes cum Cinnab. $\frac{1}{2}$ n. corr. vel Mercur. dulc. opt.* Deinceps *Vena* quoque *Brachii secanda*, sanguisque pro conditione *Ægrotantis* majore vel minore quantitate extrahendus. Hinc *Lignorum decoctum m. ac v. ad quatuor plures* uncias hebdomadæ spatio, vel diutius propinandum, simulque *gut-tæ 20. vel 30. Tincturæ $\frac{1}{2}$ nii vel Coral-lor. addendæ.* Extus verò *Aqua phagedænica* pluries calidiusculè cum linteolo applicanda, desuper imponendo *Emplastr. de Ranis Vigon. cum Mercurii duplo*; si inde non discutiatur, *Unguentum digestivum cum Mercurio præcipitat. albo, Flor. $\frac{1}{2}$ ris, Aloë, Myrrh. atque Bezoardico minerali* miscendum, & diligenter illinendum, vel *Emplastrum stict. Croll. cum Mercur. dulc. & Oleo later. permixtum* admovendum.

CONSVMPTIO CORPORIS, vid. *Marasmus*.

CONTRACTIO vel CONTRACTURA MEMBRORVM, est motus voluntarii abolitio cum membri validâ plus minus contractione, ita ut sponte flecti nullâ ratione queat.

Vnde sub nomine *Contracturæ* etiam comprehendimus illam *Manuum immobilitatem*, quæ frequenti & vehementi admodum Colicæ spasmodicæ succedere, atque aliàs *Parheses* nomine venire solet, in quâ Hominum manus ac digiti valde debiles redditi contrahuntur, ita tamen ut si non sponte, aliena tamen ope flecti atque à se invicem diduci possint.

Duas hinc *Contracturæ species* admittere oportet, quarum altera quidem *rigida* est, cum absolutâ & constanti membrorum immobilitate, & propriè vel $\kappa\alpha\lambda\iota\epsilon\chi\omicron\chi\eta\nu$ *Contractura* dici meretur: altera autem *flaccida*, in quâ membrum resolutum contrahitur, sed flecti tamen alieno adminiculo potest, sicuti in manibus parheticis contingit. Prior species ad *Convulsionem tonicam*, posterior autem ad *Paralysin* commodè refertur.

In priore specie varia membra affici solent; contrahitur aliquando *brachium*, vel *crus* alterutrum aut utrumque; aliquando *maxilla* inferior, dū ad superiorem ita pertinaciter apprimitur, ut os ea propter aperiri nequeat. Vidimus & caput rigidè intortum atque tantum non planè inflexile & immobile redditum. Interdum unus alterve digitus, vel etiam plures simul contracti manent & rigidi in Arthritide nodosâ. Observavimus quoque Homines, quibus vertebræ lumborum inflexiles redditæ sunt, adeo ut corporis trunco perpetim inclinato incedere coacti fuerint, seseque erigere nunquam potuerint. Proin hæc *Contractura rigida*, sive *Convulsio toni-*

ca interdum aliquandiu tantum durat, ac dein iterum cessat; subinde verò etiam *perpetim durans* existit: tandem & aliquando *periodica* evadit; cujus quidem raram hoc tempore speciem in formosissimâ Juvenulâ non sine admiratione conspeximus; hæc enim ab optimis & lautioris fortunæ Parentibus laudatissimè educata ab ineunte meticulosa extitit, de cætero felicibus ingenii dotibus prædita: anno 1706. qui duodecimuserat ipsius ætatis, nimio forsan pavore excitata, atque domum reversa postridie statim febricitare cœpit, sed leniter admodum, fuitque hæc Febricula postliminiò nunc quotidiana, nunc tertiana, & quidem cum Maxillæ inferioris *Convulsione tonicâ* sive *Contracturâ periodicâ*, quæ vesperi semper redibat, & hinc usque in matutinas sequentis diei horas durabat; his & alia interdum symptomata jungebantur, donec tandem ambo simul pedes sensim immobiles redditi, atque paucarum hebdomadarum spatio retro versus clunes ita tracti fuerint, ut ultra biennium jam immobiles, clunibusque arctè applicati manserint, utut Parentes toto hoc tempore nullis in optimorum remediorum conquisitione sumtibus pepercerint, ad sanitatem pientissimæ Filiae recuperandam, licet hæc tandem pertæsa aliquandiu ab usu remediorum destiterit, Dei misericordiæ sese unice commendans. Nullos interim ex hac Contracturâ unquâ persensit in genubus aut alibi dolores; appetebat, digerebat atque egerebat benè, nondum menstruata est, dormit

tranquillè, totum corpus, etiam contracti pedes crescunt sicut reliquæ partes, & augentur secundum naturâ. Utut autem Contractura pedum immutata semper ultra duos annos permanserit, maxilla tamen periodicè tantum, & quidem à tertiâ cujuslibet diei vespertinâ usque ad tertiam matutinam sequentis diei sine ullo dolore contracta existit. Quod si aliquando instrumentis variis pedes diducere conaremur, statim dolores non genua tantum & tendines pedum, sed & caput ipsum cum metu convulsionum universalium prehendere cœperunt. In quo statu jam verferur ista filia dicere non licet, cum à longo ipsam tempore videre non contigerit. Fascino interim malum hoc plures adscribere voluerunt, cum manifesta ejus nulla causa deprehendi potuerit. Ante triennium aliam similiter Filiam duodecennem vidimus, per aliquot menses simili Contracturâ maxillæ periodicâ laborantem, quæ præcisè horâ octavâ vespertinâ incipiebat cum aliquali capitis dolore, & hinc per novem aut decem horas durabat. In utroque exemplo subitò accidebat, subitòque iterum remittebat paroxysmus.

In *Contracturâ flaccidâ* sive *Parhesi* manus tantum affligi solent, rariùs autem extremi pedes simul debiles, & ad voluntariam flexionem impotentès redduntur. In manibus etiam muscoli extensores plus minusve resolvuntur, oppositis, qui digitos contrahunt, sanis manentibus.

Qui causas ejusmodi malorum veras, genuinas, atque omni dubio carentes

rentes à nobis scire desiderat, is sanè rem oppidò difficilem petit; est enim hæc ipsa materia, quæ ab omni tempore excellentium Medicorum ingenia torfit, multorumque animos in suspenso tenuit. Cum autem in morbis hisce ad oculum pateat, membra contrahi, atque ita vel rigida & inflexibilia manere, vel flaccida esse, sed ad miniculo alieno flexibilia, satis facile quivis comprehendet, illam partem, cui membrum alligatum est, decurtari, vel breviorē reddi debere. Pars verò talis est musculus cum suis fibris atque tendinibus; musculus itaque, vel musculosi tendines, atque fibræ nervosæ præternaturaliter decurtatæ *causa proxima* Contracturæ statuerunt. *Crispationem* vel *Crispaturam* vocant hodierni Medici, eamque à diversis causis produci existimant antecedentibus & mediatis; immediate enim talis Crispatio vel Contractio fibrarum fit ab elatere earundem aucto per copiosiorē fluidi spirituosī affluxum, ob quem fibræ compactiores atque breviores redduntur, non secus atque funis ficcus, quando humore perfunditur, à quo ita decurtari & contrahi observatur, ut etiam pondus aliquod attollere & elevare queat. Equidem fibræ cujuscunque musculi naturalem sese contrahendi nīsum obtinent, ac ea propter perpetim contraherētur nisi oppositi semper musculi exstarent, qui similem nīsum haberent, & ita membrum, cui adhærent, in contrariam partem ducerent. Quamdiu proin fluidum spirituosum in fibras talium oppositorū sive antagoni-

starum musculorum nerveas vel tendineas æqualiter distributum est, atque sic velut æquilibrium quoddam utrobique observat, tamdiu membrum, in quod hi muscoli desinunt, ultro citroque flecti, contrahi atque extendi potest. Quamprimum autem illud æquilibrium tollitur, ita ut quantitas spirituum in nervos unius musculi major effusa sit, quàm in fibrosam oppositi musculi texturam, tum membrum reverà spasmoticè eo trahitur, quo fibræ, quoad suum elaterem ab influxu spirituum copiosiore auctum crispatæ, tendunt; dum musculus antagonista, qui in oppositam partem idem membrum flectere solet, ob minorem elaterem sufficienter resistere nequit. Atque hinc talis præternaturalis tensio durat tamdiu, donec elater utrobique æqualis fuerit restitutus. Sed idem phænomenon similiter contingit, quando fluidum nerveum in uno quidem musculo naturali quantitate manet, in opposito autem minuitur præternaturaliter.

Si quis ergo *tonico Spasmo*, atque *immobile Contracturâ* unius membri laborat, tum vel fibræ musculi illud contrahentis continuè majorem fluidi spirituosī copiam in sese continebunt, vel fibræ musculi antagonistæ ob defectum sufficientis spirituum quantitatis laxiores & flaccidiores præternaturaliter facti erunt.

Majorem quantitatem fluidi nervei fibris conciliant, aut in illas depluere faciunt variæ nervorum irritationes & punctiones, quas modò humores acido-vel austero-acres, modò

*Causa
contra-
ctura ri-
gida.*

varii generis instrumenta pungentia , lacerantia , exasperantia , compri-
mentia excitant ; quemadmodum
hoc ante aliquot annos in Fabro fer-
rario experti fuimus , cui ex Vulnere
in metatarso accepto tamdiu maxilla
contracta & immobilis mansit , quam-
diu frustulum calcei aut tibialis intra
vulnus permansit , nervosæque fi-
brillas compressit , aut asperitudine
suâ lancinavit. Quando contingit,
ut in omnes omnium musculorum ,
motui voluntario dicatorum , nervos
spiritus majore quantitate æqualiter
imprimantur , tum Tetanus , vel to-
nica totius corporis convulsio obori-
tur , tamdiu durans , donec spiritus
à suâ in nervos contentione remittant.
Quod si per longum tempus quis
membrum non movit , tum tendi-
nes musculorum illud flectentium ita
rigidi ac duri sensim evadunt , ut flecti
postliminio amplius nequeat.

Defectus fluidi spirituosus in ner-
vosæ fibræ oboritur , quando vel
comprimuntur , vel discinduntur ,
vel obstruuntur , vel siccantur , &
indurantur. Vnde podagrâ nodosâ la-
borantibus , graviter vulneratis , usti-
one læsis & similibus in casibus Con-
tracturæ non rarò obtingunt.

A Fascino etiam contracta quo-
modocunque membra fuisse Georg.
Abrahamus Merklinus in *Casibus me-
dicinalibus Incantationi vulgo adscri-
ptis* , & J. Christ. Fromannus in *Tra-
ctatu de Fascinatione* referunt.

Contractura periodica , quæ sub-
inde datur , adscribenda venit humori
viscido-acri statis horis suam irritatio-

nem exercenti , & ad certum tempo-
ris spatium continuanti.

Manuum Contractura , sive *Par-
hefis* proximè quidem contingit à re-
solutione nervorum & musculorum ,
digitos , manusque extendentium ,
unde fit , ut musculi oppositi sive an-
tagonistæ , vel integrè sani , vel non
multum debiles redditi , suo officio
defungantur , nisi se se contra-
hendi exercent , & ita decurtati ma-
nuum digitos contrahant. Hæc con-
tractio tamen ejusmodi est , ut alienâ
nihilominus ope digiti extendi que-
ant , quoniam naturalis tantum flui-
di spirituosus quantitas in nervis illis
musculorum contrahentium existit ,
quæ extensionem impedire nequit ,
cùm aliàs per se , si oppositi muscoli
resoluti non essent , extensio digito-
rum per intercedentem hominis vo-
luntatem , sine alieno auxilio facilè
contingere posset. Quod si verò reso-
lutis musculis extensoribus muscoli
adducentes sive contrahentes quanti-
tatem fluidi nervei justo majorem ac-
ciperent , tum propter auctum sic fi-
brarum nervosarum elaterem adeo va-
lidè contraherentur digiti , ut neque
alieno adminiculo illi extendi possent ,
nisi vim maximam adhibere , dolo-
remque immanem excitare vellemus.

Resolutio autem illa musculorum
contingit ab impedito fluidi nervei
sufficientis influxu , unde elater in il-
lis minutus , vel planè abolitus , reni-
tentiam oppositorum musculorum a-
ctioni naturalem præstare nequit , at-
que simul flacciditatem iisdem muscu-
lis conciliat. Fluidum nerveum non in-
fluit

Prognosis

fluit in musculos extensores , quoniam nervosæ ipsorum fibræ per consensum , quem cum plexu nervorum mesenterico , in spasmodicâ vel biliosâ Colicâ graviter afflicto , habent , validè sunt constrictæ , & quasi ligatæ ; usque adeo ut hæc ipsa Colica pro causâ antecedente , eaque ferè ordinariâ Parhesiõs haberi debeat. Colica hinc *spasmodica* , vel sic dicta *biliosa* semper ferè præcedit , atque Hominem plus minus diu aut frequenter excruciat , antequam Parhesin post se trahat. Quod si tamen nervi ad musculos distributi , horumque tendines , vel in vulnere rescissi , vel in ambustione siccati ac destructi , vel in ulcere erosi fuerint , similiter ejusmodi Contractura vel Parhesis oboritur. Venena tandem mercurialia , aliave quotidie tractata , vaporesque illorum hausti , vel assumpta venena aut remedia drastica huic quoque Affectui ansam præbent.

Quod autem in Parhesi musculi manus contrahentes sint illæsi , vel exinde cognosci potest , quoniam homines per hanc digitorum contractionem aliquid manibus tenere solent.

Ex dictis jam faciliè hi Affectus cognosci possunt atque à se invicem discerni solent , ut ulteriore *Signorum diagnosticorum* recensione opus non sit. Parhesis indolens est semper , Contractura autem rigida subinde , nõ perpetim dolorem comitem habet. Usque adeo ut in contractis quomodocunque membris sensatio tactûs ut plurimum illibata maneat , cum interea motus sit abolitus.

Quoad Prognosin autem hoc tenendum , Morbos hos , si radicati atque inveterati fuerint , plerunque ad mortem usque Hominis , etiam citra dolorè ullû durare , omnemq; remediorum vim eludere. Imò quæ à nervorum aut tendinum amputatione , erosione , vel ambustione originem ducit Contractura , omnem statim in principio medicationem respuit , prorsus insanabilis existit , & non rarò Atrophiam tandem post se trahit , præprimis quæ à fascino , aut per incantationẽ excitata fuit. Reliquæ autem *recentes* Contracturæ , nisi æger enormes in ipsâ Diætâ errores per frequentẽ iram , aut largam quotidie Vinorum ingurgitationem , aut continuam tristitiam &c. commiserit , nunc integrè nunc magnâ ex parte curari possunt.

Curatio.

In *Curatione* proin huic unicè satisfieri debet indicationi , ut æqualis fluidi nervei influxus atque expansio vel distributio debita & naturalis restitatur ; siccitasque , si quæ adfuerit , humectantibus corrigatur. In *Contracturâ* proin *rigidâ* dolente vel indolente primæ ante omnia viæ expurgandæ , sicque impedimenta felicitis sanationis tollenda veniunt : hunc in finem leniens aliquoties remedium exhiberi poterit , v. gr. in Adulto ;

Contractura rigida.

℞. Syrup. de Cichor. cum Rhab. vel
Ros. sol. compos. cum R. A. S.
flor. Persicor. ana. ℥i℥.
Aqu. Portulac. ℥i.
Fenic. ℥ij.

M. f. Potio d. ad. Virr. Sumatur pro
dosi , & quidem bis vel ter , alternis die-
bus. Vel

Ll 3

℞. Pa-

R̄. *Panaceæ solut. alcal. 3vj.*

Semin. Aquileg.

Cinnab. ꝯn. opt. ana. 3ß.

M. f. Pulv. subt. divid. in 6. Part. æqual. ad ch. Singulis diebus mane sumatur dosis in dilutiore Emulsione Amygd. dulc. cum Aqu. Beton. & Beccabungæ, vel simili factâ.

Præmissis hisce intus proderunt blanda volatilia per longum tempus, mutatis subinde formis ac remedium speciebus sumta, quemadmodum sequentia proficua sæpè deprehendimus: v. gr.

R̄. *Essent. Aquileg.*

Betonic.

Succin.

Ambr. gryf. cum Spiritu Meli. extr. ana. 3iß.

M. detur ad Vitr. Dosis m. ac vesp. 25. vel 30. guttæ cum Aquâ Beccabungæ, Nasturt aquatic. Cherefol. fl. Til. Pæon. aut simili. Vel

R̄. *Essent. Trifol. fibr.*

Meliß. ana. 3ij.

Castor.

fl. Aquileg. ana. 3ij.

Misc. detur ad Vitr. Dosis ut supra.

Vel R̄. *Spirit. Cochlear.*

Tinctur. ꝯn. vel

Corallor. ana. 3ij.

M. d. ad Vitr. Dosis ut supra.

Vel R̄. *Spirit. Sanguin. human. 3ij.*

Salis armon. anis. 3j.

Aqu. Cinam. cum Vin. dest. 3ij.

M. d. ad Vitr. Dosis 20. ad 25. gutt. m. ac vesp. cum vehiculo superiore.

In formâ Pulverum sequens apprimè valet:

R̄. *Viperar. ppt.*

Bezoard. miner. ana. 3iß.

Daris.

Semin. Aquileg.

Pæon. ana. 3j.

Θis volat. C. C. 3ß.

Sacchar. cand. alb. 3j.

M. f. Pulv. subt. detur ad scatul. Dosis m. ac vesp. 3ij. cum Infuso fol. Thee, Betonic. & Chamædr.

Vel R̄. *Specier. diamb.*

diamosch. dulc. ana. 3iiij.

Θis vol. Viperar. vel C. C. 3ij.

Matr. Perl. ppt.

Ebor. ust. ppt.

Specif. stom. Poter.

Unicorn. marin. ppt. ana. 3j.

Ungul. Alc. ppt.

Cinnab. nativ. opt. ana. 3ij.

Fol. Ori num. iiij.

Sacchar. rosat. tab. 3ij.

M. f. Pulv. subt. d. ad Scatul. Dosis ad 3j. vel plus, m. ac vesp. per se aut cum vehiculo conveniente.

Vel præscribi potest usus Jusculorum herbis nasturcinis atque nervinis alteratorum, v. gr. Borragine, Buglossò, Chamædr. Cherefol. Majoran. Beton. Endiv. Cichor. Fumar. Agrimon. Ulmar. Beccabung. Nasturt. hortens. vel aquat. & similib. Vel ex iisdem plantis cum additione Fimi Caballi Avenâ nutrit. Fimi columbini, Semin. Anis. Fœnic. &c. Aqua destillari, ac ejus postea haustus, unciarum trium vel quatuor, quotidie mane per plures hebdomadas propinari potest: vel æstivo tempore potus Thermarum perinarum, aut etiam Acidularum prodest.

Extus

Extus ea quoque conducunt, quæ tonum fibrarum roborare, obstru-ctosque nervorum tubulos referare valent. Quem in finem comendantur *Balnea Aquæ dulcis* cum admistione *Lactis vaccini*, & incoctione Herbarum tam emollientium, quam cephalico nervinarum, ut sunt: *Alcea*, *Althæa*, *Agrimonia*, *Ulmaria*, *Solanum*, *Anserina*, *Branca ursina*, *Chamædrys*, *Chamæpitys*, *Majorana*, *Anethum*, *Abrotanum*, *Absynthium*, *Ruta*, *Malva*, *Origanum*, *Lappa major vel minor*, *Mentha qualiscunque*, *Salvia nobilis ac sylv.* *Beccabunga*, *Angelica quævis*, *Petroselinum*, *Cherrefolium*, *Lavendula*, *Rosmarinus*, *Chamomilla*, & simil. Vel sacculus ejusmodi plantis repletus in *Vino* coqui, exprimi, & applicari membro potest. *Venæsectio* & *Cucurbitulæ cum scarificatione* in Plethoricis non negligendæ. *Friktiones* quotidianæ cum linteis mollibus calentibus instituendæ. Imò juxta usum Remediorum validè emollientium etiam membrorum artificialis extensio per commoda instrumenta tentari sensim debet, nisi Convulsio qualiscunque metuenda sit.

Notandum autem, ab ejusmodi remediis tam internis, quam externis, subinde sudorem expectandum aut eliciendum esse; post sudorem autem, vel post balneum quodvis, imò etiam citra hæc m. ac velp. Membrum afflictum, aut origo certè nervorum, ad musculos talis membri descendendum, illiniri aut inungi debet *Oleo*, *Unguento*, aut *Balsamō* efficaci nervino; quemadmodum sunt

v. gr. *Olea Hyperici*, *Anethi*, *Abrotani*, *Rutæ*, *Melis*. *Ocymni*, *Chamomill.* è *Floribus Slotani*, *Scorpionum Matthioli*, *Lumbricor. terrestr.* *Later.* quibus admiscere possumus *Axungias*, *humanam*, *ursinam*, *caninam*, *Castorei*, *Murium alpinorum*, *Anatum*, *vulpinam*, cum *Oleis destill.* *Aneth.* *Baccar.* *Juniperi*, *Spic.* *Lavendul.* *Amarac.* *Roris-mar.* Vel *Galbanetum Paracelsi*, si corpus macilentum non est, loco omnium usurpetur. Commendatur etiam à nonnullis *Balsamus Visci tiliacei*, vel *Balsamus magicus Pforzheimens.* non secus atque *specif.* *Unguentum Hartmanni in Praxi chymiatr.* Vel *Sanguis Bovis*, *Vituli*, *Ovis*, aut alius animalis, imò *Hominis* adhuc calens spongiâ excipi & affectæ parti cum fructu applicari solet. Quin & involvi sæpius potest membrum pelli recenter ab animali vivo extractæ, adhuc calenti, ad aliquot horas. Si sudor non facile sequatur, in laconico frequenter pro re natâ quærendus erit.

Contractura ab Arthritide fixâ oriri solita præcaveri, vel si recens adhuc fuerit, curari potest sæpè usu *Balneorum mineralium*, *Argillam* cum tantillo *Aluminis*, aut *Nitri* vehementium; ut & potu *Lactis bubuli*, vel *asinini* aliquandiu continuato mane; hæc verò curâ durante à *Vini* usu est abstinendum, & ejus loco pro ordinario potu *Decoctum Lignorum mite* potari debet.

Parbesis manuum intus quidem sequentibus curari potest remediis, v. gr.

Rx. *Tinctur. Corall.* vel *g n. 3iij.*
Essent. Trifol. fibr.

Pæon.

Contra-
ctura ab
Arthri-
tide cu-
ratio.

Cura
Parhe-
ses.

Pæon. ana. ʒj.

Aqu. Cinam. cum Vin. dest. ʒij.

Misc. detur ad Vitr. Dosis m. ac vesp. horâ ante pastum 25. ad 30. gutt. cum vehiculo convenienti, v. gr. Syrupo aperit. Minderer. vel sceletyrb. vel de Beton.

Vel R̄. Decoct. Lignor. aut saltem.

Ligni Sassafr. ʒij.

Tinctur. ʒri, vel

ʒnii.

Spirit. Cochlear. ana. gutt. xv.

Rotul. Man. Christ. simpl. ʒij.

M. f. Potio d. ad Vitrum pro dosi quotidie mane ac vesp. per aliquot hebdomadas repetendâ, horis aliquot ante pastum.

Singulis autem biduis vel triduis post haustam hanc potionem in lecto vel laconico Æger sudare debet.

Juxta hæc post cœnam, imò etiam quandoque mane sequens Tragma, vel Electuarium usurpetur; v. gr.

R̄. Fol. Betonic. Meliss. ana. ʒiʒ.

Majoran. Chamædr. ana. ʒj.

Succin. alb. ppt.

Rasur. Ebor.

Matr. Perl. ppt.

Cinnab. ʒ n. corr. ana. ʒiʒ.

Semin. Fœnic. Pæon.

Radic. Cal. arom.

Cassia. Lign. ver.

Cubebæ.

Cinam. elect.

Flaved. Cort. aurant.

Nitr. ʒ iat. ana. ʒj.

Sacch. rosat. ʒvj.

Folior. Aur. num. 8.

M. f. Pulvis subt. d. ad scatul. Dosis ʒj. ad ʒiiij.

Vel R̄. Conserv. Beton.

Meliss.

fl. Anth. ana. ʒʒ.

Nuc. Ind. condit. ʒiʒ.

Condit. rad. Satyr. ʒiiij.

Succolat. Indor. ʒʒ.

Syrup. Capill. ʒr. q. s.

M. f. Elect. d. ad Oll. Dosis magnitudo nucis juglandis bis quotidie.

Si à Veneno aut Remedio drastrico provenerit malum, tum Lac bubulum per plures dies, quotidie ad uncias 6. vel octo calidè bibendum, Sacchari, vel Conservæ Betonicæ, Borræginis, aut flor. Tunicæ tantillo educoratum. Sed insimul m. ac vesp. sequens Pulvis exhibebitur:

R̄. Corall. rubr. ppt.

Terr. Lemn. ppt. ana. ʒiʒ.

Bol. Arm. ppt.

Matr. Perl. ppt.

Pulv. Viperar. ppt. ana. ʒj.

Fol. Auri num. 3.

Sacch. rosat. tab. ʒvj.

Misc. f. Pulv. subtil. d. ad Scatulum Dosis ʒj. cum Emulsione Amygdal. dulcis vel Lacte bubulo.

Vel Electuarium sequens, maxime absorbens, demulcens, atque confortans præscribetur:

R̄. Conserv. fl. Tunic.

Borræg.

Ros. rubr. ana. ʒʒ.

Conditur. rad. Symphyt. ʒij.

Nuc. mosch.

Conf. Hyacinth. compl. vel in compl.

Roob. Sambuc. ana. ʒj.

Unic. fossil.

Terr. sigillat.

Uni

Unic. marin. ppt. ana. ℥ij.

Syrup. Capill. ꝑ r. q. s.

M. f. Elect. d. ad Oll. Dosis singulis sex horis magnitudo Nucis moschatae.

Æstivo tempore potus Lactis asinini, vel Thermarum Fabariensium, aliarumve optimè conducit. Nonnulli virus eluunt potu Acidularum, si fibras Stomachi nimis teneras non habent. Vide quoque Titulum de Hypercatharsi.

<sup>Vapo-
us ve-
natu,</sup> A Vaporibus venenatis, mercurialibus, arsenicalibus producta Contractura, v. gr. in Aurifabris, Pictoribus, Figulis, Metallifossoribus, curatur intus quidem ante omnia decem vel duodecim doses Panaceæ solutiæ sive laxatiæ alcalinæ exhibendo; deinceps autem diaphoreticis pluribus propinatis sudorem frequenter pellendo; quem in finem præscribi possunt, v. gr. ꝑ n. diaph. Specif. stomach. aut antihect. Poter. Bol. Arm. ppt. Pulv. Pannon. ruber, Viperar. ppt. Bezoardic. minor. Dens Apri vel Hippopotam. ppt. Diaphoret. Yare, Unicorn. mar. ppt. & simil. è quibus Pulvis componi, & ad dosin dimidiæ drachmæ cum Emuls. Sem. 4. frig. major. Card. bened. Aquileg. & Card. bened. Aquâ Galegæ & Scabios. fact. quotidie semel propinari potest. Loco hujus tamen Emulsionis inservire quandoque solet Decoctum Lignorum cum Meliss. Betonic. Majoranâ, Origano, & Scabiosâ. Sumto autem tali sudorifero Laconicum semper ingredi potest Ager.

Externè in Parhesi necesse est, ut per longum tempus Ager bis quotidie sibi spinam dorsi cum brachiis &

manibus linteis calefactis mollibus fricari, ac postea statim Oleo laurino, Lumbric. terrestr. Scorpion. Matthiol. Aneth. Majoran. Chamomill. cum Axungia Serpentum, human. vel canin. permisto, vel Balsamo Galbani terebinthinato, articulos dictarum partium calidè inungi curet. Æstivo tempore nonnullis absoluto Acidularum aut Thermarum quarundam potu profuit usus Balneorum mineralium argillaceorum, vel quotidiana intrusio manuum parheticarum in recens macerati, & adhuc probè calentis animalis interanea. Vidimus & in Plumbariensibus Lotharingiæ Thermis profuisse maximè unâ cum earundem potu quotidianum sudorem in Laconico excitatum, cum repetitâ Nuchæ, Axillarum, Brachiorum atque Manuum embrocatione, sive ut inibi loquuntur, Duciâ, la Douche. Post quemvis sudorem membra calentibus probè linteis sunt abstergenda, ac fovenda, simulque ulterius, quantum ferre potest Ager, spiritu Lil. convall. vel Anhaltino, aliove ex Herbis cephalicis, nervinis, Aromatibus, & Resinis, in Spiritu Vini rectificato infusis composito calidè lavanda; aut oleo quodam superiore, vel Balsamo paralytico Paracelsi, vel Oleo mirabili, quod Cardilucius in Officinâ Sanitatis Capit. p. m. 135. describit, perungenda veniunt.

Si Contractura existat periodica, <sup>Cura
Contra-
ctura pe-
riodica.</sup> intus subinde corporis interanea blando laxante extergenda sunt, ubi conducit Potio qualiscunque eccoprotica, vel Panacea alcalina repetitis vicibus

M m

sumpta.

sumpta. Postmodum conducit frequens assumptio vel *Pulveris specifi- cephalici Michaëlis cum Viperis ppt. vel Essentiæ Succini, Betonic. Aquileg. Ambræ, Trifol. fibrin. Tincturæ* $\frac{1}{2}$ n. $\frac{1}{2}$ ri, *3* tis aperitiv. Æstivo tempore potus *Thermarum* aut *Acidularum* non prætermittendus, exactumque *Dietæ* regimen observandum. *Fonticulus* in brachio excitandus. In plethoricis etiam *Vena secanda*, *Cucurbitulæ cum scarificatione* dorso applicandæ.

Contra-
ctura
Senum.

Contractura Senum nonnihil *Balneorum* & *Inunctionum* usu emendari potest, perfectè autem curari nequit. *Aliæ Contracturarum species*, à dilaceratis, discissis, erosis, Ulcere corruptis, aut diu siccatis nervis, vel à *Vulneribus articulorum*, & luxatione malè tractatâ oriundæ, sunt immedicabiles.

Contra-
ctura à
Tumore
vicino.

Si *Tumor vicinus*, aut res *Vulneribus* inhærentes, nervos vel tendines comprimendo, pungendo, lancinando ve in culpâ fuerint, tum tumor emolliendus, resolvendus, dissipandus, vel in *Abcessum* & *Ulcus* mutandus. Res autem præternaturales *Vulneri* inhærentes eximendæ, tumq; demum *Vulnus* cicatrice obducendū.

Contra-
ctura à
Fascino.

Contractura à Fascino, quæ radices jam firmas egit, & inveterata est, curabilis vix existit. Recens autem, quæque immediatè à maleferiato Spiritu maligno non est introducta, curationem adhuc admittit. Refert Barthol. Carrichterus, *Imperat. Maximil. II. Archiater, in Curat. Morbor. magicor.* Contracturam sine Contabescentiâ interdum Homini in bra-

chiis vel pedibus per fascinationem contingere, quando *Venefica Bufonem* ejus nomine circa lumbos fustibus egregiè contundit; atque hunc dein morbum sequenti modo curari posse memorat:

Rx. *Herbarum jam florentium, Plenilunii tempore sereno cælo mane collectarum.*

Antirrhini nobil. Man. 5.

Abrotoni Manip. 3.

Incisas probè & mixtas coque in Vini rubri Mens. ij.

Colato hinc tali vino Ægrum in labro novies lava, ac deinceps vinum effunde in amnem sive fluvium proximum; post singulas autem lotiones membra Ægri contracta Balsamo Visci corylini calidè inunge, quod ita describit:

Rx. *Axung. Caponum purificat. 3xij.*

Ursi probè depurat. 3 viij.

Pinguedin. Catulor. depurat. 3 iij.

Visci Corylin. cum baccis Mij.

Viscum hunc contunde probè in mortario cum pistillo tiliaceo, ut inde succulenta fiat massa, quam dein cum Pinguedinibus optime mixtam vitro sive phialæ angustî orificiî immitte, atque radiis solaribus per novem hebdomadas expone; sic tandem fiet Unguentum viride, quod externe usurpatur.

Balneum quoque Aquæ dulcis ex incoctione diutinâ largæ quantitatis Herbæ Filicis atque Scrophulariæ, præparari, eique Æger mane per bihori- um, vesperi autem non nisi per horæ spatium insidere potest. Sequens denique Apozema commendat:

Rx. *Radic. Scrophular. 3ij.*

Herbar. Verben. Man. 5.

An-

Antirrh. Mj.

Vini alb. veter.

Aqu. fontan. aa. Mens. j.

Incis. & contus. coque ad tertiæ partis consumptionem. De colaturâ hinc Æger ter quotidie haustum egregiû assumat.

Finito primo Decocto secundum, imò tertium quartumve est bibendum, atque ita continuandum, donec speratus succedat effectus. Huic Apozemati etiam Aquilegia cum toto, Trichomanes, Angelica, Artemisia, Viscus tiliaceus, Verbena, Abrotanum, Alliaria, Hypericum, Ophioglossum, Pyrola, Scordium, Leontopodium, &c. imitti possunt.

Alias etiam Suffumigia antimagica parare solent ex Herbis Salviæ, Rutæ, Solani, Roris mar. Artemis. Hyperici, Verbenæ, Visci corylin. Antirrhini, Pilosell. Ligno Aloës, Santalo citr. Thure, Mastich. Corticib. Citr. Benzoe, Styrace calamit. Ladano, Asâ fœtid. Sulphur. &c.

Sunt qui Cataplasma ex Stercore humano cum Pulvere Asæ fœtidæ, Visci tiliacei, Scrophulariæ radic. Seminis Antirrhini, &c. conficiunt, & calidè membris contractis sæpius applicant. Decantatus verò maximè est Balsamus magicus Pfortzheimensis, quotidie membris inungi solitus, cujus descriptionem sequentem è G. A. Merklini Sylloge Casuum Incantationi adscriptorum pag. 85. & 254. didicimus:

R. Ol. Hyperic. optim. ℥j.

Vini generos. Sextar. 3. vel Mens. j.

Ol. Terebinth. Lumbric. terr.

Philosophor, ana. ℥ij.

Ceræ ℥j.

Pingued. human. destill.

Olei medullæ Ossium humanor. vel cervinor. destillat. ana. ℥iij.

Theriac. Andromach.

Mithridat. Damocr. ana. ℥j.

Radic. Aristol. rot.

Dracuncul. macul.

Symphyt. ana. ℥ß.

Scrophular.

Fabar. aa. ℥j.

Visc. quern. tiliac. & coryl. aa. Mj.

Folior. Persicar. Pyrol.

Rutæ murar.

Menth. crisp.

Polytrich.

Scabios. ana. Mij.

Flor. Antirrh. Mviiij.

Hyperic. Man. vj.

Verbasco. Man. ij.

Betonic. Centaur. min.

Auricul. Mur.

Brunell.

Consolid. aur.

Ptarmicæ.

Chelidon. maj. aa. Mj.

Pomor. Momord. ℥iij.

Baccar. Herb. Parid. ℥iß.

Seminis Antirrh. ℥ß.

Hyperic. ℥iß.

Incisa & contusa coque in Diplomate, vase clauso, ad consumptionem Vini. Exprime fortiter, ac dein impone

Croci Mart. aperit.

Mumiæ, Mastich.

Touris, Myrrh. aa. ℥ij.

Coque iterum leniter, & pro circulatione Solis radiis expone: hyeme verò ad fornacem colloca.

CONTVSIO cum Ecchymosi sive ^{Contusio} Sugillatione, est Morbus solutæ uni- ^{eum sugillatione} tatis, in quo sanguis è vasculis, per violentam externam causam ruptis, exprimitur, membranasque cutis in-

tercurrendo, rubicundum primitus, mox lividum parti colorem inducit. Ita ut sic unaquæque ferè corporis pars externa huic malo obnoxia sit.

*Diagno-
sis.*

Cognoscitur id ipsum è variato sensim colore partis contusæ, qui primò ruber, post lividus, aut etiam obscurè viridescens, tandem flavus evadit, donec naturalis iterum color redierit. Nullus præterea dolor, aut exiguus duntaxat simul jungitur; imò nec ipsa pars contusa semper tumet, quoniam parum sanguinis est, quod in contusione è vasis exilit, idque ultra cutim vix descendit.

Prognosis.

Malum leve, modò probè tractetur: sinistrè verò curatum, aut etiam neglectum, in Inflammationem Abscessum, Ulcus, Fistulam, imò & ipsam Gangrænani, atque Sphacelum degenerare potest, apud eos præprimis, quorum sanguis acrimoniâ corrosivâ pollet. Superaccedit quandoque Febris, quæ tamen diaphoretico uno vel alteto iterum dissipatur.

Curatio.

In *Curatione*, antequam pars contusa sugilletur, repellens statim remedium applicandum, quod impedit vi quadam adstringente, quo minus sanguis è vasculis ruptis exprimi possit. Tale est v.gr. *Aqua gelida*, vel *Aetēr frigidū*, vel *Lapis* aut *Ferrū frigidum* statim ab accepto ictu applicatū. *Spiritus* autem *Vini* aliufve sulphureus calidè cum linteis adhibitus impedit sugillationem tumoremque omnem, vel hunc jam factum confestim, circulationem humorum probè conservando promovendoque discutit.

Si *Contusio* est magna atque vehe-

mens, tum illicò Patiens jubetur *Vri-*nam mittere, quam dein nonnulli adhuc calentem cum linteis imponunt. Statim verò simul vena brachii secanda, hincque *Æger*, aut saltem contusæ quocunque modo partes ovillâ pelle recenti & adhuc calente involvantur, ut sic extravasatio humorum prohibeatur. Si quid tamen nihilominus extravasatum creditur, internis quidem *diaphoreticis*, & *grumos sanguinis resolventibus* discutietur; v.gr. *Sperma Ceti recens* ad 3j. *Sanguinem Hirci ppt.* ad 3i. vel 3j. *Ocul. ʒo.* vel *Dent. aprin. ppt.* vel *Pulv. Vipera-*rum ppt. ad 3ß. aliquoties cum *Jusculo* propinando: cui jungatur etiam *Mixtura diaphoretica* ex *Aqu. Chere-*fol. *Heder. terr. fl. Sambuc. Syrup. a-*perit. *Minderer.* vel de *Betonic.* cum *Ocul. ʒo.* ppt. *Cannab. &c.* Imò & *Decocta contra casum traumatica* m. ac v. calidè pota magnum in ejusmodi casibus usum habent: ad ea verò sumuntur *Herbæ Alchymill. Anserin. Be-*tonic. *Sanicul. Artemis. Pyrol. Virg.* aureæ, *Vinc pervinc. Fragar. Caryophyl-*lat. *Carbones Til. Acetoreslinct. &c.* quæ in mediâ parte *Vini albi* & *Aquæ* coqui possunt: hinc quotidie semel aut bis ʒiij vel iv. propinando.

Si *Gangræna* immineat, quod ex duritie, livore, & insigni ardore Tumoris colligi debet; potenter est resolvendum, quod fit parti applicando *Cataplasma* ex *Scordio*, *Fimo ca-*ballino, *Sigillo Salomonis*, *Brunellâ*, *Salviâ*, *Meliss. Card. benedict. Cam-*phorâ, &c. *Vino incoctis*, & in *Pul-*tis formam redactis. Vel lintea saltem

Rori minerali, ac Spiritui vini vel Ceras. nigror. camphorato immerfa sæpiùs cum fructu applicantur, intus simul diligenter propinando *diaphoretica*, tam in *potionibus* quàm & in *potu ordinario*, ubi à *Vino* abstinere debet Æger. Si opus videbitur, etiam pars cultello aperiatur, vel scarificetur, hincque curatio prout in Gangrænâ absolvatur.

Si *Vulnus* simul adest, illud consueto more curetur, sed etiam *discutientia Fomenta* aut *Cataplasmata* applicentur.

Contusionibus, hincque enatis Tumoribus atque Sugillationibus Infantum frequentibus statim quidem repellentia frigida applicabis; vel linteam *Albumini ovorum* & *Aceto* confectum intinctum, sæpè repetendum. Si verò Tumor jam sit factus, aut ipsa Sugillatio, tum Mulierculæ id omne discutere nōrunt suis *spiritibus domesticis*, v. gr. *Lil. convall. Ceras. nigr. Vini camphorat. aliove*: vel etiam statim *Sambuci flores, Salviam, Majoranam, Chamomillam, &c.* *Vino albo* incoquunt, & lintea immerfa calidè applicant. Aliæ *Butyrum elixum cum Spiritu vini & Albumine ovi* applicant. Aliæ iterum *Aquâ muriaticâ* calefactâ & sæpiùs admotâ vitiū curant. Tandè verò Sugillationes reliquæ paulatim à solâ naturâ discutiuntur, imposito solum *Cerato simplici ex Oleo rosaceo vel Lil. alb. & Cerâ flavâ*.

CONTUSIO cum Fracturâ Cranii & Vulnere, est Morbus solutæ unitatis, in quo non solum Cutis capitis membranæ atque vascula dividuntur,

sed & ipsum Os Cranii frangitur.

Causa hujus mali est vel lapsus *causa.* ex alto, capitisque ad rem duram fortis allisio, vel ictus à diversis rebus duris acceptus; quâ ratione nunc punctum, nunc cæsum, nunc alio qualicunque modo, continuitas solvi potest; sed hic non nisi ea læsio, quæ per modum allisionis, aut contusionis, obtuso instrumento factæ, contingit, intelligitur.

Vt adeo ad cognoscendum hoc malum signis opus non sit multis; sed notandum tamen, per ejusmodi Contusionem diversimodas læsiones institui posse, sicque pro accidentium varietate Affectum nunc deteriorem & periculosiorem, nunc leviolem & minùs periculosum existere, ac ea propter diversimodè curari debere. *Diagnosis & Prognosis*

In *Curatione* proin, si per Contusionem sanguinis copia sit effusa inter cranium & membranas, quod sciri potest ex emissionè sanguinis per nares, aures, os; item è capitis gravitate, stupore, sopore, &c. statim post *Vrinæ excretionem Vena brachii* secetur, atque hinc, si opus videbitur, *Clysmâ emolliens ac detergens* injiciatur, paratum ex decoctione *Herbar. Parietar. Betonic. Betæ, Mercurial. Malv. Atriplic. Salviæ, Artemis. Baccar. Laur. Juniperi, Semin. Anis. Laur. Carv.* Additis tandem post colaturam, *Electuar. lenitiv. vel Melle rutaceo*, ac *Oleo oliv. Hyperic. vel Lil. albor.* Dein internè grumos sanguinis solventia sunt exhibenda, v. gr.

℞. *Aqu. Cherefol. Scab.*

Card. bened. ana, ʒiʒ.

Mm 3

Röob

Roob Sambuc. 3iß.

$\frac{1}{2}$ n. diaph.

Ocul. ʒ. ppt. ana. 3ß.

Essent. traum. ʒij.

*M. d. ad Vitr. Sumantur singulis
triboriis aliquot cochlearia.*

R̄. Pulv. ad Casum Aug. 3iij.

$\frac{1}{2}$ n. diaph. 3j.

*M. f. Pulv. subt. div. in 8. dos. æqu.
ad ch. mane ac vesperi sumendas cum In-
fuso fol. Betonicæ & Alchymillæ. De-
cōcta hinc traumatica sunt bibenda,
quibus-ni Febris obstet fortior, etiam
Essentiâ Trisol. fibr. Betonicæ, Alchy-
mill. Sanicul. Virgæ aureæ, Gramin.
Parnass. Bellid. minor. Numular. &c.
admiscere possumus, dosi qualibet 30.
vel 40. guttarum.*

*Vulneri postmodum externè suo
modo, alibi exposito, prospicien-
dum; ac etiam Fractura Cranii ipsa,
quemadmodum suo loco dicetur, de-
liganda. Sacculi interim ex Herbis
Betonic. maximè, sed & Meliloti, Sal-
viæ, Majoran. Origan. Calaminth. Ve-
ronic. Artemis. Bacc. Laur. Juniperi,
&c. componantur, atque Vino inco-
cti & expressi frequenter Capiti appli-
centur, ut sic grumi sanguinei discu-
tiantur ac dissolvantur, ipsaque san-
guinis circulatio pristino vigori resti-
tuatur.*

*Quod si Cranium sit simul depres-
sum, aut spinæ quoque subtus Me-
ninges pungant, tum Cranium tre-
pano est aperiendum, ac elevandum,
quem operationis Chirurgicæ modum
suo loco videre licet.*

Morbus solutæ unitatis, à re qua-
dam externâ violentâ graviter in Cor-
poris truncum incurrente, originem
trahens, ita quidem ut intus Vasa
quædam sanguinea rumpantur, sic-
que effusus in Ventriculum, Intestina
aut Thoracem sanguis per superiora
vel inferiora projicitur.

Nimirum vehementes adit odum
contusiones, aut allisiones Corporis,
quocunque demum modo per lapsum
aut ictum à variis rebus seu instrumen-
tis duris productæ, facile quædam in
ipso venas rumpere, indeque largio-
rem parcioremve sanguinis extrava-
sationem excitare possunt. Sanguis
verò ille postea coagulari, ac, nisi
promptè resolvatur, putrescere, In-
flammationem, Abscessum, & Ulcus
producere, Febrim accendere, alia-
que subinde periculosa symptomata
causari solet.

Itaque in Curatione ad nimiam
sanguinis extravasationem impedi-
endam statim Vena brachii secetur, ac
bona sanguinis quantitas extraha-
tur. Deinceps simul ad resolutio-
nem atque dissipationem ejus, quod
jam extravasatum ac fortè coagulatum
est, accedendū, intus quidē aliquot do-
ses Pulveris ad Casum Aug. vel sanguin.
Hirc. ppt. Dent. apr. ppt. $\frac{1}{2}$ n. diaph.
Bez. min. Spermat. Cet. recent. Ocul. ʒ.
ppt. exhibendo cum Aqu. Scabios.
Plantag. fl. Sambuc. Cherefol. &c. Imò
Decoctum contra Casum ex Sanicul.
Alchymill. Artemis. Burs. pastor. Agri-
mon. Virgæ aureæ, Pyrol. Vincæ pervinc.
Geranio Robert. Millefol. & similibus
cum Aquâ & Vino paratum, sæpius
calidis

calidis haustibus propinetur. Com-
mendant in hunc finem quoque *Pos-*
cam dilutam, vel *Medicament. è Coa-*
gulo Leporis, *Hædi*, *Caryophyllat. Ar-*
temis. rubr. Caul. rubr. Betonic. Rha-
*pon-*tic. factum. Sic & *Decoctum Radic. Ru-*
biæ Tinct. Vincet. Flor. Bellid. min. Hyper.
Folior. Fumar. Scabios. Fœnicul. Ascle-
piad. Semin. Cardui ben. &c. non con-
temnendum. Ejusmodi remediis præ-
missis opus est, ut rupta debite vasa
conglutinentur, ne à levi quocunque
motu denuò aperiantur, & novum
sanguinem profundant; quem in fi-
nem *Electuarium* concedetur ex *Con-*
servis Plantag. Rosar. rubr. Flor. Tunic.
Borragin. Bugloss. Aurantior. cum Con-
ditur. Radic. Consolid. maj. Bol. arm.
ppt. Terr. sigill. Croc. ♂ t. adstring. Sy-
rup. Cydon. &c. Vel Pulvis præscri-
batur ex *Gumm. arabic. Gummi Ceras.*
Pulvere Lichenis petræi, Sempervivi
major. Bol. armenat. Unic. fossil. Lapid.
Hæmat. ppt. Sanguin. Dracon. ver. Se-
minis Hyperic. &c. Veletiam *Essentia*
Numulariæ, Hyperic. Bellid. min. Gra-
min. Parnassi, cum Balsamo peruviano
permixta, guttatim per plures dies ex-
hibebitur.

CONVOLVVLVS, VOLVV-
LVS INTESTINORVM, vid *Ileus*.

CONVULSIO, Σπασμος, ἀ-
σπᾶν, contrahere, est Symptoma
Actionum animalium, in quo nunc
totum corpus, nunc hæc aut illa tantū
membra involuntario, violento at-
que præternaturali motu contrahun-
tur, distorquentur, ac obrigescent,
ita ut, nisi contractio cesset, facilius
membrum frangas, quàm in natura-

lem figuram reducas.

Pars affecta sunt principaliter ferè
Meninges cerebri, deinceps autem
Musculi nunc hi nunc illi, imò fibræ
quoque motrices variarum corporis
partium, quas illæ sui contractione
violentâ multivariam distorquent.

Differentiæ hujus Morbi sunt mul-
tiplices; nunc enim universaliter to-
tum corpus cum sensûs & motûs vo-
luntarii amissione affligitur, & vel O-
pisthotonus est, quando musculis ca-
put extendentibus contractis seu cri-
spatis, abdomen in altum ita
torquetur, ut caput, atque pedes
posteriori ferè jungantur: vel *Empro-*
sthotonus, ubi corpus cum abdomine
retro in gibbi formâ torquetur, capite
verò atque pedibus antrorsum flecti-
tur: vel *Tetanus*, quando Corpus
æqualiter obrigescit, & quasi in lon-
gitudinem extenditur; Nunc specia-
liter hanc aut illam tantum corporis
partem affligit, velut Brachium, Pe-
dem, Digitum, Oculos, Cervicem,
Linguam, Maxillam, Labia, Ven-
triculum, Intestina, &c. ubi Sensus
& reliquarum partium voluntarius
motus manet integer. Quod si Os
spasmodicè contrahitur, in alteru-
tram partem, convulso Oris musculo
lato ex uno tantum latere, *Spasmus*
cynicus. Sin verò contracto in utram-
que partem eodem musculo Os in u-
trumque latus diducitur, tum for-
mam ridentis exhibet, ac *Risus sardo-*
nus; si porro Musculi temporum con-
trahantur cum Stridore dentium, *Tris-*
mus. Si Os in spasmo valdè aper-
tum teneatur, *Hiatus oris spasmodicus*.

Pars
affecta.

Diffe-
rentia.

Opistho-
tonus.

Empro-
sthotonus.

Tetanus.

Spasmus
cynicus.

Risus
sardonius.

Trismus.

Hiatus
oris.

Tan-

*Spasmus
flatulentus.*

Tandem si hic aut ille solum musculus Digiti, vel Brachii aut Pedis dolorificè trahatur, & rigidus evadat, *Spasmus flatulentus* nuncupatur. Denique Convulsionem dividunt in *tonicam*; qualis hic describitur, cum membrorum immobilitate conjunctam, & *clonicam*, cum membrorum concussione contingentem, veluti est *Epilepsia*, suo loco tractata. His adde, quod Convulsiones aliquando *continuae* sint, brevius vel longius pro *causarum* varietate durantes, aliquando *periodicae*, incertis temporum intervallis recurrentes, ac similiter citius vel tardius finientes.

Causa

Causa verò omnium ejusmodi Contractionum convulsivarum *proxima* est Spirituum animalium elastica quaedam in tubulos atque vesiculas Musculorum nerveas impressio, cum aliquali velut impetu facta; ubi dum ab expansis fibris nerveis reliqua Musculi vascula simul premuntur, atque ita sanguis nonnihil in illis cohibitus augeatur, necessariò Musculus primum in latitudinem expandi, postea verò quoad longitudinem contrahi & decurtari debet. Atque hæc contractio dura existit, firma & rigida, quoniam vis nervosarum fibrarum & spirituum impressorum elastica externæ cuicunque violentiæ maximè resistit, ut, nili elaterium illud in musculis convulsis remittat, & ad æquilibrium cum elatere musculorum antagonistarum redeat, membrum convulsus flecti planè nequeat. *Contractionem* illam fibrarum nervearum, quæ breviores redduntur hæc, & in sese

quasi ducuntur, *spasmodicam* vocant plures hodierni quoque *Crispatione* nomine insigniunt. Quando itaque talis crispatio generaliter magnam generis nervosi partem affligit, ac incipit vel ab ipso nervorum principio atque meningibus incipit, tum *universalem* inde *Convulsio* oboritur, & quidem nunc *Emprosthotonus*, quando musculi Caput antrosum flectentes convelluntur: nunc *Opisthotonus*, quando musculi Caput retrò vel extendentes crispantur: nunc *Tetanus*, quando musculi totum corpus in longum tendentes spasmodicè afficiuntur. Cum autem crispatio unius tantum vel alterius musculi aut membranæ fibrarum nerveasprehendit, ita ut hæc affectio non communicetur principio Nervorum & Meningibus, tum particularis tantum evadit Convulsio, & e quidem non sine intenso convulsus partis dolore; dum enim sensus Tactus in hoc Morbo integer manet, non potest non illa vehemens unius membranæ vel membri tensio dolorem sive tristem sensationem inferre. Ita enim v. gr. Spasmus flatulentus Colica spasmodica, Digiti unius vel alterius tensio dolorem inferunt haud contemnendum.

Periodica si est Convulsio, hæret alicubi inter membranas materiam quædam viscido-acris, quæ datâ occasione in motum concitata fibrilla proximas nerveas pungendo, lancinando, aut tendendo crispabit. Vnde fibræ membranosæ corporis adeo teneræ, fluidumque nerveum adeo acre, mobile & volatile erit, ut ab ob-

jecti

jectis pluribus externis quàm facillimè ad spasmodicas musculorum plurium vel pauciorum contractiones producendas incitentur.

Tamdiu autem durant Convulsiones, donec crispatio fibrarum laxetur, fluidique spirituosus nervorum elastica expansio diminuatur.

Causæ *antecedentes*, quæ proximam in corpore excitant, sunt omnia illa, à quibus fibræ nervosæ, membranosæ, aut musculo-tendinosæ, præternaturaliter irritari, atque hinc contrahi crisparique vehementer possunt, non sine fluidi nervorum spirituosus elatere aucto. Talia sunt acidi & austeri valdè acres humores, resve aliæ, quæ nervosas fibras, ubicunque demum locorum, gravius lancinant & pungunt, hacque ratione eas ad sui contractionem & decurtationem stimulant. Huc igitur referuntur Dolores harum aut illarum partium intensi, difficilis Dentitio, Colica, Passio iliaca, Cephalalgia vel Hemisrania vehemens, Passiones hystericae, Lumbrici intestinales, Cruditas acris in Stomacho fluctuans, Febres malignæ, Variolæ, Morbilli, assumpta Venena, vel Purgantia vehementissima, accepta itidem Vulnera ac dilacerationes nervorum, & membranarum, inprimis Cerebri; ictus vel morsus Animalium venenatorum, ac iræ æstuantium, & similia, quæ Spasmos post se trahere valent. Tale quid produciunt etiam Vasorum sanguineorum exinanitiones in Hæmorrhagiis nimis, à quibus, juxta *Baglivi Celeberrimi* systema, æquilibrium

solidi & fluidi destruitur, & hinc Fibræ ob penuriam fluidi resistentis vehementer versus unam plagam contrahi atque crispari solent. Tractavi ante decem circiter annos Virginem cholerico-sanguineam, Febri tertianâ laborantem, quæ in singulis paroxysmorum initiis ultra dimidiam horam convulsa jacuit, donec repetito emetico biliosæ cruditates omnes è primis viis expulsæ fuerint.

Inter causas *procatarticas* ^{*procatartica.*} primum facile locum concedimus Iræ atque Terrori subitaneo, pluries recurrenti, à quibus humores acriores redditi, & vehementius commotæ fibræ crispationibus ansam facilem præbent. Sed & Cibi dyspepti, acido-austeri, acres, in liquamen nidorosum, vel acido pungens conversi, cum interveniente nausæa, Convulsiones per nervorum irritationem non rarò produciunt. Potus Liquorum spirituosorum excessivus frequens similiter nervis inimicus est, & spasmodicis contractionibus ansam præbet.

Cognoscitur quævis Convulsio ex ^{*Diagnosi.*} involuntariâ, eaque validâ musculorum, ac membrorum inde commoveri solitorum, contractione. Quando igitur *universalis* est Convulsio, membra omnia præternaturaliter intorta, immobilia, ac rigida erunt, ut flectere ea nequeas, nisi magnâ cum vi, ac metu rupturæ tendinum. Sensus ablati sunt tam interni quàm externi; oculi nunc clausi, nunc torvi apparebunt, ut non nisi album eorum cernere possis: os firmiter clausum plerunque existit, rarius aperi-

tur cum Linguae emissionem, quæ interdum etiam commissis validè dentibus ita vulneratur ac mordetur, ut sanguis copiosè effluat; pollices manuum cum digitis arctissimè in pugnum constringuntur; quandoque fridor dentium cum aliquali vociferatione accedit. In *Empyothotono* corpus cum cervice & capite violenter ad anteriora protrahitur, ut mentum pectori firmiter annectatur, & corpus navis carinam referre videatur; imò quandoque in arcum vel in orbem ita contorquetur, ut *Ægri* suum caput genibus applicatum habeant. In *Opisthotono* caput retro versus dorsum validissimè non secus atque pedes trahuntur, abdomenque sic in altum attollitur. In *Tetano*, qui moribundis est familiaris, corpus in longum extenditur, rigidumque evadit. Convulsiones ejusmodi nunc brevius, nunc diutius durant, cessantesque vel non recurrunt amplius, vel semel iterumque in *Cholericis*, *Hypochondriacis*, aut *Hystericis* datâ occasione redeunt.

Convulsio particularis.

In Convulsione *particulari* musculus tantum unus vel alter hujus aut illius partis contrahitur, salvo manente sensu, ac motu reliquorum membrorum voluntario; unde etiam dolor à tensione validâ nervorum partis convulsæ oboritur. Particulares Convulsiones nonnullæ peculiaria sortiuntur nomina, ita ut, quæ in musculo hoc vel illo Oculi contingit, *Strabismus* vocetur; quæ in musculis Mandibularum aut Temporum fit, *Trismus*; quæ in lato oris musculo ex uno so-

lùm latere producit *Spasmus cynicus*, vel *oris Tortura*; ex utroque autem latere facta ejusdem crispatio, *Risus sardonius* audiat. Musculorum virgæ spasmus *Satyriasis* sive *Priapismus* nuncupatur. Dantur & plures aliæ, sed quæ nominibus propriis carent.

Imminentes Convulsiones aliquando præfagiunt vertigo crebra, coruscationes, scintillationes ac intorsiones oculorum, capitis gravitas, horripilationes cutim totius corporis crebrè pervadentes, pavores somnum turbantes, inquietudines corporis, anxietates pectoris, artuum tremebundæ agitationes, internorum viscerum miræ commotiones, manuum attactu non rarè sensibiles.

Universalis Convulsio per se ex causis procatacticis oborta non adeo periculosa est, sed occurrendum citò, ne, si sæpius recurrat, in Epilepsiam degeneret, quod apud *Cholicos*, *Hypochondriacos* & *Meticulosos* non secus ac apud *Fœminas hystericas* fieri haud difficulter potest. Convulsio Dentitioni difficili superveniens, aut ante Variolarum, Morbillorum, &c. eruptionem accedens minus mala; sed si perfectis jam Variolis, aut in Statu Febris malignæ adveniat, plerumque lethalis existit, internam quandam Gangrænam & Sphacelum præfagiens. Convulsio subito orta, alvi fluxu, vomitu, vel Febre superaccedente solvitur. Convulsi quartum diem si effugiant, plerumque sanantur. Si Apoplexiæ, Lithotomiæ, Herniæ sectioni, aliisque Vulneribus nervorum Convulsiones

nes superveniant, lethale est. Ab assumptis autem Venenis qualibuscunque, aut drastice remediis productus morbus in principio quidem curabilis, postmodum autem, cum Venenum jam radices firmiores egit, insanabilis notatur. Spasmi *particulares* in Febribus malignis ut plurimum sunt deleterii, extra Febres autem si Hominemprehendant, non magnum quidem statim periculum in se habent, sed subinde diuturni, vel periodici esse, & gravius etiam quid post se trahere solent. Hystericæ convulsiones, aut quæ Doloribus, vel Cibis, malignum forte succum in se foventibus, in Ventriculo malè digestis, superaccedunt, parum vel nihil periculi portendunt.

Quoad *Curationem*, in Convulsione ab assumptis Venenis, vel ab Irâ vehementi, statim emeticum est exhibendum, & quidem pro personarum diversâ habitudine, vel *Oleum Olivarum* ad aliquot uncias cum *Jusculo tepido*, vel *Aqua* saltem *fontana*, vel *Hydromel tepidum*. Hinc statim post unum vel alterum vomitum copiosum, in *Veneno* quidem *Lac* affatim hauriendum præbeatur cum *Terrâ sigill. Unicorn. fossil. Ebor. ppt. Corall. ppt. &c.* In Irâ verò potiunculæ dentur ex *Aqu. Cichor. Endiv. flor. Til. flor. Consol. regal. Card. bened. cum Syrup. Pæon. Syrup. anodyn. Ungul. Alc. ppt. Dent. aprin. vel Hippopotam. ppt. Cinnab. $\frac{1}{2}$ n. Ol. Fr. per deliq. vel Sale Rutæ, &c.* Clysmata quoque emollientia & detergentia non omittantur. In ipso autem paroxysmo

Os cautè nec magnâ cum violentiâ est aperiendum, ne Temporalis musculus, aut quædam ejus fibræ rumpantur. Verùm ad sedandum paroxysmum naribus frequenter admoveantur, quæ Spiritibus animalibus alium motum conciliare possunt; quemadmodum sunt *Ruta, Angelica, Castoreum, Camphora, spiritus volatiles C. C. Viperarum, Salis armon. &c. Acetum rutac. rosac. vel simplex vel comp. cum Bacc. Juniper. Rutâ, Majoranâ, &c.* Mulierculæ quoque, vanâ superstitione adhuc repletæ, *Alcis ungulam, Flores Fœni*, aliaque deterioris notæ Ægrorum stragulis ac pulvinaribus subjiciunt.

Ad futuros autem paroxysmos spasmodicos præcavendos, genusque nervosum roborandum extra Morbi insultum *Pilulæ* aut *Pulveres usuales* præscribi possunt ex *Extractis Beton. Pæon. Centaur. min. Castor. Diaphor. $\frac{1}{2}$ vial. vel Mar. Cinnab. $\frac{1}{2}$ n. vel Nativ. opt. Ungul. Alc. ppt. Ægagropil. ppt. Bezoard. miner. Visc. quern. Seminib. Aquileg. Pæon. Rutæ, Radic. Pæon. Valerian. Men, Petasitid. Antim. diaph. Succin. alb. ppt. Ebor. ppt.* Quibus pro Homine cholerico addi solent *Nitrum, $\frac{1}{2}$ iat. Lap. prunell. Cichor. vel Absynth. Salia essentialia Card. bened. Acetosell. Acetosæ, Rubi idæi, &c.* Pro Hypochondriacis verò jungantur *martialia* diversis modis parata. Sed & Vere atque Autumno *Vinum medicatum* laxans atque alterans, ex antispasmodicis, cephalicis & spleneticis paratum præscribi debet, æstivis autem mensibus

bus Thermæ piperinæ aliæve calentes, vel Acidulæ bibi possunt. Externe etiam præservationis loco nucha spinaque dorsi inungantur *Pinguedine Cati, Gallin. Anat. Castor. cum Oleis Chamomill. Aneth. Costin. Vulpin. Succin.*

Convulsi-
o. u. a
Vi. u. i. e. r. e.

Si *Convulsio* superveniat *Vulneri*, tum interne quidem *Mixtura antispasmodica*, sicut paulo inferius extant, cum granis octo vel decem *Theriace cælestis* juncta cochleatim propinabitur. Externe verò pus acre ac spasmodicum est extergendum, atque eluendum, eaque indenda, quæ nervos afflictos ac irritatos demulcere valent: sed imponatur simul *Fomentum* ex decocto plantarum cephaliconervinarum, necnon *Fimæ equino*. In primis pro arcano habetur *Succus recens Symphyti, Alth. Verbasci* vel *Sempervivi majoris* calidiuscule cum plumaceolis immixtus.

ab acido-
austero,
a Vermi-
bus.

Ab acido Intestinorum corrosivo, vel etiam à *Vermibus* excitata primùm *Colica Intestinorum spasmodica*, hinc & *Convulsio* universalior, primùm quidem desiderat *laxans* è *Rhabarbari* vel *Pulvere* cum *Mercurio dulci*, vel *Infuso paratū*; Vel *Panacea solutiva alcalina*, sub *Materiæ perlata* titulo in Germaniâ hætenus distributa, quinquies aut sexies ad ʒj. pro dosi, exhibebitur. Dein ea in usum trahentur, quæ in *Colicâ biliosa* superius commendata sunt.

A *Doloribus* ingentibus excitatæ *Convulsiones* requirunt *Mixturas antispasmodico-anodynas*; imò & dosis una alterave *Theriace cælestis* in *Pilu-*

lis, vel *Mithridatii Damocratis* exhibebitur.

Convulsio *Febribus* ardentibus aut malignis superaccedens desiderat *antispasmodica diaphoreticis & alexipharmacis* diligenter permiscenda, quemadmodum suo fusiùs loco, sub *Curâ* *Februm* malignarum exponetur.

A *Terrore* autem inductus hic *Morbus* postulat ante omnia *Venæsectionem*, dein *Potiones antispasmodico-diaphoreticas* ex *Aqu. Cherefol. fl. Til. flor. Calendul. fl. Consol. regal. Sambuc. Pæon. Card. bened. Betonic. Syrup. aperit. Mind. Bellid. min. Citr. ʒ n. diaph. Ungul. alc. ppt. Bezoard. min. Lapid. Bezoard. oriental. vel occidentali vero, Pulv. viperin. Liqu. C. C. succ. Tinctur. Cast. cum Spir. Salis armon. ppt. Essent. Croc. Succin. Satyrion. Castor. Pæon. Valerian. Aquileg.*

In omni tandem *Convulsione*, à quâcunque causâ enatâ, seqq. formulæ cum fructu præscribi & usurpari possunt, v. gr. in *Cholericis & Sanguineis* post *Venæsectionem*, si necessaria videbitur, finito paroxysmo:

℞. *Aqu. Cichor. Endiv.*
Flor. Til. ana. ʒj.

Syrup. Citr. ʒvj.

Tinct. ʒ mi ʒß.

Bezoard. min.

Ebor. ppt. ana. ʒj.

Cinnab. nat. ʒß.

M. ad Vitr. Detur per cochlearia.

Vel ℞. *Aqu. Lactuc.*

Flor. *Calcatripp. ana.* ʒiß.

Hirund.

Syrup. Rub. id. ana. ʒß.

Tinct. Cast. cum spirit. Sal. ar-

mon.

mon. par. ℥j.

Ungul. alc. ppt.

Dent. apr. ppt. ana. gr. xxv.

Julep. rosac. ℥iij.

Misc. detur ad Vit. Sumatur cochleatim.

℞. Tinctur. $\frac{1}{2}$ n. vel

Corallor. ℥℞.

Liqu. Terr. fol. $\overline{\text{F}}$ ri ℥ij.

Misc. detur ad Vit. Dosis 25, ad 30.

Gutt. cum Aqu. Endiv.

Vel ℞. Crystall. alb. ppt.

Corall. rubr. ppt. ana. ℥i℞.

Diaphor. $\overline{\text{F}}$ ial. vel

Bar.

Ungul. Alc. ppt.

Cinnab. $\frac{1}{2}$ n. corr. ana. ℥j.

Semin. Aquileg.

Pæon. ana. ℥ij.

Anis. ℥℞.

Sacch. penid. ℥℞.

Misc. f. Pulv. subt. d. ad Scat. Dosis

man. ac vesper. ℥℞. ad ℥ij. cum vehiculo conveniente.

In Subiectis autem Hypochondriacis aut scorbuticis, pituitosis, hystericis:

℞. Aqu. Flor. Til. ℥j.

Pæon.

Nasturt.

Fl. omn. ana. ℥vj.

Syrup. de Eupator.

Pæon. ana. ℥℞.

Confect. Alk. inc. ℥℞.

Essent. Castor. Trif. fibr.

Succin. ana. ℥j.

Diaph. $\overline{\text{F}}$ ial.

Corall. rubr. ppt. ana. ℥℞.

M. ad Vit. Hauriatur per cochlearia. vel

℞. Aqu. Satyrion.

flor. Paralys.

Plantag. ana. ℥j.

Syrup. fl. Tunic. ℥vj.

anod. ℥ij.

Essent. Beton.

Rutæ.

Tinct. $\frac{1}{2}$ n. ana. ℥℞.

Sacch. ros. tab. ℥iij.

M. ad Vit. Sumatur ut supra.

℞. Liqu. C. C. succinat. ℥i℞.

Aqu. fl. Til. ℥iij.

M. ad Vit. D. singulis 6. horis à 15, ad 25. guttas pro dosi.

Vel ℞. Essent. carminat. Wed. ℥iij.

Castor. ℥j.

Opii liquid. ℥℞.

Misc. d. ad Vit. Sumatur ut supra per guttas.

Vel ℞. Elix. propr. Claud. vel sine acid. ℥ij.

Essent. Succin.

Aquileg. ana. ℥j.

Misc. d. ad Vit. Dosis ut supra.

Vel ℞. Essent. Rorismar.

Ligni Aloës.

Salv. ana. ℥ij.

Opii liquid. ℥℞.

M. detur ad Vitrum.

Vel ℞. Spirit. Nitr. vel

Salis dulcis.

Liquor. Nitri fix. ana. ℥i℞.

M. d. ad Vit. Dosis 15. vel 20. guttæ cum Vehiculo conveniente man. ac vesperi per aliquot hebdomadas.

Vel ℞. Spec. cephal. Mich.

diamosch. dulc.

Pulv. epilept. March. ana. ℥j.

Cran. hum. ppt. ℥ij.

Radic. Doronic.

Pæon.

Nº 3

℞.

Fol. Mari ver.
Flor. Stæch. Arab.
Cheir. ana. 3ß.
Sacch. alb. ʒij.
M. f. Pulv. subt. d. ad Scat. Dosis
3j. m. ac v. per aliquod tempus.
Vel ʔ. Tinct. Castor. cum Spirit. Salis
armon. parat.
Essent. Rut. ana. 3j.
Opil liquid. ʒj.
M. ad V. Dosis. 16. ad 26. guttul.
Vel ʔ. Essent. flor. Til.
Rut.
Castor.
Satyrion. ana. ʒij.
Tinctur. Croc. 3ß.
Aqu. fl. Lil. convall.
Bugl. ana. 3iß.
M. ad. Vitr. Dosis. 18. ad 28. gutt.
ʔ. Liqu. C. C. succin. 3iß.
Θis vol. C. C. gr. vi.
M. ad Vitr. Admoveatur naribus in
paroxysmo. Vel
ʔ. Spirit. Urinæ vol. vel
Salis armon. urinos.
Volat. Lumbr. terr.
C. C. ana. 3iß.
M. d. ad Vitr. pro Naribus.
Vel ʔ. Θis Fri &
Θis ammon. ana. part. æqual.
statim post mixtionem admove naribus.
Vel ʔ. Spirit. Rut.
Anhaltin.
Meliss. ana. 3iß.
M. ad Vitr. & Naribus inspergatur.
Vel ʔ. Ol. nucist. express. 3ij.
dest. Rut.
Succin.
Meliss.
Amarac. ana. gutt. viij.

Θis volat. C. C. oleos. gr. vi.
M. F. Bals. d. ad pyxid. Inungatur
vertici, temporibus atque naso.
ʔ. Axung. Anat.
canin. ana. 3vj.

Ol. rutac.

Chamomill.

Hyosc. Semin. express. ana. 3iij.
dest. Chamomill.

Aneth. ana. 3ß.

M. ad Oll. Inungatur sæpius cervix
cum totâ spinâ, nec non Regio umbili-
calis.

Æstivo tempore sicut Cholericis
& Sanguineis Acidulæ, ita Hypo-
chondriacis ac Pituitosis Thermæ Plum-
barienses, vel Piperinæ in Potu. Hysteri-
cis & Scorbuticis eædem, sed his qui-
dem frigidæ, illis verò calidæ profunt,
cum vel sine Balnei usu.

Spasmus flatulentus tollitur frictio-
ne partis, inunctione ejusdem cum
Pinguedinibus Vulpis, Lupi, Anseris:
item applicatione Sacculi Θe torrefa-
cto repleti, & calefacti. Etiam Spi-
ritus vel Oleum Juniperi cum Spirit
Ceras. nig. vel Vini camphorat. ve
flor Lil. convall. aliisque calidè imponi-
tur aut affricatur. Sic & Cortices ra-
dicis & caulis Dulcamaræ conquassati
& applicati Spasmodum quoque tollunt
Qui verò huic incommodo obnoxii
sunt, subinde in parte affectâ, si fieri
potest, Cucurbitulas cum scarificatio-
ne admittant; aut parti super spas-
modicum musculum ligaturum quan-
dam injiciant. In ipso Spasmo simu-
partem, quantum possibile, exten-
dant, sicque sese à dolore spasmodico
liberabunt.

Spasmi

Spasmus cynicus, ac *Risus sardonius*, sæpè à Lumbricis primarum viarum, vel venenato quodam, acrive humore oriundi, *Vomitorium* statim exigunt ad eliminandam primarum viarum saburram spasmodicam: dein *anthelmintica*, & *antispassmodica* superius commendata in usum vocabuntur.

Spasmi alii *particulares* post evacuationes primas vias desiderant *Spiritum* qualemcumque *cephalicum*, *castorinum*, aut *camphoratum*, quo muscoli & nervi Partis affectæ continuè sunt calidè fovendi, v. gr.

Rx. *Spir. Anthos.*

Anhaltin. ana. ℥iv.

Lumbric. terr. ℥ß.

Formicar. ℥ij.

Essent. Castor. ʒj.

Misc. detur ad Vitr.

CORDIS PALPITATIO, est motus Cordis depravatus, quo pars ista præternaturali cum impetu pulsat, & ita ad costas appellitur, ut inde majus minusve incommodum Ægri perferant.

Originem ducit à causis & rebus musculum Cordis fortiter irritantibus, quemadmodum sunt Sanguis bulliens, post motum corporis vehementiorem; Serum sanguinis crassum, lentum, acido-acre; Polypi cordis: Serum acre in pericardio, aut etiam thorace collectum, ac Hydropem pectoris vel minitans, vel ipso actu efficiens: Vermis pericardii, aut alibi circa Cor existens: Calculus: Flatus, & alia. Occasionem hinc præbent sufficientem

Mensium vel nimius fluxus, vel suppressio diuturna: nec non Hæmorrhoidum fluxus diuturnus, indeque nascens Cachexia, aut Leucophlegmatia. Vehemens cursitatio, & corporis qualiscunque exæstuatio: Intemperies melancholica aut scorbutica: Temulentia nimia: Chlorosis, in quâ ob lentorem sanguinis per Cor ægrè transeuntis fibræ illius nervosæ carnosæ perpetim ferè irritantur, ac spasmodicè tenduntur; Ira vehemens; Terror subitaneus; Metus ac Tristitia magna & continua.

Facile cognoscitur hic Affectus *Diagnos.* tum ex Ægri relatione, tum ex applicatione manûs ad pectus ejusdem. Simitior est Palpitatio, tantum incommodi non parit, ut adeo Ægroti vix dignum querelâ morbum æstiment. Si autem fortius pulset, ac insimul pectoris anxietatem, & inquietudinem suscitet, tum verò ansam queritandi majorem præbet; subinde Cor ita palpitat, ut dolorem costarum regioni inferat. Imò perhibitum est *Fernelio*, etiam Costam in quodam Homine, propter nimiam Palpitationem aliquando fractam fuisse, quod certè contingere potuit in Homine, cujus una vel altera costa à Lue venereâ corrupta & cariola reddita erat; talia enim ossa haud difficulter frangi experientia testatur. Si à Flatu provenit, repentinè Cor palpitabit, sed hæc tamen Palpitatio non diu durabit. Si verò Polypus est in causâ, tum perpetuo palpitabit, donec polypus vel discussus sit, vel homo inde mortuus. Si a Verme, Palpitatio quidem

dem continua erit, sed nunc vehementior, nunc mitior, prout ipse Vermis nunc quietus magis erit, nunc mobilis. Si est à Sanguine viscido, maxime seroso aut inæqualiter etiam crasso tenacive; tum Ægro existente quieto Cor minùs palpitabit, quamprimum autem movebitur, ambulabit, aut etiam scalas ascendet, tum fortius pulsabit, subinde cum respirandi difficultate. Si tandem ab aquâ falso-acri Pericardii, aut in cavo Pectoris fluctuante producet malum, tum sæpissimè anxietas magna Palpitationi jungetur. Denique non raro observatum est, ita fortiter apud Ægros Cor pulsasse, ut ex ejusdem ad Costas allisione sonus fuerit productus, non in conclavi saltem Ægroti ab omnibus, sed etiam extra illud à pluribus facile auditus.

Atque ita Morbus hic non est contemnendus, utpote qui haud difficulter in peiores alias degenerare potest ægritudines, v. g. Polypum, nisi jam adsit, Hydropem Pericardii & Pectoris, Asthma, Febrim lentam, Atrophiam, Apoplexiam, & similes.

Curatio.

In *Curatione* Affectûs à crassitie feri sanguinei provenientis, unicè advertendum est, ut sanguinis debita naturalisque fluiditas atque consistentia æqualis restituatur, restitutaque conservetur. Quod fit primum, si absit Febris, *Laxante* quodam *Mercuriali* ex *Syrupo de Cich. cum Rhab. de Spinâ Cervinâ, Florib. Acac. cum Electuar. è succ. rosar. Confection. Hamech. Diacydonio lucido, & Mercurio dulci.* v. gr. in Adulto;

Rx. Diacydon. lucid. ʒß.

Merc. dulc. ʒß.

Aqu. Card. bened.

Fenic. ana. q. s.

Spirit. Cochlear. ʒß.

M. f. Potiuncula. d. ad Vit. sumatur unâ vice jejuno stomacho.

Vel Rx. Syrup. de Cich. cum

Rhab. ʒiß.

Conf. Hamech. ʒij.

Spirit. Sal. arm. anis. ʒß.

Aqu. flor. Til.

Beccabung. ana. ʒvj.

Cinam. bugl. ʒij.

M. f. Potio d. ad Vit. pro dosi maturâ cum regimine diætæ hauriendâ.

Cum fructu optimo etiam ordinavimus aliquoties Vinum medicatum sequens:

Rx. Radic. Apii.

Vincetox.

Rusci ana. ʒß.

Herb. Beccabung.

Card. bened.

Meliß.

Summit. Absynth. ana. Mj.

Baccar. Junip. ʒij.

Semin. Nasturt.

Anis. ana. ʒß.

Fol. Sen. opt. mund. ʒx.

Rad. Helleb. nigr.

Rhab. el. ana. ʒiib.

Cortic. Winter.

Θis Absynth. ana. ʒiiij.

Limat. Chalyb. ʒiij.

Incis. contus. atque in nodulo ligatis affunde Vini albi veteris ʒiiij. & Aqu. fontan. calentis ʒij. dein quotidie mane Calix unciarum quatuor plus minus exhauriatur.

Rx. Θis

R̄. *Θis volat. oleos. Sylv. ʒiij.*
d. ad. Vitr.

Dos. gutt. x. m. ac vesperi.

R̄. *Spirit. Sal. arm. anis. vel fœnic.*
Aqu. Cinnam. opt. ana. ʒij.

M. ad V. Dos. gutt. xx.

R̄. *Spirit. volat. C. C. vel Ebor. ʒiʒ.*
Aqu. Meliss.

Flor. Acac. ana. ʒij.

M. ad Vitr. Dos. gutt. xv.

R̄. *Mixtur. simpl.*

Tinct. ʒnii ana. ʒiʒ.

M. ad Vitr.

Dosis gutt. xij. ad xvj.

Vehiculum hisce & sequentibus etiam
 præbebunt *Aquæ destillat. Card. bened.*
Fumar. Meliss. Flor. Acac. Nasturt.
Paludapii, Cherefol. & simil.

R̄. *Essentiæ Trisol. fibrin. ʒiij.*

Spirit. Cochlear. ʒij.

Tinct. Cast. cum Spirit. Sal. arm.
par. ʒj.

M. ad Vitr. Dos. gutt. xvj. ad 26.

R̄. *Bezoard. mineral.*

Diaph. ʒial. ana. ʒj.

Milleped. ppt. ʒij.

Θis vol. C. C. purior.

Cinnab. nat. opt. ana. ʒʒ.

Extract. Trisol. fibrin. vel

Card. bened. ʒij.

Cum Syrup. aperit. misc. f. l. a. Pi-
lul. Pisi minoris magnitudine. Dosis ea-
rum est ab 8. ad 10. vel 12.

Cholerici aut Melancholici bene
 etiam habent ex potu *Acidularum*
maximè spirituosarum, prout sunt
Sualbacenses, Egranæ, Deinacenses,
aliæ.

Si *Polypus* existat causa Palpita-
 tionis, tum pertinaciter insistendum

est usui Remediorum volatiliū, at-
 que validè incidentium; cui scopo
 satisfacere possunt *Saliā volatilia* pro-
 bè à fœtente oleo liberata v gr. *Cornu*
Cervi, Eboris, Viperarum, Cranii huma-
ni, Succini, ad decem grana quotidie
 mane ac vesperi per aliquot hebdo-
 madas cum vehiculo conveniente
Aquæ Cheref. Nasturtii, Beccabung. Ur-
ticæ, Fœniculi &c. data. Vel usurpa-
 buntur *Spiritus volatiles salino-oleosi*,
 ad guttas 20. 30. vel 40. pro dosi,
 v. gr. *Spiritus salis armoniac. urinosus*
simplex vel anisatus, fœniculatus, la-
vendulatus, Spirit. C. C. Viperarum,
Eboris, Cranii aut Sanguinis humani
volatilis, Cochleariæ, Tincturæ Castorei
cum Spir. Sal. arm. parat. ʒri, Tinctura
Martis ʒrisata, ʒnii, Corallor. Essen-
tiæ Lignorum, Trisol. fibrin. Fumar.
Chelidoniæ major. Subinde Vina me-
 dicata aperientia, præsertim in princi-
 pio *Polypi* conducunt; v. gr.

R̄. *Radic. ʒ. aperient.*

Carlin.

Scrophular.

Cyperi rot. ana. ʒij.

Herbar. Chamædr.

Origani.

Anserin.

Nasturt. hort. vel aq. rec.

Card. bened. ana. Mj.

Flor. Genist.

Stæchad. Arab. ana. Mʒ.

Semin. Anis.

Apii.

Baccar. Juniper.

Laur. ana. ʒiʒʒ.

Θis Cent. min. ʒiiij.

Limat. Chalybis in nod. ligat. ʒiij.

00

Incis.

Incisis, contusis, atque in nodulo ligatis affunde Vini albi Veter. ℥iij.

Aqu. fontan. fervent. ℥ij.

Hinc mane atque vesperi horâ ante pastum Cyathus unciarum quatuor, plurimumve exhauriatur.

*! Euratio
Palpitationis à
sero acri
salso.*

Quando serum salsum acre, in Mediastini, Pericardii aut Thoracis cavitatem effusum, in culpâ est, tum Mixtura sequens, aut similis exhiberi cum fructu potest:

℞. Conserv. Fumar.

Meliß.

fl. Citr. vel

Aurant. ana. ʒß.

Pulv. Viperar. ppt.

Diaph. ʒial.

Spod. ex Ebor. ppt.

Corall. rubr. ppt. ana. ʒj.

Conf. Alk. compl. ʒiijß.

Syrup. fl. Tun. q. s.

F. Mixtura ad formam Opiat. d. ad Ollam. Dosis magnitudo Nucis mane ac vesperi.

Subinde simul corpus per vices purgabitur, quem in finem proderit sequens Mixtura:

℞. Oxymel. belleborat. Gesn.

Syrup. de Cichor. cum Rhab.

Aqu. fl. Sambuc. ana. ʒij.

Spirit. Cochlear.

Tinctur. ʒ. aperit. vel

ʒnii.

ʒri ana. ʒj.

Misc. detur ad Vitr. Dosis m. ac vesp. duo cochlearia, horâ unâ vel alterâ ante pastum.

Post hæc valida diuretica, diutius usurpata conveniunt; v. gr. ex sequentibus parata.

℞. Radic. Carlinæ.

Calam. arom.

Scrophular.

Ireos florent. ana. ʒß.

Herbar. Artemis.

Hed. terr.

Nasturt. aqu. rec. aa. Mj.

Salis Juniper.

Ononid. ana. ʒß.

Limatur. Chalyb. ʒiijß.

Semin. Urtic.

Fenic.

Dauc. ana. ʒij.

Incisis, contusis, ac in nodulo ligatis affunde Aquæ fervidæ atque Vini albi veteris ana. ℥iijß. Hinc m. ac v. per aliquot hebdomadas uncia 4. vel plures exhauriantur.

Poterimus etiam, si Vrinæ non multum lixiviosæ ac tinctæ fuerint, aliquoties dimidiam Radicis Jalappæ drachmam cum Jusculo, mane stomacho jejuno exhibere, ut ita serum superfluum evacuetur. Quin & Juscula Herbis nasturcinis alterata, vel talium Herbarum Succis expressi ac filtrati ad duas m. ac v. uncias propinati conducunt. Vel Cephæ albæ radicem per triduum aut quatrimum mane sub cineribus assa, hinc decorticatam comede, sic per Vrinam copiosè serum purgabitur.

Ab irâ vel exercitatione corporis nimia productum malum vel per se paulatim corporis & animi quiete cessare solet, vel haustu uno alterove Aqu. Card. ben. Borrag. Scabios. aut Beccabungæ dissipatur. Si verò nihilominus continuet pulsare nimium Cor, Venæsectio simul in Brachio institue-

tue-

tuetur, atque cum prædictis Aquis per aliquot dies m. ac vesp. dimidia drachma $\frac{1}{2}$ nîi diaph. & Ocul. $\overline{\text{O}}$. ppt. unâ cum Roob Sambuci æquali dosi dabitur.

Ab *Æstu* corporis *excessivo* in Febribus vel extra eas excitata *Palpitatio* Julepi refrigerantis haustu curabitur, v. gr.

R̄. *Aqu. Scab.*

Endiv.

Lactuc. ana. ʒij.

Syrup. Rub. id. vel

Berber. vel

acetos. Cit. ʒiʒ.

Spir. Nitr. q. s. ad grat. acid.

M. f. Julepus d. ad Vitr. Sumatur aliquot vicibus.

A *Mensium* vel *Hæmorrhoidum* retentione producta *Palpitatio* remediis curatur emenagogis, prout suo loco monstratur.

Quando autem à nimia qualicunque *Hæmorrhagiâ*, indeque proveniente magnâ serositate humorum circulantium, debilitatoque inter solidas Cordis fibras, & fluidum transiens æquilibrio malum inducitur, difficile profecto est illud, & *Cachexiam*, *Hydropem*que thoracis, aut reliqui corporis universalem post se facile trahit; hinc ea in usum vocanda, quæ balsamicum Sanguini florem restituere promptè valent, id quod *Juscula consumata* optima quotidie pluries hausta, *Vini rubri* & generosi modicus potus post singulas menses, usus *Decocti granor.* *Coffè* & *Succolatæ Indorum*, optimi succi *Cibi*, *aromatibus conditi*, *Carnes teneræ assæ*, *Vita tranquilla ac*

bilaris, *Corporis modicū exercitium*, ac præterea sequentia remedia præstare valent.

R̄. *Θis volat. oleos. Sylv. ʒʒ.*

Detur ad Vitr. Dosis 20. vel 25. guttæ m. ac vesp. cum Vino generoso.

Vel R̄. *Elix. Vit. Matth. ʒij.*

Essent. Absynth.

Cort. Aur. ana. ʒj.

Misc. d. ad Vitr. Dosis cochleare plenum post singulos pastus.

Vel R̄. *Conserv. fl. Tunic.*

Ros. rubr. ana. 3vj.

Nuc. Indic. cond. ʒiʒ.

Succolat. Indor. ʒʒ.

Conf. Alk. compl. ʒiʒ.

Specif. stom. Poter.

Matr. Perl. ppt. ana. ʒj.

Syrup. de Cinam. q. s.

F. Mixtura ad formam Opiat. d. ad Oll. Dosis m. vesperi ac noctu magnitudo Castaneæ vel Nucis moschat.

Ipsa Succolata cum Lactæ & Ovis præparata, & quotidie sumta valde etiam juvat heic. Probamus tandem usum unius vel alterius *Balnei Aquæ dulcis* non ita ferventis, cum incitatione *Herbarum cephalicarum* & *traumaticarum*.

A *Terrore nimio*, *Metu continuo*, *Tristitiâ* excessivâ sensim excitata *Palpitatio* requirit volatilia, omni acido resistentia, vel illud validè destruentia remedia; unde profunt *Spiritus Cochleariæ*, *Salis armoniac. anis. Tincturæ* $\frac{1}{2}$ nîi, *Corall. ʒtis* *Frisata*, *Salia volatilia C. C.* aut similia, *Oculi* $\overline{\text{O}}$. ppt. *Diaphoretic. ʒial. ʒvial.* *Specif. stom. Poter. Corall. rubr. vel alb. ppt. &c.* cum *Aqu. Scolopendr. Borrag. Bugloss.*

A terrore, metu ac tristitiâ.

Fumar. Card. bened. ac simil. exhibita. Conducunt & *Juscula antiscorbuticis Plantis alterata*, vel *Aquæ talium Herbarum destillatæ*, aut earundem non secus ac *splenetic. ficcatarum Infusa* ad modum *Infusi fol. Thée* quotidie sumta. *Æstivo tempore potus Thermarum Fabariensium, Embsensium, aliarumve*, vel *Acidularum* concedendus: Animus ad tranquillitatem, & hilaritatem excitandus.

A Flatibus.

A *Flatibus* productus Affectus facile tollitur injectis *Clysmatibus carminativis* pluribus, exhibitis sex vel pluribus dosibus *Panacæ solutivæ alcalinæ*, atque deinceps propinatis *Aquis Physagogis* per cochlearia, aut *Essentiis carminativis* quolibuscunque guttatim exhibitis.

ALumbricis.

Si verò denique à *Lumbricis Intestinorum*, aut *Vermibus Pericardii* orta fuerit *Palpiratio*, tum anthelmintica conveniunt medicamina sub titulo de *Lumbricis* commendata.

Tremor Cordis.

CORDIS TREMOR est motus depravatus, quo Cordis musculus ob inordinatam spirituum animalium impressionem tremebundè pulsat, ac sæpius simul pectoris angustiam sive anxietatem excitat.

Causa.

Producitur hoc Malum ab impedito nonnihil, hinc & vibrativo quodam Spirituum animalium in fibrillas musculi cardiaci nervosas, earumque interstitia influxu vel impressione; unde fasciculi fibrarum cordis motricium inæqualiter tenduntur, & ita pulsum ejus inordinatū efficiunt. Sed & dyscrasia atque inæqualis con-

sistentia *Massæ sanguineæ*, hincque diversimoda irritatio ventriculorum cordis, nunc fortiolem, nunc remissiolem, modò celeriolem modò tardiolem ejus pulsationem excitat: quod in illis maximè contingit, quorum sanguis ferofior est redditus, ac ad dissolutionem totalem inclinat. Denique elater fibrarum Cordis debilitatus causa Tremoris esse potest, quando sanguini circulanti & irritanti, aliàs benè constituto validè satis reniti haud potest.

Quoad *Diagnosin*, non facilius cognoscitur istud malum, quàm ex applicatione, manus ad thoracem *Ægrorum*; dum hi ipsi non semper Tremorem hunc perferunt; & quamvis aliquando tale quid sentiant cum anxietate, nesciunt tamen satis ipsum definire morbum. Plerumq; aliis morbis supervenit, velut *Febribus* malignis, *Hydropi pectoris* &c. Si sanguis est in culpâ, tum aliquid ejus è seclâ venâ extractum valde ferofum ac fluidum apparebit. Si tonus vel elater fibrarum debilitatus, tum sanguis erit bonus. Si obstructio quorundam tubulorum nervosorum Cordis, adeoque flacciditas eorum accusanda est, tum quidam vel torpor, vel sopor præternaturalis, aut lassitudo aderit. Jungitur huic Tremori sæpius anxietas præcordiorum, somnus interruptus, inquietudo.

Cum itaque Tremor Cordis vel de obstructione quorundam ejus nervulorum, vel de inæquali fluido-ferosâ consistentiâ *Massæ humoralis*, vel de elatere aut tono fibrarum Cordis nervearum plus minus debilitato

teste-

testetur, funestum sæpè præfagit eventum, præsertim si diutiùs duret, si Febri jungatur malignæ, & ad usum remediorum neutiquam mitigetur. Quin & indicium præbere solet Humorum ad dissolutionem tendentium, quam subsequitur facilè circulationis humorum destructio & mors. Vel Affectus post se trahere solet Hæticam, Apoplexiam, Hydropem pectoris & Ascitem.

Curatio instituenda est ita, ut vel sanguini justa & æquabilis restitatur consistentia; vel tonus & elater fibrarum cardiacarum naturalis revocetur: prius obtinetur nec per *purgantia*, nec per *Venæsectionem*, quibus Massa sanguinea adhuc magis turbaretur aut funderetur, sed per *mitia absorbentia, confortantia, blandè spiritiosa*, inprimis etiam *martialia*: quem in finem commendamus *Diaph. Jis, Crocum Jis aperitiv. specif. Anti-hæct. aut stom. Poter. Ocul. ꝑpt. Bezoard. min. Sanguin. Hirc. ppt. C. C. phil. ppt. Ebur phil. ppt. ½ n. diaph. Unic. fossil. Dentem Hippopotam, ppt. Tinctur. J t. aperit. vel Tinct. ½ n. Essent. Virg. aur. Beton. Bellid. min. Spirit. salis armon. anis. ̄volat. oleos. Essent. Ambr. Aqu. destill. fl. Acac. Borrage. Bugl. Rosar. Meliss. fl. Til. Lilior. convall. &c.* ex quibus variæ formulæ possunt componi.

Elaterem ac Tonum fibrarum resuscitamus, simulque obstructions referamus per *Cucurbitulas cum scarificatione* dorso applicandas, *lenes purgationes repetitas*, ac blanda spiritiosa sæpius exhibita, quemadmodum sunt *Conf. Alb. compl. Essentia Beton. Succin.*

Ambræ. Spirit. Sal. armon. anis. fœnicul. &c.

CORNEÆ Oculorum TVNICÆ DISCOLORATIO, est ejusdem à nativo suo colore deflexio; adeoque symptoma qualitatis mutatæ in ea parte Oculi, quàm *Corneam* appellamus *Tunicam*. Hæc tunica Oculo propria existit, reliquas omnes suâ amplitudine excedens, dura & crassa, hinc *Sclerotica*, *Σκληρότις* Græcis dicta, antèrùs Cornu instar pellucens, & polita, unde nomen ortum, posterùs opaca, diversis fibrarum filamentis ita intertexta, ut difficulter ipsam dilaceraveris; ex aliquot item lamellis membranaceis composita, quemadmodum id *Pustulæ* vel *Vlculæ* testantur, inter pelliculas istas *Corneæ* nata, ac subinde plana existentia, qualia certè fieri non possent, si humor inibi stagnans circum circa æqualiter premeretur, sic enim *Pustulæ* magis rotundæ evaderent. Format autem *Cornea* velut utriculum quendam, cavum & rotundum quo reliquæ, interiores nimirum, Oculi partes continentur, atque in globosam figuram cœercentur, unde nomen *Globi* vel *Bulbi* etiam adeptæ fuerunt; quamquam rotunditas per totum Globum perfecta non sit, quoniam trans parens *Corneæ* portio nonnihil eminentior est reliquâ ejusdem superficie, & ita in Homine quidem ac plerisque Animalibus quadrupedibus, partem efficit *Circuli*, cujus diameter octavâ circiter parte minor esset diametro *Circuli*, quem *Sclerotico* toto suo ambitu efficit. Accipit præter hæc

Cornea discoloratio.

Cornea descriptio.

Cornea suas quidem *arteriolas* à ramo Caroditis Nervum comitante opticum; *venulas* autem, ad jugularem truncum sensim progredientes, & ramulos quosdam nerveos, à quinto pari descendentes. Omnia hæc vascula non tantum in Scleroticam expanduntur, sed & eandem ex parte transeuntia in Vveam, cœterasque interiores partes Oculi distribuntur. A parte posteriore Nervus opticus Corneam penetrat, atque in transitu ita firmiter eidem connectitur, ut à se invicem neutiquam separari queant.

*-jus co-
or natu-
alis.*

Colorem hæc Tunica naturaliter quidem antè in parte transparente glaucum plerunque, in reliquo autem ambitu opaco, quem conjunctiva membrana tenuissima obtegit, album habet. Mutatur verò utrobique color præternaturaliter à variis causis, velut à Sanguine stagnante in *Sugillatione*; à Lympha & Sanguine simul subsistente in *Ophthalmiâ*, à Cicatricibus Ulcusculorum, Pustularum, à Maculis, à Succo nutritio corrupto in *Ictero flavo & nigro*, atque aliis causis. Ejusmodi *Discolorationes* proin cum sint Symptomata Qualitatis mutatae, neque valde urgeant, per se Curationem expressam non requirunt, sed medela ipsarum causis diversis adhibetur, quæ plerunque sunt certi Morbi, quibus profligatis, ipse Color Oculi naturalis per se redit.

*Cornea
obscura-
tio.*

CORNEÆ OBSCVRATIO est partis ejus anterioris perspicuitas læsa, ita ut radii visivi lento gradu, neque confertim transire queant, sicque Vi-

sionis sensus debilitetur, ac Homines objecta externa veluti per nebulam quandum cernere cogantur. Ortum ducit hoc Symptoma qualitatis mutatae vel à Corneæ densitate per affluentem copiosiore succum gelatinosum præternaturaliter auctâ, quæ si recens fuerit, medelam haud difficilem hætenus admittit; vel ab ejusdem siccitate, paulatim ob succorum affluentium penuriam in Senectute introductâ, quam corrigere vix licet.

In priore specie Ægrum subinde *Pilulis marocostinis*, aliisve cum *Mercurio dulci* mistis purgamus, *Venam* quoque *Brachii* incidimus, *Cibos* boni succi, *Aromatibus* benè conditos suademus, *Vinum* ex Infusione *Radic. Calam. arom. Chelid. major. Herb. Beten. Euphras. Baccar. Junip. ac Seminis Fœniculi* quotidie bibendum concedimus. Externè Oculorum bulbis sæpè inspergimus Pulverem *Lapid. calam. ppt. Magister. Zinci* vel *Marcafit.* cum *Sacchar. cand. alb.* Applicamus quoque clausis oculis linteola *Spiritu Anhaltino*, aut *Anthos* turgida calentia.

CORNEÆ Oculorum Tunicæ PVSTVLÆ, sunt parvæ vesiculæ sero plus minus falso-acri, quandoque etiam humore purulento repletæ, in Tunicâ Corneâ, imò & Conjunctivâ simul efflorescentes, pruritu ac dolore molestæ, sæpiùs & corrodingi vi ulterius serpentes, atque nunc interius cum visionis læsione, nunc exterius erumpentes, & *Ulcuscula* aperta formantes. *Phlyctænas* quoque nominant, quando sero aquoso plus minus turgent.

Gene-

Generantur autem à fero quodam falso, nunc tenui & aquoso, nunc purulento crasso & acri, in extremitate tubuli cujusdam inter lamellas Tunicarum ita subsistente, ut tandem cum transpirare nescit, extravasatum parvulam quandam vesiculam efformet, cineritii ut plurimum coloris. Nonnunquam externæ quoque causæ violentæ v. gr. Ardor Solis, res acres oculo illapsæ, occasionem præbent stagnationi cujusdam Lymphæ, quæ si falso-acris evaserit, & sui acrimoniâ acidâ fibrillas eroderit, Pustulam unam vel alteram excitat. Datur & *Pustula variolosa*, cum Variolis in Oculi bulbo efflorescens. Tandem remedia Ophthalmica peioris notæ similiter tubulos Corneæ adstringendo, vel nimis rodendo, ejusmodi Pustulas producere valent. Ut plurimum verò solent esse pedissequæ Ophthalmiæ.

Facile verò hic cognoscitur Affectus; Vesicula nimirum est parva, nunc transparens & *Phlyctæna* dicta, coloris varii pro diversitate loci in Oculo: nunc opaca magis, & purulento humore turgida, quæ à nonnullis simpliciter *Pustula* nuncupatur, & primum quidem in ambitu rubet, deinceps verò genito pure albescit. In *Prognosi* dicendum, non semper feliciter evanescere talem Pustulam, quandoque enim major reddita, de loco quasi in locum cedit, & Vlcus malignum facit. Rumpitur etiam Pustula nunc exterius, & facile curatur, nunc interiùs, quæ difficiliùs sanatur, & plerunque Ægrum vi-

sione nunc totali nunc partiali privat. Si Pustulæ juxta pupillam existant, difficilius abiguntur; si verò in Adnatâ solum tunicâ hærent, faciliùs curantur: superficiariæ enim Pustulæ profundioribus semper sunt sanabiliore; eò quòd interiùs erumpentes, ipsamque corneam perterebrantes facile in Vlcuscula sinuosa aut fistulosa abeant.

In *Curatione* talium Exanthematum ante omnia corpus purgabis remedio quodam mercuriali, ubi inprimis commendantur *Pilulæ ex Mass. Pilular. è Succ. Craton. Extract. panchy-mag. Croll. Pilulis Emanuel. Mass. pilul. hydropic. Bont. &c. cum Mercur. dulc. vel Cinnabar. ꝯn. & Ol. still. Fenicul. paratæ. Postea internè vel Acidulæ sunt bibendæ, vel Lac caprillum integrum ad aliquot septimanas hauriendum. Dein & Tragma quoddam Ophthalmicum concinnabitur, ab Ægro per plures menses sumendum, non tantum curationis, sed & præservationis scopo: v. gr.*

℞. *Radic. Chelid. maj.*

Valerian. ana. ʒiij.

Caryophyllat. ʒij.

Semin. Rut. ʒj.

Fenicul. ʒiij.

Herb. Euphras. ʒij.

Ocul. ʒv. ppt.

ꝯn. *diaph.*

Corall. rubr. ppt. ana. ʒiij.

Nuc. moschat.

Lign. aloes.

Cardamom. ana. ʒj.

Sacch. alb. ʒiv.

M. f. Pulv. subt. pro Tragmate, de quo

quo man. ac. v. ʒij. capiantur. Vel etiam *Tinctura* ʒ nī, *Essentia Fœniculi*, *Hyperici*, *Bellid. min.* *Numular. Vincetoxic.* ad plures vel pauciores guttulas pro ætatis ratione frequenter m. ac v. concedetur. Quibus addimus *Decoctum* aliquod *traumaticum* è *Betonica*, *Veronica*, *Euphrasia*, *Vincâ pervincâ*, *Semin. Fœniculi*, *Radic. China*, *Sarsaparill.* *Lign. Sassafr.* *Santalalis* &c. confectum. In Adultis Venam brachii secare, *Cucurbitulas* cum scarificatione dorso applicare, atque Vesicam in Nuchâ excitare licet, imò oportet. Dein verò ulterius

Externè *Liquores Ophthalmici* primùm quidem refrigerantes, exiccantes aut discutientes in usum trahentur, ex *Aquis Fœnicul. Chelid. maj. Plantag. Euphras. Flor. Cyan. Brunell. Flor. Ligustr. Succis. Rosar. albar. cum Mucilag. Semin. Cydon. Aqu. Plant. fact. Tutia ppt. Lapid. calamin. ppt. Ocul. ʒ. ppt. Flor. Zinci, Sacch. Saturni. &c.* parati, & calidè sæpius guttatim in Oculum demissi.

Quibus cautè etiam addi potest vel *Vitriolum album* ad aliquot grana; Vel *Crocus metallorum* incoqui. Si quis tamen *Balsama* felicius toleret, ji parari poterunt ex *Butyro rec. non salito*, vel *Axungia Serpentum*, *Urinâ humanâ* aut *Aquâ Chelidon. sæpius lotâ*, permiscendo dein *Tutiam ppt. Sacch. Satur. Mercurium præcipitatum rubr. vel alb. Æruginem* &c. cujus *Balsami* granum subinde Oculi bulbo indi potest. Sunt qui prorsus diductis palpebris inspergunt *Pulverem* ex *Sacchar. cand. alb. Ocul. ʒ. ppt. & Lapid.*

calamin. ppt. factum, cui in casu necessitatis, ad vim fortiolem reddendam etiam granum unum vel alterum *Æruginis* aut *Oli albi* permiscunt. Quod si ex usu talium remedium Inflammatio quidem discussa fuerit, & nihilominus Pustula remanserit, tum *Collyrium emolliens* atque *resolvens* simul in usum vocabitur, quale sequens esse poterit:

℞. *Radic. Chelid. maj. ʒij.*

Alth. ʒß.

Scorzon. ʒj.

Flor. Melilot.

Verbasc.

Herb. Euphras.

Fol. Hierac. ana. pj.

Incisa coque parum in Aqu. Euphras. Succis. ana. ʒiij.

Postmodum infunde *Croci opt. grana 12.* De liquore hinc filtrato pluribus vicibus aliquot guttulæ Oculo instillantur tepidè. Neque etiam *Amuleta* intermittuntur, quæ quidem sub formâ *Sacculorum herbaceorum* de collo antèrius vel inter scapulas suspenduntur. *Sacculis* ipsis verò indunt *Radices Valerian. Angel. Caryophyllatæ folia* atque *radices, Herbam Succis. Rutæ, Pilosellæ, Satureiæ vel Thymi; Chamæcisti, Verbenæ &c.* Tandem & ipsa Oculi Pustula ne serpendo Vlcusculum profundius excitet, cautè vel lanceolâ ad latus incidetur, vel acupertunderetur, hincque facto Vlcusculo, statim *Collyrium detergens & exiccans* tepidè sæpius instillabitur, ex *Aqu. Ros. alb. Plantag. Brunell. cum Mucilagin. Semin. Cydon. Tutia & Sacch. cand. alb. paratum*, cui etiam ali-

aliquot grana *Vitrioli albi*, *Liquor vesicularum Ulmi arboris*, si haberi potest, vel saltem succus folior. *Alth. Symphyti*, *Verbasci*, *Hieracii* cujuscunque aut *Tragopogonis albicans*, & lacteus permisceri pro lubitu possunt. Atque ita instar *Vlceris Oculi* perfanabitur.

In *Dietâ* prohibemus omnia valdè salita, flatulenta, acria, aromatica, vinum, iram &c. Potûs a loco concedimus *decoctum Baccar. Juniper. Sem. Fenicul. C. C. rasi* &c. Præservativi loco, ad impediendas ulteriores *Pustulas*, capilli Capitis non sine fructu minuuntur, *Setaceumq;* in *Nuchâ*, vel *Fonticulus* in *Brachio* excitatus per unum alterumve annum gestabitur. In eruptione *Variolarum*, ne *Pustulæ* quoque *Oculorum* bulbos adoriantur, statim à principio earum *discutiens Collyrium* sæpius tepidè instillari debet, v. gr.

R̄. *Aqu. Spermat. Ranar. Plantag. ana.* ʒij.

Mucilag. Sem. Cydon. Aqu. Plantag. fact. ʒj.

Croci orient. ver. gr. 12. Camphor. ʒss.

Misc. stent per trihorium in loco tepido, postmodum filtrato Liquori adde Tutie ppt. ʒiiij. Detur ad Vitr.

CORNEÆ VLCVS, est Morbus solutæ unitatis, à sero quocūq; salso-acri-acido, fibrillas tunicæ oculorum corneæ subinde haud citra dolo-rem erodente oriundus. Subsequitur hinc ut plurimum *Ophthalmiam*, *Abcessum*, *Pustulam*, *Vulnus*, & in

universum omnes continui in *Oculo* solutiones.

Veteres *Corneæ Vlcera* divis-
runt in *superficialia* & *profunda*. *Superficialia* plerunque excitantur vel à se-
ro salso acri è glandulis destillante, ac
superficiem *Adnatæ* & *Corneæ* lanci-
nante; ve' à pulvere, & minutis aliis
rebus externis, asperitate suâ læsio-
nem afferentibus. Quatuor etiam
horum species, non nisi gradu inter
se discrepantes, recensentur, quarum
prima, *Achlys* sive *Caligo* dicta, instar
tenuissimæ nebulæ in transparente
Corneæ parte, quam ferè totam oc-
cupat, apparet, atque non videtur
quid esse aliud, quàm levissima exco-
riatio epidermidis, quæ hinc citò re-
stituta nullam post se relinquit *Cica-
triculam*. *Secunda* dicta *Nephelion*
sive *Nubecula*, priori nonnihil pro-
fundior, & magis alba est exulcera-
tio, sed minus spatii occupans, quæ-
que sanata cicatriculam post se re-
linquit valdè tenuem, & visui non-
nihil incommodam, si in loco pupil-
læ versetur. Ante quadriennium ta-
lem speciem observare contigit in
Viduâ sexagenariâ, *Variolis* laboran-
te, in cuius *Oculo* dextro enata *Pu-
stula* superficialia feliciter quidem
aperta, mundificata & sanata fuit,
sed relictâ cicatriculâ transparente,
quæ mediâ in loco pupillæ partē oc-
cupabat, atque ita hucusque Visionis
sensum tantillum offendebat, dum
per unam *Pupillæ* partem res probè
conspiciebat, per alteram verò eas-
dem tanquàm per tenuissimam ne-
bulam cernere cogeatur. *Tertia*
Pp spe-

Differen-
tia.
Superfi-
cialia.

Achlys
S. Caligo.

Nephelion, s.
Nubecula.

Argemon, f. Ulcus rotundum.

Species, *Argemon*, Vlcusculum est rotundum, magis profundum, quod apertas plerunque Pustulas vel Variolas subsequitur; album, si pellucidam, rubens verò, si reliquam albam Corneæ portionem tenet. Cicatrix huic superinducta, si Pupillæ locum præcisè occupat, visum magis intercipit. Quarta denique species, omnium pessima, Vlcusculum est inæquale, cinericei coloris, dolore ardente & pruriente molestum, hinc *Epicauma* dictum, quod malè tractatum faciliè in sordidum & profundum Vlcus degenerare potest.

Profunda.

Profunda Corneæ Vlcera à ruptis Abscessibus, vel acceptis Vulneribus oriunda, in tres quoque species distincta fuerunt, nimirum in *Bothrion*, f. *Fossulam*, quæ Vlcusculum est angustum & durum, colorem impetrans in loco Pupillæ albicantem, si cicatrizetur; extra illum verò in ambitu suo valdè rubescens, in medio autem nigricans. 2. *Celoma* vel *Cavitatem*, Vlcusculum magis latum, nec ita profundum sicuti præcedens. 3. *Encauma*, Vlcusculum valdè sordidum, pruriginosum, quod crassam, inæqualem, & peioris notæ saniem fundit, hincque cicatricem deformem, & crassam, visionis sensum intercipientem, post se relinquit, modò Pupillæ locum obtegere potuit.

Cornea Tyosis.

CORNEÆ ABSCESSVS, seu HYPOPYON, *Pyosis*, *Lunella*, est collectio puris inter pelliculas tunicæ Corneæ Oculi, vel inter Corneam & Vveam, vel inter utramque & Hu-

mores facta, Ophthalmiam graviolem, Pustulam sinistrè curatam, Contusionem sive Ictum acceptum, indeque extravasatum ac suppuratum sanguinem ut plurimum subsequens. Dum formatur talis Abscessus, inflammatio atque dolor lancinans maximè intensus adest. Quando pus est inter pelliculas ipsas Corneæ, tum leviusculum quoddam, & instar alicujus Clavi acuminatum tuberculum apparebit, sed quando idem est inter Vveam & Corneam, vel etiam subter Vveam genitum, tum extus in Oculo tuberculum nullum conspicietur. Si *Pyosis* est inter pelliculas sive lamellas partis Corneæ diaphanæ, tum patescit hoc exinde, quando ad latus Oculum inspicendo, retro Abscessum Iridem atque Pupillam in statu naturali cernere possumus. Aliàs cognoscitur præsentia hujus mali, quando vel pustula vel macula quædam albicans aut cineritia, major vel minor in Oculi Bulbo apparet; præcessit causa ut plurimum manifesta: dolor semper adest, neque pure utcunque formato multum minuitur. Morbus est Visioni maximè infensus, utpote cujus usum plerunque tollit, sive per Vlcus inde formatum, sæpissimè malignum & sordidum; sive per Cicatricem subsequentem crassam; sive per rupturam ipsius Corneæ, indeque factam Vvæ proci dentiam, nec non humoris Aquei effusionem, ac reliquorum dislocationem; sive denique per totalem Oculi suppurationem. Nihilominus tamen etiam hoc tenendum, minutos

Cor-

Corneæ Abscessus, qui magis sunt versus exteriorem ejus superficiem constituti, aut in opacâ ejus parte formati, felicius curabiles esse.

Symptoma est frequentissimum, Ophthalmias, Pustulas, Vulnera, Abscessus atque Vlcera Oculorum comitans, ob quod Ægri lumen externum sine magnâ doloris exacerbatione tolerare nequeunt; hujus autem phænomeni ea videtur esse causa, quod cum talibus Affectibus simul tunica Oculi Retina per consensum affligatur, atque hinc ab incurso radiorum luminosorum ad spasmodicas veluti crispationes incitetur.

CORNEÆ VVLNVS est Morbus solutæ unitatis, à re quadam externâ violentâ sive pungente, sive incidente, sive contundente, in istâ tunica excitatus, ut sæpè per eandem ruptam humor aqueus effluat, vel saltem Vvea tunica nonnihil procidat.

Singuli hi Morbi, quemadmodum ex solo adspectu, vel ipsâ Ægri relatione haud difficulter cognoscuntur, ita earum quoque causæ efficientes ex ipsâ descriptione patent. Interim Morbi sunt, utut per se minimè lethales, attamen valdè molesti, dum sæpè difficiles sunt curatu, præsertim si profundi fuerint, & Ophthalmias, Cephalalgias, Corneæ rupturas, Fistulas, Excrecentias carneas, & Cicatrices visui nocivas post se trahant. Si superficiant, rii tamen Morbi existat facilius & citius, sine magnâ visionis læsione curantur, nisi pupillæ regionem nimis occupaverint. Quæ Vl-

cera saniem fundunt acrem, vicinas partes arrodentem, sive tenuem, sive crassam, rubentem aut nigricantem, quæque à continuo humorum acrium affluxu in subjectis cacochymicis, scorbuticisque foveantur, difficulter admodum mundificari possunt, ac subinde totius Oculi suppurationem post se trahunt. Quorum Oculi vel ab Vlcerebus præcedentibus, vel à Senectute, vel à Catarrhis falsis, vel ab exhalationibus candelarum debilitati fuerunt, quiq; Ciliorum pilos incurvos, oculum semper pungentes, obtinent, ii talibus Vlcerebus valde obnoxii sunt.

In *Curatione* autem, *Vulnerum* ^{*Curatio.*} quidem Venæsectio, Vlcerebus verò purgans mercuriale ante omnia prodest. Deinceps externè omnia ea adhiberi possunt remedia, quæcunque superius jam adversus *Corneæ Pustulam* commendata sunt.

Vlcera inprimis requirunt medicamina acidum acre destruentia atque obtundentia, imò simul Inflammationem compescentia, ac discutientia; quem in finem profunt, post universalia præmissa, *Venæsectionem* scilicet, *Alvi elotionem*, *Cucurbitulas cum scarificatione* dorso applicatas, *Tutia*, *Pompholyx*, *Magist.* vel *Sacch. Saturn.* *Myrrha*, *Aloe*, *Camphora*, *Lapid. calamin.* *Magisterium* & nri optimè edulcoratum; quæ vel cum *Axung. human.* aut *Serpentum Aquâ Plantag. lotâ* in *Balsamum Oculorum vulnerarium*; vel cum *Aquis destillatis Ophthalmicis* v. gr. *Chelidon. maj. Plantag. Brunell. Flor. Cyan. Sanicul. Geran.*

robertian. *Euphras.* &c. in *Collyrium*, tepidè *Oculis* sæpius instillandum & applicandum, concinnabuntur. Cui nonnulli circumspèctè deterfionis gratiâ immisceant guttulas quasdam *Spiritus Vini camphorati*, vel *Spirit. Sal. arm. urinos.* Ad maiorem consolidationem adstringentia quoque in usum vocantur, veluti sunt *Infus. florum Balaustiorum*, *Cortic. Gran. Plantag. Flor. Cyan. Macilago Seminis Psyllii*, vel *Cydoniorum*, ejusmodi infusis, vel aquis destillatis extracta. In *Vlcere superficiali*, ubi magna non adest *Inflammati*o, sequens *Collyrium* maximè proderit:

℞. *Aqu. Hierac. Plant. ana.* ℥ij.

Lap. Calam. ppt. ℥ij.

Trochisc. alb. Rhas. s. opio.

Sacch. cand. alb. ana. ℥j.

Vitrioli alb. ℥ss.

Gum. Arab. Aquis priorib. soluti
gr. 12.

M. d. ad Vitr. Instilletur tepidè decies vel duodecies quotidie. Possunt etiam quinque vel sex grana *Camphoræ Saccharo candid. albo* prius contrita permisceri.

Quod si talia remedia *ophthalmica* nimis siccant, aut calefaciunt, tum mitiora sunt præscribenda: si verò nimis humectant, & sordidiora *Vlcera* reddunt, tum remedia magis siccantia & absorbentia fortiora sunt adhibenda.

In *Vlcere profundo*, si *Inflammati*o magna non adest, dolorque mitior existit, superiori *Collyrio* adhuc grana tria vel quatuor *Aloës & Thuris* addi possunt. Si malignitas simul

adfuerit, etiam *Mercurius præcipitatus albus* vel *ruber* permiscebitur.

In formâ siccâ sæpius optimo cum succellu *Oculo ulceroso* inspergitur *Pulvis*, v. gr. sequens:

℞. *Sacch. cand. alb.* ℥i℥.

Tutia ppt. ℥j.

Sacch. Saturni ℥ss. ad ℥j.

Radic. Ireos flor. ℥ss.

Vitrioli albi gr. vj.

M. f. Pulv. subt. ter vel quater per diem oculo inspergendus.

Si *Hypopyon* adest, tum pus omni arte est expellendum ac educendum, cumque etiam in finem exitus incisione, si opus videbitur, parandus; hinc statim dolor applicatione *Lactis fæmin. cum croco* sedandus. Dein *Aqua Chelidon. majoris*, vel *Succus Plantag. Hieracei, Scabios. &c.* cum *Aloë & Myrrha* ad fordes purulentas eluendas tepidè sæpius adhibendus; atque hinc demum ad consolidantia superius recensita est deveniendum. Ad meliorem deterfionem aliquando opus est simul *Cataplasmate* ex *Pomis putrid. Flor. Melilot. Chamom. Herb. Fœnicul. Euphras. Chelidon. &c.* composito, & frequenter calidè applicato. Prodest etiam *Linimentum ophthalmicum Hartmann.* ex *Melle rosaceo*, ac *Felle Anserum* vel *Gallarum* in *Vitro* ad *Linimenti* formam concinnatum.

℞. *Butyr. rec. non saliti & Vino albo defæcato* probè loti. ℥ss.

Axung. Serpent. ℥j.

Fell. Lucii pisc. ℥ss.

Magist. ꝑn. diaph. ℥i℥ss.

Tut. ppt. ℥ij.

Mercur. præcipit. alb. ℥ss.

Œli alb. gr. jv.

M. f. Bals. d. ad Pyxid. Ter vel quater de die Pisi magnitudo Oculo indatur.

Si quantitas puris subfit, tum si-phunculus quidam affabre in hanc rem constructus (inque tubuli medio ventrem habens, quò pus extrahendum facillè recipi queat,) foramini incisione aut puncturâ facto insinuetur, sicque pus vel pistillo, vel suctione à famulo extrahatur, & exsugatur. Extracto autem pure Vlcus studiosè extergendum est Decocto Hordei cum Melle rosaceo; Vel Aqu. Verben. Plantag. Burs. pastor. Liquore Vesicular. Ulmi, Mucilagine Semin. Cydon. cum Tutiâ, Thure, Lapide Calamin. ppt. additis etiam Succis Plantarum supra dictarum.

Vidimus notabilia hujus Mali exempla satis feliciter curata; unum quidem in Puellâ rustica 15. annorum, nondum menstruatâ, cui per frequentem Ophthalmiam tandem pus sub Corneâ Oculi dextri enatum fuit, quod dein acrimoniâ suâ duo foramina in Corneâ produxit, non multum à se invicem distita, unde partim elapsum pus, partim simul procidens Vvea in exteriori tunicâ Adnatâ tuberculum efficiebat, suâ magnitudine phaseolum penè æquans, non sine Visionis magnâ obscuritate, & aliis incommodis, citra tamen notabilem dolorem. Tuberculum verò illud, quod prius erat verum Hypopyum, beneficio Balsami prædicti nostri Ophthalmici apertum, factumque inde Vlcus ita detersum brevi, retractaque

per se Vveâ consolidatum fuit, ut postmodum foramina Corneæ prædicta non nisi instar macularum albicantium extra Pupillæ regionem comparent, Visionis sensu perfectè restituto. Alterum exemplum contigit in Puella lactente anniculo, qui Variolas copiosissimas acres feliciter evasisse videbatur, sed subito postea dextri Oculi Inflammatione, totum Bulbum occupante, prehendebatur; è qua dein pustula albicans juxta Iridem enata verum Hypopyon exhibuit, cujus purulento-acris materia quadridui spatio Corneam ita perripuit, ut inde Prolapsus Uveæ excitaretur, capitello Muscæ & magnitudine & colore persimilis, quem postea solo Balsamo nostro ophthalmico discussimus, & ad cicatricem deduximus, alit Visionis sensum perfectum, propter Corneæ structuram in regione Pupillæ nimis graviter laceratam, reddere haud potuimus.

In *Vulneribus* externè hætenus commendata remedia quoque conducunt, citoque admodum consolidationem procurant: In principio tamen statim imponatur *Albumen ovi*, cum *Aqu. Chelidonie*, *Croco pulverisato*, & *Tutiâ*, calidiuscule. Præterea simul *Lintea* frequenter applicentur, *Decocto Bacc. Juniper. Flor. Chamomill. Herbar. Fenicul. Caryophyllat. Beton. Euphras. Lavendul. Marrub. alb. Scabios. Hieracei, Plantag. in Aquâ facto*, immersa & expressa.

Dolores Vulnera comitantes optimè compescit *Cataplasma Ophthalmicum Cnæphelii*. R. *Pomor. dulc.*

n. iij. Coqu. in q. s. Aqu. Rosar. & Euphras. ad mollitiem, trajiciantur hinc per setaceum, pulpæ trajectæ adde Sacchari cand. alb. ʒij. Camphor. gr. v. Misce & applica calidè. Si quid Oculo illapsum est, velut pulvis, festuca, Mufca &c. instrumentis artificiosè eximatur, & hinc Collyrium demulcens applicetur.

Internè in his omnibus Affectibus pro re natâ conducunt *Decocta vulneraria*, quæ ingrediuntur *Radic. Valerian. Rut. Caryophyllat. Herb. Succis. Euphrasie, Chelidon. Apii, Beton. Verben. Sanicul. Bacc. Juniper. Semin. Anis. Fœnicul. Dauc.* Profunt etiam *Essentiæ traumaticæ* ad acidi correctiorem. v. gr. *Bellid. minor. Numular. Gramin. Parnass. Fœnicul. Tinctura item Antimon. &c.*

In *Dietâ* fugiantur omnia acidocracia, falsa, flatulenta; caveatur ab *Irâ*, & corporis exæstuationibus; alvus quotidie respondeat: *Vini* loco concedatur *Decoctum Hordei, Fœnicul. & Baccar. Juniper.* Aër frigidus, pluviosus, fumis inquinatus, crassus, exhalationibus *Ceparum, Alliorum, Raphani rustici* &c. refertus, Oculis nocet.

Corneæ
Fistula.

CORNEÆ FISTVLA est Vlcus sinuoso-callosum in tunicâ Oculi Corneâ ex Vlcere simplici, vel punctione & rupturâ ejusdem membranæ, utut rarius, enatum. Contingit autem, quando Corneæ apertura valde angusta, ejusque sinus cum extremitate Vlcis hiantæ ac rotundâ evasit callosus. Effluit per hanc Fi-

stulam subinde Humor Oculi aqueus, & tum membranæ tantillum flaccescunt; sed regeneratur ille denuo semper, tunicasque iterum expandit. Quod si Fistula hæret in opacâ Corneæ parte, tum sensatio Visus integra manet, quamdiu Humor aqueus præsens in oculo est; quando autem ille effluxit, tum, antequam regeneretur, Visio obscura erit. Si autem Fistula deprehenditur in diaphanâ Corneæ portione, tum actum plerunque est de sensu Visionis; etsi enim Fistula non omne ejusdem spatium occupet, nihilominus tamen perspicuitas Corneæ ab ejusmodi morbo tollitur, Irisque Oculi ut plurimum in suo situ mutatur. Affectus est oppidò rarus, atque curatu ferè impossibilis, eo quòd callositas Fistulæ cathæretico quodam absumi deberet, quale quid autem in Oculis instituere haud licet, saltem non adeo audacter. Interim crediderim, *Balsamum nostrum ophthalmicum*, quem supra in curatione Abscessûs Corneæ commendavimus, atque descriptum dedimus, aliquid fructuosi in extersione, callositatis absumptione, & consolidatione Fistulæ hujus operari posse. Utut fatendum mihi sit, quòd tale Corneæ Vlcus hætenus non viderim, cujus non nisi quatuor etiam exempla conspicienda occurrerunt *Peritissimo Oculistæ & Chirurgo, Antonio Maitre-Jan*, quemadmodum id claris verbis testatur in Gallico suo *de Morbis Oculorum Tractatu, Cap. 19. p. m. 409.*

CORNEÆ EXCRESCENTIA CARNEA, est substantiæ tubuloso-membra-

membranosæ ejus luxuries, ex Ulcere vel Vulnere quodam enascens. Contingit hæc in opacâ magis quàm diaphanâ Corneæ parte, propter vascula sanguinea numerosius eo distributa.

Admittit differentias respectu magnitudinis, dum alia *major* & *eminentior*, alia *minor* & *depressior* existit: utraque nunc *benigna*, nunc *maligna* sive in *Cancrum degenerans*, quæ dura, inæqualis ac diversi coloris est, saniem virulentam, & corrosivam, vicinas, quas alluit, partes excoriantem, atque inflammantem, fundens, præterea maximè dolens, & grandibus satis venis, circa basin admodum conspicuis dotata; difficilimæ hinc sanationis, imò propemodum immedicabilis.

Excrescientia *benigna* sensim auferitur adhibitis frequenter *Collyriis*, leniter *siccantibus*, & *adstringentibus*, sive liquidam, sive solidam habuerint formam. Sub formâ liquidâ profunt *Aquæ destill. Fœnic. Euphras. Chelid. maj. Plantag. Brunell. cum Tutia ppt. Coralliis alb. ppt. Sacch. Saturni, Vitriolo albo. Sacchar. cand. alb. &c.* Sub formâ siccâ autem conveniunt *Lapid. Calamin. ppt. Sacch. Saturn. Tutia ppt. Radix. Iræos. Florent. Mercur. præcip. albus vel ruber, in subtilissimum pulverem redactus*, & similia alia, quæ quater vel pluries quotidie Excrescientiæ adhibentur. Si grandes nimis sunt illæ, tunc vel ligaturâ paulatim, vel scapello cautè adhibito simul & semel abscinduntur, & auferuntur, hincque factum

Ulcusculum *desiccantibus*, & *consolidantibus Collyriis* persanatur.

Excrescientia *maligna*, à lenissimè *maligna* etiam acribus remediis exasperatur, atque augetur; hinc non nisi blandissima saturnina veniunt adhibenda, quemadmodum v. gr. potest esse sequens Collyrium.

℞. *Aqu. Spermat. Ranar. ℥ij.*

Brunell.

Rosar. alb. ana. ℥j.

Cerussæ lotæ.

Lithargyr. auri.

Tutia ppt.

Magist. † nii diaph. ana. ℥j.

Misc. detur ad Vitrum; instilletur sæpius per diem calidè.

Corpus hinc frequenter laxari potest *Panaceâ solutivo-alcalinâ*; Diætæque optima exactè semper observetur.

CORNEÆ CICATRICES sunt *Cornea Cicatrices.* concrescientiæ callosæ & crassæ, ex Ulceribus aut Vulneribus curatis ab ipsâ naturâ productæ, ut plurimum albicantis coloris, nullâ arte extirpabiles, quæ proin, si Corneæ partem diaphanam occupant, pupillamq; obtegunt, immedicabilem Visûs obscuritatē, aut cœcitatem totalem afferunt.

CORPULENTIA NIMIA est *Corpulentia nimia.* Morbus auctæ magnitudinis, in quo Corporis humani moles usque adeo increfcit, ut inde Homo valdè segnis, imò ineptus sæpè reddatur ad varias actiones præstandas.

Respicit verò hic Morbus non tam staturæ longitudinem, quàm ejusdem latitudinem, sive crassitiem: etenim

etenim dantur subinde Homines longissimæ staturæ, qui tamen nullâ Corpulentiam sunt præditi, sed macilenti potius sunt, & contrario vitio laborant.

Partes affectæ.

Affligit Corpulentia non hanc solum aut illam partem, sed totum omnino corpus, ita quidem ut à capite ad calcem usque membra singula præter modum crassa, & obesa existant. In specie tamen interstitia fibrarum, mollitie & laxitate nimiam præditarum, propriè affecta dici possunt, utpote quæ plus nutritii succi ubicunque admittunt, quàm quidem naturaliter admittere deberent.

Causa.

Atque hæc ipsa est proxima quoque Corpulentiam nimiam causa, dum videlicet nutritius & pinguis succus è Massâ sanguineâ ubique in poros laxiores & interstitia fibrillarum admittitur atque recipitur. Præsupponitur ergo, in Sanguine circulante particulas ejusmodi nutritias maxime cumulas, & quidem è primis viis eo delatas esse. Vnde Ciborum eupptorum copia quotidie assumpta, probeque in Ventriculo dissoluta, materiam illam uberem pro formandâ Corpulentiam suppeditat. Animus verò à curis & gravioribus animi pathematibus vacuus, cum moderato corporis exercitio, ac Cerevisiæ ordinario potu huc multum simul contribuit.

*Differen-
tiæ.*

In specie itaque respicit Corpulentia hæc partes tantum vel membranofo-fibrosas, vel musculofo-carneas. Vbi partes quidem membranofo-fibrosæ, hinc inde per totum corpus,

præprimis in Omento, Panniculo carnofo, Membranâ adiposâ, Cutis texturâ retiformi &c. in loculos quasi, vel vesiculas distinctæ, sicubi laxæ & molles satis sint, pingues & oleosas sanguinis particulas intra sese copiosius admittunt, quæ dein ibidem sensim magis ac magis cumulatae & concretæ Corpulentiam producant pinguem, Obesitatis nomine venientem. Partes verò musculofo-carnosæ si similiter laxæ satis, aut à corporis exercitationibus (cum subsequente vel antecedente quadam inunctione) quoad motrices suas fibras distentæ admodum fuerint, guttulas gelatinoso-vel balsamico sanguineas intra poros suos, vel interstitia copiosè admittunt, quæ postea in totidem grumulos aut globulos concretæ, cumulataeque corpulentos homines lacertosos, maximeq; robustos efficiunt. Hanc verò Corpulentiam carnosam appellare licet, ubi nimia evaserit. Si autem modica extiterit, nuncupatur tantum. *Habitus corporis torosus, athleticus, lacertosus*, quem Rustici maxime, hinc & Lanii, pluresq; Opifices alii obtinent. Adde his tertiam Corpulentiam speciem, ex carnositate & obesitate conjunctis oriundam.

Contribuit ergo ad Corpulentiam ejusmodi nimiam radicaliter ipsa Hominis nativa temperies, sanguis videlicet balsamico-seu butyroso- & lacteo-dulcis, omnis acrimoniæ salinæ expers; nec non fibrarum membranacearum & musculosarum aptitudo ad sui expansionem magnam. Quibus etiam adnumeramus Ætatem con-

consistentem, juvenilem ac virilem; non enim ita frequens est, ut quis ante vigesimum annum reddatur obesus, cum infra hanc ætatem Homo adhuc in altum crescat, & ad staturæ sibi naturalis perfectionem tendat. Accensem deinde numero causarum *Aërem* temperatum, minimè æstuantem, utpote in quo facilius atque frequentius Homines pinguescunt, quàm in *Aëre* nimis calente; Cibos itidem copiosi & laudabilis succi, saltem apud adsuetos Rusticos, & Opifices omnis conditionis; eos imprimis qui Lacte & lacticiiniis, Caseo, Butyro, Pane ac Cerevisiâ copiosè quotidie utuntur, strenuosq; interea corporis labores, non sine interpositâ debitâ quiete, exercent, ac animum curis vacuum circumferunt; qui etiam Vinum, spiritumque Vini, aut similes liquores parcius bibunt. Vnde longè plures obesos in Belgio, Daniâ, Sueciâ, &c. reperire datur, quàm in Italia, Hispaniâ &c. Somnus & quies crebra tam corporis quàm animi, similiter impinguant corpus prædispositum, &c.

Hinc manifestum evadit, neque Ossa, neque Cartilagines, neque Tendines, Arterias, Venas, Membranas denique, si semel integritatem suam adeptæ fuerint, ulterius vel crescere, vel decrescere; si excipias roridum quendam succum, qui poros talium partium varios in statu naturali adimplet.

Sed & *Corpulentia nimia* distinguenda venit 1. quidem à *Cachexia*, huiusque specie *Leucophlegmatiâ* vel *Anasarcâ*; utpote in quibus Affecti-

bus corpus increfcit per succum non balsamicum, sed per serosum potius, cutaneos sensim poros adimplentem.

2. A subitaneo quodam Tumore, per flatum, aut ictum quoque Animalium venenatorum &c. producto. Hinc *Corpulentiam nimiam* facile est non tantum cognoscere, sed & à modò dictis corporis Tumoribus discernere.

Diagnos.

In *Prognosi* *Corpulentia nimia* non tantum molesta est Hominibus, sed & teste *Hippocrate* interdum periculosa; quanto plus enim corpori accrescit, tanto plus quoque periculi accedit, & securitati decedit. Impedimentum certè illa est liberæ respirationis, imò & motus atque operationum corporis. Hinc plerunque tales Homines obnoxii sunt Apoplexiæ, Hydropisi, Paralyfi, Catarrhis suffocativis, Asthmatis &c.

Curatio

Corpulentia itaque, quò minùs nocere queat, vel præcaveri debet, vel si adsit, corrigi & imminui mature. Obtinere licet utrumque, si copiosioris nutrimenti generationem impedimus, idq; per parciores victum; per exercitia corporis & animi continua; per lucubrationes frequentes, curas & sollicitudines, quibus tranquillitas atque somnus Hominis quotidie turbatur; per usum *Ciborum minùs temperatorum*, exiguum alimentum suppeditantium; per frequentem Chylificationis turbationem; per crasseos tandem sanguineæ massæ dulcioris mutationem in texturam acriorem & salsiorem.

Inprimis autem *Corpulentia* car-

Qq

nosa

nosa desiderat remedia maximè chirurgica, sanguinem detrahentia, imminuentia: *obesa* & *pinguis* postulat magis pharmaceutica, chyli lactescentiam imminuentia. Vtramque bona *Dieta* minuere valet, in quâ quidem, præter superius allegata, usus *Aëris* subtilioris, calidioris & siccioris convenit; sed & profunt *Laconica* sive *Balnea sicca*, sæpè usurpata. In *Cibo* & *potu* extenuant corpus, quæ multo aromate vel sale condiuntur, aut acidis quoque diluuntur; unde vim chylus acquirit incidentem, attenuantem vel resolventem, imò & aliquatenus diureticam. Quamobrem commendari solent frequentia Aromata, inprimis *Piper*, *Caryophylli*, *Cinamomum*, *Zingiber*, *Sinapi*, *Raphanus rusticanus*; item *Acida*, v. gr. *Acetum*, vel simplex probè filtratum, vel *scilliticum*, *Succus Citri*, *Rubi id. Berberum*, *Mororum*; *Potus Aquæ chalybeatæ* acido liquore dilutæ creber?

Inter pharmaceutica Remedia primò statim conducunt frequenter assumpta non vehementer purgantia, sed mediocria, qualia sunt aloëtica minimè lota, quoniam lotionè vis eorum valdè minuitur; quibus *Myrrham*, aliaque amaricantia, deterisivâ suâ amaritudine attenuantia, ac dissolventia, sanguinis massam acuentia &c. ac ita nutritium succum resolventia, & paulatim abstergentia admiscuntur: v. gr.

℞. *Extract. Panchymag. Croll.* ʒiʒ.
Mercur. dulc. ʒj.
Radic. Aristol. rot. v.
Gentian.

Myrrh. elect. ana. ʒij.

Resin. Jalapp. ʒʒ.

Cum Ol. dest. Anis. f. l. a. Pilulæ granorum duorum pondere, conspergendæ pulvere Cinamom. d. ad scatul. Dosis singulis mane quinque, sex, vel septem cum vehiculo debito.

Singulis partibus quoque cyathum seqq. *Vini medicati alterantis* exhaurire licet.

℞. *Radic. Gentian. Calam. arom.*

Rubiæ tinct. Fœnic. ana. ʒʒ.

Herb. Card. bened.

Marrub. alb.

Cuscut.

Meliss. ana. Mj.

Summit. Cent. min.

Absynth. ana. Mʒ.

Semin. Fœnic.

Dauc. ana. ʒij.

Julorum Coryli ʒiij.

Incis. & contus. coque parum in Vini albi veteris diuret. ʒʒʒ.

Aqu. fontan. ʒʒʒʒ.

Colatura albumine Ovor. clarificata in usum vocetur.

Quin & valdè emaciatos novimus ex crebro atque diligenti *Pulveris contra strumas* usu; inprimis autem ejus, qui ex *Cancris fluvialibus* vivis, *Spongiis marinis*, ac *Cynosbati spongiis*, invicem in terreâ Ollâ combustis, deinceps in *Pulverem subtilissimum* redactis parari consuevit; à quo certè Homines ita macilenti redduntur, ut in periculum *Atrophix* immedicabilis incidunt, nisi studiosè præcaveamus. Hinc potius sequens nobis hoc in casu placet descriptio:

℞. *Spong.*

℞. *Spongiar. marin. uſtar.*
Lapid. Spongit. uſt. ana. ʒj.
Oſſ. Sepiæ ppt.
Radic. Scrophular. ana, ʒvj.
Seminis Urtic. ʒß.
Cinam. optim. ʒij.
Piper. alb.
Singiber.
Caryophyll. arom.
Œis polychreſt. ana. ʒj.
Sacch. cand. alb. ʒiiß.

Misc. f. Pulv. ſubſt. d. ad Scatulam.

Dofis ʒj. vel ʒiiij. ſingulis Noctibus,
dum Lunæ lumen decreſcit, cum
Melle, vel Syrup. Capill. Veneris. Lau-
dant alii uſum Nitri vitr. Arcani
duplicati Mynſ. Tartari vitriolati, Ni-
tri tartariſati, & ſi quæ habentur
ſimilia, mane ac veſperi aliquamdiu
ad ʒj. vel ʒß. data. Imò & Phlegma
commendant ʒli ad ʒj. vel ʒij. quo-
tidie cum alio vehiculo exhibitum.
Huc refer potum Acidularum qua-
rumvis, vel Thermarum Fabarienſium,
Carolinarum in Bohemiâ, Embſen-
ſium, Plumbariarum, ſimiliter corpus
extenuantium, ſi debito modo hauri-
antur cum regimine diætæ per plures
hebdomadas.

Imò in *Corpulentia obesa ſaliva-*
toria Cura inſtitui poteſt, ſi cœtera
 conſentiant, corpusque benè præpara-
 tum ſit; de quâ medendi ratione con-
 ſuli debet *Curatio Luis veneræ ſuo*
loco explicata. Novimus etiam No-
bilem quendam, ultra quingentas
libras ponderantem, beneficio quam-
plurimorum Veſicatoriorum abdomi-
ni, cruribus, brachiis &c. applicato-
rum, valde ſenſim attenuantium,

macilentum redditum eſſe, aliquan-
 diuque ita manſiſſe, licèt priſtina
 paulo poſt *Corpulentia* redierit, co-
 mite ſibi juncto *Hydrope Aſcite* cum
Hominis perniciæ.

In *Corpulentia carnoſa* frequen-
 tes *Venæſectiones, Cucurbitularum cum*
ſcarificatione applicationes, aut *Hiru-*
dinum admotiones magnopere lau-
 dantur. His adnumeramus *Fonti-*
culos variis in locis ſimul excitatos,
 utpote quibus primùm membra, ubi
 apponuntur, dein paulatim totum
 corpus extenuatur, & macilentum
 magis redditur.

Sed verum heic quoque, ſi ullibi,
 quod in proverbio habet:

Naturam expellas furcâ tamen
uſque recurret.

rarum enim, imò rariffimum, ut quîs
 emaciatus evadat, & ita maneat.
 Obſervavimus etiam, homines poſt
 inductam aliqualem macilentiam A-
 poplexiâ fortî ſubitò correptos interi-
 iſſe.

CORYZA, *Vid. Narium Coryza.*
COXENDICVM S. ISCHIA-
DIS DOLOR, *Vid. Dolor Iſchia-*
dicus.

CRANII FRACTVRA cum
CONTVSIONE, *Vid. Contuſio cum*
Fracturâ Cranii.

CRANII FRACTVRA cum Cranii
VVLNERE, eſt Morbus ſolutæ Fractura
 unitatis, in quo Calvaria una cum cum Vul-
 cute ſupernatâ aut Meninges etiam, nere.
 Cerebrique ſubſtantia per violentam
 quandam rem externam dividitur, &
 plus minùs graviter læditur.

Pars affecta.

Pars affecta est partim dura, nimirum Cranium, partim etiam mollis; nimirum Cutis capitis, Pericranium, Meninges, imò ipsum quoque Cerebrum.

Causa.

Pro *Causâ proximâ* agnoscitur violenta quædam allisio ex casu ab alto, vel Ictus aliquis gladio, ligno, lapide, globo sclopetario, aliasve re acceptus, unde vel pungendo, vel contundendo, vel perforando, vel secando non solum Cutis capitis dividitur, sed etiam Calvaria ipsa quocunque demum in loco frangitur, ac subinde Cerebrum simul plus minus graviter vulneratur.

Diagnos.

Cognoscitur Fractura, si Ager ex ictu accepto conciderit, & sine sensu ac motu jacuerit: si per nares, os, aures, subinde & oculos sanguis effluerit; si vomuerit; si filum sub dentibus firmiter tenere nequeat; si adfuerit externum Vulnus, & immisso specillo asperitas Ossis sentiatur; si atramentum è solâ Gallâ, (ubi Vitrioli acrimonia metuitur,) illitum & scalpris iterum derasum lineam reliquerit. Denique res ad oculum patebit, si divisâ magis cute in loco Vulneris Cranium detectum fuerit. Meningum ac cerebri læsionem indicant secuta Inflammatio, Febris plus minus acuta, Deliria, Inquietudines, quandoque sensuum torpor, Somnolentia, & Convulsiones subsequentes. Si autem Cranii portio amputata est, per foramen Vulneris satis patebit, num Cerebrum simul læsum existat.

Prognosis.

Quoad *Prognosin*, læsio hæc frequenter est lethalis, imprimis si Me-

ninges inflammentur, ipsaque simul Cerebri substantia lædatur, ac sensum putrescat, vel si è ruptis vasculis sanguineis humor effluens Apoplexiam inducat; si humores in tubulis stagnent, ipsique spirituum animalium pori in medullâ Cerebri distorqueantur; si glandularum fibrillæ tono suo labefactatæ spirituum transcolationem impendant, hacque ratione Carum, aut Lethargum inducant, Apoplexiæ, aut impeditæ Humorū circulationis prodromum. Si verò Cerebrum ipsum non adeo vulneratum aut læsum est, tum spem adhuc bonam felicitis restitutionis facere possumus; præprimis quando jam aliquoties observatum est, Homines dulci sanguinis temperie gaudentes perfectam sanitatem recuperâsse, etiam si post acceptum insigne vulnus, aliquam etiam Cerebri, licet non magnam, corticis portionem amiserunt.

In *Curatione* Fracturarum Cranii pro diversis circumstantiis diversimodè est procedendum. In omnibus quidem casibus statim capilli circa Vulnus sunt *abradendi*; etiam *Vena Brachii secanda*, & *Clysmâ emolliens* atque *detergens* injiciendum, ex *Decocto Herbarum emollientium*, cum *Plantis* quibusdam *cephalicis*, additis tandem post colaturam *Electuario lenitivo*, *Mellève rutaceo*, *Oleo vulpino*, atque *anethino*.

Si *Fissura* adsit cum *Vulnere* cutis, tum post abrasos capillos *remedium sanguinem sistens*, ubi opus, applicabitur, quemadmodum in *Hæmorrhagiis*

giis Vulnerum suo loco demonstra-
tur. Desuper hinc imponetur fo-
mentum ex Decocto *Betonicae, Gratio-
lae, Veronicae, Salviae, Saniculæ*. At-
que ita continuando per aliquot dies
opus naturæ permittatur; notabis ta-
men, si Hæmorrhagia sit magna, non
nisi *sanguinem sistens* remedium esse
applicandum, atque *Fomentum* secun-
dâ demum deligatione, quando nul-
lus amplius metus Hæmorrhagiæ
adeſt, eſſe uſurpandum. Postmodum
Cutis cum ipſo pericranio, vitatis ta-
men futuris, ac Temporum muſculis,
ſcalpello incidenda, à Cranio avellen-
da, & hinc vel ſcalpro, vel atramen-
to Fractura inueſtiganda.

Si autem certior eſſe velis, an Fiſ-
ſura utramque laminam Cranii per-
ruperit, imperabis Ægro, ut clauſis
ore naſoque fortiter exſpirare con-
etur, tum enim, quando Vulnus per
utramque laminam penetravit, è fiſ-
ſuris exſudabit ſanies cruenta. Hoc
perſpecto Vulnus linteis carptis mol-
liſſimis cum pulveribus cephalicis,
v. gr. *Radic. Aristoloch. rot. veræ, An-
gelic. Calam. aromat. Garyophill. Bol.
armenat. &c.* totum eſt replendum;
ac deinceps *Emplaſtrum de Betonica*,
vel de *Saniculâ, Virgâ aureâ, Scabiosâ,
Alchymillâ, Hyperico, Vincâ pervincâ,
Gratiâ Dei &c.* applicandum, ſimulq;
Sicculus ex *Herbis* ſupra dictis concin-
natus, *Vinoque albo* incoctus calidè
imponendus, ſæpiusque renovandus.
Secundo dein apparatu fiſſura ſcalpris
eſt elidenda, & ubi multum feri ſan-
guinisque inter Cranium & Menin-
ges hæſere notabitur, ſuâ putredine

tandem lethale futurum, tum ſine
morâ Trepani inſtrumento Cranium
perforandum erit. Si verò parva ſit
fiſſura, vel in unâ tantum laminâ, vel
etiam in utraque, ſine tamen ſangi-
nis extravafatione aut hujus ſuper
Meninges effuſione, tum deligatio
etiam abſque Trepanifatione peragi,
tandemque cicatrix, ſanatâ Fiſſurâ,
ſuperinduci poteſt. Os verò nudum
& detectum aliquoties ſcalpro raden-
dum, & ſiccè ſemper deligandum,
donec carne iterum tectum fuerit, et-
enim Oſſibus humida unctuoſaque
omnia quàm maximè ſunt nociva;
horum igitur loco præſtant pulveres
cephalici ſupra dicti, niſi Inflammatio
aliqua vicinæ cutis adhuc obſiſtat.

Si cum fracto Cranio Meninges ſi-
mul ſint læſæ ac diviſæ, tum non ſo-
lùm incifione factâ Cranium dete-
gendum, ſed & ulterius Trepano, aut
aliâ ratione, ſi fieri poteſt, aperiendum
venit, ut ſic membranarum detecta-
rum læſioni tanto melius ſubvenire
poſſimus. Ante omnia verò neceſſi-
tate cupiente *sanguinem ſiſtens* reme-
dium eſt applicandum, quale decan-
tatum illud *Galenii*, ex *Aloës partibus*
duabus, & *Thuris parte unâ* compoſi-
tum, cui tamen permiscere licet etiam
Terram ſigillatam, vel *Bolum Armena-
tem*, aut *Sanguinem Hominis* vel *Co-
lumbæ ſiccatum & pulveriſatum*. Dein-
ceps excuſſo Hæmorrhagiæ me-
tu, pro deterſione ſordium, & impe-
dimento gravioris putredinis, im-
mitti cum carptis linteis poterit *Mel
roſaceum*, aut *rutaceum*, cum *Succo
Apii, Cichorii, Hieracii, Tragopogonis,*

*Cum læ-
ſione Me-
ningum.*

vel etiam *Sanguine columbino*; commendant nonnulli oleosa, sed hæc tamen, propter occultum acidum rodens, plerunq̃ue nociva existunt, ac sæpius fungosæ *Excreſcentiæ* proventum suscitant, qualis subinde unâ nocte efflorescere solet ad pomi etiam magnitudinem accedens.

Ad dissipandam autem hanc *Fun- gi* efflorescentiam inspergere cum fructu consueverunt *Pulverem radic., Angelic. Imperator. Galang. Aristoloch. rot. ver. Garyophyllor. aromatic. &c.*

*Sordes
elucenda.*

Disſipato autem ejusmodi tumore melius est, Vlcus omne non nisi siccantibus, vel siccis rebus perſanare, & ita sicce tantum semper deligare: neque tamen hoc carptis filis, sed parvulis frustis lineis, utpote quæ facilius semper iterum extrahi possunt. A Turundis autem heic est cavendū, neque specillo profunditas crebrò exploranda, eo quod facile in ipsum usque Cerebrum adigi posset.

Quod si in Curatione exulceratarum Meningum sordes observentur, tum eluendæ veniunt illæ supra dicto *Melle rosaceo*, cum *Succo Apii, Salvie, Betonic. Scordii, Majoranæ*, aut simili cephalico. Neque interea multum metuendum, etiamsi foetor subinde aliquis è Vulnere exspiret, quoniam hic ferè in tali casu consuetus esse, ac modò laudato detergente remedio sensim dissipari solet.

Interea temporis, dum hæc aguntur, interna quoque remedia usurpari debent, præprimis autem *Decoctum Lignorum cum Betonicâ, Chamædri, Origano, Alchymill. Pyrol, Virgâ aur.*

Sideritide, Veronicâ &c. nec non *Pulveres absorbentes Coralliorum, Succini alb. Ebor. ppt. C. C. phil. ppt. Bol. armenat. Gumm. arabic. &c.* imò & *Tincturæ Succin. Betonic. Numular. Scordii, Origani, Virg. aureæ, Hyperici*, cum *Balsamo Peruviano* mistæ. Sanatis Meningibus sicca deligatio continuanda venit, donec os quoq̃; Cranii simul sanatum sit; vel saltem aliquid osseæ substantiæ analogum succreverit, quo tandem facto paulatim cutis, ipsaque demum Cicatrix imposito *Emplastro diapalmæ* supernasceatur. Notandum tamen, pro ratione circumſtantiarum frequenter admodum ac diu *Sacculos cephalicos*, de quibus supra, *Vino incoctos & expressos*, ad circulationem humorem conservandam, calidè applicandos esse.

Si squamæ adsint in Osse cranii, non vi aliquâ evellantur, sed separationis opus naturæ soli permittatur; istud tamen, quantum possibile, promovendo, neque ullâ ratione impediendo. Promovebitur autem maximè, si nullus accedentibus salibus corrosivis acidis locus concedatur, atque eapropter semper deligatio sicca usurpetur, vel cum vel sine pulveribus absorbentibus, & aromaticis blandis, à quibus simul Calli generatio promovetur.

Quando cum contusione & ictu accepto simul Cranium introrsum *deprimitur*, atque hinc ipsæ Meninges simul compressæ dolorem obtusum, aliaque incommoda producant; vel quando etiam Cranii fracti *spinæ* in duram piamve Matrem continuè impin-

impingentes pungitivum dolorem semper inferunt, tum ipsa quidem Cranii depressio Cucurbitulis majoribus impositis ad pristinum statum revocatur, præsertim si ipse simul Agrotans frequenter, ore naribusque clausis spiritum sursum exprimat, quod in Pueris successum habere potest, in Adultis autem, quorum Cranium valdè induratum est, neutiquam succedit. Vel etiam *tenax Emplastrum picatum* imponitur, quando Vulnus est perlanatum; vel tandem, si Cranium est nudum, terebello, aut tripode infixò quantum potis est, in altum attollatur.

Spinæ autem, testulæque confracti Cranii, quocunque modo eximendæ, sive id fiat per rostra excindendo, sive per scalpra erodendo; sive per volsellas, cum malleo plumbeo, effringendo: sed caveas, ne in hac operatione, Meningem plus rædas. Operatione autem feliciter peractâ deligatio superius dicto modo continuabitur.

Si ab accepto Ictu enata est Contrafissura, in Osse opposito, quod ictum propriè non accepit, tunc primò quidem inquirendus est locus Contrafissuræ, qui vel ex dolore attatum sequente cognoscitur; vel con-jicitur, si raso capillitio, *Emplastroque* imposito è *Pice Liquid. Cerâ, Terebinth. & Aloe*, quis locus tumidior, humidior, aut mollior appaerit, huic enim fissuram subesse, probabile est, adeo ut Æger etiam tale nihil cogitans manum subinde ei parti ad-movere, vel eandem fricare cogatur.

Huic vitio medela affertur, si *Emplastrum vel sticticum Crollii*, vel de *Baccis Laur. de Betonicâ, Norimbergense* aut *Diapalma* imponatur per longum tempus, ac insimul *Sacculus cephalicus*, ut supra, *Vino* incoctus calidè semper applicetur, donec nulla amplius symptomata Ægrum molestant. Si tamen Fissura creditur esse magna, ita ut metuendum, ne Sanguis aliquis extravasatus subsit, Abscessum postliminiò vel supra vel infra Cranium pariturus, tum protinus est cutis ad Cranium usque incidenda & aperienda, deinceps, Hæmorrhagiâ consueto more sedatâ, Os fissum probè examinandum, ac pro re natâ etiam *Trepano* perforandum, quo subtrus forsan latitans pus exitum inveniat. Deinceps verò sicca deligatio instituetur, & ad sanitatem usque continuabitur.

Eadem ratione procedendum, quando inferior lamina Cranii fissa est, superiore manente integrâ. Interim *Symptomatibus*, si quæ in ipsâ Curatione accedant, suo more est occurrendum, ita tamen, ut remediis scopus generalis medendi fracturæ non impediatur.

Diæta in principio tenuis admo- *Diæta.*
dum sit, quemadmodum in morbis gravibus: nocent *acida* omnia, *aromatica* & *acria* nimia, *Salsa* copiosa, austera; nocent maximò perè *Ira, Venus, Vinum*, risus immoderatus, sternutatio, stertitus nimius. *Aër* purus sit & calidus. *Potus* sit *Decoctum Raf. C. C. Hordei. Liquirit. Betonic. Chamædr. Thé. Semin. Pæon. Anis. &c.*

CRE-

*Crepitus
Ventris
nimis.*

CREPITVS VENTRIS NIMI aliquando Hominibus, pudibundis inprimis Fœminis atque Virginibus, ob forditiem atque fœtorem molesti esse solent; dicuntur autem Symptoma Excretorum, quo quidem flatus in primis viis non solum præternaturali copiâ gignuntur, sed etiam deinceps crebrius per alvum cum fragore extruduntur. Beneficium magnum naturæ, dum corpus sic ab onere rei inutilis, imò noxiæ liberatur; sed quod tamen originem habet emendatione indigentem, videlicet malam Ventriculi digestionem, quæ, nisi probè curetur, variis morbis ansam præbere solet. Quomodo autem hisce molestiis occurrendum sit, sub Titulo de *Flatibus* monstratur.

CRISTA. v. *Verruca.*

CRVRIS FRACTVRA. v. *Fractura.*

*Crusta
lactea.*

CRVSTA LACTEA, est ulceroſa Cutis capitis scabies, ab humore falso-acri originem ducens, crustulasque albicantes excitans, ac Infantibus peculiaris. De hac vide *Achores*.

CRYSTALLINI HUMORIS Oculorum vitia, Vid. *Humoris crystallini Vitia*.

*Cutis a-
peritas.*

CVTIS ATTRITIO, EXCORIATIO, Vid. *Intertrigo*.

CVTIS ASPERITAS, Symptoma est qualitatis in superficie Cutis mutatae, quo naturalis ejus mollities tollitur, & asperitas inducitur, non incommoda tantum, sed & propter subsequentes atque conjunctas simul sordes munditiei adversa.

Subjectum ejus sive *Pars affecta* Cutis est, cum super inhærente Cuticulâ, pelliculâ illâ tenui ac densâ, externis injuriis oppositâ, parvulis ubique foraminibus, sive porulis, in quos vascula sudoris excretoria, valvulis in extremitate donata, hiant, præditâ. *Cutis* verò ipsa involucrum est membranaceum, crassum, potissimâ sui parte è filamentis nerveis, atque vasculis humorum, affabie inter se complicatis contexta, quibus glandulae numerosae, harumque excretorii tubuli, tanquam sudoris aut vaporum viæ densissimè interponuntur. Ut adeo Cutis è duplici quasi substantiâ conflatur, exteriore nervoso-membraneâ, interiore glanduloso-velut carneâ. Qui autem cum accuratissimo *Malpighio* nudam per microscopium cutim diligenter contempletur, ei primò lustrandum occurret corpus sic dictum reticulare, crebris foraminibus suis non solum tubulos sudoriferos, sed & plurimas papillulas pyramidales nerveas in cuticulam usque protensas comprehendens. Infra corpus istud reticulare glandulae hærent numerosae, in quibus materia halituoſa ex arterioliſ secernitur, & inde per vascula excretoria ad Cuticulâ protruditur, ubi dein nunc sub formâ sudoris colligitur & expellitur, nunc sub formâ vaporis subtilis in Auram externam transpirat. Rugosa est Cutis, superficiei inæqualis, sulcis ubique donata, sed in statu naturali tamen mollis atque plicatilis, totum corpus integens, quibusdam in parti-
bus

bus crassa, densa, in aliis verò tenuis atque tenera.

In naturali proin statu Cutis terfa, mollis, lævis, polita, & æquabilis existit, quando nimirum pori ipsius omnes humore miti, blando, gelatinoso ac velut oleoso adimpleti sunt. Hæc autem mollities vel lævitas nativa variis à causis tolli, & contraria qualitas, durities atque asperitas induci solet. Quod si statim à natiuitate Infans vino vel aquâ nimis calente, & propemodum fervente lavatur, ac à cutaneis sordibus liberatur, tum à nimio liquoris fervore cutis superficies ita exasperatur, ut postea per totam penè vitam aspera ac duriuscula maneat. Sed & Asperitas præterea Adultis jam hominibus accedit à causis tam internis, quàm externis. Internè heic culpatur humor vitiosus, falsus, in cutaneis poris copiosè collectus, aut à frigore externi aëris fibras epidermidis constringente coërcitus, talis enim superficiem magis rugosam & asperam reddit, ac interdum Scabiem producit, in Leprosi maxime sordidam. Sed & exasperatur eadem, quando pori cutanei ab unctuofo humore planè exhauriuntur, unde sulci rugæque grandiores evadunt.

Externè asperitatem Cuti inducunt calentes valde humores affusi, vel frigida nimis res admotæ: ita aër frigidus-rigidus, aqua gelida eo contriunt. Qui hinc frigidâ nimis, aut nivosa aquâ, aliisve gelidis liquoribus suas quotidie manus abluunt; vel qui earum sordes aquâ lixiviali,

saponatâ, aut calcariâ detergere solent, nitidas quidem eas, sed insimul duras, asperasve reddunt. Idem præstat Aër vel nimis æstuans, vel frigidus in excessu; Victus itidem crassus, falsus; labor durus quotidianus, unde Opifices, Rustici, Ancillæque manus semper asperas obtinent.

Ad tollendam ejusmodi Asperitatem, ac lævitatem vel lubricam molliem & teneritudinem conciliandam emollientia, atque unctuositate quadam minimè salinâ pollentia profunt, si post elotas sordes Cuti inungantur. Sordes extergunt nonnulli Aquâ calidâ saponatâ, sed melius est *Vino & Aquâ* calidè invicem mistis ac *Furfure*, vel *Micâ panis*, vel *Farinâ seminis Lini* additâ id præstare. Exterfa verò Cutis fricari potest sequenti v. gr. *Magmate*, vel *pastâ*: *Amygdalas dulces* recenter excorticas contunde probe, dein misce cum micâ panis recenter è clibano extracti, & cum *Vini albi* & *Aquæ Rosarum* quantitate sufficiente in *Pastam* redige, quâ postea manus quotidie fricantur. Utuntur alii tantum *Magmate* illo, vel *Placentâ Amygdalarum dulcium* post expressum *Oleum* in prelo remanente, quo manus quotidie fricant; si *Aquam Rosarum* permiscebis, odorem simul fragrantem conciliabis. Commendant alii *Olea expressa seminis Rapparum*, *Nucleorum Persicorum*, aut *Amygdalarum dulcium*: *Oleum* item *Violarum purpur. flor. Keiri. Lil. albor. &c.* cum *Axungia Caponum*, *caprinâ*, *cervinâ &c.*

Vel ℞. Amygd. dulc. rec. excort. ℥iij.
 Contusis probè affunde
 Spiritus Vin
 Aquæ Rosar. ana. ℥j.

Malaxa invicem & frige in Vase terreo vel æneo parum super ignem lenem; & quando incallescere incipient atque fumum emittere, tum sacculo lineo crasso immitte, hunc prelo subjice, & Oleum inde clarum atque nitidum exprime, adhuc statim calenti Aquæ pluviæ mox immitte, atque in eâ tamdiu circumages, & conquassabis, donec in Unguentum album fuerit mutatum, quod dein pro inunctione asservabis.

Vel ℞. Amygd. dulc. rec. excort. ℥iij.
 Mastich. elect.
 Gumm. Tragac.
 Storac. Calamit. ana. ℥j.
 Albumen duorum ovorum.

Contunde omnia probè ac misce invicem, stent per 5. vel 6. dies, quotidie iterum conquassando totam pastam; tandem exprime Oleum, ac eo Faciei vel aliarum partium asperam Cutim quotidie inunge.

Vel ℞. Amygd. dulc. rec. excort. ℥℞.
 Semin. 4. frigid. major. ana. ℥iij.
 Pinear. dulc. ℥ij.

Invicem probè per aliquot horas contusis adde Vitellum duorum ovorum.

Misce exactè, ut fiat Massa, quam ollæ terreæ immitte, inspergendo parum Sacchari, ut diutius incorrupta asservari queat. Quotidie mane fricantur inde manus, & linteo molli leniter iterum absterguntur.

Vel ℞. Amygd. dulc. rec. excort. ℥j.
 Pinear. ℥iij.

Pulver. radic. Ireos Flor.

Spermat. Cet. rec. ana. ℥j.

Contunde invicem probè in formam Pastæ, ad misce dein Olei è 4. Seminib. frigid. express. ℥ij.

Vitelli Ovor. num. ij.

Aqu. Rosar. ℥vj.

Coque in lebetè ad ebullitionem lenem, continuè spatulâ agitando, donec pasta lebeti non amplius adhæreat. Hâc Massâ dein quotidie mane ac vespèri manus fricantur.

Faciei Asperitas à Solis radiis producta sequenti Unguento corrigitur:

℞. Axung. Capon. ℥iij.

Malaxa per triduum in Aquâ fontanâ, quotidie bis vel ter novam affundendo: agita diligenter manibus, usque dum maximè alba evaserit, postea immitte in Ollam vitreatam, adde

Pinguedin. vitulin. ℥ij.

Ceræ alb. ℥j.

Aqu. Lil. alb. ℥iij.

Agita invicem probè spatulâ, quando super ignem lenem per quadrantem horæ coquantur; hinc per linteam filtra, & depluere permitte in patinam subjectam, cui Rosarum Aqua prius indita fuit: sine refrigerari, dein exime cochlearis ope Unguentum, & in mortario contunde, donec album evaserit, quod dein Ollæ mundæ inditur in loco sicco usui asservatur. Inungitur autem vespèri, & sequenti mane linteo molli blandè abstergitur.

CVTIS ATTRITIO, Vid. Intertrigo.

CYNANCHE, Vid. Angina.

CYNI-

CYNICVS SPASMVVS, Vid.

Spasmus cynicus, & Convulsio.

DEFATIGATIO POST LABORES, Vid. *Lassitudo.*

DEFLVXIO, Vid. *Catarrhus.*

DEJECTIO CRVENTA, Vid.

Dysenteria & Fluxus hepaticus.

DEJECTIO AQVOSA vel BILIOSA, Vid. *Diarrhœa.*

DEJECTIO NIMIA, Vid.

Diarrhœa.

DEJECTIONIS DEFECTVS,

Vid. *Alvi constipatio.*

DELIRIVM, Vid. *Imaginatio*

perversa.

DENTIVM CARIES & NIGREDO, est Symptoma qualitatis

mutatæ, simul & morbus solutæ uni-

tatis, in quo Dentium substantiæ con-

tinuitas à sale acido corrosivo dissol-

vitur, exeditur, simulque color albus

naturalis in nigrum sordidumque

mutatur.

Afficitur autem Dentium sub-

stantia primum in circuitu, ubi gin-

givæ proximè adhæret, interdum &

in superficie Dentium molarium;

ubi materia tenax sive ex cibis sive

ex salivâ ipsâ residere & agglutinari

commodè potest. Quandoque etiam

in radicibus eorum erosio contingit

nunc à sero acri, nunc à vermiculis.

Causa efficiens est sal acido-

acre plus minus occultum, quod vel

cum saliva, scorbutico caractere infe-

ctâ, vel cum cibis multum sacchara-

tis, mellitis, caseosis, falsis, aliisque

ad latera dentium sub masticationis

negotio demissum adhærescit. Non-

nunquam cura mercurialis qualiscun-

que ad dentes appellens, non tantum

Vacillationem eorum inducere, sed

& sensim Cariem simul excitare, ip-

samque ut plurimum nigredinem pro-

ducere valet. Ita & nimis calida, aut

nimis frigida, dulcia, acida, austera,

vitriolica sæpius usurpata non secus

ac Fuci ex Hydrargyro ad dentium

nigredinem simul & Cariem contri-

bunt.

In Curatione præservationis *Curatio.*

gratiâ in usum trahuntur varii pulve-

res dentifricii, ex maxillis Lucii piscis

ustis, C. C. usto, ossibus Sepiæ piscis,

Crustâ panis tostâ, Coralliis rubris, Ra-

dic. Ireos florentin. Radic. Aristolochiæ,

Cinamom. Garyophyllis aromat. Lapi-

de Pumicis, & similibus parati; v. gr.

R. Oss. Sepiæ. ꝑss.

Rad. Ireos flor.

Corall. rubr. ana. ʒij.

Sang. Drac. ver.

Santal. rubr. ana ʒiijss.

Cinamom. opt. ʒß.

Alum. ust. ʒiijss.

Ambr. grys. gr. vj. ad x.

M. f. Pulv. subt. d. ad scatul.

Alii etiam ejusmodi pulveres

Mellifera permiscunt, hocque post

singulos pastus dentes suos vel fricant

vel illinunt, sine ablutione succeda-

neâ, dum salivâ solâ meliore cum suc-

cessu eluunt. Si quis tamen Carie jam

dentium ipsâ laborat, tum vel reme-

dia Cariem ulteriorem præcaventia in

usum trahenda, vel Dens evellendus

aut exurendus. Caries dentium ul-

terior præcavetur, si Pilulæ fre-

quenter immittantur ex Opio, Garyo-

phyll arom. Pipere, Radic. Pyrethr.

Rr 2

Imperat.

Imperat. Aristoloch. Euphorbio, cum Ol. mest. Rorismarin. & Gargophyll. Itali dndunt Radicem Chelidoniae majoris recentem, quo fieri credunt, ut dens paulatim emoriatur, ac frustillatim excidat. Sunt qui etiam stylis ferreis ardentibus sibi foramina dentium cariosorum probè exuri patiuntur, quo fit, ut non solum Caries ulterius non serpat, sed & nervuli dentium emoriantur, ut postea nullus amplius per totam vitam dolor eos prehendere valeat. Alii in hunc finem frustula plumbi sive auri nonnihil calentia foraminibus dentium infigi, atque malleolo tantillum intrudi patiuntur, quò firmitus inhæreant, ac superficies Dentis claudatur, sicque omnis aëri externo aliisque particulis ingressus præcludatur. Alii iterum continuè frustula Cerae foraminibus Dentium ingerunt, inque hunc finem consultò Ceram Oleo destillato Gargophyllorum, vel Buxi, vel Piperis &c. acuunt.

*Dentis
o vulsio.*

Si quis verò Dentem sibi evellere cupiat, illud non nisi à perito Chirurgo fieri patiatur, ne cum ipso dente simul magna portio maxillæ auferatur, indeque Vlcus, Fistula, Cariesque maxillæ accersatur. Chirurgus ipse caveat primò, ne sanum pro ægro dentem arripiat; ne maxillam nimis dimoveat, sicque ipsum simul Dentis alveolum maximè diffingat, unde sæpius difformis facies redditur. Ut autem Dentes sine magnâ violentiâ evellantur, Gummi bederae imponendum, vel Radix Cucumeris agrestis in Aceto macerata per triduum est applicanda; vel etiam Semen Hyoscyami,

aut Radix ejusdem assata Radici Dentis calidè admovenda, ita tamen ne saliva his imbuta deglutiatur, aut vicini dentes inde simul tangantur. Extractio ipsa fit Instrumentis in hanc rem affabrè structis, prout sunt *Forceps dentium communis*, vel sic dicta *corvina*, vel *Forceps dentium Pelicano rostro similis*, quibus dentes prehendi, & extrahi possunt; *Vestes dentium bifidi*, quibus dentes prehendi nescii excutuntur; *Vestes trifidi*, quibus dentes primores unâ radice gaudentes extruduntur: *Dentiscalpium*, quò gingiva à dentibus liberatur, &c.

Exempto dente, si hæmorrhagia nimia sequatur, atque *Oxycrato* vel *Aceto solo*, vel *Vino rubro* sisti nequeat, gossypii frustulum, in quo *Olum cypreum* reconditum sit, alveolo dentis evulsi indatur; atque sic postea aliquoties iterum Os vel *Aceto* vel *Vino rubro*, cui incoctæ prius sint *Radices Angelic. aut Aristoloch. Salvia* item vel *Gargophyll. aromat. aut Myrrha*, eluatur, & ita Hæmorrhagia sistetur. Permittendum tamen est, ut sanguis post exemptum dentem modicè profluat, sicque vicem aliquam Venæsectionis admodum salutaris præstet. Remedia ergo tum demum adhibeantur, quando sanguis nimium, atque justo diutius cum virium Ægri detrimento emanare solet.

Si Dentes admodum nigri sint, tum illi *Melle rosaceo* primùm ficientur, hinc scalpro acuto nigra cutis deradatur, sicque studiosè omnes inde sordes abstergantur. Si quis tamen incommoda hujus rationis tolerare nolit,

nolit, ei parabitur *Mixtura ex Melle rosaceo, Syrupo Violarum, & guttulis variis Spiritus* cujusdam acidi, quâ miscelâ dentes ope penicilli aliquoties illini atque detergi possunt; sic enim Spiritus acidus nigras omnes fordes feliciter eluet, ac dentes albissimos reddet sed insimul Stuporem inducet, cui tamen suo more per affricationem v. gr. *folior. Malv. Althææ, Violar. Verbasci &c.* medebitur. Vel quamprimû albos fecisti dentes, iterum statim abluito *Aquâ Angelicæ, Imperatoricæ, Althææ, Malvæ, Cinnamomi*, cum *Mucilagine Seminis Psyllii*, ut ita omnes acidi Spiritus particulæ probè auferantur, antequam dentes flavedinem quandam fordidam inducant, iis familiarem, qui tali remedio sæpius uti solent. Postmodum dentes sic albi redditi ab ulteriore nigredine præservantur, si à quolibet pastu statim mundantur, & quidem vel *Pane tosto pulverisato*, vel qualicunque *Pulvere dentifricio*, ex supra dictis composito. Ut autem tanto melius omnes detergantur fordes, nonnulli *spongiâ*, alii *Radice Malvæ, Aceto rosaceo* intinctâ, & iterum siccatâ, alii denique *Scopulis setaceis* defricare solent. Interim simul cavendum, ne cibos potumque vel nimis calidè, vel nimis frigide ingeramus, aut ciborum dulcium, atque Casei manducationi plûs nimis indulgeamus, quoniam ab his dentes sensim nigerrimi redduntur.

Cariei dentium non rarò succedit *Abscessus, Ulcus*, imò *Fistula*, quæ profectò non nisi Dente carioso ex-

tracto, atque radicitus extirpato curatur. Ne autem ejusmodi Dentis evulsio tumorem pariat, gingivæ inungi solent *Oleo Amygd. dulc. rec. expr. vel Pinguedine Ranar. viridium.*

DENTIVM SORDES atque TOPHI, negligentibus hominibus sunt familiares, qui scilicet nullam suorum dentium curam habent, eos nunquam sive à pastu, sive aliàs detergunt; sed intactos semper relinquunt, ut mirum non sit, quòd his tandem Caries cum nigredine ac fœtore accedat.

Originem ducunt à particulis viscidis salino-tartareis sive terrestribus, quas partim Cibi masticati, partim saliva nonnihil subinde glutinosa subministrat, ob irregularem figuram suam facile dentium superficier adhærescentibus, ac deinceps auctis, & in tophaceam duritiem paulatim mutatis. Vocant aliàs *Lithodonton* vel *Lapidem dentalem*.

Auferuntur Sordes solæ, quemadmodum sub præcedenti jam titulo indigitatum est. *Tophi* autem non nisi subtilibus scalpris abraduntur, & hoc quidem interdum peritam circumspecti Operatoris manû requirit, ne vel Gingiva nimis lædatur, vel Dentes frangantur. Ablatis autem Tophis, ac mundatis probè dentibus *Dentifricii pulveres* quotidie in usum trahendi veniunt, ut ita fordes novæ ac Tophi posteriores præcaveantur. Pulveres ejusmodi magno numero descripti apud diversos Auctores reperiuntur, sequentes verò nobis apprimè satisfecerunt hæcenus:

R. 3

R. Co-

*Dentium
Sordes ac
Tophi.*

Causa.

R̄. Corall. alb. ppt.

Lapid. Pumic. calcinati, atque in
Aqua Rosar. extinct.

Orizæ finis. ana. ℥ij.

Radic. Ireos Florent. ℥j.

Santal. rubr. ℥℞.

Sanguin. Dracon. ver. ℥iij.

Alumin. rup. ℥ij.

Mosch. & Ambr. gry. Spirit.

Ros. sol. ana. gr. vj.

Ol. stillat. cinam. gutt. iij.

M. f. Pulvis subt. d. ad Scatul.

Vel R̄. Offis Sepiæ. ppt.

Dent. Canin. ppt. ana. ℥i℞.

Radic. Ireos florent.

Corallor. rubr. ppt. ana. ℥j.

Cinamom. opt. ℥i℞.

Alumin. usti ℥j.

Succi Japon. ℥ij.

M. f. Pulv. subt. d. ad Scatul.

Vel R̄. Crust. Panis tost.

Ocul. ☉. ppt. ana. ℥j.

Radic. Bardan.

Scorzoner. ana. ℥℞.

⚥ n. diaphoret. ℥ij.

Salis commun. ℥j.

Ol. stillat. Garyophyll. gutt. iij.

M. f. Pulv. subt. d. ad scatul.

Vel R̄. Crust. Panis tost. ℥ij.

Radic. Ireos flor. ℥j.

Salis polychrest. ℥j.

Cinam. elect. ℥ij.

Mosch. & Ambr. ana. gr. iij.

M. f. Pulv. subt. d. ad scatul.

Vel R̄. Lact. Luna.

Lapid. Pumic. calcin. ana. ℥j.

Unicorn. fossil. ℥℞.

Santal. citrin. ℥ij.

Salis Gemm. ℥ij.

Ol. stillat. Cinam. gutt. ij.

M. f. Pulv. subt. d. ad scatul.

Cum ante triginta annos Tiguri Helvetiorum studiis operam navarem atque Fœminas, Virginesque plurimas etiam alias formosissimas, sordidis nigrisve dentibus præditas deprehenderem, sequentem aliquibus Pulveribus commendavi, quo non sine fructu notabili usæ fuerunt, atque dentes mundos & albos inde reportarunt.

R̄. Summitat. ac Foliolor. Salviae nobil.

Flor. Rosar. rubr. ana. ℥℞.

Radic. Ireos florent. ℥j.

Corall. rubr. ppt.

Off. Sepiæ ppt. ana. ℥i℞.

Cinam. acut. ℥iij.

Santal. rubr. ℥℞.

⊖is commun. ℥i℞.

Mosch. & Ambr. opt. ana. gr. vj.

M. f. Pulv. subt. d. ad scatul.

Denique sequens etiam bonus est Pulvis, pluribus familiaris:

R̄. Offis Sepiæ ppt.

Cochlearum cum testis calcinatar. ana. ℥ij.

Santal. rubr. ℥i℞.

Matr. Perlar. ppt. ℥℞.

Cubebæ.

Alumin. usti. ana. ℥i℞.

Rasur. Lign. Rhod. ℥iij.

Ambr. gry. & Mosch. orient. ver. ana. gr. vj.

M. f. Pulv. subtil. detur ad scatul.

Quod si autem ex ejusmodi Pulveribus cum Mucilagine Semin. Cydonior. vel Gummi Tragac. Aqu. Rosar. & Salviae extr. bacillos facias, hosque leni calore paulatim exicces, ac deinceps pos

post pastum quōtidie ad fricandos Dentes usurpes, non solūm eos à for-
dibus & carie tutos servabis, sed etiam
Gingivas à corruptione ac putredine
immunes præstabis.

DENTIVM PROMINENTIA
est vitium, quo dens unus vel alter
extra seriei ordinem præternaturaliter
prominet, vel etiam grandior cæteris
redditur, ita ut subinde extra labia,
sicut in Apris, feratur. *Excrescentiam*
dentis etiam appellare posses, quoni-
am reverâ nihil aliud est, quàm præ-
ternaturalis ejusdem elongatio, à ta-
li structurâ proveniens, ut copiosius
justo nutrimentum per poros osseos
admittatur atque concreascit. Vitium
& venustati sive decori faciei adver-
sum, & manducationi vel masticati-
oni naturali ciborum incommodum.

Huc referendum est aliud Den-
tium vitium, quando videlicet nu-
mero excedente peccant, observan-
tur enim subinde dentes duplices,
quorum unus retro alterum positus
extat. Rarius integra dentium sive al-
terutriu, sive utriusque Maxillæ series
duplex obtingit; molesta certè, quo-
modocunque appareat.

Vitia hæc ferè à nativæ maxil-
larum structuræ præternaturali statu
originem trahunt, ubi per qualem-
cunque naturæ lusum alveoli Denti-
um multiplicantur; sicque affluente
jugiter osseo nutrimento Dentes justo
plures gignuntur.

Mederi non licet aliter ejusmo-
di vitii nisi superflui ablatione. Igitur
evellendi sunt illi Dentes supervaca-

nei, & deinceps id agendum, quod
post exemptionem fieri solet, ad Hæ-
morrhagiam nimiam sistendam, &
gingivam firmandam.

DENTIVM VERMIVCLI
sunt animalcula vivencia ex ovulis In-
sectorum in foramina dentium cario-
forū depositis, atq; vivificatis proge-
nita, hincq; radices eorū nerveas non
sine notabili sæpè cruciatu pungentia
ac mordicantia. Ovula ejusmodi
cum cibis assumpta, sub masticationis
actione eo plerunque detruduntur,
nisi forsan cum sanguine circulante
eo deveniant, aut propellantur.

Vermiculi tales vel suis in nidis
ab immisso qualicunque oleo, inprimis
destillato, v. gr. *Buxi*, *Quajaci*,
Iuniperi, *Garyophyllor.* *Rorismarin.* e-
enecantur; vel per admissum intra Os
fumum, v. gr. ex accenso super pru-
nas *Pulvere fol. Solani*, *Meliss.* *Matri-*
car. *Absynth.* *Tanaceti*, *Abrotoni.* *Bac-*
car. *Laur.* *Seminum Dauci*, *Cynæ*,
Flor. Papav. rhæad. &c. vivi evocan-
tur. Ex ejusmodi pulvere cum *Tere-*
binthinâ etiam *Pilulæ* formari, & pru-
nis injici possunt, pro fumo excitando.

DENTIVM STVPOR, est
Sensus depravatus, quo in dentibus
percipitur incommoda cujusdam ad-
strictionis molestia, citra naturæ con-
suetudinem.

Etsi autem Dentes heic affici dicantur,
non tamen omnis illorum sub-
stantia, sed tantūm expansiones ner-
vosæ & membranosæ in radicibus
dentium

Dentium
Vermicu
li.

Curatio

Dentium
Stupor.

Subje-
ctum.

dentium, vel in ipsis gingivis adstrictorio quodam motu affliguntur.

Causa. Et quidem Stuporem talem inducunt omnia acido-austera, dentibus admota; sic Vomitus acidæ pituitæ; sic saliva acida; sic Glum, & quæ exinde parantur: sic spiritus omnes acidi; sic Fructus horæi nonnihil acerbi & immaturi; præprimis, qui succo austero-adstrictorio pollent, velut Sorba, Pruna sylvestria &c. talem promptè affectum producunt.

Prognosis. Quod si Stupor frequens occurrit ab humore salivali austeriore, ceu causâ internâ, periculum est, ne tandem dentes carioli reddantur, imò quoque corruptâ inde gingivâ vacillent.

Curatio. In *Curatione* ea solùm profunt, quæ succum austerum dentibus oblitum absorbere aut detergere valent. In hunc finem illi sæpè fricentur *Herbis Portulacæ, Sempervivi majoris, Malvæ, Parietariæ, Violar. Verbasco, Quercis, Alth. Mucilag. Semin. Cydon. Aqu. Portulac. fact. Nucibus avellanis, Amygd. amaris excorticat. & contus. Radic. Pulvere Glycyrrhizæ, Malv. Alth. Symphyti, Melle tandem rosaceo, cum Roob dianthum & Pulvere Ocul. ☉. ppt. Unicorn. fossil. permisto.* Si Massa sanguinis, austerior reddita, sit in culpâ, *Acidulæ* debito cum regimine diætæ, vel etiam *Lac caprillum* aut *asininum* bibatur.

Dentium dolor.

DENTIVM DOLOR, ODONTALGIA, est tristis sensatio in unius vel plurium dentium radicibus, atque fibrillis nerveis à causâ quâ-

dam rodente & crispante producta. *Odontagram* subinde vocant.

Afficiuntur autem in hoc malo præcipuè Dentium fibrillæ nerveæ; sed & subinde etiam membranæ gingivarum à catarrho falso ita lancinantur ac roduntur, ut dolor hinc in universam lateris maxillam sese repandat.

Causa proxima Odontalgia est rosio fibrillarum in dentium cavitatibus & radicibus existentium; vel etiam membranarum Gingivas cingentium nervosarum. Rodunt autem nunc Vermiculi, dentium cariosam cavitatem occupantes vivi; nunc seroso-falso-acres particulæ ad istas partes delatæ, & inibi propter obstructionem qualemcunque stagnantes, tubulosque hâc sui stagnatione expandentes, ac dilacerantes. Si Dens usque ad cavitatem internam cariosus, perforatus, & niger existat, tum qualescunque externæ injuriæ dolorem producere valent; ita enim aër frigidus ac humidus, cibi multum saliti, acidi & acres; potus vel nimis frigidus, vel nimis calidus ansam huic malo præbere observantur. Si quis Scorbuticus affluat in suo corpore humoribus falsis, crudis & acris, hincque aëri frigido, humido ve diu multumque sese exponat, ut pedes & caput admodum refrigerentur, ei etiam ob hanc rem Odontalgia in alterutro maxillarum latere contingit, dum tale serum crudum & acido-acre ibidem in tubulis obhæret, stagnat, suisque spiculis rodit. Vocant hoc tum communiter *Defluxionem* s. *Catarrhum Capitis*. Malum

Malum hoc per se cognitum ab Egro datur ; sed aliquando tamen mitius, aliquando gravius eundem habet ; & nunc in uno vel altero Dente carioso existit, nunc in totâ lateris maxillâ hæret ; ac non rarò simul aliquantillam Febrim, Anorexiam, Cephalalgiam, Oralgiam, præprimis autem Vigiliis perpetuas inducit. Etsi proin ab Odontalgia per se nullum periculum imminet, per accidens tamen si contumacior fuerit, prava ac vehementia symptomata post se trahit. Diuturnior ac frequentior est Odontalgia in Homini- bus scorbuticis, hypochondriacis, Lue venerea affectis. Reperti etiam sunt, qui præ nimio dolore prorsus convulsi fuerunt.

In Curatione itaque ad Causam attendendum ; quæ si *Vermiculus* unus aut alter existat, fortè in cavo dentis hærens, tum vel *Oleo stillat. Absynth.* *Piperis*, *Lign. Guajac.* *Succin. Buxi*, aut *Garyophyllor.* vel *Spiritu Salis armoniac. urinoso*, *Spiritu itidem odontalgic.* aut *cephalico* qualicunque cum *Camphora* mixto ; vel *Succo amaro Anethi*, *Absynth.* *Abrotoni*, *Centaur. min.* *Tanaceti*, cum pulvere *Aloës* ; vel *Essentiâ* aut *Decocto* earundem plantarum dentibus calidè admoto enecetur, expellaturve ; vel ignito ferro exuratur, atque hinc foramini Dentis *Cera*, *Plumbum*, *Aurum*ve præservationis causâ indatur, atque firmiter infigatur. Evocatur etiam *Vermiculi fumo Tabaci* nonnihil hausto, inprimis si *Centaurium minus*, *Absynthium*, *Abrotonum*, *Solanum*, *Card.*

benedictus, *Matrican*, *Folia Hyoscyami*, *Flores Chamom.* *Sambuci* ; *Mastiche*, *Myrrha* permisceantur.

Quod si verò *serum salso-acidove-* Odontalgia à se-
ro false
scorbuti-
co.
acre, sive scorbuticum in culpa sit, Dentem cariosum inprimis affligens, tum vel Dens prorsus evellendus, quemadmodum in *Dentium Carie* explicavimus, vel exurendus, & *Cera*, vel aliquâ aliâ materiâ, prout supra dictum, repletus continuè servandus. In hoc tamen casu ordine quoque Remedia præscribi debent, universalia præmittendo, dein specialiora exhibendo. Ante omnia nobis perplacent *Pilulæ purgantes*, compositæ ex *Mass. pilul.* è *succ. Craton.* *Extract. cathol.* vel *panchymag. Croll.* cum *Scamm. sulph.* *Mercur. dulc.* vel *Cinnab.* $\frac{1}{2}$ *nii* & *Ol. stillat. Amarac. Rorismar.* &c. Imò instante malo post aliquot dies idem purgans repeti potest. v. gr.

Rx. *Extract. panchym. Cr.* \mathfrak{z} j.
Pilul. marocostin.
cathol. ana. \mathfrak{z} ss.
Trochisc. alband. gr. vj.
Ol. stillat. Garyoph. q. s.

M. f. Pilulæ num. 30. *Inaur. d. ad*
scatul. Dosis numer. 2. 3. aut 4. *mane*
vel ante cœnam, aliquoties repetendo.

Vel si vomendum simul sit, quod sæpe multum conducit :

Rx. *Gumm. Gutt.*
Crem. Fri ana. gr. 8. vel 9.
 Θ *is Artemis. gr.* 6.
Cinnab. $\frac{1}{2}$ *n. opt. gr.* 4.

M. f. Pulv. subt. detur pro dosi ma-
tutinâ.

Vel *Clyfma* unum alterumve purgans ac detergens injiciatur. Post purgans profunt quoque *Pilulæ catarrhales compositæ* ex *Extracto Betonic. Lign. Guajac. vel Saffaphras, Gumm. Guajac. Rorismarin. Bezoard. mineral. Ebor. ppt. Succin. alb. ppt. Cinnab. nativ. vel ḡn. Ol. stillatit. mac. Nucist. Amarac. Salv. &c.* De quibus m. ac v. ʒj. exhiberi debet, cum *Aquâ Betonic. Salv. Verben. Apii selin. Flor. paralyf. &c.* vel cum *Infuso fol. Thee Betonic. Chamædr. Majoran. Meliss. Ocym. & Chamomill.* quod alias in Catarrhis cephalicis efficacissimum remedium est. Si Dolor his non obstantibus persistat vehemens, *Pilulis* supra dictis catarrhalibus permiscebitur quoque aliquod *anodynum*, v. gr. *Massa Pilul. è Styrace, vel Theriaca celestis.*

R̄. *Extract. Betonic.*

Rorismar.

Gumm. Guajac. ana. ʒß.

Theriaca celest. gr. xv.

Bezoard. miner.

Cinnab. ḡn. corr. ana. ʒj.

Ol. stillat. Amarac. vel Succ. q. s.

M. f. *Pilulæ numer. 40. Inaur. d. ad Scat. sumantur decem pro dos. noctu. horâ somni.*

Vel R̄. *Extract. Lign. Guajac.*

Saffaphr. ana. ʒß.

Mass. Pilul. è Styrac. ʒj.

Cynogloss. gr. vj.

Ol. stillat. Lavend. q. s.

M. f. *Pilul. n. 30. Inaur. d. ad scat. Dosis est 10. noctu horâ somni.*

Absorbentes etiam pulveres anodynii loco Pilularum sæpius usurpati pro-

sunt, præprimis si sudor ab illis iteratus proliciatur:

R̄. *Dent. aprin. ppt.*

Corall. rubr. ppt. ana. ʒij.

Diaph. ʒvial. vel

Dar.

Bezoard. min.

Cinnab. ḡn. correct. ana. ʒij.

Laud. opiat. gr. vj.

Ol. stillat. Rorismar. vel Thym. gutt. 8.

M. f. *Pulv. subt. divid. in 12. dos. æqu. ad. ch. Mane ac vesperi sumatur dosis cum Jusculo vel Infus. fol. Thee, Beton. aut Meliss.*

Ad destruendam verò causam antecedentem sicque ultiores paroxysmos Odontalgiae arcendos, tota *Massa sanguinea* est purificanda, atque à superfluis particulis salino-acribus liberanda. Id præstare valent ante omnia *Succi Plantarum antiscorbuticarum* v. gr. *Nasturtii aquat. Cardamines, Beccabung. Cherefolii, Petroselini Macedonic. Plantag. aquat. Trifol. fibr. &c.* recenter expressi, filtrati, & ad uncias duas mane ac vesperi per aliquot hebdomadas hausti. Vel *Succorum loco Juscula* assumi possunt, *Herbis diaphoreticis ac antiscorbuticis*, v. gr. *Scabios. Fumar. Beccabung. Cherefol. Borrag. Pimpinell. Numular. Alchymill. Saniculæ, Plantag. &c.* alterata. Simile quid præstant *Essentiæ Trifol. fibrin. Succin. Beton. Lignor. Strobilor. Pini, Meliss. Anthos, Thymi, Saturejæ, Numular. Spiritus Cochlear. Tinctur. ḡn. Corallor. Martis aperitiv. Elix. propriet. Clauder. ad 20. 25. aut 30. guttas m. ac vesper. cum ve-*

hicula

hiculo commodo. Æstivo tempore Sanguinem optimè corrigit potus *Lactis asinini*, vel *Thermarum* quarundam, veluti sunt *Fabarienses Helvetiæ*, *Plumbarienses Lotharingiæ*, *Carolinæ Bohemiæ &c.* Subinde opus est, ut vel *Setaceum in Nuchâ*, vel *Fon-ticulus in Brachio* excitetur. Vere & Autumno Vina medicata purgantia conducunt, quemadmodum sequens vel simile præscribi poterit, & cum moderamine diætæ in usum vocari:

℞. *Radic. Carlin.*
Pimpinell.
Polypod. ana. ʒß.
Cortic. Cappar. ʒiij.
Lign. Sassaphr. ʒvj.
Herbar. Hepat. nob.
Beton.
Fumar.
Scolopendr. ana. Mj.
Card. bened. Mß.
Fol. Senn. opt. mund. ʒx.
Agar. trochisc.
Rhabarb. elect. ana. ʒß.
Cortic. Winter.
Semin. Anis. ana. ʒiß.
Æis Tamaric. ʒj.
 Incisis, contusis atque in Sacculo li-gatis affunde
Vini albi veteris.
Aquæ fervent. font. ana. ℥iijj.
 Singulis hinc diebus mane exhauria-tar Cyathus unciarum quatuor.

Si quis respuat usum Vini medi-cati, ei sequentes *Pilulæ usuales* or-dinabuntur; v. gr.

℞. *Massæ Pilular. Marocost.* ʒij.
Emanuel. ʒj.

Magister. Jalapp. ʒß.

Ol. stillat. Rorismar. q. s.

M. f. l. a. Pilulæ num. 180. Inaur.
d. ad Scatul. conspersæ Pulv. Cinamom.
De quibus 8. 10. ad 12. quater vel quin-quies, alternis nimirum diebus, mane cum Jusculo exhibeantur.

Inter topica Remedia profunt, ^{Remedia topica.} quæ causam proximam destruere, humorem circa Dentes stagnantem acrem discutere, fibrasque irritatas anodynâ suâ vi demulcere possunt. In hunc finem æstimamus valdè pro-desse *Collutiones Oris* frequentes cum decoctis calentibus institutæ, ubi vel in Aquâ vel in Lacte coqui solent v. gr. *Radices Althææ, Allii, Caryophyllatæ, Malv. Carlin. Ulmar. Herbæ Parietar. Salv. Alth. Beton. Meliss. Scabios. Flo-res Chamomill. Sambuc. Melilot. Malv. hortensis arboreæ, Verbasc. Calendul. Croc. Ligna Guajac. Sassaphr. Semina Anisi, Fœnic. Præstans etiam Sotirella parva sic dicta, sive Massa pilularis è Pipere, Caryophyll. arom. Radic. Py-rethri, Zingib. Croco & Laudano opiato cum Oleo destillato Caryophyll. Buxi, Chamom. aliove aromatico confecta, & dentis præcipuè cariosi foramini sæpè intrusa. Placet nonnullis su-ctione Fumi Foliorum Tabaci, Solani, Melissæ, Betonicæ, Seminum Anisi, Fœ-nic. aliarumve herbarum sibi mederi. Massa Pilularum antipestilentialium Ruffi ad grana 6. plurave Aceto Vini dissoluta, & hinc calidè denti afflicto cum gossypio imposita levamen af-fert promptum, inprimis si Opii tinctu-ra simul permista fuerit. Sunt qui Pulverem Radic. Zingiberis, Pyrethri,*

Pentaphylli, Piperis albi, Spiritui Vini mistum. naribus affecti lateris calidè aliquoties attrahunt, & momento citius quandoque à dolore liberantur. Neque *errhina* alia heic contemnenda sunt. Nonnulli quinque *Cantharides pulverisatos* cum tribus contusi *Allii apicibus* & *Theriaca* in formam *Cataplasmatidis* reducunt, hocque linteolo exceptum admovent flexuræ Cubiti lateris affecti non sine succedente levamine. *Vesicatoria* acria in pertinaciore *Odontalgia* Nuchæ aut pone Aures, leniora verò etiam Temporibus applicari debent. Vbi sanguis adest sufficiens, *Venæsectio* quoque in pede afflictæ lateris, vel sub Linguâ instituta, aut *Scarificatio cum Cucurbitulis* dorso applicatis prodest. *Sanguisugas* alii Fronti aut Temporibus, ubi venæ patentes sunt, admovent. Neque contemnendæ sunt *frictiones* Capitis ac Dorsi cum linteis calidis institutæ. *Radix Lapathi acuti* in taleolas concisa ac denti afflictæ imposita mirè auxiliatur, non secus ac decoctum *foliorum Lappæ* utriusque. Quidam porro anthelicem Auris *Cauterio actuali* tangunt atque exurunt. *Allium* cum Nitro ad olecranon applicatum juvamen citum attulisse referunt alii. Sic & *Amuleti* loco manipulus *Herbæ Aparines* concisæ, linteoque exceptus inter Scapulas suspendi solet cum fructu.

Curatio
Odontalgia
ab
humore
pituitoso.

Quando autem ab humore pituitoso-viscido, leniter acri, quem Veteres incensu causarum frigidarum posuerunt, membranas circa dentes nimium distendente producitur *Odontalgia*,

tum in ipso quidem Paroxyſmo statim *Clyſma emolliens* atque *detergens* cum fructu injicitur; dein verò corpus purgari adhuc debet, v. gr. sequenti uno alterove:

℞. *Maß. pilul. marocost.*

è *Succin. Crat. ana. ʒß.*

Resin. Scammon. gr. 2. 3. aut 4.

Cinnabar. ʒ n. correct. gran. 8.

Ol. stillat. Garryophyll. q. s.

M. f. Pilul. num. 12. Inaurat. d. ad ob. pro dosi matutinâ, superingerendo Jusculum carnis non salitum singulis horis usque ad meridiem.

Vel ℞. *Spirit. Anth. ʒiijß.*

Anis. ʒj.

Resin. Jalapp. gr. 8. vel 9.

Solutis leni igne adde.

Syrup. de Beton. ʒiijß.

Aqu. Cinam. cum Vin. dest. ʒß.

M. F. Potiuncula d. ad Vitr. pro dosi matutinâ.

Vel *Vinum medicatum* per epicrasin purgans ordinari potest, blandè educens & incidens simul viscidas cruditates humorum: v. gr.

℞. *Radic. Apii.*

Calam. arom.

Scorzoner.

Vincetox. ana. ʒiij.

Herbar. Beton. Miß.

Meliß.

Sumit. Centaur. min. ana. Mj.

Flor. Stæch. Arab. pij.

Fol. Senn. opt. mund. ʒj.

Rhab. elect.

Radic. Helleb. nigr. ana. ʒiij.

⊕ *is Card. bened.*

Cinam. elect.

Spic. Indic. ana. ʒj.

Semin.

Semin. Anis. ʒij.

Incisis, contus. & in nodulo ligatis affunde Vini albi Veter. ℥iiij.

Aquæ fontan. calentis ℥iiij.

Singulis diebus mane jejuno stomacho quatuor plus minus uncia hauriantur.

Purgato corpore attenuantia, resolventia & humorem stagnantem discutientia conducunt, atque hunc in finem præscribi possunt Infusa herbarum cephalicarum cum Foliis Thee mixtarum, mane ac vesp. per aliquot hebdomadas calidè sorbillata: v. gr.

Rx. Radic. Ireos Florent.

Sarsaparill. ana. ʒiiij.

Chinæ.

Calam. arom. ana. ʒij.

Folior. Thee optim.

Betonic. ana. ʒiiij.

Chamædr. ʒij.

Meliss. ʒj.

Summit. Thym. ʒʒ.

Flor. Borrag.

Tunic. ana. ʒij.

Croc. optim. ʒj.

Cinam. elect. ʒiʒ.

Incisa tenuiter misce, d. ad Scatul. Hinc mane ac vesp. drachmæ duæ huius miscelæ infunduntur in Aquâ fervente, quæ dein calidè sorbillanda, succo Liquiritiæ potius quàm Saccharo edulcorata.

Simul tamen in hoc Infuso propinari semper poterunt guttulæ 25. ʒo. pluresve, Salis alicujus volatilis oleosi, vel Spiritus Cochleariæ, Melissæ, Anthos, Elixiris cujusdam cephalico-stomachico-balsamici, Tincturæ Succini, Essentiæ Betonicæ, Thymi, Serpilli, Rosmarini, Zedoar, Galangæ, & similis.

Vel sequens Pulvis in usum trahatur:

Rx. Radic. Angelic. vel Imperat.

Calam. aromat.

Cyperi rotund.

Zedoar. vel Galang. ana. ʒj.

Ebor. ust. ppt.

Corall. rubr. ppt.

† n. diaph. ana. ʒij.

Semin. Anis. Fœnic. ana. ʒij.

Salis Vol. C. C. ʒʒ.

Sacch. cand. alb. ʒiʒ.

M. f. Pulvis subt. d. ad Scatul. Dosis m. ac v. ʒʒ. ad ʒij. cum vehiculo appropriato, subinde sudorem abhinc expectando.

Extus in hoc Dolore, per pituitam stagnantem excitato, maximo-pere profunt Gargarismata attenuantia, resolventia, & discutientia, qualia parari possunt ex Herbis Calaminth. Hyssopi, Rutæ, Verben. Solani, Majoran. Meliss. Ocymi, Origani, Salviæ, Serpilli, Thymi, Floribus Sambuc. Croci, Chamomill. Melilot. Radicib. Pyrethr. Hyoscyam. Angelic. Imperat. Men. Cepar. Allii, Cyperi, Pentaphylli, Filicis, Sarsaparill. Seminibus Urtic. Dauc. Anis. Carvi, Ligno Quajac. Sassafr. Juniper. Baccis Lauri, Juniper. Cinnamon. Zingiber. Caryophyll. aromat. & similibus in mediâ parte Vini & Aquæ decoctis; cujus postea decocti calentis vel calefacti portio quædam sæpius in ore aliquamdiu teneatur, tandemque iterum exspuatur. Alii loco Decocti Spiritum Vini, vel Anthos, vel Anhaltinum camphoratum frequenter Ori ingerunt, & in eo tantisper retinent. Maximè verò heic profunt fomentationes siccæ, quales sunt Sac-

culi interpassati, *Menthâ*, *Melissâ*, *Ocymo*, *Thymo*, *Origano*, *Calaminthâ*, *Floribus Sambuci*, *Chamomillæ*, *Croci*, *Seminibus carminativis*, *Baccis Juniperi*, *Lauri*, *Avenâ*, &c. repleti, atq; calidè semper applicati. Sed & conducunt *Lintea fumo Pulveris* alicujus fumalis, v. gr. *Herbarum cephalicarum*, *Aromatum* ac *Seminum carminativorum*, calefacta; nos sequentem deprehendimus esse efficacissimum:

R. *Radic. Angelic.*

Cyperi oblong. ana. ʒij.

Galang. ʒj.

Rasur. Lign. Juniperin. ʒvj.

Santal. citr. ʒij.

Mastich. elect. ʒj.

Olibani ʒij.

Storac. calamit. ʒʒ.

Folior. Meliss. Thym.

Puleg. ana. ʒiʒ.

Solani. ʒj.

Flor. Sambuc. ʒiij.

Incis. & contusa redigantur in Pulverem grossum, qui dein prunis injectus fumum discutientem exhibet, Linteis excipiendum & applicandum.

Vesicatoria quoque conducunt, retro Aures applicata: vel Emplastrum è Mastiche, Olibano, Styrace, Semine sinapi, Tacamahacâ, cum aliquot granis Cantharidum, & Resinâ paretur, ac semithaleri magnitudine Temporibus applicetur. Venæsectio aut Cucurbitulæ cum scarificatione in iis locum habent, quorum vasa sanguine sunt repleta. Dolentibus verò Dentibus aromatica & anodyna cum fructu applicari solent: ita Gossypium solutione Camphoræ in Aquâ Regiæ. Hun-

gar. vel Oleo quodam destillato, v. gr. Caryoph. aromat. Piperis, Buxi, Lign. Guajac. Thymi, Rorismar. Lavendul. Essentiâ Opii, vel Succo Allii sub cineribus cocti imbutum, ac denti impositum mirè sistit dolorem. Rulandus heic extollit suum Oleum heraclinum, Michaëlis suum Balsamum odontalgicum; Wedelius Tincturam suam anodynâ, Clauderus suam Tincturam Aris Oli ad 40. guttas cum Aquâ quadam appropriatâ permixtam, atque in Gargarismate usurpatam. Sic & Radices Hyoscyami, vel earum ramenta dolenti Denti adhibita cruciatus ejus promptè interdum sedant. Vertex Capitis quotidie bis vel ter linteis calentibus, aut fumo superiore imburis, probè fricari, ac dein Oleum destill. Succin. Baccar. Juniper. Lavendul. Rorismarin. Thymi, Chamomill. Angelic. inungi, desuperque adhuc Cucupha è speciebus ordinariis parata imponi cum successu poterit.

Extra paroxysmum corpus subinde Pilulis usualibus supra descriptis purgandum est. Sudor quandoque haustu Aquæ destillat. fl. Sambuc. Cherefol. Fumar. Card. bened. Beton. cum Roob. Juniper. vel Sambuc. addito scrupulo uno Spiritus theriacalis camphorati, &c. eliciendus.

Quod si à Lue venereâ producatur dolor frequens, tum Lues debite est curanda ac profliganda, ac interea topica superius allegata in usum vocanda. Si verò Hydrargyri usus in culpâ fuerit, tum corpus ante omnia Infuso fol. Sennæ ac Rhabarb. vel Pilulis marocostinis, vel Extract. catholic.

tholic. purgabitur ; deinceps autem quotidie sudor exhibito haustu *Aquarum destillatarum* elicietur ; simul sumto pulvere diaphoretico qualicunque, ex absorbentibus merè parato.

Quando *Gingivæ Inflammatio* Odontalgiaë causam ferè agit, tum *Clyisma emolliens & detergens* ante omnia injiciatur : dein etiam vel raninaë sub Linguâ, vel vena Brachii aperiatur. Os verò sæpius colluatur vel *Spiritu Anthos, Cerasor. nigr. aut Serpilli* ; vel *Decocto Herbar. Brunell. Scabios. Salv. Meliss. Agrimon. Anserin. Succisæ, Florum Chamomill. Sambuc. Ligustr. Croci, Malv. arboreæ, &c. in Aquâ & Vino factis.*

Si ad *Suppurationem* tendit Inflammatio, & ita *Epulidém* constituit, tum maturans Gargarisma ex *Lacte calente cum incoctione Fol. Alth. Malv. Violar. Parietar. Flor. Melilot. Sambuc. Verbasc. Croc. Malv. hortens. arbor. Calendul. Ficum pinguum, in usum trahetur.* Gargarisationis actu absoluto *Ficus* dissecta tuberculo *Gingivæ* imponenda venit : maturatus autem, ruptusque per se Abscessus extergendus est *Melle rosaceo cum Succo Apii, Aquâ Plantag. Nasturtii, Essentiâ Myrrhæ, Aloës, pulvere tandem Rubricæ fabrilis.* Exterfione Ulceris cum aliquali expressione sæpius factâ consolidatio promovenda est, vel solo *Melle rosaceo cum pulvere Myrrhæ, Mastichis, aut Rubricæ dictæ* pluries applicato.

Vbi tota Gena cum dentium Doloré intumuit, ac valdè calet, tum intus quidem exhibitis aliquoties dia-

phoreticis sudor blandus movebitur, extus verò *Sacculus interpassatus triticeâ Farinâ* probè siccata, nec non *Cretâ albâ, Bolo communi, pulvere Liquiritiæ* repletus, atque tepidè Genæ toti applicatus prodest. *Clyisma* simul emolliens & detergens, etiam, si opus videbitur, repetitâ vice infundetur, & *Venæsectio* pro re natâ in Brachio instituetur.

Si *Dentium Caries* occasionem Dolori præbeat, tum huic malo ita medendum est, quemadmodum sub Titulo *Dentium Cariei* supra indigimus. Vbi evulsio certè Dentis peritâ Artificis manu instituta omnium certissimum Odontalgiaë remedium haberi debet. Si quis verò hanc formidet carnificinam, ei spontanea Dentis carioli elapsio procurari debet ; atque hunc in finem commendant multi pulverem *Radiciæ Hellebori nigri, Turbith, Angelic. Imperator. Aronis, Armoraciæ, Seminis Hyoscyami, Myrrhæ, Salis armoniac. Caryophyllor. arom. Piperis, aut similium cum Farinâ, Cerâ, viridium Ranar. pinguedine, ac Melle in globulos coactum, aut in Unguenti formam redactum, & Cariei sæpius cum gossypio immisum.* Alii succum è *Foliis Tithymali, Ficus, Chelidoniæ majoris, Nicotianæ, Solani, Aronis, Armoraciæ, Piperitidis &c.* recenter exprimunt, eumque *Farinæ* subactum indunt sæpè, donec Dens vel frustilatum sponte exciderit, vel vacillans redditus sine dolore aut periculo eximi queat.

In *Diatâ* notandum, ea omnia esse formidanda, quæ vel Massam sanguis-

Dolor
à Carie.

• sanguinis nimis salsam & acrem, vel nimis pituitosam reddere valent: quæ itidem Dentibus cariem adferre possunt, prouti sunt *Casei*, *Mel*, *Saccharum*; nimis calentes, vel nimis gelidi *Cibi* ac *Potus*. Si jam cariosus est Dens, Aër frigidus-humidus, acer, & rigidus; Cibi nimis saliti, & modò dicta paroxysmum excitantia sunt fugienda. Æstivo tempore potus Thermarum unà cum leni balneatione prodest.

*Dentium
vacillatio*

DENTIVM VACILLATIO est Morbus solutæ continuitatis, quo dentes, qui naturaliter in suis alveolis immobiles ac firmi hærere deberent, ruptis vel laxatis habenis, mobiles & vacillantes evadunt.

Causa.

Oritur malum, quotiescunque fibrillæ sive in radicibus Dentium existentes, sive Gingivarum, quâ dentibus applicantur, ut eos firmiter in suis alveolis teneant, vel à seroso humore nimium humectatæ & emollitæ laxiores redduntur; vel etiam à salivâ aliove allabente humore acri salso-corrosivo exulceratæ aut erosæ rumpuntur; unde Gingivarum carne molliore, flaccidiore, ulcerosâ, tumidiore, & sanguinolentâ redditâ Dentes mobiles valdè redduntur. Hinc *remotius* ad Affectum contribuunt Intemperies humorum & Salivæ scorbutica, aut venerea; ut & dyscrasia corrosiva Lymphæ salivalis per inunctiones mercuriales, aliamve Mercurialium remediorum adhibitionem inducta, unde fibrillæ substantiæ Gingivarum sensim penetrantur, toni

fui firmitudinem amittunt, atque emollitæ, aut corrosæ dentes in suis loculis tenere amplius nequeunt. E causis autem *procatarteticis* contribuent Aër crassus, humidus, Cibi saliti, acidi, Potus Cerevisiæ acescentis, vel multum *Frææ*, nec non Vinorum *Fræorum*; concubitus cum hominibus Lue *Fræâ* laborantibus; applicatio mercurialium fasciarum in Scabie; opiatorum denique usus frequens in Odontalgia.

Et si verò morbus hic per se ex Ægrorum querelis cognoscatur, viderique & tactu deprehendi possit, notandum tamen probè Medico Practico, utrum Æger simul Scorbutico, vel Lue *Fræâ* laboret? Vtrum remediis mercurialibus sive extus, sive intus fuerit usus? Interim concurrat simul cum ipso Affectu oris foetor, dentium nigredo & squalor, Gingivarum corruptio, facilisque sanguinolentia. Quandoque & dentes ipsi malè habitii prorsus excidunt. Quæ proin à Dentium dolore, vel à Salivatione mercuriali producta est Vacillatio, per se ferè curatur, modò Salivatio, vel Odontalgia cesset, & nulla Gingivæ putredo vel nigredo adfuerit. A scorbuticâ autem humorum & salivæ diathesi excitata sæpius est diuturna, & post se facile trahit Gingivarum absorptionem, Dentiumque casum.

In *Curatione* radices hujus Mali sunt extirpandæ, ac eapropter Gingivæ flaccidæ, tumidæ, cruentæ, ulcerosæ, adstringentibus, absorbentibus, mundificantibus, consolidantibus persanandæ. Quod si proin Lues adsit

adit & ea, tum non nisi hoc morbo curato & alter tolletur. Si verò scorbutica adit inquinatio, & illa suo more per internas sanguinis elutriationes tractabitur, uti sub titulo de *Scorbuto* fusè notavimus. Si neutrum adsit, præscribetur duntaxat *Vinum medicatum purgans* ex *Radic. Chinæ, Filic. Pimpinell. Caryophyll. Ligno Sassafr. Juniperin. Herbis Sanicul. Alchymill. Scolopendr. Fumar. Borrag. Scabios. Hepatic. nobil. Cuscut. Beccab. Trifol. fibrin. Petroselin. Florib. Calendul. Salv. Betonic. Ros. rubr. Seminib. Anis. Fenic. Carv. Fol. Sen. s. s. Rhabarb. opt. Radic. Helleb. nigr. Agar. trochisc. Cortic. Winter. Sale Absynth. Onon. Centaur. min. &c. Vel *Pilulæ purgantes* ex *Extract. panchymag. Croll. catholico, Massâ pilul. è Succin. Crat. sine tamen Mercurio dulci* aliquoties præscribentur. Et ubi aliqua simul adest plethora, Venæsectionem quoque suademus. Postea verò m. ac v. exhaustiatur cyathus decocto *Ligni Sassafr. Juniper. ac Rad. Sarsæ parill.* repletus, sicque per plures dies urgente necessitate continuabitur; quin verno tempore potus *Lactis caprilli*, aut æstivo potus *Acidularum*, vel *Lactis asinini* concedatur debito cum regimine diætæ.*

In omni casu topica remedia usurpari possunt; & quidem primò omnium detergeri gingivæ dentesque debent probè decocto *Cochleariæ, Trifol. fibrin. Sanicul. Nasturt. aquat. Apii hortens. Geran. robert. Salviæ, Rorismarini, Rutæ, Betonic. Pyrol. Flor. Ros. rubr. Ligustr. Malv. hort. in Vino*

rubro, adjecto quoque *Sale prunellæ*, vel *Nitro* $\frac{1}{2}$ iat. \ominus *Absynth. Alu- mine*. Imò etiam quandoque *Spiritus Vini camphoratus, Mel rosaceum, Roob dianusc.* permisceri poterunt. Vsurpabitur autem sæpiùs tepidè, os probè colluendo, linteisque mollibus *Gingivas* cum aliquantillâ pressione abluendo. Commendatur quoque *Gargarisma de Radice Tormentill. Myns.* nec non *Decoctum* ad *Gingivas* roborandas *Poterii*. Postea remedia blandè exiccantia, & adstringentia, simul & sanantia in usum vocabuntur; qualia sunt vel *Tinctura Myrrh. Aloës, Laccæ florentinæ Myns. aut Catechu, vel Essentia Trifol. fibrin. Corticum Tamaricis, vel Spiritus Cochleariæ, Rorismar. vel Decoctum Lignorum forte*, quibus invicem mistis sæpiùs gingivæ foveri possunt. Si aliquid de \odot albo permisceas, tanto feliciùs adstringet, sed simul Stupor dentium excitabitur, brevi tamen iterum cessans; & nigredo sequetur, suis remediis facile præcavenda. Alii liquores eosdem *Melli rosaceo* cum tantillo *Aluminis usti* permiscent, sicque frequenter cum fructu inungunt. Addi potest & *Pulvis lapidis Hamatites*, nec non *Ocul. \odot . ppt. vel Cretæ alb. $\frac{1}{2}$ n. diaphor. Lapidis medicamentosi Croll. Tinctura Laccæ* sequenti modo parata valde proficua est:

*Tinctura
Lacca
florent.*

\mathcal{R} . *Aqu. Plantag.
Fl. Ligustr.
Salv.*

*Phlegm. Vitrioli ana. \mathfrak{z} ij.
Misce atque in hac Aquâ dissolve
Aluminis usti q. s.*

Tt

Solu-

Solutionem postea digere cum Lacca florentina pulvere, donec Tinctura valde rubicunda evaserit.

Hinc variæ miscelæ fieri possunt, ad Gingivas extergendas, roborandas ac firmandas: v. gr.

℞. *Aqu. Plantag.*
Rorismarin.
Brunell. ana. ʒj.
Lapid. medicamentos. Cr. ʒij.
Tinctur. Lacc. fl.
Essent. Myrrh. ana. ʒj.
Mell. rosac. ʒß.

M. d. ad Vitr. Humectetur linteam vel spongiola, hacque Gingivæ & Dentes pluries quotidie fricentur, ad scorbuticam diathesin corrigendam. Vel

℞. *Aqu. Salv.*
Centaur. min.
Semperviv. maj. ana. ʒj.
Mell. ros. ʒvj.
Roob. dianuc. ʒij.
Œus Cochlear. ʒj.
Θis ʒß.

Misc. d. ad Vitr. Usurpetur ut præcedens.

Vel Decoctum Salviæ cum Melle rosaceo ac Spiritu Salis aut Vitrioli mixtum adhiberi potest cum fructu ad Ulcera, Putredinemque Oris & Gingivarum mundificanda atque persananda. Vel sequens in usum trahatur Linimentum, ad emendandam Vacillationem dentium scorbuticam egregium.

℞. *Radic. Ireos flor. ʒiß.*
Tormentill. ʒj.
Fol. Salv. ʒij.
Flor. Aquileg.
Myrrh. elect. ana. ʒj.

Aluminis rup. ʒij.

M. f. Pulvis subtil. cum Melle rosaceo ad Linimenti formam redigendus, quo dein Gingivæ bis vel ter quotidie illinendæ sunt.

Vel ℞. Pulver. radic. Bisfort.

Aristol. rot. v. ana. ʒj.
fol. Beton.
flor. Malv. hort.
Balaust. ana. ʒiijß.
Rubricæ fabril. ʒiß.
Myrrh. elect. ʒj.
Alum. ust. ʒij.

Ol. dest. Garyoph. arom. gutt. 6.
Mell. rosac. q. s.

Misc. f. Liniment. d. ad Fictile.

Vel ℞. Decoct. aut Succ. Semperv. ʒij.

Aqu. Calc. viv. ʒj.
Tinctur. Lacc. fl. ʒij.
Myrrh. ʒiß.

Aqu. Salv.
Cochlear. ana. ʒj.
Mell. rosac. ʒvj.

M. d. ad Vitr. Laventur inde Dentes.

In graviore Gingivarum putredine & inde natâ Dentium vacillatione prodest egregiè Linimentum Hartmanni cum additione Essent. Myrrhæ, ac Spirit. Cochlear. Imò nonnunquam ad usum Unguenti Ægyptiaci cum Melle rosaceo permisti, pro erodendâ, fortiusque extergendâ putredine Gingivarum deveniendum est.

DENTITIO DIFFICILIS, est symptoma Infantibus peculiare, quo dentes cum labore, difficultate atque dolore post septimum ætatis mensem excrecere, tandemque erumpere incipiunt.

Non

Nonnullis quidem Infantibus facilius eruptio dentium contingit, sed illis solum, quos natura gingivis mollioribus & laxioribus donavit, quarum fibrillæ facilius erumpentibus Dentibus cedunt. Quando autem Fibræ Gingivarum firmioris ac durioris texturæ sunt, tunc difficilius perfringuntur, & sic dolorificam Dentitionem producunt, fibris nimirum in extensione valde opere irritatis.

Diagnosis. Post septimum mensem ut plurimum hæc Tenellos molestiaprehendit, aliis citius, aliis etiam tardius eadem contingit. Qui fortè primis ægotârunt mensibus, iis ut plurimum tardius comparent dentes. Si verò durius hoc negotium obtingit, tum varia simul symptomata Misellos excruciant; præter dolores enim, tumorem atque inflammationem gingivarum sequentes, etiam subinde febricitant, alvi fluxu pituitoso ac mucilaginoso divexantur, sitiunt, parum appetunt, inquietè dormiunt, in somno expavescent, non rarò convelluntur, epilepticosq; delabuntur in motus; clamant frequentissimè, interdum Aphthis simul affliguntur: inque hoc statu per plures aliquando hebdomadas manent, ut etiam reperti sint, qui ad extremam ferè maciem redigebantur, aut epilepticis motibus prorsus interimebantur.

Quod si proin molesta hæc negligatur Dentitio, haud difficulter in Febrim malignam, Diarrhœam funestam, Epilepsiam lethalem, aut etiam Hæticam Misellos conjicere potest.

Quamobrem in *Curatione* partim Nutrix capiat remedia quædam anti-febrilia, sub formâ *pulverum* ex $\frac{1}{2}$ n. *diaph. C. C. phil. ppt. Ungul. Alc. ppt. Ebor. ppt. Ocul. \odot . ppt. Dent. Apr. ppt. Crystall. alb. ppt. & similib.* aut sub formâ mixturæ, ex *Aquis destillatis Card. bened. flor. Samb. Scab. Fumar. cum prædictis pulveribus & Syrup. Papav. rhead. comp.* Sed insimul ab irâ, æstu, excandescentiâ; à frigido aëre; à cibis acidis, maximè salitis, fortiter aromatizatis abstineat Nutrix.

Infanti autem dentienti pulvis quoque ex *Ebor. ppt. Ungul. Alc. ppt. Bezoard. min. Corall. rubr. vel alb. ppt. Ocul. \odot . ppt. Semin. Pæon. atque Saccharo comp.* subinde detur. Imò *Lapis bezoardicus orientalis vel occident. verus* ad aliquot grana simul concedatur. Si convulsivi motus adsint, mixtura cochleatim propinetur, ex *Aqu. Borrag. fl. Til. vel Consol. regal. Flor. omn. cum tantill. Syrup. flor. Tunic. pulveribusque modo dictis concinnata.*

Extus quoque antispasmodica suo loco comendata in usum vocentur. Dein cura omnis adhibeatur ut gingivæ emolliantur, quod obtinetur vel *baculo Liquirit. contuso & ad lambendum exhibito*; vel *Oleo Amygd. dulc. rec. expr. vel Butyr. aut Adipe gallinaceo* gingivis frequenter inuncto. Sunt, qui *Cerebellum Leporis*, aut *Cerebella Gallinarum*, vel *Pulverum cum Melle* terunt, iisque Gingivas fricant. Conducit in eundem finem melius *Cremor Hordei*, vel *Succus à Cancris vivis & contulis expres-*

fus cum *Aqu. Sempervivi* ac *flor. Cyani*. Alii etiam gingivas scalpello aperiunt, quod tamen cautè est faciendum, ne Vlcus inde sordidum enascatur. Mulierculæ nostrates appendunt *Dentem lupinum argento exceptum*, vel *Radice Ireos florentinæ*, ut Infantes sæpiùs ipsas mordeant, sicque mordendo eruptionem dentium promoveant. Si nulla Infantem teneat Febris, tum pro anodyno concedi & exhiberi solet *Vinum album minùs acidum*, quotidie ad duo vel tria cochlearia per aliquot dies. *Aphthis* præsentibus occurritur, sicuti suo loco exponimus.

Si *Diarrhoea* nimium torqueat, Nutrix bibat *Emulsionem Amygdalarum dulc.* ipsique Infanti pulvis *Corallo- rum rubr. ppt. & Unicornu fossilis* cum *Saccharo* concedatur.

Diabetes

DIABETES est frequentissima copiosæ Urinæ excretio, sine dolore, vel ardore, cum maximâ siti, virium prostratione, atque corporis diminutione Hominem ad mortem plerumque comitans.

Pars affecta.

Affectus oppidò rarus, cujusque pauca à Medicis & Practicis etiam celeberrimis observari solent exempla: ubi principaliter quidem Renes & Vesica, specialiùs autem Fibrillæ glandularum renalium, atque Sphincteris Vesicæ simul quandoque affliguntur.

Causa.

Producitur hic Affectus ferè à Fibrillarum renalium paralyfi, ubi nimirum spiritus animales quamcunque ob causam antecedentem, sive obstructionem, sive compressionem,

sive ruptionem aut erosionem nervorum renalium, in dictas fibrillas non influunt, sicque tonum & firmitudinem ipsis justam non amplius conciliant, ut hinc per poros ampliores serum sanguinis copiosius transcolari & transmitti necesse habeat. Tubuli tamen renales iis tantum in extremitatibus, quibus secreta jam urina in pelvim elabitur, flacciditate pollent nimiam, imò fortè paralyticam; sed in alterâ extremitate, quâ tubuli hiant in glandulas, aut inde oriuntur, nullam flacciditatem habent, quia flacciditas hisce in locis contingens potius Ischuriam excitaret. Deinceps verò tali in Sanguine, Hominis hoc vitio laborantis, fusio interdum est concipienda, quâ serum longè fluidius redditum copiosè admodum per patentes Renum poros diffluit, ac dum interea siticulosus Ager continuò largiter bibat, nova jugiter materia Urinæ subministratur.

Facile interim Morbus hic cognoscitur, dum Ager frequentissimè ad mingendum stimulatur, neque frustra, sed copiosam etiam urinam semper reddit, cum in Vesicam nova jugiter iterum demittitur. Retinere tamen ad tantillum tempus Ager urinam potest; ubi verò, quod etiam contingere solet, simul Sphincter Vesicæ resolvitur, tum Urina continuè invito vixque sentiente Homine profluit; quod vitium *Incontinentiæ Urinæ* nomine venit. Interea Ager viribus orbatur quotidie magis, inextinguibili siti torquetur, inquietus & ἀγρυπνος redditur, febricitat lentè,

paula-

paulatimque emaciatus & exsanguis redditus extinguitur.

In *Curatione* ab omnibus diureticis est cavendum, ac ea potius in usum trahenda, quæ debilitatum renalium fibrarum tonum corroborare, Spirituumque animalium ad illas influxum refuscitare valent. Vnde nec Venæsectio, nec purgantia, neque etiam Vomitus profunt; sed potius blanda diaphoretica, & nervina sunt præscribenda: ubi internè quidem commendamus usum nunc *Tragematis ex Aromatibus*, item *Herb. Major. Rorism. Flor. Beton. Ros. rubr. Corall. rubr. ppt. Unicorn. fossil. Ebor. ppt. ☉e volat. C. C. purior. Radic. Tormentill. Bistort. Terrâ sigill. Croco Martis adstring. &c.* cum *Saccharo concinnati*: nunc usum *Tinctur. antiphthis. Garmann. Essent. Succin. Gramin. Parnass. Trifol. fibrin. Myrrh. Plantag.* Nunc etiam *Mixturas* ex similibus *Pulveribus* ac *Tincturis* cum *Aqu. Burs. pastor. Polygon. Fœnicul. Flor. Lil. convall. Flor. Til. Beton.* atque *Confect. Alk. vel Hyacinth. compl.* compositas ordinamus. Non contemnenda quoque *Tinctura Ambr. gryf.* atque *Succi Japonici*, aliis permixta. Externè in principio statim *Balnea* commendamus *Aquæ dulc.* cum incoctione *Herbarum cephalic.* atque *uterinar.* Sed infimul *Cucurbitulas* magnas *Lumbis* applicandas cum *Scarificatione* suademus. Hinc & inunctiones cum *Oleo myrtino, mastichino, Absynth. laurino, juniperin. Succin. Camph.* ut & *Friktiones spinæ dorsæ*, ejusque lotiones cum *Spirit. Vini camphorat. Spiritu Anth. Juniper. Lumbric. terr. &c.* commendamus.

DIARRHOEA, Vid. *Alvi Fluxus.*

DIFFICILIS RESPIRATIO, Vid. *Asthma.*

DISLOCATIO MEMBRORVM, Vid. *Luxatio.*

DOLOR in genere est tristis sensatio Animæ ob læsionem fibrarum alicujus partis nervearum, à motu irregulari & violento factam, oriunda.

Dolor in genere.

Dolorum species sunt *gravativus, pulsatorius, tensivus, pungitivus, lancinans, urens, mordax, ostocopus*, aliæque, à diversis fibrillarum nervearum concussionibus, vellicationibus, commotionibus, lincinationibus violentis originem ducentes.

Ejus species.

Quanquam autem Dolor, ceu tristis sensatio, propriè non hæreat in ipsis partibus corporis, sed in solâ mente animæ, quæ eapropter dolere, vel dolorem sentire dicitur; nihilominus tamen occasio tali dolori enascitur à partibus præternaturali modo affectis, quibus hinc impropriè dolor attribuitur. Nimirum Doloris sensus non producitur, si fibræ nerveæ in naturali manent tono; quoniam anima non tam consuetos & naturales, eosque tremulos fortè nervulorum motus, quam infuetas valdè eorum agitationes violentas apprehendit, de quæ illis judicat; quippe hæ solùm commotiones violentæ aptæ sunt dolentes in animâ cogitationes vel ideas suscitandi. Vt ita omne id, quod violentam talem fibrillarum agitationem excitare valet, pro causâ doloris habendum veniat, sive dein in corpore lateat sub formâ humorum acrim;

Subiectum.

Causa.

*Modus
produ-
ctionis.*

sive extus corpori accedat, ejusque partes nervosas quomodocunque lædat. Modus autem, quo sensatio illa tristis perficitur, talis est: supponendum ante omnia, meditullium Cerebri sedem esse rationalis Animæ, ubi vel ad motus spirituum animalium diversissimos, vel ad tremulam fibrillarum agitationem violentam studiosè attendat, eosque dijudicet. Quando igitur naturaliter sese partes illæ habent, non est, cur in Mente idea quædam Doloris enascatur. Sciendum præterea, inde à Cerebri meditullio & basi nervos per universum corpus esse productos, atque dispersos, & quidem certo quodam tensionis gradu. Sciendum denique, nervulos omnes cavos esse, perque illos Spiritus animales ultro citroque discurrere, moverique, ac simul ab undulante vel tremulo eorundem motu fibrillas certo quodam modo pulsari, & agitari. Quæ agitatio, quamdiu lenis est, molliterque contingit, nullam equidem in animâ cogitationem molestantem parit; quamprimum autem fibrillæ istæ violentius justo, vel in extremitate duntaxat, commoventur, tum in momento Anima non sine quadam perturbatione talem sive mutationem sive læsionem persentiscit, eò quòd unâ nervi extremitate graviter tactâ, per continuitatem ejus ad cerebrum usque protensam, simul & altera extremitas eodem modo percellatur, planè sicut in chordis Instrumentorum musicorum contingere videmus, utpote quarum unâ extremitate pulsatâ simul & altera opposita tremet.

Quod si proin Mens persentiscere dolorem debeat, omnino requiritur, ut commune Sensorium, sive Cerebri meditullium in bono sit statu; requiritur item, ut fibrillæ nervosæ in parte quadam læsæ haud interruptam aut intercisam continuitatem habeant ad Cerebrum usque; requiritur, ut iidem tubuli nervei undique sint aperti, nullibi obstructi vel compressi, atque ut spiritibus animalibus liberimus per illos decursus pateat: requiritur porro, ut Spiritus sufficiente quantitate adsint, nec ullo modo sopiti: requiritur, ut iidem Spiritus placidum observent cursûs sui motum, utque temperati sint, nec igneâ suâ rapiditate & tumultuario motu hinc inde rapiantur aganturque, sicut in Epilepticis, Maniacis, Phreneticis &c. requiritur denique, ut Mens ipsa non intensius sit circa aliquod objectum occupata, & ita abstracta, ut ad motus spirituum ac fibrillarum Sensorii communis non attendat, quemadmodum id Melancholicis, profundè meditantibus, atque in Ecstasi versantibus contingere solet.

Ex quibus patet, Indolentiam, Torporem atque Stuporem, ceu Affectiones gradu inter se tantummodo differentes, non esse nisi privationem sensationis à motu fibrillarum nervosarum valdè imminuto productâ.

Indolentia talis, sive sensûs suspensio, aut doloris discussio hinc fit per *anodyna* vel *narcotica Remedia*, quæ scilicet vel causam doloris auferunt, vel spiritibus fixationem, & quasi congelationem inducunt, ut inde

de Somnus, vel ad minimum Stupor aut Torpor accedat.

Dolor *gravativus* producitur ab obstructione, quando hæc simplex est in tubulis humoralibus, à viscosâ tantum terrestrique materiâ oriunda, atque ob molem sui ponderis vicinas plus minus fibrillas nerveas gravat, sicque hospitantibus ibi spiritibus obici est, quò minus placidum suum progressivumque cursum liberè continuare queant; unde illorum motus circularis in intestinum conversus, in Cerebri usque medullio certum quendam eumque præternaturalē motum producit, Animæque sic occasionē præbet ad ideam de gravi quodam pondere corpus afficiente formandam.

Quod si obstructio sit in Canaliculis arteriosis, vel saltem hi ita angustati existant, aut humores adeo crassif, ut difficulter transire queant, tum aucto ibidem motu Sanguinis intestino, arteriæ magis dilatantur, distenduntur, atque fibrillas nerveas comprimendo pulsant, & sic Dolor *pulsatorium* excitant.

Dum verò serosi humores flatibus permixti, vel flatus ipsi tam nidorosi quàm acidi membranas distendunt, aliasque partes nerveas vicinas comprimunt, tunc oritur Dolor *tensivus*.

Si particulæ Lymphæ aut Sanguinis extravasati sint aculeatæ, salinæ, ac poros fibrillarum feriant, Dolor nuncupatur *pungitivus*.

Si verò tales salinarum particularum aculei altius adigantur in poros, ac ita

fibrillas violentius distendant ab invicem, tum dolor oritur *lancinans*.

lancinans.

Si plures fibrillas simul & semel, sed levius ipsâ punctione spicula talia feriant, oritur dolor *mordax*, qualis propemodum ab Vrticâ, vel fumo in oculos sparso persentitur.

mordax.

Si Anima caloris frigorisve urentis ideam sibi formet ob conforme acidum acre, Dolor enascetur *urens*.

urens.

Intenduntur, exacerbantur Dolores, quando vel obstructiones augentur, vel Salium acrimonia intensior fit, vel eorum acrium quantitas in affecto loco augetur; vel denique ab instrumentis pungentibus, lacerantibus, aliterque afficientibus partes membranosæ gravius quomodocumque offenduntur ac læduntur.

Si quæras, utrum Partes corporis solidæ doleant, ac sentiant? Resp. Sentiant, vel dolent *receptive* non *perceptive*; sicuti de Brutis quoque dicitur, quod illa non sentiant, non doleant &c. *proprie*, id est, non *perceptive*, sed tantum *receptive*. Etenim in quolibet Sensu tria notamus, *receptionem*, *perceptionem* ac *judicium*, è quibus *receptionem* solum, tanquam motum fibrillarum nervearum, ab objectis externis factum, corporeis organis, Brutisque attribuimus; *perceptionem* verò, ac *judicium* soli Animæ ratiocinanti, si-ve Menti adscribimus.

Cum autem Dolor vulgo habeatur pro *urgente* in morbis *symptomate*, ac facile pejora post se trahere mala, velut Convulsiones deleterias possit, meritò fuerunt ab omni antiquitate quæ-

Remedia anodyna, narcotica.

quæſita ad illum vel leniendum vel tollendum planè Remedia, quæ proin ab effectu quem præſtant, modò *paregorica* vel *anodyna*, modò *narcotica* vel *hypnotica* fuerunt appellata.

Talia verò *Medicamina*, partim *interno* partim *externo* usu familiaria, dicuntur, quæ vel particulis aquoſo-mucilaginoſis aut oleoſis laxando ac emolliendo; vel ſalino-ſulphureo-volatilibus humores ſtagnantes viſcidos plus minus acres incidendo, reſolvendo ac diſcutiendo; vel reſinoſis, gummoſis, aut mercurialibus attenuando, penetrando ac diſſolven-do; vel denique particulis ſalino-ſulphureis volatilibus blandis ac vapo-roſis Spiritus animales figendo, ſopiendo, nervosque irritatos demul-cendo dolorem lenire ac mitigare, vel ſimul ſomnum aut ſtuporem quendam inducere valent.

*Externa,
in formâ
Balneo-
rum, Fo-
tuum,
Embro-
cationû,
Epithe-
matum.*

Itaque *externè* quidem Dolores lenire, vel prorfus ſedare poſſumus
1. Balneis, Semicupiis, Fotib⁹, Epithe-
matibus, Embrocationibus, & ſimili-
bus, factis cum *Aquâ*, *Vino*, aut *Lacte*,
poſt incoctas Radices *Althææ*, *Malv.*
Symphyt. *Petaſitid.* *Angelic.* *Impera-
tor.* *Lappæ*, Herbas ac Folia *Vitis vini-
feræ*, *Alliariæ*, *Calthæ paluſtr.* *Hyo-
ſcyam.* *Solan.* *Verbaſci*, *Scrophular.* *Li-
nariæ*, *Alth.* *Malv.* *Nicotian.* *Lappæ*
utriusque, *Sphondylii*, *Violar.* *Parietar.*
Meliſſ. *Anethi*, *Abroton.* *Sideritid.*
Verben. *Salv.* Flores *Chamom.* *Sambuc.*
Melilot. *Verbaſc.* *Croc.* *Papav.* *rhead.*
Linariæ, *Gallii lutei*, *Malv.* *hortens.*
Oculos Populi; Semina *Cannabis*, *Lini*,
Hyosc. *Papaverum*, *Cumini*, *Fœnicul.*

Carvi, *Aniſ.* *Anethi*, *Capita Papave-
rum*, *Furfur.* *Calices Roſarum.* 2. E-
mulſionibus, Epithematibus, Lotioni-
bus, ad quæ partim ſuperiora uſur-
pantur, partim ulterius aſſumuntur
Semina 4. *frigid.* *major.* *Papaverum*,
Nuclei Perſicorum, *Pinearum*, *Amygd.*
amarar. *Aquæ* vel *Succi Anethi*, *Al-
thææ*, *Malvæ*, *Parietar.* *Solani*, *Roſar.*
Tabaci, *Spermat.* *Ranar.* *Fœnicul. flor.*
Sambuc. *Cham.* *Spiritus Vini ſimplex* aut
camphoratus, *Cornu Cervi volat.* *Lum-
bric. terreſtr.* *Formicarum*, *Sambuc.*
Carminativ. *Lilior. conv.* *Anth.* 3. Ca-
taplaſmatibus, ad quæ præter ſupe-
riores plantas ulterius trahuntur *Vitel-
la Ovor.* *Theriaca Andr.* *Mithrida-
tium Damocr.* *Philonium Roman.* *Re-
quies Nicolai*, *Electuar.* *Orvietan.* *Mel,*
Farina qualiſcunque, *Mica Panis*, *But-
tyrum*, *Lac.* 4. Unguentis, Oleis &
Linimentis, quemadmodum uſu mul-
tiplici in medendo commendata ſunt
Unguenta alabaſtrinum, *enulatum*, *iri-
num*, *anodynum*, *de Hyoſcyamo*, *dialth.*
popul. *Axungia omnes*, *Baſamum hy-
pnot.* *Medullæ Oſſium*, *Zibethum*, *Olea*
infuſa expreſſa, aut cocta *Anethi*, *Ab-
ſynth.* *Chamomill.* *Hyperic.* *Ovor.* *Ro-
ſar.* *Violar.* *Lumbricor. terr.* *Spica*, *lau-
rinum* *Alth.* *Laterum*, *Verbaſc.* *Lini*,
Melilot. *hortens.* *Lilior. alb.* *Amygd.*
dulc. & *amarar.* *Nucleor.* *Perſic.* *Se-
min.* *Papav. alb.* & *Hyoſcyam.* *Scorpio-
num ſimpl.* aut *compoſit.* *Gallii lutei*,
Linariæ, *Malv.* 5. Emplaſtris. v. gr.
de Baccis Lauri, *de Cicutâ*, *de Hyo-
ſcyamo*, *Meliloto*, *de Tacamahac.* *Ma-
ltich. incognitum*, *diaphoretic.* *Myn-
ſicht.* *de Ranis Vigon.* cum *Mercur.*

6. Sac-

6. Sacculis repletis nunc *Avenâ*, nunc *Cineribus*, *Radicibus* & *Herbis* atque *Seminibus* supra commendatis, hinc siccè & calidissimè frequenter applicatis. 7. Fomentationibus aliis siccis, v. gr. *Frictionibus*, *Linteorum* valde calentium applicatione, præprimis si fumo imbuta sint *Masticis*, *Storacis*, *Calam.* *Succin.* *Thuris*, *Semin.* *Carvi*, *Sumin.* *Folior.* *Solan.* *Menth.* *Origan.* *Flor.* *Sambuc.* *Chamomill.* *Melilot.* *Ben.* *on.* *Cheiri*, *Rosar. rubr.* *Verbasc.* *Ra-* *ur.* *Lign. juniperin.* *Santal. citr. &c.* 8. Pulverum adspersionibus, v. gr. in *Erysipelate*, ubi conducit Pulvis ex *Cretâ albâ*, *Ceruâ*, *Radic. Liquirit.* *Bolo Arm.* *Terrâ sigill.* *Furinâ domestic.* late- *ritio Lapide*, *Camphorâ compositus*.

Interne pro sedandis Doloribus inserviunt sub formâ *Potionis* aut *Emulsionis* *Aquæ destillatæ* *Lactucæ*, *Acetos.* *Portulac.* *Malv.* *Nymph.* *Solan.* *Papav. rhead.* *Rub. id.* *Nasturt.* *aquat.* singulæ ad ℥iij . vel plures pro dosi, *Destillatum equinum* ad eandem dosin, *Semina.* 4. *frigid. major.* *Lactucæ*, *Pæon.* *Papav. alb.* In formâ *Juleporum* aut *Mixturarum* cum *Aquis* supra dictis misceri solet *Syrupus Papaveris albi* aut *anodynus* ad ℥vj . pro dosi in *Adultis*, *Syrup. Papav. rhead.* de *Succo Nicotian.* de *Nymph.* *Violar. purp.* de *Portulacæ Succo*, de *Jujubis*, ad ℥j . *Diacodium Montani* ad ℥℥ . In formâ *Pulverum* habemus *Cinnabarim nativam* vel $\frac{1}{8}$ *nii opt.* ad gran. 15. *Sulphur Vitrioli anodynum* ad gran. 3. vel 4. *Trochiscos narcoticos Plateri* à ℥j . ad ℥℥ . *Magisterium anodyn.* *Wedel.* à gran. 4. ad gr. 8.

Pulverem anodynum Scretæ ad grana 6. vel 8. *Semina Papaveris alb.* ad gr. 15. vel ℥j . & *Hyoscyami* ad gran. 6. vel 8. *Laudanum opiatum* ad gran. j. vel ij. In formâ *Pilularum* profunt, prætermodò dictum *Laudanum*, *Theriaca cœlestis* ad gran. 5. vel 6. *Extractum Croci* ad ℥℥ . *Massa Pilularum de Styrace* ad grana 7. 8. vel 10. & de *Cynogloss.* ad gran. iij. In *Mixturis* aut per se *Essentia opii liquida* ad gutt. 10. vel 12. In formâ *Bolorum* aut *Electuariorum* conducunt *Theriaca Andromachi*, *Mithridat.* *Damocratis*, *Electuar.* *Diascord.* *Fracastor.* vel *Orvietanum* ad ℥j . Denique in *Jusculis* aut per se *Oleum Olivarum recens* non salitum ad ℥ij . vel ℥iij . vel *Oleum Amygd. dulc.* rec. expr. ad ℥ij . dari consuevit.

Essentia florum Violarum, *Papaveris erratici*, *Tunicæ ac Citri melliformis*, cum *Aquæ fontanæ* aut *Aquæ destillatæ Lactucæ*, *Malvæ*, *Acetosæ*, *Portulacæ*, similisve alius calentis affusione & subsequente abstractione, in *Balneo vaporis* ad mellis consistentiam, parata, hincque *Saccharo* liberaliteredulcorata, hypnoticum quoque præstans est, atque ad unam duasve drachmas in conveniente quodam liquore facile soluta propinabilis.

DOLOR ARTICVLORVM
sive ARTHRITICVS, Vid. *Arthritis*.

DOLOR CAPITIS, Vid. *Cephalalgia*.

DOLOR COLICVS, Vid. *Colica*.

DOLOR DENTIVM, Vid. *Dentium Dolor*.

Uu

DÔ-

Pilularum.

Guttularum.

Bolorum Electuariorum.

*Dolor,
Ischiadi-
cus.*

DOLOR ISCHIADICVS sive **COXENDICIS**, est tristis animæ sensatio à compressione, lancinatione, rosione, aut distensione violentâ fibrarum nervosarum juncturæ Ossium Ischii vel Coxendicis atque Femoris, originem ducens; quas causas humor crassus, viscidus, salsus, acidus collectione & stagnatione factâ excitat, ac per plures sæpè menses, hyberno in primis tempore citra intermissionem durat, motusque seu flexionis Femoris impotentiam post se trahit. Cum autem hujus Affectûs genesis & cura ferè cum *Arthritide* coincadat, Lectorem ad istum Titulum transmissum volumus, ubi singula necessaria de hoc Malo, & curam specialem pag. 89. inveniet.

*Dolor
Rheuma-
ticus.*

DOLOR RHEVMATICVS est Sensatio tristis in qualicunque corporis parte à Catarrho seroso-vel flatuoso membranas distendente aut pungente oriundus, quandoque simul fibrillas nerveas ac musculosas spasmodicè contrahens.

*Subje-
ctum.*

Dolor hic frequenter affligit musculos humeri, dorsi, femoris, aliarumve partium: cumque frigori aëris externi sæpius originem debeat, ipsaque affecta pars plus frigeat, quàm caleat, vocari à nostratibus consuevit ein Kaltes Gesicht. Si verò dolorprehendat articulos manuum aut pedum, tum potius *Arthritidis* nuncupanda venit.

Causa.

Causa proxima est vel humor aliquis seroso-pituitosus, vel etiam flatus membranis musculorum in

hærens, easque plus justo expandens aut etiam pungens atque dilacerans. Huic verò sive flatûs collectioni, sive humoris cujusdam stagnationi ansam præbet frequenter nunc sudoris aut largioris transpirationis subita retro pulsio; nunc aëris externi frigus in partem diutius justo admissum; nunc denique Musculi hujus vel illius partis à violento quodam motu distortio.

Cognoscitur hic Affectus ex eo, quando non hæret in aliquo Articulo, quando dolor in lecto è plumis adornato semper augetur; quando sudore corporis prolecto ipsa pars dolens frigidiuscula ac sicca semper manet, & nequaquam sudat; quando denique eadem pars semper nonnihil frigidior reliquis partibus deprehenditur.

In *Prognosi* tenendum, quòd plus semper molestiæ creet, quàm periculi habeat Affectus hic; si verò malè tractetur, tum etiam Inflammationem atque huic succedentem Abscessum post se trahere potest, in Fistulam, vel Ulcus sinuosum difficulter sanabile abeuntem.

In *Curatione* omnis eo cura est dirigenda, ut flatus, vel humor stagnans discutiatur: quem in finem primò dabitur *purgans* aliquod *Mercurio dulci* permistum: vel *Clysmata* unum alterumve *carminativum* inspergetur. Deinceps *interne* sudoriferum unum alterumve ex $\frac{1}{2}$ n. diaph. Bezoard. min. Ebor. ppt. C. C. phil. ppt. Dent. aprin. ppt. Spirit. volat. C. C. Spirit. Sal. arm. anisato vel fœnicul. Cin-

Cinnab. nativ. vel $\frac{1}{2}$ *nii*, *Camphorâ*, *Croco*, *Laud. opiat.* vel *Essent. Opii*; *Diascord.* *Fracastor.* *Mithridat.* *Damocr.* *Theriac.* *Andr. &c.* detur. Externè pars subinde calido fricetur *Linteo*, hinc *sacculo ex Herbis carminativ.* v. g. *Radic. Galang. Zedoar. Angelic. Imperator. Herb. Menth. Meliss. Puleg. Ocymi, Majoran. Salv. Origan. Calaminth. Seminib. Carvi, Cumin. Fœnicul. Aven. Baccis Juniperi, Lauri, &c.* composito, calefacto & *Spiritu Vini camphorato* consperso tegatur. Quandoque *Empl. Oxycroc. de Bacc. Jun.* vel *Norimbergense*, *Incognitum*, *diaphoret.* *Mynsichti*, vel *Vesicatorium*, vel *Roob Juniperi solum* cum fructu imponitur. Inprimis tentandum, ut quandoque pars sudet, appositis quam proximè *Æger* ferre potest, *Lateribus*, aliisve *Lapidibus fervefactis*, & *Vino rubro* nonnihil extinctis. Porro *Venæsectio* in *Brachio* aut *Pede lateris affecti* est instituenda; vel *Cucurbitulæ cum scarificatione dorso* applicandæ. Nonnunquam frictiones partis dolentis, cum calentibus sæpè *linteis factas*, haud absque levamine excipere solent ejusdem vel *lotiones*, cum *Spiritu Anthos*, aliove *cephalico* composito, & *camphorato* calente institutæ; vel *perunctiones*, *Oleis Anethi, Lauri, Amygdal. amar. Althææ, Philosophorum, Chamomill. Melilot. Verbasc. Nucum jugl. Hyperici, Semin. Hyoscyam. aut Papav. alb. express.* *Oleis destillatis Carvi, Camphor. Chamomill. Angelic. Fœnic. Galban. Baccar. & Ligni Juniper. Menth. Hyssop. Lavendul. Ruta, Sabin. Salv. Spic. Gal-*

baneto Paracels. Petroleo, Axungis Castorei, Canis, Anserum, Murium alpinor. vulpinâ factæ.

**DOLORES PARTVRIENTI-
VM & PVERPERARVM**, vid. *Partus difficilis*, & *Puerperarum Symptomata*.

DOLOR LVMBORVM, five **LVMBAGO**, est tristis sensatio in *Lumborum regione* plus minus intensè affligens, à causâ membranas nerveas vel tendente, vel rodente ac dilacerante oriunda.

*Dolor
Lumborum.*

Afficiuntur hic *tunicæ atque* *membranæ Lumbos* externè inprimis circum cingentes, sed & *tendines ac membranæ inter Vertebrae* hærentes.

Subjecti

Dolor ipse magis *tensivus*, & *grativus*, quàm verò *pungitivus* est; nonnunquam velut *ὀσχοπός*, cum vel sine ardore.

Excitatur autem nunc à *sanguine* *crasso, æstuante*, in *Venâ cavâ* descendente rarefacto, & hinc admodum distendente, vel membranas vicinas premente, aut dolorificè expandente; vel suo æstu *fibras nerveas* rodente, irritante, sicque ad tensionem dolorificam excitante, quemadmodum hoc in *Febribus* observari solet: nunc à *sero viscido, salso-tartareo* articulos *Vertebrarum* occupante, inibi subsistente, lancinante, rodente, qualis dolor sic excitatus *Arthriticus* penè est, & speciali nomine à quibusdam *Lumbago* vocari solet. Simile contingit, si vel in *Tubulis Renum* pituita viscida, falsa, acrius-

Causæ.

cula obhæret, inque suo transfluxu impedita, canaliculos admodum distendit, dilacerat, aut rodit, unde vicinarum simul membranarum fibræ per consensum affliguntur atque præternaturaliter tensæ, vel etiam nimium compressæ dolorem Lumborum efficiunt atq; producant. Tandem & expansio vasorum uterinorum à sanguine viscidior ac ebulliente facta, eundem planè effectum præstare potest; quatenus internis Lumborum membranis sic vel pressis vel tensis, simul externæ eodem modo affici necesse habent, vario tubulorum nervosorum apparatu iisdem continuatæ. Neque heic *externarum* causarum est obliviscendum, quando diutinæ corporis inclinationes, longus in Morbis decubitus, diversi etiam lapsus ab alto, similem dolorem suscitare valent. Ut taceam nunc morbos plures, in quibus ejusmodi cruciatus satis familiaris esse solet, quem admodum sunt Calculus, Nephritis, Mensium suppressio vel immutatio, difficilisque fluxus, Febres ardentes, Fluor albus, Plethora, Vertebrarum distorsio, &c.

Diagnosis.

Utrum autem hic dolor proles sit hujus vel illius morbi, ex præsentibus talium Adfectuum signis cognosci debet. Si à Plethorâ solâ existit, nullius alius morbi vestigia aderunt. Si à falso, viscido, crasso, tartareo phlegmate, vertebrae lumborû occupante, tunc Ægri difficulter & non nisi maximo cum dolore vertebrae illas flectere poterunt; dolor erit ὀσσοπόνος, durabilis, vel sæpè recurrens, Arthri-

ticis familiaris. Aliàs malo huic Fœminæ magis quàm Mares obnoxii observantur.

Quoad *Prognosin*, Affectus per se nullum portendit periculum, sed diutius tamen durans, lassitudinem post se trahit, quotidie majorem. Si sanguis crassus atque viscidus est, tum sæpius hominem affligit, donec humores nativam fluiditatem ac volatilitatem fuerint adepti.

In *Curatione* ad Morbos præsentis attendendum, iisque suâ ratione medendum; utpote quibus sublatis, simul hic Dolor cessabit. Si Plethoræ originem debeat, tum illicò *Vena secabitur*, & sufficiens sanguinis quantitas extrahetur; hinc *Victus tenuis* concedetur, ac subinde sudor qualicunque modo prolicietur, qui tandem per frictiones abstergetur. *Balnea Aquæ dulcis* cum incoctione *Herbarum emollientium* ac *cephalicarum* vel *uterinarum*; nec non *Balnea Aquarum mineralium*, sive naturâ sive arte calidarum, per aliquot dies commendabuntur.

Externæ dein in omni ejusmodi dolore inunctiones lumborum institui possunt cum *Unguent. dialtb. resumptivo*, *Oleis semin. Hyoscyam. & Papav. alb. express.* *Melilot. Chamomill. Verbasc. Spicæ, Petræ, Lauri, Pini, Baccar. Juniper. Vulpin. Scorpion. Camph.* &c. Harum tamen inunctionum loco subinde melius conducit *Empl. Roob Junip. Norimbergense*, vel *Oxycroceum*, oleo *Scorpionum malaxatum* & Lumbis impositum. Mulierculæ in hunc finem solam *Terebinthinam papyro cæ-*

ruleo

ruleo inungunt, & Lumbis alligant; inibique sinunt, donec sponte decidat.

DRACVNCVLI, five COMEDONES vel CRINONES, Germanicè *die Miteffer*, sunt (juxta *Ettmüll.*) Vermiculi vivi, coloris cineritii, cornubus s. potius antennis binis longè prominentibus instructi, oculis rotundis grandiusculis, caudâ oblongâ in fine villosâ, aspectu horridâ gaudentes, in totius dorso cute ex materiâ feminali, propter impeditam transpirationem collectâ, progeniti, & continuâ punctione maximum pruritum, inquietudinem, febriculam lentam, tabemque excitantes.

Contingit Pueris fordido victu nutritis, maleque habitis, unde verminosa semina facile massam sanguineam inquinare, feroque ejus acrimoniam depascentem imprimere possunt.

Et si autem ejusmodi Infantes & Pueri in hoc casu per totum corpus æqualiter diminui videantur, major tamen Tabes in dorso notatur, cum pruritu nunc majore, nunc minore; accedit simul ex humorum crassitie & acrimoniâ lymphæ Febris, eaque continua, lenta, in quâ tamen ægelli non desinunt satis benè appetere, nec malè bibere. Si Febris hæc lenta profundas firmasque radices egit, malum evenit immedicabile: si autem nulla Febricula adhuc torqueat, nec obstructions mesenterii sint induratae, tum remedia supersunt, malum feliciter tollentia.

Et quidem in principio *Curatio- nis* dentur *Trochisci Hermetici*, qui egregiè admodum cruditates primarum viarum lentas ac tenaces resolvunt, atque nunc per superiora, nunc per inferiora simul expellunt; v. gr. pro Puero trium annorum:

℞. *Trochisc. hermet. num. 4.*

Dentur pro dosi mane devorandi.

Vel ℞. *Mercur. dulc. opt.*

Scammon. ℥rat. aa. gr. iij.

Rad. Mechoacann. gr. ij.

Sacchar. rosat. gr. 6.

M. f. Pulv. subt. d. ad ch. pro dosi matutin.

Imò hujus medicamenti dosis etiam reiterari post aliquot dies potest. Deinceps interne dabitur vel *Tinctura ℥nii m. ac v. à gutt. vj. ad x.* Vel *Pulvis antatrophus ex Radic. Aron. Ireos flor. Semin. Plantag. Aquileg. ℥n. diaph. Corallin. ppt. Diaph. ♂ ial. Ebor. ppt. ⊕e Absynth. atque Sacch. v. gr.*

℞. *Spod. ex Ebor. ppt. ℥ij.*

Specif. stom. Poter.

Radic. Ireos flor. ana. 3℔.

Mechoacann.

Corallin. ppt.

Fol. Trichoman.

Sem. Plantag. ana. ℥j.

Anis. 3℔.

Sacch. alb. 3iij.

M. f. Pulv. subt. d. ad scat. Dosis ℥j. ad gr. 25. m. ac vesperi.

Externè autem varia à diversis commendantur remedia, ad Vermiculos dorso eliciendos, sicque Tabem curandam; quorum optimum est Pueros *Balneo Aquæ dulcis* immittere, cui parum *Mellis* sit inditum,

ut ejus dulcedine allecti è poris prodeant, sicque capitellis suis promineant nigricantibus, quæ dein vel unguibus vel cultro, vel novaculâ extrahi aut deradi possunt. Mulierculæ dorsum solùm *Melle* inungunt, aliquandiu sinunt, hinc foràs prolecta Vermiculorum capitella rasorio cultro rescindunt. Sed remedia hæc pluries repeti debent, ut ab omni malo liberentur Ægri. *Strobelbergerus Balneis* insidere vult Pueros per semihoram, ex *Lixivio cinerum Ligni quercini* factis, hinc Ægris in Lecto sudantibus, spinaque dorsi totâ *Melle* perunctâ, tandemque sudore peracto, dorsum cultro rasorio deradendum esse monet; idque ter per septimanam repetendum censet. Ita & eodem effectû *Zedoariæ radix* in *lixivio querno* decoqui potest, ut hoc dein Infans ante & post rasuram in sudatorio diligenter abluatur. *Dolæus* post repetita *Balnea* non nisi cum forti decocto *Hydrargyri* dorsum probè abluicurat, unde Comedones citra omne periculum necantur, atque sic Tabem curari censet.

Dysenteria.

DYSENTERIA voce è Græc. *δυσ & εντερον*, *intestinum*, compositâ, est intestinorum in primis tenuium, hinc & crassorum Inflammatio, atque exulceratio, cum dejectione frequenti cruentâ, purulentâ, acerrimo ventris dolore ac torminibus, nec non tenesmo molestissimo, nunc cum febris continuâ malignâ, nunc sine eâdem Hominem affligens.

Plerunque æstate nimis fervidâ, atque Augusti præprimis ac Septembris mensibus Affectus sævire solet, promiscuè in omnis ætatis ac sexûs homines, frequenter in militum exercitûs, ac eos maximè, qui vel horæorum fructuum, in primis prunorum, malorum armeniacorum, & persicorum, melonum, uvarum, cucumerum, acetariorum & similium largâ devoratione, vel potu liquoris gelidi, putridi, musti etiam largioribus haustibus, cruditates acido-corrosivas in primis viis, imò & ipso sanguine cumulârunt; vel qui aliàs sanguinem acriorem habuerunt. Etenim non nisi serum fallacido-acre & corrosivum proximè tum mucum intestinalem dissolvens & abradens, tum ipsas fibrillas tunicæ nerveæ intestinalis maximè pungens, dilacerans, corrugans, crispans, atque vascula capillaria erodens, proxima dolorum, & excretionum dysentericarum causa existit, imò inflammationis & exulcerationis ipsius. Quin sicubi eadem salia ferocia Malignam humoralem turbaverint, maligna simul Febris juncta erit. Accidit etiam, ut non tantùm sanguineæ reddantur mucosæque excretiones, sed subinde integri plexus glandulosi prius abradi simul cum excrementis proficiantur. Dum autem sphincter Ani ab ipsis acidis acribus salibus transfuentibus, ac suâ partim glutinositate adhærentibus, semper pungitur & torquetur, simul quoque *Tenesmus* admodum dolorificus singulis horæ quadrantibus ferè affligit, usque adeo,

adeo, ut in laxioribus constitutionibus ea propter ipsa è suâ sede Alvus elabatur.

Neque omni *contagio* immunem pronunciamus morbum, quin effluvia ex Aëgris emanantia sicubi deprehendant Hominem ad eundem aliquâ ratione prædispositum, protinus & in illis simile malum excitabunt.

Si verò Morbus quoad sua tempora consideretur, tum notamus, in principio vel primo gradu mucosum solum & pingua, aliquali sero, rarius simul cruore perfusa excerni; in progressu verò morbi etiâ biliosas particulas, mucosis tunicæ Intestinorum quartæ ramentis permixtas, ac simul cruentas, striisque sanguineis persperfas rejici; tandem in ultimo gradu ipsos plexus glandulosos instar caruncularum cum ramentis Intestinorum substantiæ, atque copioso interdu sanguine prodire.

In *Diagnosi* statim hoc est tenendum, *Dysenteriam* aliam esse *benignam*, quæ nullam habet comitem Febrim malignam; aliam *malignam*, quæ cum malignâ Febris affligit, & contagiosa sæpius est. Dein sciendum, *Dysenteriam* à *Fluxu hepatico* differre, quod in hoc per alvum sine tenesmo copiosus humor seroso-sanguineus instar loturæ carniū, in *Dysenteria* verò pauca mucoso-cruenta dejiciantur. Differt etiam ab *Hæmorrhoidum fluxu*, in quo plus minus frequenter sanguis sincerus purusque, interdum sine tenesmo excernitur.

Dysenteria maligna ferè incipit cum horrore quodam per horam plus minus durante, quem excipit mox calor totius corporis, cum appetitu prostrato, ciborum etiam fastidio, ac nausæa; subsequuntur dein sitis simul plus minus intensa, ventris tormina, circa Umbilicum maximè, (signo tenuia Intestina affici) dejectio frequens & copiosa, in principio quidem aquoso vel seroso-biliosa, sine notabili tenesmo; post unum verò aut alterum diem, quo tormina sensim vehementius hominem excruciant, mucosa, pauca, putamen oviminoris vix replens, striis sanguineis plus minus tincta, aliquando etiam purulenta, flava, viridescens, imò diversicolor, non sine laborioso, ac maximè dolorifico egerendi conatu, singulis ferè quadrantibus horarum recurrens. Pulsus evadit celer, frequens ac debilis, Urinæ redduntur parvæ, valdè tinctæ, crudæ, claræ; vigiliæ perpetuæ, & anxietates frequentes hominem torquent; lassitudo vel in principio Morbi jam ingens adest: subinde, si vasa hæmorrhoidalia, aliave grandiora erosa aperiantur, cruor purus excernitur. In progressu Morbi, dum abrasus jam est omnis mucus, etiam plexus glandulosi atque portiones substantiæ Intestinorum erosæ dejiciuntur. Quæ in principio circa Umbilicum erant tormina, interdum cessant in Morbi decursu, atque versus pubem & inguina descendunt, inibique cum tenesmo creberrimo Aëgrum vexant; ita quidem ut Abdomen sæpius quasi

spas-

spasmodicè introrsum contrahatur. Febris continuat inter hæc , & malignè quidem , ingravescent enim quotidie , si præscripta remedia nihil operentur , anxietates præcordiorum , inquietudines , Lingua evadit arida , quæcunque assumuntur , per alvum statim cum multiplicato tenesmo profluunt , & vel in transitu quoq; acrimoniam corrosivâ mutantur ; tandem post decem , undecim , plures aut pauciores dies , frigus extremos primùm artus , dein & reliquum corpus totum ferè , excepto abdomine , cum sudore etiam frigidoprehendit , pulsus maximè debilis evadit , subinde tum cibos appetere & comedere incipiunt Ægri , cum interim viscera eorum , præprimis Intestina , uruntur ac siderantur. Sic verò instar glaciei frigidi existentes , bidui triduive spatio , sphacelati intereunt. Affectus castra Militum frequenter exercet , sed & populosas Civitates , imò Pagos etiam indiscriminatim peragrat. Quod mirandum , intra paucos dies Morbus hic substantiam corporis humani ita consumit , ut Æger hinc citò faciem Hippocraticam adipiscatur , præcipuè si ad mortem ejus terminetur Morbus.

*Signa
Dysenteria
benigna.*

In Dysenteria *benignâ* nulla adest Febris , saltem maligna ; hinc non incipit illa cum horrore & æstu febrili , sed statim cum Ventris cruciatibus , & aliquali Diarrhœa , quàm excipit mox Tenesmus , cujus stimulo singulis ferè horarum quadrantibus aliquid muci acris nunc albi , nunc cinericii , flavi , viridescents , &

sanguineis striis tincti excernitur. Tenuia Intestina si laborent , Æger proclivis est ad vomendum , & dolor circa Umbilicum satis acerbus existit , ac si cultris perpetim discinderentur , vel dilacerarentur fibræ nervosæ. Si verò in crassiss Intestinis mali origo & fomes hæreat , tum dolores colici non nihil leniores sunt , neque circa Umbilicum , sed secundum Coli ac Intestini recti ductum magis percipiuntur ; Æger que ad vomendum minus inclinatur. Appetitus in principio Morbi adhuc adest , in progressu autem illius paulatim deperditur ; sitis vel nulla vel modica adest. Vigiliis interea patitur Æger , aut certè propter frequentissimum egerendi desiderium diu dormire nescit. Anxietatibus tamen nullis torquetur ; neque glaciei instar frigescent membra , nisi fortè morbus præter spem lethalis evaserit , & Intestina sphacelo inquinata fuerint. Excreta alvina in principio copiosa sunt , mucoso-aquosa , acria ; deinceps verò minuuntur , atque cruore plus minus tincta evadunt ; vel etiam purulenta quandoque apparent. In progressu Morbi propter somni defectum , & cruciatus Intestinorum frequentissimos Febricula continua accenditur , quæ si Inflammatio atque Gangræna Intestinorum superveniat , tandem in malignam & lethalem convertitur. Subinde evenit , ut non nisi mucosa alba cum ardentibus alvi cruciatibus crebrò rejiciantur , sine intermixtis etiam sanguinolentis striis , tumque *Dysenteria alba* vocatur , quæ non nisi gradu differt

differt à *Dysenteriâ cruentâ*, in quâ mucus sanguine tinctus, aut sanguis etiam purus cum tenesmo plus minus acerbo excernitur. Intensior est dolor, quando tenuia Intestina, quàm quando crassa affliguntur.

Quoad *Prognosin*, si Febris simul adest maligna, tum periculosissima existit Dysenteria, ac plerique etiam inde moriuntur. Sed & inter alios, qui nullam Febrim malignam comitem simul habent, sæpius enecantur aliqui, quorum intestina à salibus nimis inflammantur, quiq; ad assumenda remedia debita admodum difficiles sunt, unde promptè etiam intestina siderantur, sicque machinæ destructionem totalem inducunt. Ac etiam si benignus sit, haud statim tamen sanabilis affectus, quin plures usque dies pertinaciter sæpius durat, nonnullosque ad extremam ferè maciem deducit. Si extrema frigere incipiant, & continuè frigeant, loquelâ utcunque præsentè, & appetitu aliquàlter constante, signum est certissimum internæ siderationis, atque futuræ mortis. Intra 12. vel 14. dies tamen sisti debet, si proba medendi methodus apud Ægrum morigerum adhiberi possit.

In *Curatione* causa morbifica quantocius eliminanda est, nimirum humor acris corrosivus expellendus, hinc & reliquiæ ipsius absorbendæ, invertendæ, aliòve modo corrigendæ. Tandem excoriationes Intestinorum persanandæ, tonusque Ventriculi debilitatus pristino vigori restituendus, quo sic Lenteria subsequi

solens vel præcaveaiur, vel citò etiam curetur. Interim probè attendendum, an Febris simul adsit maligna, nec ne.

Absente enim Febri malignâ ante omnia dabitur in principio statim Morbi *Rhabarbarum* in substantiâ, cum aliquot granis *Mercurii dulcis* & *Cremoris Fri*: vel hujus loco *Infusum Rhabarbari cum Radic. Caryophyllat. Bistort. Fœnicul. & Sale Card. Bened.* aut *Crem. Fri* exhibebitur. Vel etiam *Syrupus de Cichorio cum Rhabarbaro*, cum bonâ quantitate *Aqu. Plantag. Burs. pastor. & tantillo Salis polychrestis*, vel *Ol. Fri* per deliq. propinabitur. Ejusmodi purgans, inprimis *Rhabarb.* in substantiâ, repetitâ vice quoque dari potest. v. gr.

℞. *Rhabarb. elect.* 3j.

Mercur. dulc. opt. ʒß.

Scam. ʒti. gr. j.

M. f. Pulv. subt. d. ad ch. pro dosi matutin. Repetatur bis vel ter mane.

Vel ℞. *Radic. Caryophyllat.*

Scorzoner.

Carlin. an. 3j.

Herb. Agrimon.

Plantag. ana. Mß.

Myrobalanor. Cheb. ʒß.

Rhabarb. elect. ʒiij.

Semin. Fœnic. 3j.

Crem. Fri ʒij.

Incis. contusis, atque in nodulo ligatis affunde

Aqu. Ulmar. vel

Plantag. q. s.

Stent per noctem in loc. cal. sequ. mane bulliant parum, dein

Colaturæ ʒiij. adde

X x

Syrup.

Syrup. Capill. ♀ r. ʒß.

D. advitr. Hauriatur mane unâ vice.

Vel R̄. Syrup. de Cich. cum Rb. ʒiij.

Aqu. Plantag. ʒiß.

Mercur. dulc. ʒj.

M. d. ad Vitr. Sumatur mane unâ vice, & sequenti die, imò tertiâ adhuc vice, licet fractâ dosi repetatur.

Vel per sex dies quotidie mane ʒj. Panacæ solut. alkaline cum Emulsione Amygdalar. tenuiore propinetur. Vel denique Radix Ipecacuanhæ in pulvere primâ die ad ʒß, secundâ ac tertiâ die ad ʒj. capiatur, & ita lenes vomitiones cum levamine subsequente excitabuntur. Hac certè methode sæpius eam cum successu Ao 1708. in grassante apud nos Dysenteria usurpavimus. Alii quotidie mane per plures dies dant Rhabarb. ʒj. & Rad. Ipecacuan. ʒß. cum dimidio Laudani grano. Interim Remedia antidyenterica diligenter simul usurpentur, quemadmodum v. g. sunt:

R̄. Conserv. Ros. Rubr.

Plantag. ana ʒvj.

Condit. Nuc. mosch.

Cydon.

Rad. Symph. ana ʒiß.

Lapid. Hæmat. ppt. ʒj.

Sanguin. Drac. ver. ʒj.

Unicorn. fossil. ʒij.

Syrup. fl. Tunic. q. s.

M. F. Electuar. d. ad Oll. & singulis triboriis capiatur magnitudo nucislæ.

R̄. Elect. diascord. Fracast.

Theriac. Andromach. ana ʒß.

Terræ sigillat. ʒj.

Cum Sacch. fiat Bolus, sumatur unâ

vice, & quotidie semel repetatur per triduum vel quatrimum.

Vel R̄. Aqu. Plantag. ʒij.

Flor. Acac. ʒß.

Syrup. de Succ. Cydon. ʒj.

Essent. Hyperic. ʒß.

Extract. fol. Quercus.

Sanguin. Drac. ver. ana. ʒj.

Essent. Opii liquid. gutt. 8.

Sacch. alb. ʒiß.

Misc. ad Vitr. & detur m. ac vesp. duabus dosibus.

Si Corpus non amplius arte purgatur, quod cum supra dictis bis vel ter non sine levamine, ac spe citioris, curationis fieri nostrâ, aliorumque felici experienciâ consuevit, tum alterantia anodynâ mista omnium optima invenimus: v. gr.

R̄. Unicorn. fossil. ʒß.

Terræ sigill.

C. C. phil. ppt. ana ʒj.

Smaragd. ppt. ʒß.

Sanguin. Drac. ver. ʒj.

Laud. opiat. gr. ij.

Sacchar. alb. gr. xv.

M. F. pulv. subtil. in 5. dos. æqu. ad ch. sumantur m. ac v. cum Emuls. Amygd. dulc.

Vel R̄. Ichtyocoll. ʒiij.

d. ad Ch.

Soluta in juscule aliquot dosibus exhauriatur. Vel ejus loco Sperma Ceti recentiss. ad ʒj. aliquoties in Juscule hordeaceo solutum propinetur.

Vel R̄. Conserv. Ros. rubr. ʒj.

Sanguin. Drac. ver.

Specier. diatrag. frig. ana ʒß.

Essent. Opii liquid. gutt. VII.

Cum

Cum Sacch. fiat Bol. unâ vice semel vel bis quotidie capiendus.

Vel R̄. Aqu. Burs. pastor. ℥ij.

Flor. Acac.

Plantag. ana ℥ß.

Syrup. de Symp.

Succ. Plantag. ana ℥j.

Extract. fol. Quercus ℥j.

Essent. Hyperic.

Sanguin. Dracon. ver. ana ℥ij.

Tinct. Opii Langel. gr. ij.

M. ad Vit. Detur duabus dosibus m. ac v.

R̄. Aqu. Plantag. ℥iiss.

Flor. Acac.

Borrag. ana ℥iiss.

Confect. Hyacinth. ℥j.

Essent. Hyperic.

Bistort.

Fol. Quercus ana 3ß.

Corall. rubr. ppt. ℥ij.

Unic. fossil.

Lapid. Hæmat. ppt. ana ℥j.

Sacch. ros. tabul. ℥iij.

M. ad V. & detur frequenter per cochlearia.

Specifica interim antidyenterica mille circumferuntur, ita ut dum quis hoc morbo laborat, omnis visitatum accedens Amicus vel Amica, novum proponat & commendet remedium, ad suum ita benignum, misericordemque animum testandum; sed plerumque nihil hâc ratione boni apud Ægrum producant ejusmodi Medicastri, ordinarium quippe Medicum in rectâ suâ medendi methodo non leviter impediens, quodque lamentabilius est, Medici etiam expertissimi famam sugillantes, sicubi curatio

non ex voto successerit; sinistram videlicet morbi eventum, atque Ægotantis mortem, ejus imperitiæ vel negligentiae imputare haud erubescens, quando clam interea multa alia, eaque vel noxia, vel non necessaria & superflua remedia Ægroto suggererunt. Autumno & Septembri mensibus Ao. 1708. dysenterica Lues per Urbem nostram maximè fuit grassata, cumque maligna esset, plures quoque è medio sustulit omnis ætatis, sexûs, & conditionis Homines; vices tum meæ erant Nosodochii Ægros visitandi, ubi sanè intra prædictos illos menses prope centum Dysentericos tractandos habui, qui omnes nostrâ medendi ratione pristinam sanitatem adepti fuerunt, duobus solum exceptis, quos post mortem, dum aperuissemus cadavera, phthisicos deprehendimus. Nimirum in Nosodochio hoc Ægri omnes medicè vivere coacti fuerunt, nihilque obtinuerunt, sive ciborum, sive medicaminum, nisi quod à Medico concessum atque ordinatum erat. Extra Nosodochium verò Medicorum præcepta & ordinata, quando non primâ statim die speratum præstitere levamen, contemnebantur, alia desiderabantur, & urgebantur à Medicis, nec minus simul alia ab accedentibus qualibuscunque vetulis, agyrtis subministrabantur, unde factum, ut ita plures ob multitudinem medentium, & inordinatam curationem impetratâ viscerum gangrænâ succumberent, ac vitam cum morbo commutare necesse haberent.

Intes *specifica* autem Remedia, eaque purgantia palmam adhuc obtinent *Radix Ipecacuanhæ & Rhabarbarum verum optimum*, quarum radicem illa quidem primo statim insultus die ad dimidiam in pulvere drachmam Adulto homini datur, sicque per superiora & inferiora Aeger purgabitur. Verum superbibi debent *Juscula* frequentia, vel *Infusum foliorum Thèe & Plantarum traumaticarum*. Secundâ exhibui viginti grana ejusdem *Radicis*, totidemque tertiâ adhuc die, cum eodem regimine diætæ, & ita simul ad præscriptionem absorbentium atque anodynorum remediorum accessi, hacque ratione meos Aegrotantes pristinae sanitati feliciter restitui, saltem eos, qui medicastis dicam statim scripserunt, nullaque alia remedia in usum traxerunt. Si primis diebus ad Aegrum vocatus non fui, hincque judicare debui, jam inflammationes in Intestinis radicatae esse, protinus ab usu *Ipecacuanhæ*, aliorumque purgantium fortiorum abstinui, uniceque Remedia diaphoretica, alexipharmaca, absorbentia, camphorata &c. in usum vocavi. Quibus autem vel in principio morbi suspecta fuit *Ipecacuanha*, eorum aliquibus etiam *Radicem Asari* eadem dosi, eademque ratione, sed cum absorbenti pulvere permixtam non sine fausto successu dedi. Aliis vero *Rhabarbarum* in substantiâ ad 3j. pro dosi exhibui, & quidem ter vel quater, mane semper cum tenui *Amygdalarum dulcium Emulsione*, sub

vesperam dein *Clysmata eluentia, mucilaginosa, traumatica* inspergendo, & *mixturam diaphoreticam, absorbentibus pulveribus fociatam, cochleatim* propinando.

Præmissis autem sic purgantibus ad *specificorum* non purgantium usum accedere consuevimus, atque inter hæc semper anodyna & absorbentia reliquis prætulimus. Interea à Medicis aliis commendari solent, sub formâ quidem Pulveris Flores *Granatorum non sylvestrium*, ut & *Flores Tunicæ, Rosar. rubr.* ad ʒj. pro dosi, bis quotidie repetendâ. *Myrobalani* ad grana 25. *Dactyli* ad ʒß. *Myrtilli* ad ʒj. vel ʒiß. *Mastiche* ad ʒj. *Pellicula rubra Nucum avellandarum* à ʒj. ad 3j. *Capulae Glandium* ad ʒj. *Baccæ Viburni immaturæ* ad 3ß. *Tburis masculi pulvis* ad ʒj. *Sanguis Draconis verus* ad gran. 15. *Succus vel Terra Catechu* ad ʒß. *Folia Saniculae, Vincæ pervincae, Ophioglossi, Vitis viniferae, Plantagin.* ad gr. 15. vel ʒj. *Pulvis radicum Tormentill. Bistortæ, Doromici, Chelidoniæ major. Seminum Lycopodii, Oxylapathi, Granorum Tiliæ, singular.* ad ʒj. plus minus cum *Emulsione Amygdal. dulc.*

Sub formâ liquidâ laudatur *Decoctum semunciae Mastich. cum Cortice Aurant. in Aquæ mensur. 2 factum, ac potum. It. Vinum*, in quo *Radices Tormentill. Bistortæ, Caryophyllatae, Noces Cupressi, Castaneæ, Sorba, Strobili Pini, Herbæ Saniculae, Alchym. Bursa Pastoris, Pilosellæ, Malvæ, Parietariæ, Virgæ aur. Aparines, Flores Lamii purpurei, & similia* fuerunt decocta.

decocta. Alii solum *Lac vaccinum*, additâ *Conservâ Rosar. rubr.* vel *fl. Tunic.* ac *Plantagin. folior.* pro cibo & potu continuè deglutiendum offerunt. *Destillati equini* unciae quatuor mane ac vesp. propinatae conducunt. *Cera flava* quoque ad ℥j. cum *Lacte* devoranda sæpe exhibetur.

Comendantur etiam inter infinita ferè alia *Succus Hederæ terr.* *Juscula avenacea*, & ex *Oryzâ* atque *Hordeo* facta, *Panis* ex *farinâ* cum *albumine ovi* subactâ, addito *Pulvere Cupularum Gland.* vel *Cortic. Granat.* coctus, contritus, & exhibitus; *Ova* ad duritiem cocta & comesta; *Semina Plantaginis*, *Oxylapath.* *Urticæ*, *Nasturt. Rosar. Amygdalæ dulces* excort. *Glandium Nucleorum assorum pulvis*; *Tunica interior Castanearum lanuginosa*, *Thus*, *Myrrha*, *Mastiche*, *Lapis Hæmat.* *Crocus Martis adstringens*, *Priapus Cervi*, *Coagulum Leporum*, *Hoedorum*, *Equorum in pulvere*. Qui plura desiderat, apud Felicem Platerum in *Praxi Medicâ* inveniet confarcinata propemodum innumera.

Pro potu ordinario interim concedatur *Emulsio amygdalina*, cum *Aquâ chalybeatâ* facta. Inter Cibus præferimus *Cremorem Hordei*, *Juscula consumata*, *Gelatinas ossium*, etiam *Lac vaccinum* cum *Conservâ Rosarum m.* ac *v.* ad ℥viii potum, in quo pro lubitu prius *Chalybs ignitus* extingui potest.

Sunt qui *Aquam panatam* solam, pro ordinario potu exhibent, cum vel

sine incoctione *Radicis Tormentill. Bistort. Caryophyllatæ. Herb. Sanicul. Pyrol. Alchymill. Vinc. pervinc. Geran. Robertian. &c.* Imò nonnulli *Panem* è *Clibano* recens extractum statim destillant, liquoremque inde extillantem, tanquam *specificum* in hoc morbo per cochlearia frequenter exhibent.

Clysmata in principio statim conveniunt largius infusa, & ex detergentibus, inflammationem discutientibus, aut ulcuscula mundificantibus, mucilaginosi concinnata, v. g.

℞. *Radic. Caryophyllat.*

Consolid. maj. ana. 3℔.

Herb. Malv. Agrimon Althææ, Nymphææ. Numular. ana. Mj.

Fol. Betæ recent. vel

Atriplic. vel

Nasturt. aquatic. Miß.

Flor. Chamom. Mß.

Verbasc. Mj.

Linariæ Pij.

Semin. Lini 3℔.

Anis. 3j.

Incis. & contus. coqu. in s. q. Lactis caprill. vel Aqu. fontan. Colatur. express. 3xij. adde

Terebinth. vitell. Ov. solut. 3ij.

— Sev. hircin. 3℔.

Olei rosac. 3vj.

Ceræ 3j.

M. F. Clyster tepide injiciendus ac subinde repetendus.

Nonnunquam *Lac* solum subinde infusum dolorem lenit, & absterget, imprimis si fuerit *serosius*, & *calculis ferrove ignitis* alteratum; si itidem

ad ejus libram unum vel alterum Ovi vitellum, aut Mucilaginis Seminis Psyllii vel Cydoniorum unciam, aut sevi recentis hircini, cervini, hœdini vel caprini semunciam, unciamve integram, cum Sacchari candidi albi semunciâ, aut Mellis rosacei ℥j. & Succo Plantagin. ℥ij. permiscueris. Alii cum bono successu sæpius injiciunt Jus Vervæcis, Pullorum, Pedum vitulinorum, cum Cremore Hordei, vitellis Ovorum aut Mucilagî nibus. Alii iterum opiata Clysmatibus permiscunt, sed cautè id agendum. Si deterfa satis creduntur Intestinorum Ulcuscula, ad Clysmata pergunt consolidantia & leniter adstringentia, ex Decocto Radic. Tormentill. Consol. maj. Thaps. barb. Fol. Sanic. Plantag. Virg. aur. Myrt. Flor. Ros. rubr. Tunic. Balaust. Semin. Hyperic. paranda, hincque Succo Millefolii, Polygoni, Geran. Robert. Burs. pastor. Hieracii, Plantag. Albumine Ovor. & Balsamo qualicunque vulnerario miscenda.

Post ablatam Dysenteriam, ad tonum Ventriculi debilitatum restituendum,

℞. Tragem. stom. simpl. ℥j.
Radic. Aron. ppt. 3℔.
Ocul. 𐀓. ppt.
Cran. human. ppt. ana. ʒj.
Diaph. ʒv. ʒij.
Flor. Ros. rubr. ʒj.
Nuc. mosch. 3℔.
Cinnam. acut. ʒj.
Sacch. plat. 3℔.

M. F. pulv. subt. d. ad scatul. Dos.
3j. m. ac v.

Abdomen totum inungi quoque potest frequenter seqq. Oleo:

℞. Ol. Mastich. myrtin.

Cydon.

Chamomill. ana. 3℔.

destill. Chamomill. 3℔.

Carv. ʒj.

Nuc. mosch. expr. 3ij.

M. detur ad Vitr.

Ad Tenesnum mitigandum usurpentur ea, quæ suo loco commendata sunt; ubi tamen optimum est, sacculum è Floribus Chamomill. Scordio, Geran. Robertian. &c. conficere, & Lacti incoctum sæpius calidè alvo applicare: atque interim Alvi sphincterem inungere seqq.

℞. Fol. recent. Heder. arbor.

Vinc. pervinc. vel

Beccabung. ana. Mj.

Incis. coque parum in Butyro recenti non salito, vel etiam Sevo hircino. Hinc colatum Oleum in frigore condensatum sæpè illinatur. Possunt etiam suppositoria formari, anoque intrudi, ex Butyro recenti, Sevo hœdino, cervino, cum Tutia ppt. Bol. arm. Pulv. rad. Liquirit. Magist. ʒni, Laudano opiat. Mucilag. Gumm. Tragac. &c.

In Dysenteriâ cum Febri malignâ conjunctâ in principio statim Clyisma unum vel alterum injici potest seqq. modo paratum.

℞. Rad. Alth. Caryophyllat. ana. 3iij.

Herb. Scord. Brunell.

Sanicul. ana. Mj.

Flor. Malv. hortens.

Ligust. ana. M℔.

Semin. Lin. 3℔.

Incis. & contus. coque in s. q.

Aqu.

Aqu. fontan. vel Lactis, Colaturæ
℥viiiij. adde

Crem. Hordei ℥iβ.

Terebinth. vitell. ovor. sol. 3ij.

Ceræ 3ij.

M. F. Clyisma tepidè injiciendum.

Intus autem, quoniam hoc malum est
 Febreos Symptoma, à purgantibus
 qualibuscunque est abstinendum. Si
 autem in principio statim Diarrhoea
 cum torminibus appareat, ipsaque
 Dysenteria metuenda sit, tum Rha-
 barbarinum purgans, uti supra, præ-
 scribi poterit.

Deinceps verò alexipharmaca ab-
 sorbentibus, leniterque anodynis per-
 mixta diligenter in usum trahantur,
 sub formâ Pulverum, Emulsionum,
 Opiatarum & Mixturarum.

℞. Ebor. ppt.

Sanguin. Drac. ver.

Bezoard. min. ana. 3β.

Laud. opiat. gr. ij.

M. F. Pulv. subtil. in 4. dos.

div. ad Ch. vel

℞. ½ n. diaph.

C. C. usti.

Unicorn. fossil.

Lapid. Hæmat. ppt. ana. 3β.

Semin. Papav. alb. 3j.

Sacch. cand. rubr. 3β.

M. F. Pulv. subtil. in 6. dos. æqu.

ad Ch. vel

℞. Pulv. Lich. petr.

Ebor. ppt.

Pulver. Viperar. ppt.

Corall. rubr. ppt. ana. 3ij.

Sacch. cand. alb. 3j.

Laud. opiat. gr. iij.

M. F. pulv. subt. d. ad scat. Dosis

singul. 5. horis 3β. vel

℞. Pulv. radic. Consolid. maj. 3ij.

Rhabarb. ver. 3β.

½ n. Diaph. 3j.

Diaph. 3ial. 3β.

Unicorn. fossil. 3ij.

Sacch. alb. 3j.

M. F. pulv. subt. d. ad scatul. Dos.
ut supra.

℞. Tinctur. antiphthis. Garm. 3iβ.

d. adv.

Dos. m. ac v. gutt. xv. cum Decoct.
ordinar.

℞. Conserv. Bellid. min.

Ros. rubr.

Borrag. ana. 3β.

Diascord. Fracast. 3ij.

Confect. Alk. compl. 3ij.

½ n. diaph.

Matr. perl. ppt.

Ebor. ppt.

Dent. Hippopot. ppt. ana. 3j.

Essent. Opii liquid. 3β.

Syrup. de Beton. q. s.

F. Mixtura ad formam Opiatæ, de
quâ singulis trihoriiis capiatur magni-
tudo nucistæ.

℞. Aqu. Plantag. Borrag.

Scabios. Brunel. ana. 3j.

Syrup. de Eupator. 3vj.

Cydon. 3β.

Confect. Alk. inc. 3j.

Unicorn. fossil.

Corall. rubr. ppt.

Bezoard. min. ana. 3j.

Sacch. ros. tab. 3iβ.

Misc. ad Vitr. Detur per cochlearia.

Externe heic quoque usurpentur,
 quæ superius indigitata sunt. Pro
 potu ordinario cedat Decoctum C. C.
 raspat.

raspat. vel Radic. Tormentill. inde concinnatæ Emulfiones amygdalinæ. Juscula carnea inprimis gelatinosa, item Avenacea non formidanda, uti nec hordeacei Cremores. Sed Lac minus conveniens.

Dysuria.

DYSVRIA, è *δύς* & *ῥεος* compositâ voce, latinè *mingendi Difficultas*, est Symptoma imminutæ excretionis, quo Urina cum vel sine difficultate, labore, & dolore non guttatim, sed majore, licet non debitâ ac naturali quantitate excernitur.

Differt hinc ab *Ischuriâ* gradu, quod in hac nulla prorsus, in *Dysuriâ* verò laticis urinosi imminuta fiat excretio: & à *Stranguriâ*, in quâ continuum adest mingendi desiderium, ac Urina cum ardente dolore guttatim sæpius excernitur.

Pars affecta.

Pars affecta vel Renes sunt, vel Vesica, ejusque ut plurimum Sphincter, quandoque tamen & ipsa Urethra simul in culpâ existit.

Causa.

Contingit autem hoc malum, quando vel Urina nimis viscida, crassa & lenta est, quàm ut commodè exprimi possit, ut hinc, dum musculi abdominis excretionem promovere nituntur, dolor in regione pubis enascatur lancinans, atque insigniter ipsum quoque Vesicæ musculum sphincterem gravans: vel Urina nimis salsa & acris plus minus crassa fibras Vesicæ rodit, & ad excretionem jugiter stimulat, quæ tamen ob ipsam crassitiem difficilis evadit: vel Urina austera, pontica, tenax, sabulosa est, ut minus comodè exprimi

possit: vel quando ipse musculus sphincter inflammatus, aut nonnihil constrictus & arctatus est, ut suo officio minus probè satisfacere queat: vel quando idem musculus tantilumerosus, excoriatus, aut exulceratus est: vel quando in ipsâ Urethrâ tuberculum, ulcus, aut excoartio contigit: vel quando calculus in Vesicâ hæret nunc magnus, nunc asper, quique subinde ostio Vesicæ obvolutus illud claudit: vel denique quando Urina sufficiente quantitate in Renibus non secernitur, idque propter obstructionem aut compressionem tubulorum, vel feri sanguinei crassitiem.

Si acris & crassa Urina est, cum labore simul & ardore excernitur; si crassa, lenta, minusque acris, cum difficultate, sed sine dolore tamen, aut eodem non nisi gravante emingitur, id quod Pueris non rarò evenit, quando Urinam crassam valde, turbidam, albam atque crudam excernere necesse habent. Si austera est, sabulosa, minore quantitate, propter Renum simul obstructionem, sed & aliquali cum difficultate, quandoque & frigidusculè expellitur. Si calculus in vesica hæret magnus, frequenter urina, & parcè excernitur, eaque valde crassa, pituitosa, ut in sedimentum mediâ ferè parte subsideat. Si inflammatio, excoriatio, aut etiam exulceratio adsit in sphinctere, vel urethra, tunc cum ardore & magno labore, quandoque cum tantillis guttis sanguinis, ac puris emittitur, adeoque simul Stranguria aderit.

aderit. Si satis benè profluat Urina, sine ardore aut labore, sed parcâ tamen quantitate, signum est Renum obstructorum aut compressorum; aut etiam crassitie feri sanguinei.

Quòd concernit *Prognosin*, Urinæ difficultas curabilis satis est, si non à Calculo Vesicæ majore exoriat, idque inprimis in Senibus, lithotomiâ formidantibus. Aliquando tamen etiam, ubi serum sanguinis copiosum ac viscidum adest, diuque neglectum, sensim vel Hydropem, vel Apoplexiam post se trahit.

In *Curatione*, si Calculus in culpâ est, non nisi eo ablato malum curabitur. Si verò Urina crassa, alba, turbida, tenax ac viscida, quæ Pueris subinde contingit, tum *Clyisma emolliens* atque *detergens* primùm injicietur, aliquoties etiam repetendum; v. g.

℞. *Decoct. Herb. emollient. ut & Petroselin.*
Portulac. ℥j. in adultis,
vel ℥v. aut vj. in Junior.

Adde *Terebinth. vitell. Ovor. solut. 3i℥.*
Ol. violac. vel Lil. alb. 3vj.

M. F. *Clyisma injiciendum tepidè.*

Post *Clyisma* sequens *Pulvis* aliquoties m. ac vesp. cum *Aqu. Petroselini Macedon. & Portulac. exhibea-*
tur, vel etiam cum Lacte bubulo:

℞. *Gumm. Arabic. vel Ammoniac. 3i℥.*

Ocul. ʒ. ppt. 3℥.

Sacch. alb. gr. xv.

M. F. *pulvis subt. d. ad ch.*

Junioribus paulo minor dosi concedetur. Interim sequens Mix-

tura simul cochleatim propinabitur.

℞. *Aqu. Frigor.*

Portulac.

Fœnicul. ana. 3j.

Cinnamom. 3i℥.

Spirit. Salis dulc. 3ij.

Ocul. ʒ. ppt. 3℥.

Sacch. ros. tabul. 3ij.

M. ad *Vitr.*

Vel etiam *Emulsio* parabitur in unam vel plures doses: v. g.

℞. *Nucl. Persicor.*

Semin. Melon. ana. 3i℥.

Nap. 3j.

Violar. 3℥.

Aqu. Portulac. 3ij.

Anserin.

Carlin. ana. 3i℥.

Cinnam. bugl. 3iij.

F. l. a. *Emulsio cui adde*

Julep. rosac. 3i℥.

D. ad *Vitr. in duas doses Adultis, & tres vel quatuor Pueris dandas.*

Profunt & sequentia euporista.

℞. *Aqu. Raphan.*

Nasturt. aquat.

Heder. terrestr.

Ononid.

Petroselin.

Portulac. ana. 3i℥.

Syrup. Viol. purpur. 3ij.

M. ad *vit. & sumatur per haustulos.*

Vel *Raphanus rusticanus*, aut etiam *hortensis* cum *Liquiritiâ* in *Vino* & *Aquâ* coquitur, & colatura *Ægro* propinatur. Sic & *Succus Raphani communis*, vel etiam *Ceparum* sub cineribus coctarum, vel *Alliariæ* expressus, *Saccharoque* edulcoratus, sub

dosi cochlearis unius quandoque exhiberi potest. Nonnunquam *Lavendula*, ut & *Chamomillæ flores*, cum vel sine *floribus Genistæ*, aut *Radice Carlina* in *Vino* probè decoquuntur, atque hinc *decoctum* sæpius exhibetur. Ita & *Infusum fol. Thée* non contemnendum existit, vel etiam *Decoctum Coffée*, addendo *Spiritum Cochleariæ*, aut *Tincturam Jni*, vel *Corallor.*

Externè Balnea conficiantur ex incoctione *Chamomill. Lavendul. Ononid. Nasturt. Petroselin. Hyperic. Malv. Artemis. Origani, Absynth. Aneth. &c.* iisque *Æger* interdum infideat. Insigne euporiston autem hoc in casu est *Cataplasma* regioni pubis calidè impositum, è *Baccis juniperi, Petroselin. Radice Allii, & Floribus Chamomillæ*, invicem contusis, ac *Vino rubro* incoctis paratum. Eundem in finem alii *Oleum Scorpionum, Chamomill. Verbasci*, aut *Hyoscyam.* illinunt, vel *Herb. Malv. Parietar. Cherefol. Petrosel. &c.* virides *Butyro* incoquant, hocque dein inungunt.

Si *Urina* est *salsa & acris*, tum præmisso *Clysmate Emulsiones* conducunt, paratæ ex *Seminibus frigidis cum semine Cannab. Lini, Papav. alb. & Aquis diureticis refrigerantibus*; quibus addere licet *Ocul. S. ppt. Unicornu fossil. Corall. alb. vel rubr. ppt. J n. diaph. Gumm. Arabic. Diaph. J ial.* Conducit simul usus *Oleor. Terebinth. & Succin.* pluribus guttulis sæpius exhibitorum. *Externè* pubis illinenda est regio *Oleo Scorpionum Matth. Verbasco. Hyperic. Chamomill. Linariæ, Violar. Rosar.* Tandem, quæ

Stranguriæ feliciter medentur, & heic locum habent.

Si alia *Vesicæ*, aut *Urethræ* vitia in culpâ sint, tum hisce medendum, quemadmodum suis locis indigitavimus.

EBRIETAS, EBRIOSITAS, TEMULENTIA, est Vitium non tantum morale, sed & naturale, quo Homo facilè citòque à levibus Vini haustibus inebriatur, indeque incommodatur, imò simul in varia symptomata delabitur, velut sunt mentis Deliria, Vertigo, Cephalalgia, Artuum dolor ac Tremor, & alia.

Quòd autem quis præ alio citius inebrietur ratio est, vel quia delicatior stomacho est præditus, cumque nec adeo crassum neque lentum in primis viis obtinet, quo quidem aliàs fibrillæ nervosæ ab injuriis externis probè arceri solent, unde hæ à paucò etiam *Vino* hausto irritantur, & ad narcosin invitantur: vel quia Homo *Vinum* statim largius ingurgitat, antequam stomachum sufficiente quantitate ciborum replevit. Adde his consuetudinem bibendi protervam, quâ Homo sibi tantam adquisivit sitim, & bibendorum vinorum desiderium, ut nullâ non occasione ea avidè ingurgitet; sicque tandem quotidianis crapulis vel *Hydropem*, vel *Apoplexiam*, *Epilepsiam*, *Tremorem Artuum*, aliaque mala accersat.

Igitur Remedia ad Ebrietatem præcavendam vel etiam tollendam tanto magis necessaria videntur, quanto

quanto facilius Ebriosi in dictos modò Affectus morbosos incidunt. Qui comestationibus frequenter interesse debent, ad præservandam Ebrietatem ante pastum *Amygdalas* plures *amaras*, vel *Nucleos Persicorum*, vel *Comas* aliquot *Absynthii*, aut *Rutæ* cum fructu comedere, vel etiam unciam unam alteramque *Olei Olivar.* deglutire possunt; cumque dein ad *Epulas* accedunt, benè faciunt, si statim in convivii principio probè comedant, antequam bibunt: imò & postmodum inter bibendum subinde comedere non desinant. Quod si etiam quis in medio convivii actu, dum probè comedit, simul haustum *Roris solis* vel similis *liquoris spirituosii saccharati* non adeo fortis sumat, tanto diutius se à crapulâ ac temulentia præservare poterit.

Ad crapulæ autem discussionem profunt vel *Decoctum granorum Coffeæ*, aut *Infusum folior. Théæ* largiter haustum: vel dosis larga prædicti *Roris Solis*, aut *Rataffiæ*, vel *Spiritus Apii selini saccharati*. Qui Ventriculum debiliorem habent, per eadem spirituosâ optimè statim à Crapulæ incommodis liberantur, præsertim si simul instituto vomitu stomachum depleant. Qui autem Ventriculi tono firmiore gaudent, his vel *Cerevisia tenuis*, vel *Julepus ex Syro Ribi*, *Rub. id. Cydon. Citr. &c.* factus, atque *Spiritu Sulphuris* aut *Nitri acidulatus* admodum prodest. Inprimis etiam postridie talis potus, non secus ac inedia Hominem planè restituit. Aliàs *Folia Brassicæ* contusa,

Aquâ Rosarum conspersa, & vertici capitis temulenti imposita crapulam quoque discurre creduntur. Si venam Ebrio feces, & aliquid sanguinis emitras, ab imminente eum Catarrho apoplectico præservabis, & Temulentiam statim abiges. Novimus aliquando Ancillam frequenter sese inebriantem, quæ Crapulam suam promptè discutere solebat, caput in fornacem aut clibanum calentem per aliquantillam temporis moram immittendo.

ECCHYMOMA, Latine *Sugillatio*, est Symptoma qualitatis mutatæ, sive coloris cutis naturalis in cœruleum, rubicundum, viridescens, aut etiam flavum mutatio, oriunda ut plurimum ab externâ qualicunque contusione, sanguinem in extremis tubulis ad stagnationem comprimente & adigente, si non prorsus extravasante.

Oritur igitur non nisi, quando pars affecta aliquam contusionem recipit, in quâ circulatio sanguinis in vasculis capillaribus, propter compressionem & angustationem ab ictu factam impeditur, sicque sanguis in pluribus vasculis extremis cutaneis stagnans primò quidem rubicundo-cœruleum, dein nonnihil viridescens, aut etiam nigricans, tandem cum prorsus discuti incipit, flavescens prodit colorem. Sine tumore Ecchymosis contingit, quando in capillaribus solum vasculis obstructio hæret imperfecta. Sed ubi nonnihil majora simul valdè premuntur

Ecchymoma, f. Sugillatio.

Causa.

vascula, hincque humores quidem affluant, & non transfluant, fit Tumor, nunc major, nunc minor, pro contusionis diversitate; quem Germani communiter vocant ein Beule. Infantes autem ob frequentes lapsus huic malo admodum obnoxii existunt. Si denique contusio adeo fortis sit, ut vascula quædam sanguinea rumpantur, ex iisque ruptis sanguis effluat, tunc inde Tumor fit inflammatorius, qui cum non promptè discutitur, in Abscessum & Ulcus abit.

Curatio.

Malum facile cognoscibile, neque si benè tractetur, ullo modo periculosum, in cuius proin *Curatione* discussio statim tentanda ac promovenda est humoris stagnantis, ne morâ putrescat, ac extravasatus Abscessum, Ulcusque progignat. Igitur antequam intumescat pars, statim vel *frigida Aqua* cum linteo imponatur, vel *lapide* aut *ferro frigido* pars tangatur. Hinc impedito tumore, nihilominus vel *Vino calido*, in quo *Flores Chamomill.* aut *Salvia*, *Majorana*, *Rosmarinus*, *Flores Sambuci*, aut *Fœni* deferbuerunt; vel etiam *Spiritu Vini camphorato*, aut *Lil. convall.* aliove *Spiritu ardente sulphureo* pars contusa foveatur, usque dum circulatio erit restituta. Vel simpliciter *Spiritus Vini* qualiscunque sive *simplex*, sive *compositus*, *aromaticusque* redditus, *Butyro* permixtus non salito, diligenter inungatur. Atque talibus fomentis Sugillatio discuti potest, sive cum sive sine tumore fuerit. Sunt qui cum fructu *Ceratium* ex *Oleo Rosar.* vel *Lil. alborum*

cum *Cerâ flav. simplic.* factum applicant. Plura vide supra in *Contusione cum Ecchymosi*.

ECTROPIVM ab ἐκτρέπω, abduco, avertō, derivato nomine, est Palpebræ inferioris inversio vel retractio extrorsum facta, ita ut velut deorsum pendeat, neque oculum obtegere queat.

Producitur à diversis causis, quales v. gr. sunt caruncula sive excrescentia carnis in interiore palpebræ superficie enata: vel corporis cuiusdam glandulosi extumescencia, inferiorem Palpebræ partem ita excutiens, ut forâs rubicundo inversa colore emineat. Subinde & Vulnus Oculi malè curatum, hincque producta cicatrix; futura item vel ustio imperita; relaxatio in Epiphorâ diuturnâ, aut Paralysis; Elephantiasis sive Lepra; convulsiva Contractio, Lippitudo, atque continuus Lacrymarum acrium fluxus in senectute ad hunc Affectum contribuunt.

Malum, si recentem adgnoscat causam, emendabile adhuc existit; si verò inveteratum, vix curari poterit. Etenim si ab Elephantiasi aut Epiphorâ originem ducat, tum hisce Affectibus est medendum, ac interea topica quoque mox dicenda usurpabuntur. Si à Convulsione sive contractione spasmodicâ, aut à defluxione acri provenerit, non sine ratione commendamus *Aquam Rosar. Flor. Til. Fœnic. Chelidon. major.* cum *Mucil. semin. Cydon. Aqu. Plant. fact.* in quâ adhuc ferrum ignitum extinguere potest.

test. Ejusmodi Aquarum miscelâ calente linteolis exceptâ sæpius Palpebra calidè foveri potest : Quin adhuc *Essentiam Croci*, vel *Spiritum Anhaltinum* permiscere licet. Vel

℞. *Butyri Aqu. Plantag. vel Levistici pluries loti* ℥iij.

Lapid. calaminar. Aqu. Ros. loti ℥iβ.

Aloës Aqu. Ros. lot. 3j.

Tut. ppt. ℥ij.

Camph. ℥j.

M. F. *Unguentum sæpius inungendum.*

Infimul tamen *Cucurbitulæ cum scarificatione* dorso applicentur ; vel etiam *Vesicatorium* nuchæ imponatur. & capilli capitis deradantur. Subinde *Clyisma* injiciatur ex decocto *emollientium & cephalicorum*, vel etiam *Purgans* aliquod, inprimis *Pilulæ præscribantur*, ex *Extract. panchymagog. Croll. Extract. Pilul. coch. &c.* cum *Mercurio dulci*, aut *Cinnab. nat.* vel *℥ nū optimâ.*

Ectropium à *Paralyfi palpebræ*, vel à *cicatrice, vulnere, ulcere* aut *combustioni* succedente, oriundum prorsus est incurabile. Quando autem provenit à *relaxatione interioris superficie* palpebræ, spem curationis facere possumus ex usu *remediorum siccantium, leniter adstringentium, & tonum fibrarum corroborantium*, aliquamdiu continuato.

Quod si *caruncula fungosa & recens* hoc malum produxerit, sicari illa & paulatim consumi potest *discutientibus Collyriis*, sive siccis, sive humidis, qualia in *Ophthalmiâ* proponuntur,

ubi *Mercurius præcipitatus* cum *Pulvere folior. Sabinæ, & Succo Geranii robert. Cichorii verrucar. Chelidon. major.* principem locum tenebit. Quando autem *Caruncula* illa dura jam est atque inveterata, tolli pro posse ac nôsse debebit *extremitatibus acutæ Forficis*, modò ne *cancrosam diathesin* sapiat, ipsaque *Palpebræ substantia* offendatur. Si supersit quædam radix *Carunculæ*, consumenda venit illa quadam *Aquâ causticâ*, aliquoties per momentum applicatâ, cavendo ne quid in oculi bulbum depluat ; postea *Ulcusculum* siccatur *Balsamo ophthalmico*, qui *Tutiam ppt. Lapidem calaminarem ppt. & tantillum Myrrhæ* recipit. Si verò talem *Carunculæ* extirpationem sequatur *Hæmorrhagia* aliqua, tum hæc sisti poterit applicatione *Pulveris* sequ.

℞. *Bol. Arm. ppt.* 3ij.

Terr. sigillat.

Lapid. Hæmat. ppt. ana. 3β.

Gumm. Arabic. ℥j.

Vitrioli Roman. calcinat. ℥β.

M. F. *Pulv. subt. ad ch.*

Sed & *cauterium actuale*, sive ignis cum circumspectione applicatus omnem illicò *Hæmorrhagiam* sistere valet.

ECTEMATA, ἑκτέματα, sunt maculæ, ut plurimum rubicundæ, per totum promiscuè corpus efflorescentes, atque sensim in pustulas, faniem plus minùs serosam, albicantem continentes mutatæ ; adeoque à *Variolis* non discrepant, sicuti *Paræus de Variolis* adnotavit.

*Elephantiasis
Græcorum, s.
Lepra
Arabum*

ELEPHANTIASIS *Græcorum* vel **LEPRA** *Arabum*, est Scabies vel totius corporis, vel alicujus certæ partis, maligna, sicca, & furfuracea, vel squamosa, cum aliquali tumore cancroso, & pluribus symptomatibus gravioribus juncta, à Massæ sanguineæ salinâ, fixâ, malignâ & acridyscrasiâ, succum nutritium ad *νεκρωσιν* disponente, & corrumpente, originem ducens.

Pars itaq; *affecteda* primariò quidem est sanguis circulans; secundariò autè nunc tota corporis cutis, nunc unum duntaxat alterumque membrum.

Causa.

Causa verò est summa Massæ humoralis intemperies sive corruptio maligna, consistens in prædominio salium acido-fixorum, acrium, & corrodentium, sulphureis fixis non-nihil irretitorum, unde succi omnes, nutritius inprimis, inquinati varia in corporis superficie symptomata & exanthemata producant. Colligitur illa intemperies sanguinis partim à contagio, quando cum Leprosi quis familiariter vixit; partim à victu sordido, & esu ciborum, salibus fixis, sulphure pingui, atque terrestrioribus particulis nimis abundantium. Dispositi verò ad hunc Affectum magis sunt, qui naturâ sunt splenetici, melancholici, hypochondriaci, vel etiam cholericici, quique ab ineunte crasso, duro, falsoque victu nutriti sunt.

Diagnosis.

Diagnostica diri hujus Affectûs signa sunt, nasus lividus, genæ rubentes, unguium fissuræ, vox clangosa, stupor surarum & totius ferè corporis, ut vix puncturam acus sen-

tiant; cutis sicca, aspera, ferè instar Elephantorum pellis, unde etiam appellatio deducta fuit; Tubercula glandosa, duraque in fronte, facie, genis, cubitis, femoribus, manibus aut pedibus, facile sub cute mobilia, indolentia, ex livore ad rubedinem tendentia, horridumque aspectum præbentia: Tubercula itidem oris, quæ hiantes hoc, linguâque depressâ, in palato & faucibus circa linguæ radicem, nunc flavescentia, nunc sublivida cernuntur: Ulcera & Fissuræ, in pedum digitorum interstitiis, vel etiam plantis, præsertim crassâ duraque illarum parte; vel in manibus juxta cubiti articulum, præcipuè in arctiore illius sede, aliisve artuum locis apparentia; quæ Ulcuscula ut plurimùm veram cutim penetrant, lata sunt, & rarenter ulterius serpunt, labiis præ-tumidis constant, atque læsa facile cruentant: Ulcera etiam narium, sæpè earum septum, fungos, & ossa seu cartilaginem depascentia, naso tandem turpiter delabente, palatum, columellamque depascentia: tumidæ duræque aurium pinnae, auriculæ crassæ, lividæ, plus justo acutæ; alæ narium dilatatae, siccae; labia tumida, dura, aspera; manus inflatae; palpebræ oculorum rubentes, ac tumidæ: pellicula in oculis juxta canthum majorem nata, sensim accrescens: capillorum capitis defluvium: tandem furfuracea & sicca Scabies, universum penè corpus pervadens, atque inprimis articulos artuum cum asperitate occupans.

In *Prognosi* tenendum, quod morbus

bus hic, si recens fuerit, curationem adhuc quandam admittat: inveteratus autem omnem medelam respuat, hominemque ad mortem usque lentam comitetur; diu enim Leprosi vivere possunt, cum cibi potusque adpetitu valde gaudeant, & utcunque licet depravatè corpora eorum nutriantur.

In Curatione unicè eo adniten- dum, ut tota Massa humoralis probè elui, & ab intemperie illâ cancrôsâ ad dulcè temperaturam atque balsamicam crasin reduci possit. Quod quidem in malo recenti obtinebitur partim *Dietâ* exactissimâ, partim potu *Aquarum mineralium*, aliorumque *Liquorum convenientium* diuturno. In *Dietâ* igitur suademus *Lac* & *Lactinia* omnia, modò *Vacca* lac exhibens nutriatur *Plantis* satis convenientibus, quemadmodum sunt *Gramen* vulgare ab omnibus *Ranunculis*, similibusque corrosivis plantis secretum: *Trifolium* omne; *Plantago* qualiscunque; *Tragopogon*; *Taraxacon*; *Chelidonia major* & *minor*; *Anserina*; *Betonica*; *Hedera terrestris*; *Bellides omnes*; *Nasturtium aquaticum*; *Hieracia omnia*, &c. Quin & ipsæ hæ *Plantæ* plures cibis quotidianis incoctæ *Ægris* maximè proficuæ forent. Suademus dein inter cibos *Carnes* omnes juniores, *Vitulorum*, *Hædorum*, *Vervecum*, *Pul- lorum gallinaceorum*, *Caponum*, *Gal- linarum*, *Perdicum*, *Alaudarum*, *Columbarum*, *Rusticularum*, *Cotur- nicum*. *Radic. Petresolin. Sisar. Scor- zoner. Carlinæ, Raphan. rustican, Api-*

um selinum, Borragin. Nasturt. hor- tens. & aquatic. Scolymos, Brassicam non salitam, Rapas recentes non salitas, Allia, Cepas &c. Inter pisces profunt *Salmones, Trutta, Lucii, Carpiones*, & alii etiam minores pisces fluviati- les. Abstineat verò *Æger* ab omnibus cibis duris, crassis, falsis, sordidis, quemadmodum sunt *Carnes Fera- rum* aliæque *duriores*, inprimis *Por- corum*, &c. sive recentes sive fumo induratae, nec non *cibi omnes sale conditi, caseus*, & quæ sunt similia: Præterea *Vinum* commendamus, pro potu moderato, minimè tartareum austerum, aut crassum; sed bonum, album, vel rubellum, tenue, & facile penetrans. A *tristitiâ, mærore*, atque *irâ* sibi temperet: *Balnea* in- primis non rarò ingrediatur, paulo ante ingressum hauriendo cyathum *Aquæ Fumariæ, Card. bened. Scabios. Succisæ, aut Cherefolii* repletum, cum *Roob Sambuci vel Juniperi*.

Curatio instituitur quemadmo- dum in sequenti Affectu, quoniam utrobique totius Massæ humoralis correctio, elutriatio, atque edulco- ratio venit instituenda.

ELEPHANTIASIS ARABVM, s. LEPROA *Græcorum* est obstructio scabiosa totius contextûs per cutem glandulosi, pertinax & maligna, cum defædatione universi corporis, crustis & tuberculis duris, maculis lividis, ulceribus, intolerabili pruritu, aliis- que molestiis hominem divexans.

Afficiuntur heic inprimis Glandulæ miliares cutis, pluresque aliæ per

Curatio.

Elephan- tiasis A- rabum.

Pars af- fecta.

per corpus disseminatæ, idque à causâ morbificâ, valdè acri, & viscidâ obstruente. Quando enim Massa sanguinea admodum inquinata est, & obruta salibus fixis, acido - austeris, acribus, ac insimul terrestribus, viscidis, & Freis, unde succus partium solidarum nutritivus, vel etiam haliuosum serum, quod aliàs transpirare solet, viscidum atque lentum redditur, tum facilè talis humor, circulationis lege ad glandulas porosque cutaneos propulsus, incipit obhærescere, stagnare, ac tubulos primùm pauciores, mox plures obstruere, ita ut hinc avolantibus particulis aquosis tenuioribus, reliquæ adhuc viscidiores redditæ, & magis accumulatæ, non solum tubercula sparsim per cutem excitent, sed etiam acrimoniâ suâ circum circa rodendo pungendoque pruritum intolerabilem, atque Ulcuscula scabiosa producant. Quod si dein particulæ quædam Freæ acido-austeris istis salibus intermiscantur, tum exinde simul squamulæ cutaneæ, aut furfures, cum asperitate totius cutis inducuntur, & tandem in extremis etiam tubulis guttulæ sanguinis à transfluxu prohibitæ & coagulatæ maculis lividis originem præbent.

Diagnosis.

Ex quibus sequitur, *Lepram* hanc *Græcorum* non nisi gradu tantillum inferiore ab *Elephantiasi Græcorum* differre. *Signa* enim dictæ *Lepræ* sunt pruritus intolerabilis & maximus; unde *Ægri* vehementissimè scalpendo, fibrillasque cutaneas dilacerando, omnis generis *Ulcuscula* &

Inflammatiunculas arcessunt, sicque corpus totum exasperant. Apparent dein etiam nunc *squamulæ albicantes*, nunc *furfures*, nunc etiam *maculæ rubicundæ, lividæ, pruriginosæ*, per cutem corporis disseminatæ. Quibus junguntur lassitudo, metus, tristitia, insomnia pavidæ. Subinde in *Venerem* sunt maximè proclives tales *Ægri*, ut priapismo ac satyriasis non rarò vexentur. *Respiratio* pluries est offensa ac tarda, *expiratio* gravis & fœtida, *pulsus* parvus, tardus, inæqualis; *sitis* sæpius intensa; *alvus* segnis; *urinæ* crassæ turbatæ, quandoque *jumentorum urinæ* similes; *color* totius corporis ferè lividus. Quibus si plura in progressu morbi accedant symptomata, haud obscurum erunt indicium succedentis veræ *Elephantiasis Græcorum*, s. *Lepræ Arabum*. Tandem notandum, quosdam arbitrari, hunc morbum in alterutro tantum vel utroque pede, valde tumido, ulceroso, leviter cancroso, coloreque livido, ac dolore pruriginoso, &c. consistere. *Elephantiasis* porrò vel *hæreditaria* est, vel *ascititia*, quarum illa vel à Parentibus obtinetur, vel per contagium acquiritur. hæc verò non nisi malâ diætâ comparatur. *Exempla* deniq; habentur eorum, qui per coitum, per oscula, per linthea, vestes, pocula &c. *Leprosi* sunt redditi.

Quod *Prognosis* attinet, *Morbus* incipiens haud difficulter est curabilis; sed ubi jam altas egit radices, vix quidem vel tantillum emendare poteris: quin facilè in perfectam *Græcorum*

corum

corum Elephantiasin transit, eamque ut eventus docet, prorsus insanabilem.

In *Curatione* ea methodus est observanda, quâ quidem & circulatorum humorum impuritas corrigi, & vitia simul partium solidarum dispelli poterunt. Si quid igitur curæ superest, in Diætæ optimæ præscriptione imprimis consistit, in quâ quidem *Ærem* commendamus purum, tenuem, lucidum, Euro perflabilem, multo *Æthere* refertum, quemadmodum in supremis *Ædium* contignationibus reperitur, nullo etiam fœtore, aliaque venenatâ qualitate infectum, nec admodum frigidum. *Alimenta* omnia sint boni succi, & facilis digestionis, quæ laudabilem per omnia phylum exhibeant; velut sunt carnes animalium juniorum, avicularum, vervecinæ, cancri &c. *Jusculis* inquantur *Herbæ aromaticæ*, saleque volatili multo præditæ: vitentur omnia acida, salsa, cruda, fumo indurata. *Potus* sit vel *Cerevisia* tenuis, probè defœcata, vel *Decoctum Lignorum* cum *Cinnamom.* vel *Decoctum Liquirit.* *Ras. C. C. Hord. Fumar. Agrimon.* ac *Cinnamom.* Post partum quemlibet exhauriat *Æger* dosin vel *Roris Solis*, vel *Rataffiæ*, vel similis *Liquoris spirituosæ*, præprimis qui cum *Petroselino Macedonico* paratus est. Vel *Spiritus Ceras. nigr.* cum *Aqu. Apii Macedon. & Cinnamom.* in quibus *Sacchari q. s.* est soluta, permiscetur, & potandus cochleatim offertur. *Motus corporis* sit blandus, *Vigiliæ* temperato somno alternentur:

Alvus respondeat quotidie, sponte vel arte. *Venus, Ira, & Animi* reliqua vehementiora pathemata fugiantur.

Ex *Fonte pharmaceutico* ea conducunt remedia, quæ visciditatem humorum potenter incidunt, attenuant, atque resolvunt, ac ita particulas remotissimis tubulis impactas, velutque incuneatas è suâ sede dimovent; hinc etiam simul acrimoniam temperant vel obtundunt, salia copiosissima valdè diluunt, secumque vel per tubulos cutaneos, vel per renales auferunt. Itaque in principio curationis *Vinum* aliquod medicatum, per 6. vel 8. dies hauriendum exhibeatur, quod compositum sit è *Radicibus Caryophyllatæ, Filicis, Pimpinellæ, Carlinæ, Aristolochiæ, Chelidoniæ majoris, Chinæ, Sarsaparill. Petasitid. Apii selini, Ligni Sassafr. Guajac. Corticib. Cappar. Herb. Fumar. Plantag. Heder. terrestr. Agrimon. Hepat. nobil. Scolopendr. Cuscut. Chamædr. Thée, Betonic. Chelidon. maj. Apii selin. Nasturt. Ulmar. Bell. min. cum flor. Trifol. fibrin. Capill. ♀ ris Semin. Aquileg. Dauc. Fœnicul. Radic. Hellebor. nigr. Rhabarb. elect. Fol. Senæ opt. mund. Limatur. Chalybis. ☉ Absynth. Cortic. Winteran. &c.* Affundendo medias portiones *Aquæ & Vini albi veteris boni.* Post *Vinum medicatum* toto autumnali atque hyberno tempore Athleticis quotidie haustus prodest *Aquarum destillatarum Fumariæ, Ulmaricæ, Chelidoniæ majoris, Nasturtii aquatic. Plantaginis* cujuscunque, *Card. bened. Carlinæ, Agrimonie, An-*

serinæ, Scolopendriæ, Hepatic. nobilis, & similibus. Aestivo autem toto tempore quolibet mane integra exhauriatur mensura sive Acidularum quarumvis, sive Thermarum Fafariensium, Plumbariens. Carolinarum Schintzenacensium &c. recens inventarum Helvet. Cum hisce tamen largis liquoribus simul conducit assumere Tincturam ♂ t. aperitivam, vel ♀ n. optimam, necnon Essentias Cinnamom. Gargophyllor. Zedoar. Absynth. Chamædr. Bellid. min. Trifol. fibrin. Cochlear. Spirit. Salarmon. anis. aut fœnicul. Sal volatil. oleos. Sylv. Sal volat. Ebor. Viperar. C. C. Succin. Fuligin. Quibus subinde jungenda sunt sicciora absorbentia, & edulcorantia, velut sunt Opiatæ, Pulveres, atque Pilulæ, compositæ è Pulvere viperino, Diaphoret. ♂ ial. ♀ vial. Unicorn. fossil. ♂ n. diaph. Bezoard. min. Ebor. ppt. C. C. phil. ppt. Lumbric. terr. ppt. Milleped. ppt. Rad. Aron. Herb. Trifol. fibrin. atque Nasturt. Conserv. Fumar. Plantag. Rosar. rubr. Bellid. min. Beton. Extract. Absynth. Beton. Lign. Sassafr. Guajac. Dolens pulverem ♂ io-antimoniale ceu specificum arcanum in hoc morbo jactitat; alii Balsamum ♂ ris ♂ iatum sine ♂ te, Oleum item ♂ ii diaphoret. Tincturam ♀ ris, aliaque inter Panacæas referunt. Si quis itidem per diuturnum tempus non nisi Aquam vel Decoctum Lignorum, in quo simul Mercurius vivus optimè bullierit, bibat; & simul externè cum eodem decocto calido sese per totum corpus, imprimis autem in ulcerosis locis, optimè lavet, ac eluat, is

tandem, non neglectis reliquis etiam remediis, à fœdo Morbo liberationem sperare potest.

Qui denique heic curam salivatoriam instituere volet, quemadmodum in Lue Venereâ, is fortè successum haud infelicem habebit.

EMPROSTHOTONOS, est species Convulsionis universalis, quâ dorsum hominis in altum valide attollitur, caput verò anteriora versus reclinatur. Vide Convulsio.

EMPYEMA ex ἐν & πύον, pus, compositâ voce, est collectio puris in cavitate alterutrâ Thoracis, proveniens ex Abscessu aliquo pectoris interno rupto.

Causa hujus morbi plerunq̃ue est Abscessus sive Pleuræ, sive Pulmonis, sive Glandulæ alicujus Pectoris ruptus, suumq̃ue pus in cavitatem Thoracis effundens. Abscessui verò originem præbet antecedens quædam dictarum partium, à viscoso acri sero aut sanguine enata Inflammatio, quæ Pleuritidem, Peripneumoniam, aut Pleuroperipneumoniam constituere aliàs solet. Oportet autem talem Inflammationem atque Abscessum eo in loco Pulmonis aut Pleuræ gigni, unde pus factum è rupto tumore in pectoris cavum immediatè defluere queat. Aliquando etiam Vulnus & Contusio pectoris ad Sanguinis & inde facti puris collectionem contribuit.

Quod si igitur præcedat talis quædam Inflammatio in Pectore, quæ,

quæ, superflite licet Ægro, curari non potuit; si pondus circa Diaphragma cum respirationis difficultate; si fluctuatio in mutato decubitu; Tussis frequens & ut plurimum sicca perferantur; simulque Febris hectica adsit, per vices exacerbata; tum Empyema adesse conjiciendum. Quando hæret in dextrâ Pectoris cavitate, pondus atque calor ibidem sentietur, simulque dextrum latus thoracis longè tumidius opposito ferè emaciato deprehendetur, & Æger interea nunquam lateri sano citra periculum suffocationis incumbere poterit. Somnus dein in Empyemate omni adest inquietus; sitis, tussis, anxietates præcordiorum frequentes, dyspnœa, per vices insigniter torquent; macies quotidie major redditur. Abdomen etiam & pedes œdematosè intumescunt, si in sinistrâ pectoris cavitate Empyema hæserit, quoniam à puris mole ductus thoracicus tum valde premitur, hincque Lympha in tubulis partium inferiorum cumulat & stagnat. Hippocrates tandem jussit linteam madidum utriusque lateri pectoris applicare, ubi enim citius siccatur illud, ibi pus latere perhibuit.

Si Prognosis spectes, sitis, anorexia perpetua, agrypnia, alvus liquida, sputum fœtidum, macies corporis cum Febri hectica quotidie major, abdominis atque pedum intumescencia, purisque nulla per quamcunque datam portam evacuatio, mortem prænunciant lentam; quoniam pus intus conclusum suâ acrimoniâ

partes quascunq; cingentes erodit, & in putrilaginem ulcerosam vertit, sicque simul Phthisin excitat. Si pus ipsum vel Pulmones perumpat, ac ita cum tussi copiosius exscreetur; vel si etiam musculos intercostales erodat, & cuniculos agendo subter musculos pectoris externos sese projiciat, tumoremque inibi producat, ac denique per eundem tumorem, qui maximè dolorificus & æstuans esse solet, novaculâ incisum apertumque effluat, tum Æger non rarò mortem evadit, ulcere sic pectoris probè non solum eloto, sed & tandem post plures etiam menses perfectè ad cicatricem perducto; qualia exempla nobis aliquot in Praxi nostrâ medicâ occurrerunt. Vidimus etiam, quibus materia purulenta è pectore, nescio quâ datâ portâ, ad Renes fuit delata, & cum urinis excreta, Ægro hinc perfectè reconvalescente.

In Curatione eo magnopere est adnitendum, ut puri in pectoris cavitate collecto quæcunque commoda porta aperiatur, quod quidem primo tentabitur per *Clysmata emollientia*, ex decocto *Hordei* & *Melle rosaceo* parata, quemadmodum habet *Forestus*; hinc pectus inungendum *Oleo Chamæl. Lilior. alb. Axung. Catuli, Felis*; vel *Fotu emolliente* ex decoctione *Herbarum* in *Lacte* facta: postmodum exhibendo *Cassiam solutivam*. Ubi autem Urina crassa evadet, tum etiam *diuretica*, in primis *Tincturam anti-phthysicam Garmani* optime paratam ad gutt. 15. m. ac v. cum *Aqu. Heder. terr. vel Veronic.* exhibere licet. Alias

Curatio.

tentanda est evacuatio per ruptionem Pulmonis, & expectorationem, dando quotidie semel aut bis duas vel tres uncias *Succi ex Hederâ terrestri Veron. Urtic. urent. Apio selin. Nasturt. aquat. Cochlear. Raph. rustic. Trifol. fibrin. Plantag. aquatic. Geran. Robertian. recenter expressi ac filtrati. Vel exhibendo pulveres ex Diaph. Uvial. Flor. Anis, Pulvere Veronica, Hederæ terrest. Ireos florent. Lichenis petræi, Lycopodii &c.* Quibus addimus *Decocta pectoralia*, atque *Unguenta*, vel *Linimenta thoracica*, qualia quidem in Pleuritide, Tussi & Asthmate aliàs commendari & præscribi solent.

Paracen-

Hiscæ verò omnibus in cassam adhibitis, *Paracenthesis* seu Thoracis *perforatio* inter sextam & septimam costam, à supremâ numerationem inchoando, ad latus venit instituenda, ita quidem ut neque nimis versus dorsum, ubi muscoli sunt crassiores; nec nimis antrorsum versus pectus, ubi Diaphragma periculose lædi posset, operatio fiat. Itaque ad hos scopulos evitandos sume filum, & metire à mucronatâ pectoris cartilagine usque ad apices vertebrarum spinæ dorsæ; dein filum in tres partes divide, & quo loco duæ tertiæ partes (à Sterno incipiendo) pertingunt, illum verum Paracentheseos locum statuas. Instrumenta quibus hæc operatio perficitur, sunt Scalpellus linteo obvolutus, quo vel simul & semel cutim, musculos, & succingentem costas membranam pertundimus; vel prius imponimus rupto-

rium sive corrosivum, ad cutim exurendam, & sanguinis fluxum impediendum.

Paracenthesi autem factâ, humorem & pus in cavitate Thoracis contentum per immassam cannulam argenteam alatam sensim effluere permittimus. Si verò pus nullum effluat, quod contingit, quando illud peculiari velut sacco, inter Pleuram & Pulmonem facto, inclusum tenetur, tum partim injectionibus Decocti traumatici per Siphonem factis, partim si ita non succedit, profundiore scalpelli, vel acûs adactione saccus erit rumpendus.

Effluente autem sensim purulentâ materiâ intus continuè *Decocta traumatico-pectoralia* m. ac vesp. calidiusculè propinanda erunt, ex *Radicibus Caryophyllat. Chin. Liquirit. Sarsaparill. Rubiæ Tinctor. Herbis Veronic. Sanicul. Alchymill. Artemis. Vinc. pervinc. Geranii Robert. Bellid. minor. Hed. terrest. Chamæpith. Scabios. Plantag. Pyrol. Millefol. Ligno Sassafr. Floribus Bellid. min. Tussilag. Papav. rhead. Borragin. Seminibus Hyperic. Fœnicul. v. gr.*

R. *Radic. Tussilag.*

Aristol. rot. ver.

Caryophyll. ana. ʒiij.

Herb. Millefol.

Pyrol. ana. Mj.

Artemis.

Sanic. ana. Mj.

Flor. Bell. min.

Tussil. ana. Pij.

Incis. & contus. coqu. in

Aqu. font. Miß.

Vin.

Vin. alb. Mß.

De colaturâ mane ac vesp̄eri Cyathus unciarum quatuor exhauriatur.

Juxta hoc *Decoctum* simul diligenter *Pulvis folior. Lichenis petræi*, vel *Sempervivi*, *Telephii*, ac *Pilosellæ* cum *Diaph. Juvial. C. C. phil. ppt. & Sacch. cand. rubr.* in usum per plures menses trahitur. Ipsum verò pectoris foramen ferè ad semestris spacium apertum est relinquendum, immissâ semper cannulâ argenteâ; donec nullum amplius vestigium purulenti humoris in pectore latitantis adsit, qui pulmonem corrumpere, Phthisicamque tabem inducere valeret. Ad hoc vero præcavendum Injections quoque in ipsum Pectoris cavum institui per cannulam debent, cum *decocto Herbarum traumaticarum in Aquâ facto*, admixta semper *Tinctura Myrrhæ, Aloës, & Mastich.* Quin & *Tinctura traumatica amara* intus quotidie exhibenda est, concedendusque usus *Conserv. fl. Ros. rubr. Tunic. ac Bell. minor. cum Florib. Agr. Diaph. Juvial. Pulv. Lich. petr. & simil.*

Tandem ubi Symptomata accedunt varia, iisdem suo modo occurrendum. Si pure effluente Abdominis tumor aut tensio remanet, non adeo benè de eventu judicandum; si verò tensio illius minuitur, melius omnino de futura salute sperandum. Contingit etiam interdum, ut post hanc operationem pedes intumescant, ipsumque Abdomen tumore velut oedematoso nonnihil expandatur, quod phænomenon tamen

non omnem statim spem adimat: quin si appetitus post apertum pectus rediens manet, si respiratio facilior, somnusque bonus evadat, tandem & ipsa illa intumescencia vel per se, diligenter continuato traumaticorum usu, cessabit, vel Laconicis sæpe institutis discutietur. Interim dum operationem Medicus proponit, nihilominus anceps illud esse remedium prædicet, à quo nonnulli quidem reviviscere possint, alii verò minimè experiantur speratum operationis successum: qui enim v. gr. acriore sanguinis temperie, aut caco-chymiâ prorsus aliqua instructi sunt, illi per operationem hanc quidem nonnihil diutius vivunt, sed tamen mortem nihilominus lentam effugere vix poterunt.

ENCANTHIS vel **EXCANTHIS**, ex *ἐν* vel *καὶ* *θὸς*, *oculi angulus* composito vocabulo, est Carunculæ lachrymalis intumescencia nunc indolens, laxa, & mollis, nunc dura, inæqualis & cum dolore punctorio conjuncta, Cancrumque minitans.

Encanthis.

Producitur ut plurimum à sero nutritio copiosius ad partem affectam transcolato, & acri quodam characterē infecto. Vel etiam Lymphâ quædam viscida intra tubulos & vesiculas membranaceas Carunculæ illius deposita, cumulataque, partem in tumorem distendit; laxum illum atque indolentem, si humor stagnans nullo acido corrosivo præditus sit: pungentem verò, dolorificum,

Causa.

ficum, durum, atque nonnihil lividum, si humori plures particulæ acido-fixæ, corrosivæque sint permixtæ. Nonnunquam ex *Pterygio* malè curato vel ex *Ulcere Carunculæ Encanthis* quoque enascitur.

Diagnosis & Prognosis

Quoad *Diagnosin* & *Prognosin*, Malignum hoc facilius cognoscitur quàm curatur, propter nobilissimæ partis, Oculi nimirum viciniam. Si tuberculum dolet, livet, & aliquando etiam album atque durum est, latentem pronunciabis Cancrum, sive *Encanthidem malignam*, vix tangendam, ne exulcerata citò miserandi Ægri faciem cum horrendis cruciatibus depascatur. Felicius hinc ferro extirpari posse credes, quam alio modo curari. Quæ autem fungosa est, rubicunda, indolens, atque nullis venulis lividis interstineta, *Encanthis benigna* audit, remediaque haud difficulter admittit; aut subinde per se separatur ac decidit.

Curatio.

In *Curatione Encanthidis benignæ*, ubi nullus subest metus Cancri, primò corpus purgante aliquo, *Mercurio dulci* commixto, elues; vel *Vino* etiam medicato evacuabis: deinceps internè quidem *Essentiam Betonicæ*, *Chamæpith.* *Hyperici*, *Numulariæ*, & *Feniculi*, aut *Spirit. Sal. armon. feniculatum*, anisatum, vel succinatatum ad guttas 20. man. ac vesp. cum *Infuso fol. Beton. & Chamædr.* quotidie dabis. Externè verò *Dolæus* commendat primò *fotum* ex *Radic. Valerian.* *Chelidon.* *Herbis Rutæ*, *Chelidon. maj.* *Puleg.* *Verben.* *Flor. Sambuc.* *Lavend.* *Betonic.* *Seminibus Fenic.*

Sileris, *Caryophyllis*, *Aloë*, in *Vino generoso coctis*, addito pauxillo *Camphoræ*. Hoc verò nil operante sæpius tangere solet *caustico* suo *indolenti*, cui non male substituitur *Aqua calcis vivæ* in vase cupreo facta, atque tantillo *Mercurii sublimati* acuata; vel saltem *solutione* ejusdem *sublimati* affusa flavens reddita; quo liquore penicillus sæpe imbutus *Carunculæ* applicatur, præmunito semper prius Oculo. Si nec ita tumor ille minuitur, tum forcipe portio *Carunculæ* extumescens auferatur, ac postmodum statim *Collyrium traumaticum* in usum trahatur, ex *Aqua flor. Cyan.* *Chelidon. maj.* *Plantag.* *Euphras.* cum *Sacch. Cand.* *Tutiâ*, *Lapid. calamin. ppt.* *Aloë*, *Myrrh.* &c. Vel *Unguentum Ophthalmicum Mynsichti* usurpatur. Sunt qui *Encanthidi*, solum *Pulverem Sacch. cand. alb.* cum *Sarcocoll. Tut. ppt. Lapid. calaminar. Matr. Perl. ppt. Aloë* &c. permixtum subinde afflant, sicque sensim tumorem absumunt; addunt alii quoque tantillum *Alumin. usti*, vel *Vitrioli usti*, veletiam *Mercur. præcipitati rubri*, aut *albi*. Sed quadrante horæ post applicatum pulverem *Ophthalmicâ* quadam *Aquâ* partem iterum tepide abluere oportet.

Si *excrecentia* magna jam evasit, ac *benigna* adhuc extiterit, filo transfixa rescinditur, cavendo, ne simul *Caruncula* tangatur; postea *Saccharum cand. alb.* cum *Tut. ppt. & Myrrhâ* vel *Aloë* applicatur.

Excrecentia dura, inæqualis, dolens, adeoque *maligna* extirpationem desiderat

desiderat totalem, plerunque verò sine funesto eventu tangi nequit, sed *Collyriis tantum siccantibus & anodynis* foveri cupit.

ENTEROCELE, vid. *Hernia intestinalis*.

EPHELIS, ἐφελίς, ex ἐπι & ἥλιος, *Sol*, compositâ voce, est asperdo & nigrities quædam in facie, ut plurimum à *Solis* ardore producta, & cum maculis etiam fusci coloris juncta.

Pars affecta præcipuè est *Faciei* cutis, quæ aëri externo semper exposita, varias quoque ejus injurias patitur.

Oritur autem ista nigrities, vel color saltem fuscus, subinde maculas magnas efficiens, à coagulatione succi certi, nonnihil in se viscidioris, sed & ab externo *Solis* ardore, quo subtiliores particule jugiter extractæ exhalant, magis siccati. Succus autem iste participat de fero sulphureo-ac resinoso, particulis salino-fixis obtusis commixto. Hinc *Mensium* quoque vel *Hæmorrhoidum* obstructions talibus non infrequenter maculis ortum præbent, ubi sanguis spissior, sive crassior est, atque acido-fixis particulis inquinatus. For- san & acidæ ejusmodi particule ipsis jam poris cutaneis inhærent, sudoris retropulsi reliquæ, quæ succos circulationis lege allabentes coagulare atque præcipitare aptæ sunt. Sol autem, cui facies quotidie exponitur,

suis radiis fortioribus multum ad has contribuit maculas, quando citissime volatiliores moleculas per cutis poros elicit, dum interea cæteræ retromanere, sponte incrassari, coagularique necesse habent; quod vel inde patet, quoniam ardore *Solis* cessante, maculæ quoque illæ sensim evanescent, atque disparent, nisi fortius radicatae fuerint.

Facile dignoscuntur hæ maculæ *Diagnosis.* à *Lentiginibus*, hæ enim minores longè sunt, adeoque & copiosiores, totum sæpè corpus defœdantes, sine ulla asperitate: *Ephelides* autem sunt maculæ multo grandiores, in *Facie* conspicuæ, fuscae, & subinde cum tantilla asperitate cutis junctæ; circa os & labia apparentes, rarius in aliis quoque corporis partibus apparentes, *Pregnantibus*, mensiumque aut hæmorrhoidum obstructione laborantibus, quam verò aliis familiariores; post partum verò, aut fluxum dictum redeuntem, iterum disparentes.

In *Prognosi* hinc tenendum, quod maculæ tales non durabiles, sed vel sponte, vel arte non adeo difficulter dissipabiles sint. *Prognosis.*

Præcaventur *Ephelides*, si facies aut *Causa.* etiam manus illinantur vel *Felle bubulâ* noctu aut mane, dum *Solis* radiis sese quis exponit, vel *Ovi albumine* conquassat. cum *Aqu. Ros.* aut *Fenicul. Chelidon. major. Cochlear. Radic. Sigill. Salomon.* vel facies tegatur *Larvâ cum panno cerato*; vel *Emulsio* in hunc quoque usum paretur ex 4. *Semin. frigid. cum Aqu. Sigill. Salom. Flo. Fabar. & calidè cum linteis noctu*

noctu applicetur. Curantur verò absterfione cum *Foliis Cerasi recent.* Vel *Aqu. Ros. Chelidon. Apii selini, Sigill. Salom. cum Oleo Tart. per deliqu. & Mercurio dulc.* Sunt, qui *Gummi Cerasorum Aceto* solutum, cum paulillo *Farinæ avenaceæ* calidè sæpius affricant. Laudatur & *Pulmentum è Baccis Lauri* pulverifatis cum *Aqu. Fungorum* paratum, ac in *Balneo* impositum. Item *Aqu. Bryoniæ* cum *Succo Limonum, Felle Gallinarum;* nec non *Lac Virginis* cum *Essentiâ Myrrhæ, Storacis, Benzoin,* atque *Radic. Sigill. Salomon. vel Irid. Florent.* paratum. *Oleum Tri per deliquium* non est contemnendum, cum *Essentiâ Myrrhæ, vel Melle, & Pulvere Baccarum Lauri* permixtum. *Unguenta cosmetica* quoque, velut in *Lentiginibus,* usurpari possunt. Sed & *internè* medicamenta in usum vocanda, quæ crassiorem sanguinem attenuare, ac volatiliorem reddere possunt: in quem finem commendamus frequentes haustus *Aquar. destill. Chelidon. Apii Macedon. Nasturtior. Cochlear. Borragin. Fumar. Scabios. cum Essent. Bugloss. Bellid. min. Trifol. fibrin. Betonic. &c.* Si menses in non gravidis deficient, debito modo provocabis.

Ephialtes, Incubus.

EPHIALTES, ex ἐπὶ, *super,* & ἄλλομαι, *salio,* compositâ voce, Latine INCUBVS, est falsa imaginatio ponderis thoraci incumbentis, vel hominis suffocationem ac necem inferre conantis, noctu atque in somno adolescentibus præprimis ob-

tingens, cum respiratione difficili terrore, & suffocationis metu.

Pars affecta primariò est *Diaphragma cum musculis Thoracis* in suo officio nonnihil præpeditis, hinc & ipsum *Cerebri meditullium,* vel *Cerebellum* potius cum meatibus, nervisque phrenicis sive recurrentibus in quo spiritus animales ac fibræ medullares non ritè agitatae occasionem perversæ imaginationi præbent.

Causa proxima hujus Affectus non est nisi Spirituum animalium influxus per nervos phrenicos & recurrentes denegatus; quod in morbo sæpius recurrente, Aëgris etiam non jacentibus supinis, producitur, inprimis à spasmodicâ aliqua contractione musculorum vel pectoris, vel diaphragmatis, vel, ut *Dolæus* opinatur, ipsius Abdominis, quos antagonistas vocat musculorum diaphragmatis. *Antecedens* vero causa est acidum quoddam austerum, è primis viis, digestionemque ventriculi mala procedens, & forte in horum illorumve musculorum membranaceas vesiculas, fibrasque nervosas ita decumbens, ut sua irritatione spasmodicam constrictionem instituat; non secus atque in furis pedum simile quid subinde hominibus contingere solet. Dum autem muscoli ita sunt contracti, Thorax commodè dilatari, expandi, ac subsidere nequit, hincque respirationis actio necessariò offenditur; cumque hoc inprimis obtingat Juvenibus dormientibus, ac supinè decumbentibus, facile simul

in somno sibi imaginari possunt, aliquod Thoraci suo pondus, vel alium hominem insidere suffocationem sibi illaturum. Etenim Adulti, sicubi tali prehendantur Affectu, vix quidem istâ perversâ imaginatione simul afficiuntur. Supinè cum decumbunt, profundeque dormiant ægri, tum à ventriculo cibis difficilioris concoctionis distento, vaporibusve aut flatibus expanso, nec non à partium in thorace sitarum mole Arteria partim aorta, partim venæ cavæ truncus valdè premitur, sicque sanguinis circulus nonnihil impeditur: partim etiam nervi phrenici comprimuntur, ut spiritus probè transfluere nequeant: partim denique ipsum diaphragma in suo motu offenditur: quapropter si corporis situs mutatur, Incubus statim cessat, evaditque sic causa Incubi rarò affligentis. Sed & aliæ quoque causæ Incubi esse possunt, quando vel chyli austerioris, crudiorisque particulæ figentes massæ sanguineæ transmittuntur, & hinc spiritibus quoque animalibus communicantur, ita ut hi dein in cerebro, dum corpus totum supinè jacet, per nervos suos ad cor, & pectus depluere sufficienter haud possint, unde thoracis motus quoque, non secus atque cordis pulsus offendi debent; imò ipsum quoque cerebrum, aut spiritus in illius poris decurrentes motu quodam perverso affici: etenim qui frequenter hoc malo laborant, obnoxii etiam sunt vel Apoplexiæ, vel Epilepsiæ, vel Convulsionibus.

Si quis etiam ab errore diætæ, à malo pastu, vel saginatione nimia, quod Pueris sæpius contingit, malum ceu à causis procatarcticis deducere velit, non refragabimur; quoniam inde crasso crudoque chylo, non secus ac flatibus abdomen distendentibus ansa sufficiens enascitur, quo dum sanguis ac spiritus inficiuntur, horrenda quandoque atque terrificæ excitantur insomnia, lemurum, v. gr. facierum cadaverosarum, vultuum monstroforum, pugnarum, litium, incendiorum, cædium, tandem & hominum thoraci incumbentium atque suffocationem minitantium. Si supini tum jacent Ægri, tanto citius obtinget, graviusque evadet malum, quia in hoc decubitu nervi pneumonici, inprimis si abdomen plenum est, non rarò ita comprimuntur, ut animales spiritus ad diaphragma & thoracem commodè defluere haud possint. Atque hinc est illa anxietas præcordiorum, hinc illa, quâ premuntur, angustia pectoris, hinc illa loquendi, respirandique difficultas, quâ Ægri in hoc morbo ultra dimidiam sæpè horam vexantur.

Quòd *Diagnosin* concernit, Incubus Pueris quàm Adultis familiarior ^{*Diagnosin*} existit. Infantibus primæ ætatis, acido spasmodico turgentibus, frequenter ita accidit, ut in somno nunc rarius, nunc crebrius subitanè cum sibilo respirandi difficultatem incurrant, unde expergefacti quandoque citius, quandoque tardius pristinam respirationis facilitatem recuperant.

In hoc etiam symptomate tandiu Misellis, constricto velut gutture, subinde Spiritus deficit, ut faciei colorem lividum prorsus acquirant, singulisq; momentis suffocari non sine quibusdam motibus convulsivis credantur. Atque hic certè paroxysmus asthmaticus non nisi à spasms nervorum pneumonicorū, à rodente primarum viarum acido ut plurimum oriundis, provenire, & nisi medela afferatur, Epilepsiam tandem post se trahere solet. Adultiores verò hoc in Affectu velut molem quandam præcordiis incumbentem sentiunt, sub imaginatione alicujus ponderis, vel etiam alius sibi insidentis atque pectus ad suffocationem usque prementis hominis; unde etiam gravitas, atque immobilitas totius corporis obvenit, propter motum cordis, musculorumque thoracis, & bronchiorum pulmonis valdè præpeditum, indeque incipientem sanguinis in pectore stagnationem, angustias, & anxietates miras simul efficientem. Præterea Ægri in paroxysmo voce stentoreâ vel clangosâ, interruptâ, multumque impeditâ auxilium petunt. Junguntur his torpidus in somno sensus, suffocationisque imaginatio, & veluti imminens Catalepsis, dum adstantes quidem anxii intuentur, sed nec loqui, nec sua membra sponte movere possunt. Quin & ipsa non rarò phantasia corrumpitur, dum sibi fingunt, Dæmones, Sagas, Magos, aliarumque chymerarum terrentia simulacra sibi vel necem, vel alia mala minitari. Ad se verò re-

deuntes, jamque post aliquantillum tempus, respirationem liberiores consequuti, nihilominus de restitante adhuc Tremore & Cordis palpitatione, vel etiam de Vertigine, Cephalalgîâ, Capitis gravitate, & lassitudine conqueruntur. In Scorbuticis quoque paroxysmi tempore maculæ lividæ, ex nigro violaceæ, vel puniceæ hinc inde in Faciè, reliquove corpore prodeunt. Tandem supinè decumbentibus citius malum contingit, quàm aliter jacentibus.

Quantum ad *Prognosin*, Incubus Pueris & Adultis rarò lethalis quidem est, sed malus tamen omnis existit, si frequentius redeat, ipsique adeo Paroxysmi diutius durent; quoniam facilè sic in Apoplexiam, vel Epilepsiam, Convulsiones, imò & Melancholiam, Maniam, aut subitanèam mortem transit per modum Catarrhi suffocativi. Infantes autem lactantes hoc malo sæpius prehensi, nisi præcaveris, certissimè in Epilepsiam incidunt, lethalem plerunque illis, quorum textura nervosa admodum delicata & tenera existit.

In *Curatione* Infantibus hoc malo prehensis extra paroxysmi tempus conveniunt crebra *Clysmata* ex decocto Râdic. Scorzonæ. Carlin. Petasitid. Valerian. Lil. alb. Herb. Rut. Malv. Alth. Aneth. Salv. Heder. terrestr. Semperviv. Flor. Chamom. Lil. convall. Til. Papav. rhead. seminum Nasturt. Anis. Fœnicul. Carv. Bacc. Juniper. &c. parata, Melleq; insuper rosaceo, atque Oleo chamæmelino permixta, v. gr.

R. Rad.

R̄. Radic. Lil. alb.

Valer. ana ʒʒ.

Herb. Alth.

Malv.

Rut. ana. Mj.

Flor. Chamom.

Pæon. ana. Mʒ.

Semin. Carv. ʒij.

Bacc. Junip. ʒj.

Incis. & cont. coqu. in q. s. Aqu. font.

Colatur. ʒvj.

adde Mell. rutac. ʒvj.

Olei Scorpion. ʒiij.

Violar. ʒj.

Salis comm. ʒj.

M. F. Clyster tepidè injiciendus Pue-
ro sexenni.

Quin & lene Vomitorium ex guttu-
lis aliquot Syrup. emetic. Ang. Sal. vel
Oxyfacch. emetic. cum Aqu. Flor. Til.
aut Flor. omnium exhibitum quando-
que spasmodicam simul effundit
morbi causam. V. gr. pro Puero
trienni

R̄. Aqu. Pæon.

Flor. Til.

Syrup. de Semperviv. ana. ʒij.

emet. Ang. Sal. ʒj.

vel ʒʒ.

Misc. d. ad Vit. Exhibeatur mane
pro dosi.

Vel R̄. Syrup. de Cich. cum Rhab. ʒj.

Aqu. Flor. Consol. reg. ʒʒ.

Mercur. dulc. gr. vj.

M. d. ad Vit. pro dosi matutinâ.

Tutius enim exhibebis aliquot
grana Mercur. dulc. opt. cum Syrup.
Ros. sol. s. Syrup. Flor. Persic. vel de
Cichor. cum Rhabarb. Quin & Rha-
barbarum in substantiâ ad gr. v. vel vj.

cum 2. vel 3. granis Mercurii dulc. &
Saccharo, Infanti semestri concedere
potes, imò aliquoties repetere, ad-
dendo quoque Corallorum, vel Ocu-
lorum ʒ. ppt. pulverem acidi spas-
modici absorbentem. Post expur-
gationem primarum viarum anti-
spasmodica sunt exhibenda, sub for-
mâ nunc Pulverum, nunc Mixtura-
rum, quemadmodum in Convulsio-
nibus fusius demonstravimus. Pa-
roxysmi tempore autem naribus In-
fantum statim applicabis Spiritum
qualemcunque v. gr. cephalicum;
cochleatimque exhibebis Mixturam
ex Aquâ Pæon. Flor. Til. Cinam. Flor.
omn. Hirundin. Syrup. de Semperviv.
Liquor. C. C. succ. Essent. Castor. Un-
gul. Alc. ppt. Pulver. Cephal. Mich. &
similibus paratam.

Adultioribus autem hoc Affectu <sup>Adultu-
rum in
Paro-
xysmo</sup> prehensis similiter dabuntur in paro-
xysmo quidem antispasmodica, spiri-
tus sopitos excitantia, nimirum Mix-
turæ ex Aqu. Nasturt. aquat. Flor. Til.
Flor. Consol. regal. vel Florum omnium,
cum Confect. Alk. compl. Tinctur. Ca-
stor. cum Spir. Sal. armon. parat. vel
Spir. C. C. aliove volatili, Essentiâ
Succin. nec non Pulveribus alcalinis,
acidum destruentibus, v. g. C. C. ust.
½ n. diaph. Ocul. ʒ. Cinnabar. nat.
vel ½ n. v. gr.

R̄. Aqu. Card. bened. ʒj.

Meliss.

Pæon.

Flor. omn. ana. ʒvj.

Syrup. de Semperviv.

Pæon. ana. ʒiij.

Conf. Alkerm. ʒj.

Aaa 2

Ungul.

Ungul. Alc. ppt.

Diaph. ʒvial.

Cinnab. ʒ n. corr. ana. ʒj.

*Tinct. Cast. cum Spir. Sal. arm.
par. 3ʒ.*

*M. d. ad Vitr. Exhibeatur cochlea-
tim.*

Vel R̄. Aqu. Flor. Til. ʒj.

Calendul.

Matricar. ana. 3vj.

Syrup. Capill. ʒr. 3ʒ.

Essent. Succin. ʒj.

Castor. ʒʒ.

Liqu. C. C. succ. ʒj.

Bezoard. min. 3ʒ.

*M. d. ad Vitr. Sumatur per cochlea-
ria frequenter.*

Quandoque sola *Aqua Menthae*,
Meliss. *Matricar.* *Cinnamom.* vel *Ros
solis*, similisque *Liquor spirituosus*, si
ad manus est, exhibitus promptè Æ-
gros reficit. Extus etiam naribus
spirituosa admoveantur, Ægro ad-
modum grata, velut *Aqu. Regin.*
Hungar. similesque *Liquores antapo-
plectici*, quorum etiam pars calefacta,
lintheisque excepta regioni Cordis
frequenter applicetur. Si malum
pertinax sit, etiam euporistum *Clys-
ma* ex *Urinâ* solâ, vel *Jusculo*, cum
Oleo & *Sale* statim injiciatur. Inter-
ea Æger quoque erigatur, & quan-
tum fieri potest ipsemet sese moveat,
aut ab alio commoveatur. Si Æger
sæpius ejusmodi paroxysmis affliga-
tur, tum ad manus habere debet vel
Sal volatile quoddam oleosum, aut
Liquorem C. C. succinatum; nec non
Aquam Cinnamom. *Borrag.* *Flor. Til.*
& *Acaciarum.* Vel etiam *Elæosaccha-*

rum aliquod cum *Oleo destill.* *Roris-
marini*, *Salviæ*, *Lavendul.* *Cinna-
mom.* *Amarac.* ac *Saccharo* paratum
de quo statim lambere aliquid potest,
aut cum *Mixturis* illis permiscere.
Sperma Ceti quoque recens statim in
Jusculo solutum ac propinatum prom-
ptè Ægros juvat.

Extra Paroxysmum autem ad fu-
turos mali accessus præcavendos,
ipsumque adeo morbum penitus era-
dicandum ante omnia necesse est pri-
mas eluere vias, acidumque spasma-
dicum inibi hospitans prorsus elimi-
nare; quod quidem *Vomitorio* tenta-
bitur in illis, qui & ad vomendum
faciles sunt, & saburram tenacem
cruditatum in ventriculo tenent. In
aliis autem præscribentur *Pilulae pur-
gantes* ex *Massâ Pilular. cathol.* *Pan-
chymagog.* *Aloephanginar.* è *Succin.*
Cratonis &c. cum *Mercurio dulci*, vel
Cinnab. nativ. aut ʒ n. & *Oleo stillatit.*
Rorismar. *Succin.* *Amarac.* &c. Pur-
gato autem corpore in usum trahatur
Sal volat. oleos. *Sylv.* vel *Spirit. C. C.*
volatil. cum *Tinctur.* *Castor.* *Essent.*
succin. *Betonic.* *Tinctur.* ʒ n. &c. in
vehiculo *Aquar. destillatar.* conveni-
entium. Post cœnam quoque ali-
quandiu *Aqua vitæ Matthioli*, aut
Ros Solis, *Aqua Cinnamom.* vel *De-
coctum Coffee* concedatur. Sed &
*Pulvis stomachicus Timæi à Gulden-
klée*, ad curandum præcavendum-
que hunc Affectum quàm optimus
est.

R̄. Semin. Coriandr. ppt. 3vj.

Pæon. 3iʒ.

Cinnamom. elect.

Macis,

Macis, Caryophyll. ana. ʒj.

Corall. rubr. ppt. ʒj.

Ol. stillat. Carv. gutt. x.

Nucist. gutt. viij.

Rotul. Man. Christ. plat. ʒiijß.

M. F. Tragema stomachicum, de quo subinde, vel ante, vel post pastum sumi poterit ʒj. ad ʒij.

Si quis porrò Oleis carminativis & aromaticis Abdomen sæpè inungere, vel etiam frictionibus, scarificationibus similibusque uti velit, ei facile talia permitti possunt, si non præcisè juvantia, saltem minimè nocentia.

Dieta verò inprimis heic est commendanda, victusque ratio ita instituenda, quò nec ventriculus multum obruatur, & in Chylificationis negotio impediatur, nec flatibus, acidisque cruditatibus ansa præbeatur. Decubitus ad latera magis in somno fiat, quàm supinè. Ab Irâ, Tristitiâ, atque Terrore Æger inprimis præservetur. Pro potu ordinario Infantibus concedatur *Decoctum radic. Scorzon. Liquir. Pæon. Gramin. cum C. C. rass.* Adulti verò bibent Vinum bonum modicè.

EPILEPSIA, Ἐπιληψία, ab ἐπι ac λαμβάνω, capio, invado, prebendo, aliàs latinè *Morbus caducus, comitialis, herculeus, sacer, lunaris, fonticus*, est subitanea motus voluntarii s. animalis, plerunque cum sensuum ablatione conjuncta, depravatio, quâ membra nunc pleraque totius corporis, nunc hæc aut illa tantum præternaturali contractivo ac violento motu ultrò citroque agitan-

tur, & subinde etiam stridore dentium, spumâ oris, ejulatione, aliisque symptomatibus corpus hominis affecti torquetur.

Pars affecta proin est Cerebrum, *Pars affecta.* cum nervis & musculis membrorum & Artuum corporis. Cum autem nunc plures, nunc pauciores ejus musculi convellantur, variaque symptomata in hoc Morbo miseros excrucient, hinc diversæ species Epilepsiæ exoriuntur.

Etenim 1. Epilepsia vel est *idiopathica*, quando ejus focus est in cerebro ipso, ubi homines subitò ut plurimum sine præcedaneis qualibuscunque indiciis concidunt, dum videl. paroxysmus instat. Vel est *sympathica*, quando focus morbi in aliis extra Cerebrum partibus hæret, unde per nervorum continuationem ipsum tandem Cerebrum in consensum trahitur; atque heic Æger ante paroxysmum molestiam quandam in hac aut illâ corporis parte persentit. Ita enim focus nunc est in Hypochondriis, nunc in Utero, nunc in Omento, Hepate, Liene, Ventriculo, nunc etiam in parte quadam externâ, digito v. g. Pedis, aut Manûs, unde tempore erupturi paroxysmi aura quasi frigida emergens secundum nervorum tractum sensibilibiter in Cerebrum assurgit, quò cum pervenit, Epilepsia cum sensuum ablatione statim in membra artusque erumpit.

2. Epilepsia vel est *universalis*, *Universa.* in quâ totum corpus, ejusque membra reciprocis motibus convulsivis,

particu-
laris.

ultrò citroque agitantur, simulque sensus omnis aboletur. Vel est *particularis*, in quâ hoc aut illud tantum membrum affligitur, Cerebro sæpius parum vel nihil affecto, sensuque & ratione manentibus integris: ita interdum pes unus vel uterque simul, interdum crura unius tantum lateris; interdum muscoli hi aut illi peculiariter commoventur.

Puero-
rum &
Adul-
torum.

3. Epilepsia ratione ætatis nunc est *Puerorum & Infantum* quæ sanabilior, nunc *Adultorum*, quæ pertinacior.

fortior,
mitior.

4. Symptomatum quoque ratione Epilepsia alia est *fortior*, *vehementior*, alia *mitior*, *benignior*; cum vel sine ejulatu, aut sensuum ablatione.

Causa

Causa proxima est Spirituum animalium inordinatus atque vehemens in nervos horum illorumque musculorum corporis impulsus, quo nunc hi nunc illi fortiter contracti spasmodicam illam membrorum calcitrationem, contractionem, motus depravatos, aliasque actiones præternaturales committunt. Phlogosin appellant nonnulli, sive effervescentiam quandam spirituum cum impetu in nervos irruentium, aut in iisdem tumultuantium.

Causa antecedens varia admodum existit, vixque perscrutabilis; plerumque verò est fermentum aliquod, sive liquor spasmodicus viscidus in qualicunque demum corporis parte hærens, elasticas acres volatiles moleculas in sese abscondens, qui subinde nactâ occasione exagitatus, sicque spiculis suis undiquaque propulsis nervosas fibrillas pungit, vel-

licat, ac ita simul hospitantes in illis spiritus animales admodum mobile ad impetuosum motum suscitât, unde spasmodica nervorum, tendinum musculorum, atque ab his flecti solitorum membrorum crispatoria spasmodica sive convulsiva agitatio subsequitur. Ad fermentum autem illud spasmodicum contribuunt cruditates primarum viarum acidæ, austerae, vitriolicæ, viscidæ, sed spirituosæ tamen, & levi occasione effervescentes, præprimis apud Infantes, quibus hinc tormina contingunt sæpius epileptica. Dentitio proin difficilis, alique dolores iisdem talem Affectum conciliare possunt. Accusant heic bilem retorridam, succum pancreaticum austero-corrosivum, mucum intestinorum haud absimilis naturæ, morbos item varios, prout sunt Febres malignæ, obstructions, Lumbrici, Cerebri concussionem, Apoplexiæ, Vertigo, Colica.

E *procatarepticis* causis huc contribuunt frequens Crapula, Ira, quotidiana & vehemens, apud hystericas præprimis fœminas; Ven⁹ nimia, Tristitia profunda ac diuturna; Terror inopinatus, inprimis ex visu hominis epileptici in paroxysmo existentis inopinato; terrificatio frequens Infantum: usus ciborum acido-austeriorum, Hæmorrhoides ac Menses retenti, plurimæque alia.

Quod *Diagnosin* spectat, affligunt paroxysmi epileptici Hominem incertis periodis, ita ut præsentiant aliqui imminentem vel advenientem paroxysmum, alii verò nihil præ-

sentien-

sentientes subito corruant, morbo prehensi. Universalis Epilepsia sensum motumque statim voluntarium abripit; jacent vel corruunt homines plerumque; subito, oculos claudunt subinde, aperiunt iterum ac intorquent, ut nil nisi album cernas: subinde præcedit aliquantillus horror membra pervadens, cum frequenti oscitatione, angustantur præcordia, stringuntur glandulæ palati, atque gulæ, plus muci salivæque effluit, ut vix Ægri sciant deglutire, minus expuere. Os firmissimè clauditur, dentes fortiter committuntur, ut maxillam diducere nescias; quandoque Lingua spasmodicè exeritur, ut metuendum, ne à dentibus mordeatur, vel auferatur ejus portio. spuma non rarò ex ore prodit; corpus dextrorsum, sinistrorsum commovetur; artus tam superiores, quàm inferiores fortiter concutiuntur; interim tensi admodum, in articulis flecti nequeunt. Sunt & qui instar catulorum larrantium ejulant. Atque hi impetus spasmodici per quadrantem vel semiquadrantem horæ, nonnunquam etiam diutius longè protrahuntur, novisque sæpè insultibus repetuntur. Finito paroxysmo, in somnum tantillum incidunt Ægri propter dissipationem, vel ligationem spirituum; unde expergefatti de lassitudine quandoque & dolore conqueruntur. Vidimus etiam qui in mille figuras corpus intorquebant, nec omni sensu privati erant, quique maniacorum instar adstantes ictibus ex abrupto petebant,

latibula quærebant, in altum se subito projiciebant, inque hoc miserando statu per unum vel alterum diem manebant, donec bile, à cujus effusione, excandescentiâ & acrimoniâ convulsiones epilepticæ proveniebant, probè expurgatâ penitus ad se redirent. Apud Infantes satis frequens est hic Morbus, in quibus nunc artus magis, nunc muscoli Capitis, Linguae, Pectoris, aut Pulmonum plus crispantur.

Epilepsia *particularis* unum tantum vel alterum membrum, brachium, pedem, caput &c. affligit. Vidimus Puellam decem annos natam, cui per periodos incertas omnes sinistri lateris partes convulsivis motibus quadrantis horæ plus minus spatio agitabantur, non excepto oculo sinistro musculisque faciei ejusdem lateris. Vidimus etiam Virum triginta ætatis annos egressum, scorbuticâ sanguinis intemperie præditum, cui ferè quotidie brachium, duntaxat dextrum, rarius pes dexter hâc ratione convellebatur. Atque ejusmodi particularis Epilepsia sensum & rationem hominis non tollit, quin potius spasmodicè tales motus atque intorSIONES membri unius vel alterius, eidem dolorem insignem conciliant, de quo proin suis valdè conqueruntur Medicis.

Quoad *Prognosin*, Infantum Epilepsia, nisi vehemens admodum fuerit, ac sine intermissione duret, aut nervos pneumonicos affligerit, sanabilis adhuc est: Adultorum verò, quique annum ætatis vigesimum egressi sunt,

Prognosis.

sunt, vix ac ne vix quidem sanabis, præsertim si Æger sit cholericus, aut hypochondriacus, aut persona hysterica. Interim nunc citius, nunc tardius post aliquos dies, menses aut hebdomadas recurrunt paroxysmi; iique nunc fortius hominem inprimis cholericum, nunc remissius affligunt. Tandem Morbus in Apoplexiam, vel Catarrhum suffocativum, vel etiam Hydropem Thoracis mutatur, nisi Febris quædam maligna interveniens hominem è medio tollat. Interim per plurimos annos, etiam ad Senectutem u. que Affectus durare, ac in aliquibus membra distorta, in aliis fatuitatem & ratiocinationis, loquelæ etiam læsionem producere valet. Puellarum nondum menstruatarum Epilepsia non rarò per se cessat, quando menses probè fluere incipiunt & pergunt.

Curatio.

In Curatione gravissimi huius Affectus inquirendum ante omnia est, utrum ille fuerit hæreditarius, vel adventitius? hicque iterum vel ab Animi passionibus, vel à malâ victus ratione, vel à Lumbricis originem ducat?

In paroxysmo.

In Paroxysmo epileptico Adulterum, quacunque de causâ orto, Spiritus volatiles C. C. Viperar. Lumbric. terrestr. Urinæ, Salis armon. Liqueur. C. C. succin. aliique naribus applicandi: qui & iidem Liqueores spirituosi Aquis cephalicis Majoranæ, Meliss. Salv. Origan. Calaminth. Ocym. &c. diluti temporibus atque vertici admoventur: vel alia etiam remedia externa Spiritus animales à turbulento motu revocantia, qualia quidem su-

prà in curatione Apoplexiæ fufius descripsimus, in usum trahenda. Imò & Clysteres quoque acres, ex decocto Plantarum cephalicarum, Rutæ inprimis, Rorismarini, ac Visci quercini vel tiliacei, Florumque Chamomill. Pæon. Calendul. cum Oleo rosac. Melle, ac Sale rutaceo inspergantur. Tandem & Balsama anodyno - epileptica, v. g. rutaceum, Succini, Rorismarini, Majoranæ, Chamomill. cum Oleo Castorei & Hyoscyam. vel ipso quoque Opio nuchæ ac temporibus inungi possunt.

Finito Paroxysmo statim Mixturæ antepilepticæ per cochlearia sumantur: v. g.

℞. Aqu. Hirundin.

Flor. Calcatripp.

Til. ana. ʒj.

Syrup. Pæon. ʒvj.

Liqu. C. C. succin. ʒij.

Terr. sigillat.

Ungul. Alc. ppt.

Cinnab. nativ. vel ʒ n. ana. ʒj.

M. ad Vitr. Vel

℞. Aqu. Semperviv.

Flor. Lil. convall.

Pæon. ana. ʒj.

Flor. omn.

Syrup. Rub. id. ana. ʒʒ.

Confect. Alk. inc. ʒʒ.

Liqu. C. C. succin. ʒj.

Dent. Apr. ppt.

Ebor. ppt.

Bezoard. min. ana. gr. 12.

Cinnab. nat. ʒʒ.

Sacch. ros. tabul. ʒij.

Essent. Opii liquid. gutt. ix.

M. ad Vitr.

Infan-

Infantibus semestribus hoc morbo afflictis propinare poteris seqq.

℞. *Aqu. Plantag.*

Flor. Til. ana. ℥i℥.

omnium.

Syrup. Pæon. ana. ℥℥.

anod. ʒj.

Confect. Alk. inc. ʒ℥.

Liqu. C. C. succin. vel

Tinct. Castor. cum Spirit. Sal.

arm. par. ʒj.

Ungul. Alc. ppt.

Ocul. ʒ. ppt.

Cinnab. ʒ n. opt. ana. ʒ℥.

Sacch. ros. tab. ʒi℥.

M. ad Vitr. detur per cochlearia frequenter. Absorbentes hinc pulveres quoque per aliquot dies m. ac v. exhibeantur ex Bolo armenate, Terrâ sigillat. Ocul. ʒ. ppt. ʒ n. diaph. Unic. fossil. Corall. rubr. ppt. Ungul. Alc. ppt. similibusque. Vertici capitis, ac naribus inungi possunt Balsama Ruta, Succini, Castor. Naribus quoque vel Ruta recens, vel Liqueores supra dicti spirituosî admoveantur. Præservationis autem ergo Pueris quidem Trochisci hermetici justâ dosi præscribantur subinde; nimirum tres Infanti bimulo, quatuor trimulo. Adultis verò conveniunt Pilulæ purgantes cum Mercurio dulci, quandoque exhibitæ. Tandem post aliquot dies per longum sat tempus Pulveres epileptici suadeantur, m ac v. in vehiculo debito sumendi. Ubi Infantibus quidem Pulvis Marchion. vel similis alius cum Succino, Oculis ʒ. ppt. Corall. alb. ppt. Semin. Pæon. Visco quærno & Sacch. cand. albo in Pulmen-

tis datur. Omnibus verò tam Adultis, quàm Pueris sequentes conducunt.

℞. *Rad. Pæon. mar.*

Semin. Pæon.

Diaph. ʒ vial. ana. ʒ℥.

Cran. human. ppt.

Ungul. Alc. ppt.

Cinnab. nativ. vel antimon.

ana. ʒij.

Corallor. rubr. ppt.

Succin. alb. ppt.

Sanguin. Dracon. ver. ana. ʒi℥.

Essent. Opii Langel. ʒ℥.

Ol. Nucist. express. gr. xij.

Sacch. optim. ʒi℥.

M. F. Pulv. subtil. d. ad scatul. Dosis ʒ℥. ad ʒij.

Vel ℞. *Radic. Valerian.*

Doronic.

Pentaphyll.

Visci corylin. vel querc. aa. ʒ℥.

Bol. armen. ppt.

ʒ n. diaph. vel ejusdem crudi.

Ebor. ppt.

Hepat. Ranar. ppt. vel

Secundin. humanæ ppt. aa. ʒij.

Castorei ppt. ʒj.

Laudan. opiat. gr. xij.

Sacch. optim. ʒij.

M. F. Pulv. subtil. d. ad Scatul. Dosis ut supra.

Noctu cubitum ituri capiant de hoc condito magnitudinem Nucistæ.

℞. *Conserv. Meliss.*

Betonic. ana. ʒvj.

Semperviv. ʒ℥.

Radic. Satyrion. cond. ʒi℥.

Diaph. ʒ vial. ʒij.

Cinnab. ʒ n. opt. ʒj.

Bbb

C. C.

C. C. phil. ppt.

Magister. Lun. ana. ℥ij.

Confect. Alc. compl. 3j.

Syrup. Papav. errat. q. s.

F. Mixtura molliuscula d. ad Ol.

In Cholericis & Hypochondriacis predest usus *Acidularum*, item *Ens ♀ris*, vel *Tinctura ♀ris Lunatica Helvetii*; item *Tinctura ♂tis* cum *Succo Citri* vel *Acetosellæ* parata juxta descriptionem in nostro Theatro Botanico exhibitam. In omnibus conveniunt *Tinctura* $\frac{1}{2}$ *nii*, cum *Essent. Croc. Succin. Castor. Trifol. fibrin. &c.* Subinde in pituitosis subjectis prodesse magis videbis *Spiritum Sanguinis humani*, vel *Secundinæ humanæ*, nec non *Tincturam Castorei* cum *Spiritu Cochleariæ*, *Trifolii fibrini*, vel *Salis armoniaci urinos. paratam*, ad gutt. 12. vel 15. man. ac v. Quibus adde *Lumbricos terrestr. ppt. Ægagropilam ppt. Specificaque alia superius laudata.*

Aliquando Morbi fomes hæret in certâ aliquâ parte corporis extremâ, cui tum *Moxa* vel aliud etiam *Cauterium actuale* ad extirpandas Affectûs radices applicari poterit.

Si à malâ diætâ, à pituitâ tenaci & acri palati, vel cruditatibus ventriculi nidorosis, biliosis, acidis, viscidis &c. morbus originem ducat, tum Æger subinde leni hausto remedio vomat; deinceps roborato iterum per *Tragema stomachicum* Ventriculo. Sequens etiam *Vinum medicatum* purgans usurpetur.

℞. *Radic. Pæon. Valerian. Bryon.*

Aristol. rot. ver. ana. 3ß.

Visc. quern.

Rasur. Lign. Sassafr. ana. 3iß.

Herb. Fumar.

Chamædr.

Flor. Centaur. min.

Paralys. ana. Mj.

Semin. Aquileg.

Fenicul. ana. 3ij.

Fol. Senæ mund.

Epith. ana. 3j.

Agar. trochisc. 3ß.

Cortic. Winteran.

Zingiber.

Salis Rutæ. ana. 3j.

Croci 3j.

Incisa & contusa d. ad sacculum ex Sindone rubr. Affund. Vini alb. veteris, & Aqu. fontan. ana. ℥iiijß. Singulis dein matutinis hauriatur Cyathus unciarum quatuor.

Profunt subinde *Juscula Herbis nasturcinis*, item *Sempervivo*, *Valerianâ*, *Pimpinellâ*, *Majoran. Ocymo*, *Floribus Pæon. & similibus alterata.*

Venæsectiones, Scarificationes, Frictiones in Plethoricis subjectis quandoque institutæ non parum quoque conducunt.

Amuletorum præservativorum loco de collo suspendi solent *Lapis Chelidonium* corio cervino infusus; vel *Chrysolitus*, *Jaspis*, *Smaragdus*, *Corallia*, *Testiculi Vulpis maris fætetes*, *Castoreumque* in *Fæminis hysteri-* *cis*; *Ungula Alcis*; *Succinum* in globulos coactum; *Lapis Ætites*; *Radices Pyrethri*, *Valerianæ*, *Caryophyllatæ*, *Viscus quern. tiliaceus*, aut *corylinus*; *Corium Asini* pro mare, *Asinæ* autem pro fœminâ circa umbilicum ligandû;

Pro

Pro secreto nonnulli habent seqq.
Emplastrum.

R². *Visci quern. vel alius* 3ij.

Succin. alb.

Thuris.

Mastich.

Ladan. ana. 3i℔.

Semin. Pæon. 3℔.

Hyoscyam. ʒij.

Galbani.

Opopanac. ana. ʒj.

Ambr. gryf. ʒ spirit. Rosar. so-

Moschi orient. ʒ lutor. aa. gr. iij.

Olei Nucis mosch. expr. parum.

Misce probè, consperge tantillo
pulvere *Cubebæ*, & postea, si pro-
bè calefactum vel solutum sit, extendatur
super alutam, & semper gestetur in
Nuchâ, singulis triduis renovando.

Si denique corpus *Vermibus* sca-
teat, sæpissimè *anthelmintica* usur-
pentur, quemadmodum sub titulo
de *Lumbricis* demonstratur.

In *Diætâ* nocent *Aër* crassus, nè-
bulosus; *Cibi* duri, dyspepti, auste-
ri, acidi, crudi; *Potûs* acido sul-
phurei; *Crapula* frequens, *Ira*, *Ter-
ror*, *Mœstitia*, *Venus* immodica.
Balnea biliosis contrariantur, sed pi-
tuitosis conducunt. *Venæsectiones*
in *Plethoricis* administrandæ, in aliis
nihil juvant. *Fonticulus* unus & al-
ter incidatur, vel aliter suscitetur in
Brachio aut *Pede*.

Denique addendum, quòd in
duobus subjectis observaverimus *E-
pilepsiam* ablatam, nec amplius postea
reversam, per *Salivationem* cum
Mercurio probè institutam, atque de-
bito cum regimine diætæ absolutam.

EPINYCTIDES, s. PVSTVLÆ
NOCTVRNÆ, die Nachtblattern/
sunt tubercula vesiculosa, nunc sub-
albida, nunc livida aut nigricantia,
cum insigni ardore ac dolore gregatim
noctu inprimis in cute efflorescentia,
fabam amplitudine vix excedentia, è
quibus postea vel sanies cruenta, vel
serum acre limpidius, quandoque
etiam nullus ferè ichor effluit.

*Epiny-
ctides.*

Locus affectus sunt Glandulæ
miliares cutis, à subitò in illis sta-
gnante & tantillum cumulado humo-
re falso-seroso intumefactæ; vel po-
tius Glandularum earundem tubuli
excretorii in extremitatibus suis, qui-
bus cuticulæ adnascuntur, constricti,
ac ab intus latente humore in *Pustu-
las* expansi.

*Pars af-
fecta.*

Modus enim generationis talium
Pustularû melius explicari vix potest,
quàm dicendo, quòd è glandulis cutis
miliaribus in excretorios tubulos hu-
mor extillet falso-acris, plus minus
corrosiv⁹ aut vitriolicus, qui valvulas
in extremitate tubulorum sitas subitò
penè constringat; illis verò sic constri-
ctis, hincque transpiratione, aut
transudatione impeditâ, necessariò
propter continuatam interea ulterio-
rem in Glandulis dictis secretionem
humor inibi stagnare, tubulos ex-
pandere, atque sic in cuticulâ *Pustu-
las* excitare debet. *Pustulæ* verò hæ
gregariæ sunt hinc inde in Cute,
dum plures simul tubuli excretorii
sibi invicem propinqui in suis extre-
mitatib⁹ constrictis intumescunt. *Ab-
bidæ* evadunt, quando salinæ humo-
ris stagnantis particulæ non adeo cor-

Causa.

rosivæ & vitriolicæ existunt, unde & tales simul Pustulæ mitiorem pariunt dolorem. *Livida* autem vel *nigræ* fiunt, ardentemque dolorem producunt, quando stagnantes illæ particulae, magis acres & corrosivæ, simul cum pinguibus vel oleosis plus minus copiose permixtæ, exulcerationem quandam leviculam excitant, & ex erosio tubulis sanguineis particulas quoque cruoris alliciunt. Noctu verò magis quàm interdiu pustulæ erumpunt, quoniam eo tempore glandulæ subcutaneæ minus ab ambiente aëre nonnihil frigido constrictæ, humoris in massâ sanguineâ delitescens moleculas copiosius transmittunt. Antecedens causa talis Affectûs non est nisi quantitas ejusmodi salium acrium, heterogeneorum, in sanguine paulatim ob diætam minus convenientem collectorum, quæ hinc à reliquis sanguineæ massæ moleculis excussæ, quâ commodè aperta portâ erumpunt, ac ubi exhalare nequeunt, in tubulorum extremitatibus, ipsaque adeo cuticulâ obhaerescunt, inque Pustulas, aliave similia Exanthemata mutantur. Dum pro diversitate figuræ, magnitudinis atque mixturæ talium corpusculorum salinorum, nunc hæc nunc alia in cute tubercula enasci ac efflorescere certissimum est.

Diagno-
s.

Quoad *Diagnosin*-, facile hæc cognoscuntur Tubercula, dum in formâ Vesicularum suâ sponte, noctu ut plurimum efflorescunt, & nunc Pustulas repræsentant, quales ab Aquâ fervente excitari solent, nunc verò li-

vidæ, nigricantesque cum majori inflammatione atque dolore evadunt. Fabæ autem magnitudinem gregatim excitatæ hinc inde Vesiculæ exæquant.

In *Prognosi* dicendum, quòd Affectus hic curatu haud difficilis sit, neglectus verò in Scabiem subinde contumacem, aliave Ulcera, eaque interdum serpentina abeat ac mutetur.

In *Curatione* ante omnia purgabitur corpus Remedio catarthico, Mercurium dulcem simul capiente. Deinceps lenes sudores absorbentibus ac diaphoreticis pulveribus excitati conveniunt: quem in finem commendantur $\frac{1}{2}$ n. diaph. Terr. sigillat. Unicorn. fossil. Ocul. $\overline{\text{O}}$. ppt. Ebur. ppt. C. C. phil. ppt. quorum 3ß. cum Aquâ Plantag. Cherefol. Nasturt. & Card. bened. commodè aliquoties propinabitur. Hisce etiam pro lubitu nunc Spiritus theriac. camphoratus, nunc Electuar. Diascord. nunc Roob Sambuc. vel Juniper. nunc Theriaca Androm. ipsa jungi poterunt. Doctæus simul commendat Essent. Fumar. Bellid. min. cum Spiritu Vitrioli Martis. His adde Decoctum Lign. Sassa-phr. Chin. Guajac. Santalin. Scabios. Agrimon. Fumar. Anserin.

Externè Pustulis inungi potest vel solum Unguent. album camphoratum, vel Oleum Juniperi. Admiscere consuevi etiam ipsos subinde Flores Salis armoniac. aut Oleum Tartari per deliqu. Imponi aliàs potest Emplastrum diapalm. vel Album coctum cum Camphorâ. Alii lavant cum Decocto Lignorum & Spirit. Vini camphorat. vel Elixiri

Elixiri Propriet. sin. acid. Aquâ calcis vivæ, ac Decocto Herbarum traumaticarum. Oleum Fri fœtidum insignem quoque vim habet, cum Oleo Nucum permistum, in curandâ hâc affectione.

In *Dietâ* sibi cavendum à potu liquorum spirituosiorum copioso, à victu pleniore, inprimis nimium salitorum, à Laconicis, quæ subinde Affectui ansam præbent.

EPIPHORA seu **LIPPITVDO** est continua eaque involuntaria Lymphæ modò insipidæ, modò acris & salso-acidæ, per tubulos glandularum lachrymalium, aliosque exstillatio, cum rubore, frequenti pruritu & ardore Oculorum conjuncta, atque originem ducens à tubulorum variorum per humores falsos, & acres factâ erosionem, ac dilacerationem.

Afficiuntur heic Palpebræ, & quandoque simul ipsi oculorum bulbi in consensum trahuntur, ac inflammationem quandam patiuntur.

Producitur autem morbus in illis maximè hominibus, qui partim frequenti Ophthalmiâ laborant, partim à malâ diætâ, ac sordido salsoque victu diathesin scorbuticam, falsamque adipiscuntur, unde postmodum lachrymalis Lympha nimis falsa reddita, teneras ophthalmicorum tubulorum fibrillas erodit, exulcerat, sicque fluxum involuntarium atque perpetuum Lachrymarum producit. Fluxus hic pruritum frequentem excitat, si serum depluens acriusculum existit: Inflammationem progignit, si nimis

acre & spissum evasit, atque tubulos sanguineos constringendo sanguinis stagnationem instituat. Aliàs verò minus incommodi aut doloris parit, sicubi insipidum magis dulce serum extiterit. Rubent simul oculi, quando falsus humor præterluens continuè ferè extimam cuticulam erodit, & excoriat; unde non potest non textura vasculosa & fibrosa cutis, plena sanguinearum guttularum, rubicundo colore apparere.

Facile cognoscitur hic Affectus ^{Diagnos.} ex iis, quæ in ipsâ definitione exstant. Sæpè Ægilopem, aut Fistulam lacrymalem, etiam probè curatam, subsequitur: subinde & Rhyadi vel Encanthidi sociatur. Lacrymæ profluunt nunc ardentes & acres, sicque non rarò Inflammationem sive Ophthalmiam post se trahunt. Sæpius quoque citra dolorem & inflammationem fluxus iste continuat. Malum alias Senibus familiare, qui vel scorbutici, vel scabiosi plurimum in Aëre hyberno frigidoque versari fuerunt, ac victûs rationem falsam quotidie observare necesse habuerunt. Leprosis etiam sæpius obtingit. Extremitates palpebrarum plerumque valdè rubent, nonnunquam simul invertuntur.

Quoad *Prognosin*, Lippitudinem ^{Prognosis} statim in principio sanare quidem licet, postea verò, cum radices jam egit, ac inveterata est, difficillimè sanabis, dum extrema tubulorum oscula hoc tempore, quo ipsorum fibrillæ circulares prorsus discissæ & erosæ

erosæ existunt, sanari & cicatrice obduci amplius nequeunt.

Curatio.

Curatio inchoanda est per ea, quæ serum sanguinis imminuere valent, prout sunt *purgantia Mercurio dulci sociata*. Continuanda dein per alia, quæ acrimoniam feri probè emendant, quemadmodum inter alia sunt *Decocta Lignorum cum Semine Fœniculi in Aquâ factâ*, nec non *Pulveres absorbentes ex Antimonio diaph. Ocul. ʒ. ppt. C. C. usto, Matr. Perl. ppt. Unicorn. fossil. Succin. alb. ppt. Bezoard. miner. Bol. armen. &c. parati*.

Externè *Cucurbitulæ cum scarificatione* scapulis & brachiis applicentur: quibus succedent *vesicatoria nuchæ applic. Fonticuli brachiis apposti, vel Setaceum in cervice excitatū*. Capilli capitis abradantur. Internè quoque adhuc *Tragema ophthalmicum* partim ex superioribus *absorbentibus pulveribus*, partim ex *Seminibus carminativ. Nuce moschat. Mac. Santal. rubr. &c. cum Sacch. cand. alb. concinnetur*, & diligenter usurpetur. Ipsius oculis *Collyria* possunt calidè applicari, ex *Aqu. Brunell. Flor. Ligust. Levistic. Plantag. Burs. pastor. &c. facta*, quibus etiam permisceantur *Trochisc. alb. Rhasis f. Opio, Coral. lia rubr. vel alb. ppt. Mater Perlar. ppt. Magist. Zinci, Tut. ppt.* Quòd si verò pulverem *Nucum Cupress. Aloës, Thuris, Mastichis, Myrrhæ, Sarcocollæ nutritæ, Sanguinis Draconis, Seminis Sumach. & similia*. Aquis destillatis misceas, tum & hoc licebit Collyrium oculo clauso applicare, sed cavendo, ne quid in bulbum Oculi decidat.

EPVLIS, ex ἐπι & ὄυλον, *Gingiva* compositâ voce, est caruncula molli, rubicunda, in Gingivis ab admissio copiosiore succo nutritio enata, plerunque indolens, & ex radice dentis alicujus, præcipuè molaris, interdum ad avellanæ nucis magnitudinem excrescens, tenuique pediculo dependens. Quando autem carnea *Gingivarum* substantia majore sui spatio ac circumferentiâ augetur, ut dentes inde molares magnâ ex parte obtegantur, tum *Dentium superincarnationem* vocavit *Platerus*, alii verò *Gingivarum excrecentiam* nuncupârunt.

Distinguitur hinc à *Parulide*, quòd hæc sit tuberculum inflammatorium, ardente & pulsatorio dolore molestum, *Epulis* autem inflammatoriâ intumescentiâ ac ardore careat. Singulorum verò talium morborum subiectum *Gingiva* est, pars illa solida, rubicunda, carnea, maxillas extremas, & ex parte Dentes, quibus affigitur, obtegens.

Producitur hinc *Excrecentia* quidem à laxitate nimia & præternaturali fibrarum & tubulorum *Gingivas* componentium, unde succus sanguineo-ferosus majori quantitate admissus, *Gingivarum* texturam emollit, spongiosam reddit, facileque, levi etiam digitorum attactu, cruentat. Laxitatem ipsis *Gingivis* nimiam conciliare solet intemperies sanguinis seroso-falso-scorbutica, venerea ac leprosa, undecunque demum contracta. *Epulis* verò è tenui ut plurimum corrosæ in *Parulide*

lide

lide Gingivæ radice, ab affluentibus, admissisque paulatim & coagulatis copiosioribus succi nutritii particulis, enascitur. Unde Parulidis ferè solet esse pedissequa, usque adeo ut *Dolæus* & quidam alii *Epulidem* à *Parulide* haud distinguant, sed unum eundemque Affectum esse sibi perperam imaginentur.

Cognoscitur faciliè excrescentia carnosa ex eo, quando caro majorem Gingivarum partem occupat luxurians, ac dentes plerunque molares obtegens; quando itidem ipsa digitis leviter pressa faciliè sanguinem fundit, ac simul tamen indolens existit. Præcedit dein aut comitatur hoc malum œcochymia falso-scorbutica, venerea, aut leprosa. *Epulis* verò est caruncula tantum, è tenui radice pendens, rubicunda, mollis, indolens, in viciniâ Dentis alicujus præcipuè molaris enascens.

In *Prognosi* sciendum, Excrescentiam post se Dentium vacillationem atque casum, nisi studiosè præcaveamus, trahere posse; *Epulidem* verò haud difficulter extirpari vel auferri solere, sed sæpè tamen recurrere, usque dum radix ejus penitus destructa fuerit.

In *Curatione* Excrescentiæ vitio ac præternatur. Sanguinis intemperies corrigenda venit *internis* maxime remediis, Scorbutum, venereum Luem, aut Lepram destruendis, sicuti suis indigitavimus locis. *Externè* verò Gingivæ extergendæ maximum, deinceps verò consolidan-

dæ vel firmandæ sunt *Decocto Radicum Aristoloch. long. Angelic. Caryophyllat. Cichor. Calam. arom. Gentian. major. Herbar. Rutæ, Alliariæ, Verbenæ, Salviæ, Myrti, Cardui bened. Succisæ, Brunell. Plantag. Virgæ aureæ, Scordii, Meliss. Cochlear. Trifol. fibrin. Absynth. Abroton. Centaur. minor. Pimpinell. Ulmar. Eupator. Geran. robert. Florum Balaust. Malvæ hortens. Ligustri, Seminum Cochlear. Nasturt. Myrrh. Mastich. Quæ in Vino rubro coqui, atque post colaturam cum Melle adhuc rosaceo, Essentiâ Myrrh. & Aloës, Pulvereque Rubricæ fabrilis permisceri possunt. Sunt qui Spiritum Cochlear. Sal prunellæ, vel Alumen decocto permiscent, atque Gingivas hinc bis vel ter quotidie calidè affricant, sanguinem vel serum copiosius exprimunt, ac denique Melle rosaceo vel rutaceo, cui immista sunt Pulvis Rubricæ fabrilis, Myrrhæ, Mastichis, Tinctura Laccæ flor. Spiritus Cochlear. Essent. Catechu, diligenter inungunt; sicque continuant, donec Gingivæ suæ integritati sint restitutæ.*

Epulis si tenuem habuerit radicem, filo sericeo cerâ obducto, constringitur, & hinc vel sponte decidere permittitur, vel forcice rescinditur, ac radix postea vel Spiritu Vitrioli aut Sulphuris, vel Butyro Antimon. semel aut bis tangitur, osque statim Aquâ tepidâ Plantaginis, Bursæ pastoris, Scabios. Card. Mar. Flor. Ligustr. Brunell. aut Succis. eluitur. Tandem verò Decocto Gallar. Nucum cupress. Flor. Balaust. Folior. Myrt. ac Salviæ,

Salvia, cum *Vino* facto pars sæpius eluitur. Intus interea corpus *Vino* medicato alterante & purgante evacuabitur, atque *Cucurbitulæ* cum scarificatione dorso applicabuntur, & sic regeneratio *Epulidis* præcavebitur.

Erysipelas.

ERYSIPELAS, IGNIS SACER aut **PERSICVS** est insignis rubor cutis, cum maximo ardore, & aliquali tensivo tumore, subinde etiam pustulis ac maculis latis atque dispersis, partem aliquam occupans, & ephemeræ Febri plerunque succedens. Nomen obtinuit *παρὰ τὸ ἐρῦεσθαι τὸ αἷμα ἐπὶ τὸ πέλας*, ab attrahendo sanguine in vicinum, unde etiam *Vicinitraba* & *Vicinirubia* à quibusdam vocatur.

Pars afflicta.

Afficitur in hoc morbo nunc hujus, nunc alterius pedis vel brachii cutis: imò & facies quandoque eodem malo affligitur.

Causa.

Causa verò proxima mali est feri admodum acris, & falso-acidi sulphurei subitanea velut in tubulis cutaneis stagnatio, quodocunque heterogeneæ tales particulae, post excitatam prius in massâ sanguineâ turbam, sub circulationis actu tandem in extremitatibus vasculorum cutaneorum (ubi nimirum pori minus patuli existunt, quàm ut transire queant) obhærent, & obhærescendo propter subsequentes plures alias moleculas cumulantur, quæ deinceps in pluribus simul tubulis stagnantes distensionem, simulque vasculorum sanguineorum pressionem insti-

tuunt, à quâ postea levis tumor ac rubor inflammatorius exoritur. Cum verò ipsæ stagnantes particulae in velocissimo motu intestini globulos humorum ad se invicem continuè allidente atque affricante existunt, tum in parte affectâ similis ardor instar ignis urentis producitur. Si Pustulae apparent, signum est lymphaticas in extremitatibus tubulorum cutis excretoriorum particulas subsistere, ac epidermidem in Vesicularum formam elevare. Salientia verò illa obstructiones tubulorum parientia determinatæ cujusdam figuræ atque texturæ existere debent, aliàs non hunc sed alium fortè morbum producent. Adscribunt hodie communiter illis salibus figuram oblongam, acutam, dicuntque esse naturæ acidæ; sed talia tamen esse videntur acida, quæ cum particulis pluribus salino-alcalibus, non secus atque aquosis & sulphureis sociata tale concretum reddunt, quod ratione aculeorum vel spiculorum in suis particulis longiorum minus aptum existit, ut per omnes cutis tubulos transeat.

Tumor affectæ partis non tantum evadit, quàm in Inflammatione, quoniam in Erysipelate tubuli solum minores affliguntur, ac materia stagnans non adeo copiosè adfertur, dum plurimæ circulantis sanguinis particulae facilem in cursu suo transitum per laterales tubulos inveniunt, retro manentibus tantum particulis falsis, & admodum irregulari figurâ præditis, quarum spicula proin subinde

nde in fibrillas tubulorum laterales
ta fortiter adiguntur, ut easdem dis-
cindendo vel rumpendo exulceratio-
nem producant. Deinceps verò ad
hunc Affectum contribuunt difficilis
menstruorum aut hæmorrhoidum
fluxus; subitanea corporis æstuan-
tis in frigidum aërem expositio; æ-
ther peregrinus derepente sive per
poros cutaneos, sive per poros pneu-
monicos sanguinis massam subiens,
ejus crasin naturalem turbans, ac Fe-
brim plus minus ephemeram produ-
cens; victus crassus, ciborum inpri-
mis salso-crudorum; contusio, vul-
nera, calor ignis, terror, ira, &c.
à quibus singulis causis Lympha pe-
culiari modo figurata, in tubulis cu-
taneis detineri, ac velut incarcerari
potest.

Erysipelas plerunque incipit cum
horripilatione febrili, oriundâ à par-
ticulis acido - alcalinis rigidis, fibras
panniculi carnosii irritantibus. Jun-
gitur sæpè statim, vel sequitur cepha-
lalgia, febrilis ardor, sitis, anorexia;
brevi dein vel brachium, vel pes alte-
ruter per totum ferè sui tractum in-
ter articulos splendente rubore suf-
funditur, citra magnum tumorem,
sed cum tensivo, plus minus ardente,
pungente ac pruriente dolore; hinc
ab Inflammatione distinguitur, in quâ
& tumor major, & rubedo satura-
tior, & dolor magis pulsatorius exi-
stet. Quando locus erysipelatosus
simul plurimis pustulis aquosis con-
spergitur, Erysipelas *pustulosum* vo-
catur. Reperitur etiam Erysipelas
velaticum, quod citò priorem dese-

rit locum, & subitò aliâ in parte no-
viter exurgit. Sed tum sæpè non
adeo magnum & amplum est, thale-
rique imperialis magnitudinem haud
multum superat.

Quoad *Prognosin*, Erysipelas per *Prognosis.*
se & communiter lethale non est;
perversâ tamen repellentium imposi-
tione tale reddi, atque Gangrænam,
Sphacelumque post se trahere potest.
Interdum rebelle, ac pertinax evadit,
quando turbatio sanguinis major,
ejusque textura acrior existit. Sunt,
qui ob peculiarem massæ humoralis
dispositionem frequenter etiam huic
Affectui obnoxii redduntur, adeoque
recidivas & plures & faciles patiun-
tur. Aliquando in Ulcus, ac Fistu-
lam quoque mutatur. Difficilius
curatur, si ossium denudationi; pe-
riculosius, si Vulneribus supervenit,
si suppuratur, si in Capite, Hepate,
Utero, aliisque partibus internis ob-
oritur. Quoad modum eventûs,
dicimus, ad salutem plerunque fieri,
idque per insensilem transpiratio-
nem; ubi tamen superveniente ali-
quali pruritu, cuticula exesa in squa-
mas fatiscit, succrescente, cum na-
turali colore, novâ Epidermide. Non
rarò etiam transpiratione mordicus
præpeditâ materia per metastasin ad
interiora pellitur, funestasque in par-
tibus internis Inflammationes parit.

In *Curatione* indicatio potissima *Curatio.*
est, ut constrictio & infarctus tubu-
lorum cutaneorum per diaphoresin
laxetur ac discutiatur, sanguinisque
acrimonia subtilis simul invertatur,
vel edulcoretur. In principio igitur

statim *Venæ sectio* administretur, deinceps vel *Clysmate emolliente*, vel exhibitione *Syrupi Rosar. solut. simplic.* Intestina eluantur leniter, ac porro semper usui *remediorum diaphoreticorum* insistatur, *fixorum* magis quam *volatilium*; quibus *aciduli* quoque *Julepi* non raro intercalentur; quem in finem commendamus *Terram Lemniam* vel *sigillatam*, *C. C. ust. ppt.* *Unicornu fossil.* $\frac{1}{2}$ n. *diaphoret.* *Bezoard. mineral.* *Roob Sambuc.* vel *Juniper.* *Diascord.* *Fracast.* *Theriac.* *Andromach.* *Mithridat.* *Damocr.* *Cinnab. nativ.* vel $\frac{1}{2}$ n. *optim.* Pro vehiculo usurpentur *Aquæ destill.* *Scabios.* *Plantag.* *Succis.* *Ulmar.* *Card. bened.* *Fumar.* *Syrup. Rub. id.* è *Succ. Limon.* *Citr. Ribium*, &c. Si tamen diaphoresis difficilior evadat, etiam *volatilia alcalia* intermiscere necesse est, qualia sunt v. g. *Spirit. Salis armon. urinos.* *C. C. purific.* *Spiritus Flor.* aut *baccar. Sambuc. camphoratus* ad plures guttas. *Mixtura* quoque *simplex* ad \mathfrak{dij} . vel \mathfrak{zj} . pro dosi cum vehiculo semel vel bis exhibita diaphoresin felicissimè promovet, *materiæq;* *morbificæ regressum* in corpus fortiter impedit. Si formulas desideres, en varias: v. gr.

\mathfrak{Rj} . *Aqu. Flor. Sambuc.*

Card. bened. ana. \mathfrak{ziss} .

Diascord. Frac. vel

Mithrid. Damocr. \mathfrak{dij} .

$\frac{1}{2}$ n. *diaph. \mathfrak{dij} .*

Misc. d. ad Vitrum. Sumatur pro dosi aliquoties repetendâ.

Vel \mathfrak{Rj} . Aqu. Succis.

Calendul. ana. \mathfrak{zij} .

Syrup. Acetosell. \mathfrak{zvj} .

Roob Sambuc. \mathfrak{zj} .

Bezoard. min.

C. C. phil. ppt. ana. \mathfrak{dij} .

M. d. ad Vitrum. Sumatur duabus dosibus man. ac vesp. & repetatur pro renatâ.

Vel \mathfrak{Rj} . Aqu. Scabios. \mathfrak{zij} .

Endiv.

Lactuc. ana. \mathfrak{zj} .

Syrup. Rub. id.

Viol. purp. ana. \mathfrak{zss} .

Spir. Theriac. camphor.

Ebor. ust. ppt.

Dent. apr. ppt. ana. \mathfrak{dij} .

M. d. ad Vitrum. Propinetur duabus dosibus, & repetatur etiam urgente necessitate.

Vel \mathfrak{Rj} . Aqu. Ulmar. \mathfrak{zvj} .

Cichor.

Fumar.

Syrup. de Nymph. ana. \mathfrak{zss} .

Mixtur. simpl. \mathfrak{zss} .

Ocul. \mathfrak{ss} . ppt. \mathfrak{dij} .

Cinnab. $\frac{1}{2}$ n. opt. gr. \mathfrak{vj} .

Misc. d. ad Vitrum pro dosi.

Vel \mathfrak{Rj} . C. C. phil. ppt.

Ebor. phil. calcinat.

$\frac{1}{2}$ n. *diaph.*

Cinnab. $\frac{1}{2}$ n. corr.

Nitr. $\frac{1}{2}$ iat. ana. \mathfrak{dss} .

Camphor. gr. \mathfrak{iiij} .

M. f. Pulv. subt. div. in 2. part. æqu. m. ac vesp. cum Aquâ Scabios. aliave capiendas.

Vel \mathfrak{Rj} . Bezoard. min.

Pulv. Pannon. rubr. ana. \mathfrak{dij} .

Crystall. alb. ppt. \mathfrak{dij} .

M. f. Pulv. subt. div. in 4. dos. æqu. ad ch. m. ac vesp. sumendas.

Externe

Externe in membris hoc morbo affectis prodest frequens *litus* aut *fomentatio* cum *Spiritu Vini camphorato*, *Aquæ Fl. Sambuc.* aut *Solani*, *Card. bened. Ulmar.* &c. permixto, ac *Sacch.* insuper *Saturni* nonnihil acuat, v. g.

℞. *Aqu. Sperm. Ran.* ℥iij.

Solan.

Fl. Sambuc. ana. ℥ij.

Spir. Vin. campb. ℥iβ.

Magist. Saturni 3vj.

Acet. sambucin. ℥j.

M. d. ad Vitr. Subinde calefiat, linteaque tenera immersa, & expressa admoveantur.

Vel imponatur *Ceratum simplex* ex *Cerâ flavâ* & *Oleo rosaceo* æquali portione invicem solutis, hinc *Camphoræ* quantitate tantillâ permixtâ, factum ac linteo raro obductum. Nonnulli etiam sumunt *Croci* ℥ij. *Camphor.* ℥j. ac *dimidiæ mensuræ Aqu. flor. Sambuci* infundunt, hinc per triduum in loco tepido digerunt, tandem lintea huic liquori immergunt, eaque postea in aëre sicco arefacta denuo eidem liquori intingunt, opusque hoc ter vel quater reiterant; tandem verò *siccatum Linteum Erysipelati* imponunt. Interdum præstat *Cortex Sambuci medianus recens contusus ac succulentus*, sæpius parti affectæ tepidè applicatus. Vel etiam *Farina siccata*, cum *pulvere Cretæ albæ*, *Terræ sigillatæ*, *Boli armenatis* permista, si præprimis simul *Camphorâ Spiritu Vini solutâ*, vel cum *Nucleis Persicorum*, semineve *Cucumerum* contusâ, exaltata fuit, linteo vel papyro cœruleæ inspergitur, sicque membro af-

fecto circumplicatur. Aliquando etiam *liquida*, *alcalino-spirituosa* profunt, velut habemus *Aqu. Calc. vivæ Aquâ phagedænicâ acuatam*; *Spiritum Vini camphoratum*, *Rorem mineralem*, aliaque plura. Omnia verò hæc usurpantur feliciter, si Erysipelas non fuerit *pustulosum* vel *ulcerosum*, in hoc enim casu remediis hætenus recensitis magis siccantia & absorbentia sociare convenit. Vel etiam *Linimentum saturninum* quàm excellentissimum in usum vocabitur, compositum ex *Aceto saturnino*, vel cum *Cremore Lactis*, vel cum *Balsamo quodam vulnerario* in *Linimentum* coacto.

℞. *Aceti saturnini*,

Balsam. vulner. ana. ℥ij.

M. d. ad Pyxid.

Si excoriata sit pars, huic Linimento admisceri poterit *Unguentum album camphoratum*, vel etiam hoc solum in usum trahetur.

In *Diætâ*, quæ sunt nimis salita & acria, vitentur; cibi sint succi laudabilis; *Vino* interdicator, cujus loco bibatur *decoctum Lign. Sassafr.* vel *Radic. Chin. Ras. C. C. Rad. Gramin. Herb. Agrimon.* Nonnunquam & *Emulsiones anodynæ ac demulcentes* propinentur. Aër frigidus summè noxius. Lintea quibus incumbit Æger suffamigiis inficiantur. Nec idem mutabit aërem, donec perfectè à malo fuerit liberatus. *Iram*, ac *Tristitiam* fugiat. *Alvus naturâ* vel arte sit libera.

Efferæ.

ESSERÆ, voce Arabicâ, sunt exanthemata sive tubercula parva diversæ magnitudinis, duriuscula, cineritii rubellive coloris, pruritu insigni molesta, interdum magis quam noctu in cute diversarum partium, brachiorum imprimis, natium ac femorum efflorescentia, hinc citò evanescencia, sed brevi iterum apparentia; quandoque totum subitò corpus occupantia, sicca plerunque, aut rarò certè tantillum humoris falsi eructantia; quæ proin si fortius premas aut digito frices, subsident atque penitus disparent.

Causa.

Productum hinc sunt phlegmatis cujusdam falsi, quod ob irregularem corpusculorum suorum figuram, penuriamque aquosarum diluentium particularum, occasione quavis commodiore datâ in extremitatibus tubulorum cutaneorum subitò obhæret, ac epidermidem in tubercula attollit. Sicca sunt atque duriuscula hæc exanthemata, quoniam aquosæ particulæ, tanquam flexibiliores, per tubulos facilè penetrant, aurasque in liberas evadunt, crassiores autem, & magis tartareæ ac fœculentæ in ostiis tubulorum remanent, aut sicubi ostiola illa jam evaserunt, nihilominus subter cuticulam, densioribus poris instructam, subsistunt eamque hinc inde gregatim elevant. Salia ejusmodi heterogenea in circulantibus corporis humoribus congregantur è primis viis, unde chylus simili characterē infectus, ceu Ciborum falsorum assumptorum productum, per thoracicum canalem advehitur.

Citò evanescunt ac redeunt ista Tubercula, quoniam materia producens volatilitate adhuc quadam & flexibilitate gaudet, ac ita laxatis quomodocunque vasculorum fibris promptè transmittitur, dum interea constrictis denuo poris noviter iterum efflorescunt. Pruritus excitant, quoniam acuminatæ sunt materiæ stagnantis particulæ, & circumstantes quascunque fibrillas nerveas blandè irritant, pungunt ac vellicant. In Febreos ephemeræ aut Synochi æstu interdum criticè tales è sanguine ad cutem præcipitantur moleculæ.

Facilè hunc Affectum ex dictis in definitione cognoscere datur: sed periculo illum vacare simul extra controversiam est; saltem per se nihil monstri alit. Pro variâ interim stagnantis humoris falsedine, acrimoniâ, & crassitie Tubercula brevius aut diutius durant, simulque gravius aut mitius pungunt. Affligunt etiam tam Adultos, quàm Pueros.

In Curatione, cum nulla plerunque Febris adsit, purgans statim adulto Homini sequens dabitur:

℞. Radic. Jalapp. gr. 25.

Crem. Fri.

Cinn. ʒ n. optim. corr. aa. gr. 5.

Diagryd. gr. 1. vel 2.

M. F. Pulv. subt. d. ad ch. pro dosi matutinâ, si opus, repetendâ.

Vel ℞. Spirit. Anth. ʒij.

Ceras. nigr. 3℔.

Resinæ Scammon. vel Jalapp. gr. 8. vel 9.

Solutis leni igne adde

Julepi rosacei vel

Syrup.

Syrup. de Nymph. ʒiʒ.

Detur ad Vitr. pro dosi matutinâ.

Purgato corpore Æger Balneo Aquæ dulcis ex decoctione Malvæ, Violariæ, Parietar. Lactuc. Flor. Sambuc. Chamomill. Melilot. aliquoties per sesqui horæ spatium tepidè insideat. Postmodum sudor moveatur & excitetur etiam repetitâ vice, idque per exhibitionem sudoriferi unius vel alterius; v. gr.

Rx. Aqu. Fl. Sambuc.

Card. Mar. ana. ʒiʒ.

Roob Sambuc. ʒij.

ʒn. diaph. ʒj.

Misc. d. ad Vitr. pro dosi.

Vel Rx. Aqu. Agrimon. ʒiʒ.

Fumar.

Cichor. ana. ʒvj.

Roob Juniper. vel

Mithrid. Damocr. ʒʒ.

Ebor. phil. ppt.

Ocul. ʒ. ppt. ana. gr. 15.

M. detur ad Vitr. pro dosi mane aut vesperi sumendâ.

Vel Rx. C. C. philos. calcin.

Corall. rubr. ppt. ana. ʒij.

ʒn. diaph.

Diaphoret. ʒvial. ana. ʒʒ.

Nitri ʒiat.

Cinnab. nativ. opt. ana. ʒj.

M. f. Pulv. subt. divid. in 6. dos. æqu. ad ch. mane ac vesperi cum Aquâ Card. bened. & Plantag. capiendas.

Extus Farina qualiscunque probè ficcata, cum Bolo, Cretâ, & Pulvere Liquiritiæ permixta aliquandiu applicatur. Venæsectio quoque in Plethoricis administratur, aut Cneurbi-

tulæ cum scarif. dorso applicantur. A falsis Cibis abstinetur.

EXCRESCENTIA CARNEA,
vid. Carnea excrescentia.

F.

FACIEI CICATRICES, sunt ^{Faciei cicatrices.} tubercula duriuscula, ex Ulceribus aut Vulneribus negligenter tractatis, & malè consolidatis nata, Faciemque defædantia, dum superficiem ipsius, quæ plana & unita esse deberet, inæqualem ac veluti divisam reddunt. Faciem heic in specie affectam adducimus, ceu partem illam capitis anteriorem, in Infantibus, Pueris, Fœminisque, si supercilia excipias, nudam, in Adultis autem Viris ex parte inferiore circa mentum, labia, & genas pilosam, fronte, temporibus, oculis, naso, genis, ore s. labiis, mento & auribus circumscriptam; quæ velut speculum aut imago aliàs esse solet non solum sexûs, ætatis, aut prosapiæ, sed & morum quoque, passionum mentis, valetudinis prosperæ & adversæ, vitæ ac mortis. In facie enim præstantes Physiognomi manifesta deprehendunt indicia humanitatis, urbanitatis, morositatis, superbix ac humilitatis, tristitiæ ac hilaritatis, iracundiæ, severitatis, superbix, humilitatis, verecundiæ &c. In facie Medici certa sanitatis vel ægritudinis; imò subinde salutis ac mortis ~~rexpñcia~~ inveniunt; unde Hippocrates jam suo tempore Medicos fuit hortatus ad Ægrotorum

faciem

faciem non obiter tantum contem-
plandam, sed penitus etiam confi-
derandam.

Causa

Cum autem Cicatrix qualiscun-
que è coalescentiâ labiorum Vulneris
vel Ulceris alicujus formetur, con-
sequens est, deformem illam gigni de-
bere, sicubi spatium majus relinqui-
quitur Parti affectæ, hæcque laxius
deligetur; propter hanc enim laxi-
tudinem plus humoris nutritii ad-
mittitur, ex eoque callus eminentior
producitur; qui certè, si jam durior
& inveteratus evasit, sanari neuti-
quam poterit, sicuti nec ille, qui è
Vulnere grandiore natus fuit, quâ
portio magna faciei oblæsa erat.

Curatio.

In Curatione proin eo adniten-
dum, ut callosa cutis durities emol-
liatur, emollitaque dein cuti reliquæ
in colore & superficiei planitie similis
evadat. Obtineri hoc potest non
solum illis medicamentis, quæ supra
sub titulo Cicatricum in genere attu-
limus, sed & pluribus aliis, quem-
admodum v. gr. sunt sequentia:

Rx. Aquæ destill. Radic. Sigill. Salom.
Bryon.

Cucum. asin.

Flor. Fabar.

Lamii purpur.
ana. ʒij.

Succi Limon. vel Citr. rec expr.
ʒj.

Mucilag. Gumm. Tragac. Aquâ
Nasturt. extr. ʒij.

M. d. ad Vitr. Quotidie man. ac
vesp. cum linteolis calidè applicetur, &
firmiter ligetur.

Vel Rx. Aqu. dest. Rad. Ireos nostr.

Serpentar.

Cyclamin.

Aron.

Lapatbi acut.

ana. ʒib.

Borac. Venet.

Mercur. dulc. opt. ana. ʒj.

Succi è Rutâ & Feniculo rec. ex-
press. ac filtrat. ʒij.

M. d. ad Vitr. Usurpetur ut supra.

Vel Succus ex hætenus dictis,
nec non Radic. Lilior. alb. Bryon. Fo-
liis Sabin. Aristol. rot. Geran. rob. Solan.
Nicotian. recenter exprimatur, filtre-
tur, & calidè sæpius Cicatrici applice-
tur, cum vel sine Melle. Alii Oleum è
Nucleis Amygd. amarar. Pers. Vitellis
ovorum, Semine Napi &c. exprimunt,
hunc Camphoræ Oleo, Pinguedini hu-
manæ, ursinæ, vulpinæ, Boraci Ve-
net. Mercurio dulci, Myrrhæ & Aloë
permiscent, atque ita applicant.

FACIEI EPHELIDES, vid.
Ephelides.

FACIEI FOVEÆ post Variolas,
sunt vestigia quædam Ulcusculorum
variolosorum, quorum acre pus cutis
superficiem plus justo erodit, ac ita
foveolas excitavit; quanquam & ta-
lia exigua foramina producantur,
quando Variolæ pruritu valdè mole-
stæ, nimis citò ab Infantibus & Pue-
ris scalpando avelluntur, ita quidem
ut non rarò cutis extrema simul au-
feratur, sanguisque hinc è ruptis vas-
culis sanguiferis profluat.

Foveas ejusmodi, si profundæ
admo-

admodum sint, frustra quis curare & emendare tentabit, quoniam insanabiles sunt prorsus. Præservare autem ab illis Pueros poterimus, si Variolas maturas, albas & tumidas, cum defervescere incipiunt, aperiamus, materiamque purulentam emittamus, sed sine Epidermidis de tractione: si dein etiam impedimus, quò minus Ægri scalpant pustulosam & prurientem cutim: si denique remediis, quantum possibile, topicis demulcentibus atque temperantibus Variolarum acrimoniam mitigare studebimus, quod fieri solet *Lactis muliebris* inspersione in faciem Ægrotantis crebrâ; *Cremore* item *Lactis vaccini* cum *Croco*, *Oleo Lil. albor. Rosar. Violar. Butyro* recenti non salito, *spongiae* tandem *Aquâ calenti madidæ* applicatione, præprimis, quando *Herbas Althææ, Malvæ, Violar. Parietar. Radices Alth. Lil. albor. Semin. Lini, Cannab. Flores Melilot. Verbasc. Sambuc.* prius incoxeris.

FACIEI LENTIGINES, vid. *Lentigo*.

FACIEI MACVLÆ ad symptomata qualitatibus in cute mutata referuntur, quando videlicet color illius naturalis aufertur, ac vel rubicundus, vel flavescens, vel nigricans sparsim in Facie excitatur.

Præter Lentigines enim observantur interdum maculae nunc majores, nunc minores, diversi coloris, in Faciei cute plus minus citò efflorescere. Ut plurimum Variolæ maculas post se

rubentes, rarius fuscas relinquunt, à ^{post variolas,} mutata cutis sparsim erosæ texturâ oriundas, dum radii luminosi ex illâ nostros ad oculos reflexi, macularum rubicundarum ideam sive imaginem excitant. *Rubent* hæ maculae, quoniam superficies cutis, ipsaque cuticula post erosionem à Variolis factam ita tenuis evasit, ut hinc sanguis per extremos tubulos circulans transpareat. *Flavescentes* dein etiam, & latae quidem interdum occurrunt in Fœminis cholericis, quarum sanguis circulans plures moleculas resinoso-amaricantes ad Faciei cutim præcipitavit, aut post copiosos sudores, præprimis in partu difficili excitatos, inibi reliquit. Hæ maculae foedæ sunt, quandoque asperæ, ac sub sordium imagine sæpius comparent. Aliquando *flavus* quoque *Icterus* tales post se maculas in Facie relinquit, sicut *niger Icterus lividas* interdum format, ob nutritii succi acido-tartareas particulas sparsim ad faciei cutim depositas & coagulatas. Ex *scorbuticâ* dein etiam atque *venereâ* circulantium humorum cacoehymia non rarò vel *rubicundæ*, vel *lividæ*, aut *fusci coloris maculae* in Facie, sicut per totum corpus hinc inde oriuntur. Tandem & insolatio, sive radii solares, quibus sese Homo, verno in primis tempore, quo cutis faciei nondum mollis fatis ex rigiditate aëris hyberni evasit, multum exponit, nigricantes maculas in facie producere consueverunt.

Per se ad oculos patent ejusmodi maculae, ita interdum in cute pertinentes, ^{Curatio,}

naces, ut, si corrosionem excipias, aliâ vix arte discutere queas. Omnium autem maximè dissipabiles sunt, imò temporis aliquo spatio per se disparent, quæ post Variolas remanserunt. Si verò citiùs eas discutere velis, obtinere scopum poteris, Faciem hominis sæpius calidè lavando cum Jusculo vitulinæ carnis non salito, imprimis si *Aquæ destill. Flor. Nymph. Fabar. Papav. alb. Verbasc. Linariæ, Levistici, Radicum Lapathi, Urticæ, Scrophular. Polygonati, cum Farinâ Lupinorum, Fabarum, aut radic. Althææ* permiscueris. Optimè conduxisse sæpius ipsemet notavi Vaporem è Decocto Pisorum, Lupinorum, Cicerum, Hordei, Furfuris, Granor. Coffeæ tostorum, Radic. Scorzonæ. Alth. Malv. ascendentem, & ad Faciem sæpè admissum. Possunt tamen etiam Lintea ejusmodi Decoctis calentibus immergi, & expressa dein applicari sæpius. Decocto addere licebit Succum Limonum, Citri, Aurantior. nec non Camphoram, Boracem. Si Unguenta vel Balsama magis desiderentur, tum sequentia profunt:

℞. Ungu. alb. camphor. ʒj.

Olei ex Seminib. Cucurbit. aut Cucum. recenter frigide expressi ʒß.

Ceræ flav. aut alb.. ʒij.

Magist. $\frac{1}{2}$ n. diaph. ʒj.

Misc. d. ad ollam, ac singulis noctibus facies inungatur; mane Aquâ Rosarum iterum abluendo.

Vel ℞. Unguent. Citrei.

Pomat. ana. ʒß.

Olei Lil. alb.

Rosar. ana. ʒij.

Mucilag. Gumm. Tragac. Aqu.

Ros. vel Flor. Fabar. extract. ʒj.

Magist. Marcasit. ʒiß.

M. d. ad Pyxid. Usurpetur ut prius.

Maculæ flavæ, lividæ, fuscae, quæque ex insolatione proveniunt, sensim internis quidem diaphoreticis, ac succum chylosum irreprehensibilem exhibentibus cibis potibusque, usu quin & Acidularum vel Thermarum quarundam disparent; externis verò detergentibus atque discutientibus abiguntur, qualia sunt imprimis Succo, aut Decocta Radicum Asphodeti, Aronis, Aristoloch. Cepar. Scyll. Lilior. albor. Bryon. Cucum. asinin. Cyclamin. Allior. Hellebori utriusque, Enula, Dracontii, Saponar. Polygonat. Irid. nostr. Herbar. aut Folior. Verbasc. Senecionis, Boni Henrici, Porri, Althææ, Tragop. Agrimon. Absynth. Abroton. Bet. Chamæpit. Scord. Ficus, Hierac. Brassicæ, Sabin. Parietar. Mercurial. Saponar. Quin & solâ affricatione talium Herbarum, præprimis quæ mollioris sunt texturæ, paulatim maculæ tales profligantur. His addimus Fel bubulum, Succum Aurantior. Citr. Limon. Liquorem Visicular. Ulm. Succum Betulæ, Sanguinem leporinum recentem & calentem adhuc, Lac asininum. Laudantur & Aquæ destillatæ Hieraciorum, Chelid. maj. Sigill. Salomon. Tarax. Fragor. Rutæ, Lepidii, folior. Raphani cujuscunque, Mellis. Imò Pulticulæ fiunt è Farinâ Fabar. Tritic. cum Succis Plantarum

lantarum supra dictarum, *Bile vac-*
n. leporin. vel *Aceto* etiam permistis,
 uæ singulis hinc noctibus applican-
 tur, & mane iterum cosmeticâ Aquâ
 liquâ tepidè abluuntur. Si pertinaces
 fuerint maculæ, tum noctu semper
 ungetur vel *Unguentum citreum*,
 vel *Ægyptiacum* corrodendi vi præ-
 titum, vel *rosatum camphoratum*
 am *Oleo Amygd. amar. rec. expr.* O-
 o *sinapin. balanin. ricinin. juniperin.*
Mercurio præcipit. alb. Imò *Buty-*
um, cui incoctæ sunt *Herbæ Esular.*
olia Ficâs, *Taraxacon.* *Tragopogon.*
helidon. major. Cepar. Alliorum, fre-
 uenter inunctum maculas quoque
 elet, præprimis si pulverem radic.
id. florent. Aristoloch. Aronis, Mer-
curii dulcis, vel præcipit. rubri aut
 bi permiscueris. Plura vide sub
 titulo de *Lentigine*.

FACIEI NÆVI, vid. *Nævus*
atervus.

FACIEI NIGREDO, est co-
 ris faciei nitidi, floridi, pulchri at-
 ue rubicundi in lividum vel nigrum
 mutatio. Equidem totius subinde
 corporis cutis præternaturali ejusmo-
 colore afficitur, id tamen homines,
 æminæ præprimis, non curant, mo-
 ò faciem, collum, pectus ac manûs
 egantes habuerint; utpote qua-
 um partium curam omnium maxi-
 am, vanitatis amantissimæ, ge-
 unt. Quibusdam etiam color e-
 smodi natus atque hæreditarius
 t. Omnes certè desiderant esse
 alchræ, ut placere, ut specta-

ri, atque æstimari magis queant.

Oritur à variis causis, quarum *causa.*
 proxima est certa configuratio parti-
 cularum superficiei cutis, ob quam
 pori ampliores redditi plurimos ra-
 dios luminis absorbent, adeoque
 paucos ad spectantium oculos remit-
 tunt. Antecedentes hinc causæ dis-
 positionem illam sive configuratio-
 nem in cute producant, quemadmo-
 dum sunt copiosi sudores, Solis ra-
 diis siccati, pulveres varii in aëre cir-
 cumvolitantes, & poris cutaneis su-
 dore madidis immixti, inibi que cum
 lymphâ siccati; atque adeo frequens
 mora sub radiis solaribus, à quâ con-
 tracta *Nigredo* vocari solet *Insolatio*,
 quæ Rusticis familiaris est. His ad-
 dimus quotidianam lardi affricatio-
 nem, & hinc faciei expositionem
 sub radios Solis. Morbos itidem
 varios, inprimis *Icterus nigrum*,
 cutis colorem defœdantes. Quo
 igitur potentiores sunt radii solares,
 quoque altius ad verticem nostrum
 Sol assurgit in suâ mutatione diurnâ,
 eo etiam magis homines ad Nigredi-
 nem cutis disponit. Hinc enim In-
 colæ *Zonæ torridæ* nigriores plerun-
 que sunt iis, qui extra illas habitant,
 nisi ab ineunte studium pulchritudi-
 nis excoluerint. Imò reperiuntur
 integræ ibi nationes *Nigrorum*, quos
Æthiopes & *Nigritas* appellant, quo-
 rumque nigredinis causam *M. Mal-*
pighius & *Joh. Nicol. Pechlinus*, *Tract.*
de Colore & Habitu Æthiopum felici-
 ter indagârunt, eamque deprehende-
 runt esse *reticularem* eamque *mucosam*
 quandam *membranam*, perpetuâ quasi
 D d d fulgine

fuligine consistam, inter Cuticulam & Cutim ita hærentem, ut fibrillarum suarum ope magis Cuticulæ quàm Cuti adhæreat, & hinc à Cute ipsâ facile, à Cuticulâ autem difficillimè separabilis existat. Hæc verò Æthiopum nigredo perfecta est, connata, nec ullâ arte dissipabilis, à quâ proinde distinguimus illam improprie sic dictam nigredinem, quæ consistit in fusco magis, eoque adventitio, quàm perfecte nigro colore. Ad hanc deinde præternaturalem Nigredinem subinde etiam crassus, acidus, pituitosus, fumo siccatus qualiscunque Cibus, sulphureo-salfo-ac tartareo principio maximè constans, contribuit. Novimus & Fœminas aliquas, quæ cum Adultæ jam Variolis prehenderentur, ad præcavendas Cutis foeveolas faciem perpetim Oleo Nucum & Amygdal. dulcium durantibus ulcusculis mungebant, sed inde cutim fuscam reportabant.

Diagnosis.

Cognoscere haud difficulter ejusmodi Nigredinem possumus, si modò cum naturali, quo prius Homo gaudebat, colore conferamus. Scire etiam ex antea actis licet, num ab æstu Solis & Aëris, num verò à Victu indecenti aliisve rebus contracta fuerit.

Prognosis.

In *Prognosi* variè de eventu Nigredinis est judicandum; quæ congenita est, certè incurabilis habetur, si palliativam, & fucorum plenam excipias curam. Quæ itidem ex operibus quotidianis in æstuante aëre faciendis contrahitur, vel contracta est semel Nigredo, eam quoque vix, nisi

tardè post mutatam imprimis vitæ conditionem auferre licebit.

In *Curatione* hinc ad Nigredinis veram originem attendemus: quæ enim provenit ab insolatione in festo quodam itinere æstivo, ut plurimum per se disparet, modò domi quies maneat aliquamdiu, cibusque eucharis ac eupeptis vescatur. Si quis verò citius meliorem habere colorem gestiat, ille singulis noctibus sequenti liquore calente faciem manusque suas probè lavabit:

Rx. Aqu. Flor. Fabar. Solan.

Spermat. Ranar. ana. ℥iij. Vini albi veteris probè defæcati ℥ij.

Suci Citr. recent. expr. ℥j.

Misc. d. ad Vit.

Vel Rx. Aqu. Rosar. alb.

Sigill. Salomon. ana. ℥iij.

Fellis bubuli ℥j.

Ol. Fri per deliqu. ℥ss.

M. d. ad Vit.

Vel Rx. Radic. Bryon. mar.

Scrophular.

Sigill. Salomon. ana. ℥ss.

Herb. Saponar.

Flor. Lil. alb.

Fabar. ana. M. 10.

Citri.

Aurant. ana. Mj.

Aceti Vini opt. q. s. ad supereminentiam trium vel quatuor digitorum. Stent per aliquot dies infusa, postea destilletur inde Liquor, quo calente bis vel pluries quotidie abluta facies Nigredinem brevi deponit.

Ve

Vel *succo tantum aut carne succulentâ Citri vel Limonum* per affricationem Cutis nigredo tollitur.

Aliâs itineri, aut obambulationi per aërem æstuantem sese accingens Homo nigredinem Faciei præcavere potest, si vel *Bilem vaccinam cum Cremore Hordei, & Succo Allii*, vel *Albumen Ovi cum Aquâ Rosarum conquassatum*; vel *Mucilaginem Seminum Psyllii, Cydonior. aut Gummi Tragac. Aquâ Rosar. extractam*; vel *Emulsionem Seminum 4. frigid. majorum*, nec non *Cannabim cum Aquâ Rosar. paratam*, per quadrantem plus minus horæ applicabit. Postea verò domum redux suam Homo faciem *Aquâ & Vino*, vel *decocto Furfuris & Aquâ Rosarum* invicem mixtis iterum abluet. *Mercurialis* refert in *Tract. de Decoratione*, Genuenses Mulieres domo egressuras, aërique calido sese exposituras, faciem prius *Succo Solani* lavare. Communissimum verò præservativum *Larvæ* existunt, quibus obvelatur facies; sistent autem illas sic parare; *Linteum crudum Belgicum*, illudque pulchrum pluries *Aquæ Spermat. Ranarum* filtratione depuratæ immergitur, iterumque siccatur: dein Linteum hoc sequenti Emplastro vel Cerato imbutur.

R̄. *Ceræ alb. nitidiss. ʒvj.*

Unguent. Pomat. ʒij.

Spermat. Cet. rec. ʒij.

Camphor. ʒß.

Misce probè invicem cum tantillo *Olei Rosar. vel Lil. albor. & penicilli* per Linteum ex unâ tantum parte in-

ungitur, dein cum induratum fuerit, alio linteo fricatur & politur, sicque *Larvæ ex Holoferico factæ* inditur, quâ utentes Fœminæ non solum à Nigredine, sed etiam à nimia Rubedine præservantur.

In Dietâ præprimis sequentia ^{Dietæ præservativa.} observare debent, qui vel quæ Cutis nitorem vel conciliare sibi, vel conservare cupiunt. Aërem qualemcunque rigidum, vel æstuantem, pulverulentum ac fumosum, præprimis verò Martii mensis auram vitabunt, utpote quæ cutim non secus ac Solis radii æstuantem denigrant, aut foedis maculis obfuscant. Infantes & pueri si tenerâ ætate nimio frigore hyemis sæpius quasi obrigeant, sequentibus adultæ ætatis annis nunquam albam, teneram, nitidam, & glabram, sed asperam semper, fusconigricantem, duram, & veluti scabiosam cutim adipiscuntur. Ab aromatibus quoque acerbis, à Melle, Leguminibus, Ciceribus, Pisibus, Lentibus, Pyris, Pomis, Cerevisiâ novellâ, aliisque rebus faciliè fermentescibilibus & acidis sibi temperabunt. In Potu non multum Vini vel Cerevisiæ fortis bibent, sed dilutum aquâ Vinum, & Cerevisiam probè defœcatam ordinariè haurient, vel aquam fontanam puram, aut Ptisanam à Decocto Hordei, Anis. & Ligni Sassafr. paratam. Somnus & Vigiliæ, Motus & Quies moderati erunt. A Venere nimia, ab Irâ, Terrore multo, ac Tristitiâ quotidianâ, vires depascente, sibi valde cavebunt. Alvus singulis diebus vel sponte vel clysmatibus injectis li-

bera erit. Singulis hebdomadis Aquæ dulcis Balneum ingredientur, sine ullius Herbæ incoctione. Diligenter denique Facies lavabitur Aquâ fontanâ, non calente illâ, rugas inducente, nec frigente admodum, ceu asperitatem causante, quæ postmodum ferè incorrigibilis existit. Lotâ autem facie Balsama vel Unguenta cosmetica usurpantur, ubi quæ Calcem vivam, aut extinctam, vel Saponem qualemcumque ac similia falso-acria recipiunt, fugienda, nisi sordes illis eluere velimus, quo præstito ad balsamica revertendum est, quibus dum pori infarciuntur, cutis certè glabra, polita ac nitida reddatur necesse est.

Cosmetica palliativa, pro facie tenerâ macilentâ.

Quando autem Nigredo planè abstergi nequit, tum ad palliativa cosmetica deveniendum, iisque semper utendum est. Sed heic distinguendæ sunt probè facies Hominum, quæ enim teneræ sunt, macilentæ, & succo gelatinoso-balsamico ferè carentes, his præscribenda sunt humectantia, succulenta, balsamica, poros cutis nutritiâ velut lymphâ infarcientia, quemadmodum v. gr. Lac est vaccinum, aut asininum, quo nigram novimus Puellam rusticam intra sex hebdomadarum spatium candidum faciei nitorem adquisivisse, & formosam redditam fuisse. Alîs profunt Aquæ è Limacibus, Carnibus, Lacte, Malvâ, Portulacâ, Althæâ, & similibus destillatæ. Sed & Farina Tritici, vel Amylum Lacti, aut tali Aquæ permiscetur, & facies dein hâc Mixturâ tepidè ablu-

tur, postque ablutionem sequens Balsamum inungitur:

R̄. Unguenti pomat. ʒj.

Axung. vitulin.

Olei Amygd. dulc. vel Seminum frigidorum frigid. expr. ʒʒ.

Magist. Marcasit. ʒij.

Misc. d. ad Ollam, noctu illinitur & sequenti mane Emulsione Amygdalarum dulcium Aquâ Ros. factâ, vel sequenti Aquâ iterum abluatur:

R̄. Limacum contus. num. 25.

Carnis vitulin. tʒʒ.

Lardi albiss. tʒʒ.

Oryzæ contus. ʒʒ.

Lactis caprill. tʒij.

Succi è Violar. Alth. aut Malv. recenter express. vel

Roris majalis tʒij.

Misce invicem in vase mundato, stent per 30. horas in loco minus calido, postmodum destilla in Balneo Mar. Destillatam aquam solaribus expone radiis per plures dies, postea filtratum Liquorem usui asserva.

Vel R̄. Micarum Panis è farinâ tritic. albiss. tʒij.

Irrora tantillum Vino Hungaric. Hispanic. Malvat. aut Frontiniac. adde dein

Flor. Rosar. incarnat. q. v.

Semin. Cydonior. ʒij.

Album. Ovorum. num. 6.

Lactis Asinin.

Caprill. ana. tʒij.

Misce invicem, atque destilla ex Balneo Mar. Destillatum liquorem pro faciei ablutione asserva. Inter destillandum in Alembico suspendi potest Zibethum,

bethum, vel Ambra gryf. aut Moschus, ut Aqua fragrans inde producat, quanquam hyssericæ Fœminæ odorem hunc ferre nequeant.

Multæ Fœminæ sequentem Aquam cosmeticam in secretis habent:

℞. Porcellum quindecim vix dierum, ab interaneis liberatum, hinc in frustula concisum, cui in vitreâ cucurbitâ affunde & adde

Vini Malvatici, similisve alius generosi ℥6. vel 7.

Limacum contus. ℥iij.

Pomor. Citr. vel Limon. concisum, 3.

Sacch. cand. alb. 3vj.

Destilla ex Baln. Mar. destillato Liquori immitte Folia Auri pro lubitu, expone per Mensis spatium radiis solaribus, & demum usurpa Liquorem, filtrandum ulterius, sicubi opus esse notabis. Sed mane ac vespere facies abluenda est tali Aquâ.

Unguenta cosmetica quoque plurima circumferuntur; Tobias Vogelius sequentia adducit multo usu commendata ad conservandum Cutis nitorem:

℞. Butyri majalis ℥j.

Immitte in vas terreum, expone radiis solaribus continè, affunde

Aqu. Hed. terr q. v.

Agita probè invicem, decanta dein Aquam, novamq; affunde, hocq; sæpius reitera, tandem Aquâ Rosarum fragante Butyrum lava, quo factò, Aquaq; denuò abstractâ, Butyro permisce

Terebinth. Venet. opt. 3j.

Vitell. Ovor. num. ij.

Misce & spatulâ ligneâ per integrum diem agita, donec Terebinthina probè subacta sit. Si quis Oleum flor. Aurant. aut Jasmini addere velit, tanto fragrantiores Balsamum adipiscetur.

Vel ℞. Lardi albiss. & tenerr. ℥ij.

Scinde vel rade minutim, ut omnes membranulæ separentur, mitte illud in catinum, affunde primum Aquam fontanam, & lava probè, aufer dein hanc aquam, & Aquam Frigor. affunde, contere invicem probè aliquamdiu, & novam quinquies vel sexies Aquam talem adfundendo opus idè repete; tandem hanc lotionem atque trituram cum Aquâ Rosar. fragr. institue, & ubi Aqua per decantationem separata fuerit, catinum leni prunarum igni superimpone, & liquari Lardum permitte: interea misce Olei Amygdal. dulc. recentiter ac frigide expressi 3ij. cum semuncia Spermatidis Ceti recentis, & uncia integrâ Cerae albæ, atq; in vasculo stanneo super ignem lenem invicem liquari sine, liquata hæc misce cum Lardo similiter liquido reddito, adde simul Magisterii Marcasit. 3j. agita invicem probè usq; dum refrigerit; asserva dein in vase terreo, superfundendo Aquam flor. Fabarum, hancq; sæpè renovando, quo sic Unguentum ab externis aëris injuriis tutum maneat. Singulis noctibus Unguento hoc Facies, imò & Manus inungi, & postridie mane iterum ablui possunt Vino & Aquâ Rosarum.

Facies obesa, crassa, requirit è contrario tales res, quæ moderatè siccare, cutim duram corrigere, tenuemque illam ac teneram reddere valent, quod inter alia præstant, quæ

aciditate quadam volatili, vel siccitate abstergente salinâ gaudent ; hinc conveniunt sequentia :

R̄. Album. Ovor. num. 12.

Fol. Lilior. alb.

Flor. Rosar. alb. vel Damasc. ana. Miß.

Radic. Ireos nostrat. rec. ʒiß.

Sigill. Salomon. ʒj.

Herbar. Meliss. Mij.

Terebinth. opt. ʒiß.

Storac. Calam.

Lad. ana. ʒß.

Incisis & contus. affunde Vini alb. q. s. stent per aliquot dies, destilla dein in B. Mar. Liquori destillato affunde

Succi Limon. vel Citr. expr. ʒj. plus minus.

Hinc noctu Faciem tepidè lava, & per se siccari permitte. Si fortius detergere velis, Mercurii sublimati ʒj. addere poteris.

Vel Radic. Lil. alb.

Ireos nostr.

Sigill. Salomon.

Aron. ana. ʒj.

Folior. Levistic.

Piperitid.

Cochlear.

Malv.

Flor. Fabar.

Rosar. Damasc.

Nymph. ana. Mij. vel plures.

Incisis & mixtis affunde parum Vini albi. Stent per 24. horas, postea destilla, & Aquam destillatam usui asserva.

Huc facit quoque Lac virginale, quemadmodum esse potest sequens:

R̄. Storac. Calamit.

Benzoen. ana. ʒiß.

Myrrh. elect. ʒiij.

Garyophyll. aromat. ʒij.

Incisis affunde Spiritus Vini rectif. vel tartarifat. ʒi8.

Stent in digestionem per octiduum, postea filtretur liquor, ac detur ad Vitr. Quod si dein Lac Virginis habere velis, tum

R̄. Aqu. Flor. Fabar.

Rosar. incarnat. ana. ʒj. vel ʒij.

Tincturæ superioris q. s. ad conciliandum lactis colorem.

Misce invicem, atque faciem inde lava, vel illine quotidie.

Vel R̄. Gumm. Benzoin.

Styrac. calam. aa. ʒß.

Cinamom. opt. ʒiß.

Balsam. Peruv. ʒij.

Camphor. ʒß.

Moschi orient. ver. gr. iij.

Incisis, contusis, ac in Vitro positis affunde Spiritus Vini dephlegmati ʒvj. Stent in loco tepido, donec Tinctura fuerit extracta, quam dein guttatim Aquæ Lil. alb. Malv. Rosar. aut simili, pro exhibendo Lacte virginali quotidie illinendo, infunde.

Rulandus Aquam habet egregie absterisivam, & hinc cosmeticam quoque haud contemnendam, quam heic apponere lubet :

R̄. Aqu. Plantag. ʒviiij.

Rosarum fragr. ʒiiijß.

Succi Aurantior. ʒiß.

Mercur. præcip. alb. ʒij.

Misce & coque ad solutionem Mercurii, ac serva usui pro lavandâ facie.

Nequ

Neque displicet odoratissima illa Aqua, pro Faciei & Manuum irratione, ad nitorem conservandum, quam Claud. Deodatus in suo Pantheo descriptam dedit: v. gr.

R̄. Cinamom. opt. ℥ij.

Macis.

Garyophyll. arom. ana. ℥j.

Gumm. Benzoin.

Mastich.

Styrac. calam. ana. ℥℞.

Omnibus crasso modo contusis, mixtis, & Cucurbitæ vitreæ inditis affunde

Aqu. Lilior. Convall.

Cortic. Citri.

Majoran.

Rosar. ana. ℥iiij.

Factâ per aliquot dies digestionem sec. artem destillantur, impositis prius Alembici rostro in petiâ ligatis

Ambr. gryf. ℥j.

Mosch. orient. opt. ℥℞.

Zibethi ℥℞.

Sic habebitur Aqua odoris suavissimi, quâ Facies ac Manus lavari vel abluï possunt.

Vel, quæ ejusdem est Auctoris libr. cit.

R̄. Florum selectiss. Anth.

Aurant.

Jasmin.

Sambuc. aa. 3vj.

Cinam. acutiss.

Garyoph. arom. ana. ℥iiij.

Gumm. Benzoin ℥ij.

Moschi fini ℥ij.

Omnibus crasso modo contusis & Cucurbitæ vitreæ inditis affunde

Spiritus Vini rectif. ℔io.

Aqu. Rosar. fragrant. ℔ij.

Vase probè clauso digerantur in Balneo per triduum, postea destillantur ad siccum, & in vase vitreo benè munito ad usum asserva. Quod si hanc Aquam multiplicare velis,

R̄. Aqu. fontan. ℔ij.

Coque aliquantisper, post ebullitionem ab igne aufer, cola, & ad singulas libras adde prædictæ Aquæ odoratiss. ℥j. Sine refrigerare, sic evadet Aqua fragrantissima.

Italorum plurium Aqua ad clarificandam, ac dealbandam Faciem sequens est:

R̄. Thur. alb.

Storac. calam.

Sacch. cand. alb. ana. ℥j.

Borac. Venet. ℥℞.

Camphor. ℥ij.

Tritis & mixtis invicem affunde

Aqu. Lil. alb. ℔j.

Destilla per Alembicum, sic Aquam habebis egregiam, quâ semel vel bis de die Facies abluï potest.

Sequenti etiam sæpius cum successu fuimus usi:

R̄. Lactis Vaccæ nigr. mense Maio collect. ℔7.

Inde Cucurbitæ vitreæ, adde

Pomor. Citr. succulentor. ac minutim incisor. num. 8.

Aurantior. simil. incisor. num. 4.

Sacch. cand. alb. ℥ij.

Borac. Venet. ℥℞.

Flor. Rosar. Damascen.

Aurant. ana. Mij.

Destilla in Balneo Mar. vel Arenæ, igne semper æquali & mediocri, tandem cucurbita

cucurbita per diem integrum, sine ulterioris ignis additione, immota maneat; postea colatum Liquorem usui asserva.

Vel R̄. Panis candid. recent. ē Cliban. extract. & concis. ℥iij.

Flor. Rosar. alb.

Lil. alb.

Fabar.

Nymph. ana. Miß.

Album. Ovor. num. 6.

Lact. caprill. ℥iij.

Misce & destilla per Alembicum in B. M.

Alii sumunt Caponem maximè obesum, & recenter excoriatum, capite, pedibus ac visceribus privatum, scindunt in frusta, hinc Cucurbitæ immittunt; addunt Caseum ē cremore factum, Albumin. Ovor. num. 6. Borac. Venet. ℥j. Spirit. Vini ℥xij. Aquæ Rosar. ℥vj. Tandem sic destillant in B. M. & Aquam probè detergentem adquirunt.

Aquam sequentem Cosmeticam Norimbergensium alii laudant:

R̄. Aqu. Sperm. Ran.

Lil. alb.

Nymph.

Rosar. ana. ℥iij.

Flor. Aur.

Succi Citr. ana. ℥j.

Album. Ovor. num. 3.

Mercur. sublim.

Camph. ana. ℥j.

Magist. Marcas. ℥ij.

Sacch. Saturn. ℥iij.

Ceruss.

Borac. Ven. ana. ℥ij.

Misce probè d. ad Vitr.

Amicus mecum sequentem communicavit, nitorem faciei optimè conservantem:

R̄. Mell. crud.

Terebinth. opt. ana. ℥ij.

Gumm. Benzoin. ℥iij.

Styrac. liquid. ℥ij.

Album. Ovor. num. 8.

Aqu. Ros. fragr. ℥ij.

Borac. Venet. ℥ij.

Misce & destilla; Aquamque usui asserva, pro lavandâ quotidie Facie. Melior adhuc hæc Aqua redditur, si ante ejus usum aliquid fimi columbini per bihorium infundes, hincque filtrabis; habent enim Fimi tales egregiam vim nitroso-salinam abster-sivam.

Qui nigram Cuticulam planè ablatam cupiunt, his præscribitur Aqua phagedænica quædam excorians; v. g.

R̄. Mercur. sublim. ℥j.

Aqu. commun. ℥iij.

Bulliant super ignem, quousq; sentiatur aliqua acrimonia in Lingua, hinc adde

Magist. Marcasit. ℥iij.

Ceruss. ℥j.

Coque adhuc parum, dein Liquor clarificetur Albumin. Ovor. ac usui servetur:

Vel R̄. Mercur. subl. ℥j.

Pone in Vas stanneum profundum, as-funde

Aqu. fontan. ℥iij.

Agita per 24. horas spatulâ ligneâ usq; dum Liquor evaserit niger; hinc dein intingitur Linteum molle, hocq; Cutis nigra tangitur, sed non ita frequenter; semel tantum bidui spatio cavend

cavendo semper, ne quid in Oculos, Aures, Nares aut Os decidat.

℞. Aqu. Rosar. ℥ij.

Lil. alb.

Succ. Limon. vel Citr. ana. ℥ij.

Mercur. sublimati corrosiv. ℥i℔.
plus minus.

Misce probe, usq; dum Mercurius sit solutus, hinc noctu Linteum huic Liquori calefacto immersum toti faciei applicetur. Quod si excoriata fuerit inde Cuticula, tum per plures insequentes dies alia applicetur Aqua consolidans: v. gr.

℞. Aqu. Fl. Ros. alb.

Spermat. Ranar. a. ℥iv.

Mucilag. Semin. Cydon. Aquâ

Plantag. extr. ℥ij.

Album. Ovor. num. ij.

Misce & cum Linteis tepide applica.

Sub usu autem ejusmodi Mercurialium studiosè cavendum, ne quid in Oculos, Aures, Nares aut Os depluat. Ad præservandam quoque Dentium Nigredinem & cariem, ex iisdem usurpatis, mastiacari sæpè iterumque expui possunt Amygdalæ dulces.

Lac Tityhmali cum Succo foliorum Verbasci pluries applicatum similiter Nigredinem aufert, sed ne quid in oculos demittatur. Similem virtutem blandè corrodentem habet illa Aqua albicans, quæ in destillatione Butyri Antimonii omnium primò prodit; postea enim prodiens Aqua flavescens nimis jam corrosiva est.

De Oleo Talci tanquam optimo cosmetico multa dicuntur, apud Chymistas; sed sophisticum omne

est, quod sub formâ Olei cujusdam circumfertur. Etsi enim Talcum nonnihil splendens sit, & visui occurrat tanquam balsamicâ substantiâ prædictum, Lapis tamen est verus, & quidem sui generis, nullas in sese particulas oleosas aut balsamicas fovens. Quod verò inde paratur remedium cosmeticum, Liquor est per deliquium factus, & ab Oleo Tartari per deliquium sic dicto quoad formam ac virtutem parum differens; v. gr. Recipitur Talcum Venetum, quod visu oleosum aut viscidum arguitur, magno illud labore teritur in pulverem subtilissimum, postmodum vel simpliciter, vel quod securius est, cum Tartaro aut Cineribus clavellatis in Furno figulorum per aliquot dies calcinatur; hinc affunditur aut inspergitur tantilla quantitas Aquæ Rosarum fragrantis, reponitur mox in Cellam, sic Liquor ille Talci per deliquium obtinetur, quem aliàs etiam Oleum Talci vocant. Liquor verò hic egregius est ad purificandam, dealbandamque Cutim, si Facies eo quotidie lavetur.

Pulveres dein etiam cosmetici cum Aquis similibus in pulticulæ formam redacti noctu sub introitum lecti Faciei, Collo, imò & Manibus, si velis, illinuntur, per se siccari permittuntur, ac postridie mane Aquâ fragrantè cosmeticâ teneris linteis exceptâ iterum abluuntur. Pulveres esse possunt sequentes, aut similes:

℞. Radic. Ireos florent.

Sigill. Salomon. ana. ℥j.

Aron. ℥℔.

Pulveres
cosmetici
Aquis.

Eee

Magist.

Magist. Marcasit. ʒiʒ.

Farin. Tritic. vel Fabar.

Amyli ana. ʒj.

Amygd. amar. rec. excortic. ʒij.

M. f. Pulvis subtil. cui, si fragran-
tem desideres, admiscere adhuc poteris

Moschi orient. ver. gr. vij.

Zibeth. gran. ʒ.

Vel R̄. Sapon. Venet. rasi & siccāt. ʒvj.

Farin. Fabar.

Lupinor.

Nucleor. Persicor.

Radic. Sigill. Salomon. ane. ʒij.

Raphar. rustican.

Bryon. ana. ʒj.

Mercur. dulc. ʒʒ.

M. f. Pulv. subt. d. ad Scatul. Usur-
petur ut superior.

*Globuli
saponi-
formes
cosmetici*

Quod si ejusmodi Pulveribus per-
misceas Essentiam Gummi Benzoin,
vel Styrac. calam. cum Spiritu Rosar.
extractam, nec non Oleum stillatit.
Ligni Rhod. cum Ambrâ, Zibetho, &
Moscho, tum inde Globulos saponi-
formes formare poteris, quibus Aquâ
Fl. Fabarum, aliâve nonnihil emolli-
tis Facies, Collum & Manus fricari
possunt.

*Palliati-
va Ni-
gredinis
cura,*

*Palliati-
va Ni-
gredinis
cura,* Palliativa Nigredinis Faciei cura-
tio absolvitur diversis fucis, quibus
Cutis nitida & alba, vel pulchro rubo-
re tinctâ redditur. Veteres Romani
hoc præstabant Cerussâ, unde Mar-
tialis Libr. 7. Epigr. 24. Cutim cerussâ-
satam, vel Cicero Buccas cerussata sap-
pellavit. Hodie pro Fuco albo usurpant
communiter Magisterium Marcasitæ,
vel Magisterium Cerussæ ex Aceto de-
stillato, cui Cerussa incocta fuit, per
affusionem Aquæ fontanæ præcipita-

*Fucus al-
bus.*

tum. Adduntur pro lubitu ad con-
ciliandum gratum odorem Flores Ben-
zoin. Alii Magisterium Perlæ hoc fine in usum trahunt. Lac Vir-
ginum superius descriptum, & quo-
tidie noctu per aliquot menses illi-
tum, laudant communiter. Vel R̄.
Farin. Lupinor. cochlearia duo, Fellis
caprill. Succu Limonum ana. cochleare
unum, Alumin. crystallin. ʒʒ. Misce
omnia in formam Balsami, vel Lini-
menti, quo Facies noctu illinitur.

Ad conciliandum ruborem autem
Fuco rubro utuntur, quem in finem
communiter hodiernâ die adhibent
Tornam Solis, quæ nihil aliud vide-
tur esse, quàm Linteolum pluries Co-
lori scarlatino intinctum & siccatum,
quo tantillum Aquâ Rosarum made-
facto, genæ fricantur. Alii Rasuram
Ligni Brasiliæ cum Alumine & Ich-
tyocolla in Aquâ decoquunt, indeque
productâ Tincturâ cum linteolis Ge-
nas sæpius imbuunt.

Labia verò rubicundo colore se-
quens inunctus inficit Balsamus.

R̄. Lacc. florent. Spirit. Vini probe
lotæ ʒj.

Olei Nucist. expr. ʒʒ.

destillat. Jasmin.

Cinnam.

Rosar. aa. q. s. ad
gratum odo-
rem concil.

Misc. detur ad Pyxidem.

Nonnulli Sanguinem Draconis ve-
rum in granis subtilissimè pulverifant,
hinc temperant cum Mucilagine,
Gumm. Tragac. Aquâ fluviatili ex-
tractâ, & inungunt frequenter. Alii
Magi-

Magisterium ex Ligno Brasiliano faciunt, coquendo probè ejus scobes vel rasuram in Lixivio ex Cineribus clavellatis & Sale Tartari concinnato, hinc pulverem Magisterii per affusionem solutionis Aluminis in Aquâ factæ præcipitando, denique Magisterium edulcorando, & cum Mucilag. Gummi Tragac. temperando, sicque illi- nendo. Sunt qui cum Magisterio Marcasitæ albo permiscunt Coccinellæ Tincturam, & sic usurpant.

FACIEI RVBEDO, vid. *Gutta rosacea*.

FACIEI RVGÆ, sunt inæqua- tates Cutis Faciei à consumtâ pin- quedine, vel muscutorum carne sic- catâ ortum ducentes. Quanquam autem hæc deformitas soleat esse fa- miliaris Senibus, nihilominus tamen etiam illis contingit interdum, qui vel diuturnâ sese inediâ macerare co- sti, vel diuturnis morbis excruciatii fuerunt; vel duos etiam, eosque continuos labores suis in vitæ condi- tionibus exantlare solent; vel qui tristitiâ & curis animi sese emaciâ- unt; vel denique, qui enormes per- essi vacationes per nares, alvum aut alias vias. Cùm enim ab ejusmodi causis corpus succorum quantitate privetur, necesse est, ut cutis tandem faciei laxior reddatur, constingatur, etque plicas vel rugas adquirat.

Rugas has Faciei, utcunque mi- nus molestas, sequior tamen Sexus, mundanæ vanitatis plenissimus tole- re nescit, ac ea propter arte quavis

quavis sibi planam magis, non secus atque nitidam cutim acquirere studet. Sed notandum tamen, in senibus tales Plicas curationem nullam ad- mittere, in Junioribus autem subin- de tolli vel corrigi posse, modò causæ removeantur, atque sic præservato- riæ indicationi satisfiat. Sed hunc scopum illæ demum Fœminæ attin- gunt optimè, quæ suam nôrunt cu- tim optimis cibis curare, atque sic chylum maximè nutrientem & co- piofum pro alendâ vel augendâ etiam partium substantia sibi comparare. Neque tamen hoc sufficit, quin simul quies corporis moderata, somnus tranquill⁹, animus curis & mœrore va- cuus, vita hilaritatis plena, alvus quo- tidie respondens, deniq; aëris tempe- rati neq; nimis rigidi, neq; nimis æstu- antis, usus requiritur. Fugienda proin- omnia illa, à quibus supra diximus su- am rugas originem trahere; hinc vide- mus illas Fœminas, quæ duos non subeunt labores, quæ vitam plerunq; sedentariâ ac tranquillam agunt, qua- rum cor nunquam angitur, sed lætum semper est, quæ in radiis solaribus, æstuanteque aëre diu vivere non co- guntur, plenâ semper, floridâ ac ni- tidâ Facie gaudere.

Quæ externa circumferuntur ad Rugas tollendas remedia, vix ullum præstare valent desideratum effectum; nisi fortè poros cutis nimis constri- ctos referent, fibrasque siccitas emolliant, quo sic nutritius succus ubertim af- fluere, cutimque expandere queat: quem in finem commendare velle- mus crebrius Oleorum, Unguentorum,

aut *Pulmentorum* calentium applicationem, quemadmodum sunt v. gr. *Axungia humana*, *canina*, *hædina*, *caponum*, *cervina*, *Butyrum recens*; *Olea Sesaminum*, *Ovorum*, *Rosarum*, *Lil. alb. Verbasc. Amygdal. dulc. Seminum frigidior. majorum recenter ac frigide expressum. Succus Herbar. Verbasc. Portulac. Violaria, Althæa, Malva*; *Nuclei Pinearum*, *Pistaciorum. Farinae radicum Althæa, Bryon. Symphyti, Seminis Lini, Fœnigrægi, Oryzæ; Ervi, cum Lacte & Aqu. Fl. Fabar. aut Rosar. in Pultis formam redactæ, & applicatæ.*

FACIEI VARI, vid. *Jonthi.*

FACIEI VERRUCÆ, vid. *Veruca.*

**FAMES CANINA seu INSA-
TIABILIS**, vid. *Appetentia canina.*

*Fastidi-
um Cibo-
rum ge-
nerale.*

**FASTIDIVM CIBORVM
GENERALE** est symptoma appetitûs planè aboliti, ita ut homines non solum odorem & saporem vel gustationem, sed etiam subinde conspectum Ciborum omnium horreant, eosque proin sine subsequente nausæa ac vomendi desiderio deglutire nequeant. Vid. *Nausæa.*

*Idiosyn-
crasia.*

**FASTIDIVM CIBORVM
SPECIALE, IDIOSYNCRASIA**, est symptoma appetitûs vitiati, quo Homo non omnes in genere Cibus, Potusve, sed hunc tantum vel illum in specie fastidit, & averfatur maxime.

Ita hi quidem Caseum, Butyrum, Acetum, Cerevisiam, Vinum, Pisces, Allia, Cepas; alii tandem alia horrent, & sine nausæa ac horrore totius corporis ori ingerere nequeunt.

Oritur hic Affectus non nisi à peculiari atque insolitâ structurâ papillarum ac fibrarum nervearum in Linguae, Palati aut Gulæ superficiem exertarum, quæ proin ad occursum ejusmodi rerum, quas horrent, plus minus graviter percelluntur, crispantur, hincque simul fibras stomachicas in consensum trahendo, nausæam ac vomendi desiderium excitant. Structura talis propria ac determinata, ferè semper nativa existit, ab imaginatione matris gravidæ non raro dependens, quandoque tamen etiam adquiritur occasionaliter; uti fit, si quis forte nimiam Cibi, quem perditæ amavit, quantitatem & copiam uno in pastu devoravit; vel si quis nausæabundum purgans aliquod cum Cibo qualicunque assumpsit; aut cibum non munde coctum, vel aliter insulse paratum degustavit, tum enim papillæ nerveæ Linguae ita accommodantur, ut tales postea Cibi fastidiosi sint, assumiq; amplius nequeant. Faciunt huc quoque vitiosi humores ad ventriculum delabentes, ac Liquorem illius corrumpentes in Gravidis

Rarò curabilis est talis Idiosyncrasia, præsertim quæ congenita est quoniam naturalem illum papillarum nervearum statum corrigere & immutare vix licet. Quæ autem adventitia est, illa verò hætenus emendari iterum potuit, Tota hæc

emen-

emendatio consistit in paulatinâ mutatione dictarum fibrarum nervearum, & assuefactione earundem ad tolerandum facilius, ac sine crispatione sui, occursum particularum antea adversarum. Quando enim sæpius tentatur eadem res, tum tandem assuetæ fibræ non amplius ad illarum adventum percelluntur, & sic Nausea tollitur.

Ad Idiosyncrasiam talem pertinet *Abstemietas*, de quâ vide suo loco: nec non *Fastidium Medicamentorum*, de quo *Dissertationem* vide Excellentiſſ. Dn. D. Joh. Henr. Hottingeri, *Tigurin.* quam heic Basileæ pro consequendo Doctôratûs Gradu conscripsit, & publicè pro more defendit.

FAVCIVM ASPERITAS, vid. *Raucedo.*

FAVCIVM ARDOR, vel INFLAMMATIO est tumor modò levior modò gravior cum rubore, siccitate, & ardente dolore, subinde etiam deglutitionis difficultate Fauces affligens. Per *Fauces* autem intelligimus posteriorem cavitatis oris partem, quæ rictum Palati efficit, consistentem è radice Linguae, Uvulâ, Tonsillis, summitate Gulæ & Laryngis, harumque Musculis, tandem & membranâ pituitariâ interiora palati obvelante. Quæ proin Inflammatio Musculos Laryngis & Pharyngis occupat, de eâ consule Titulum *Anginæ*. De Uvulæ Inflammatione vide *Gargareonis Affectus*; & de Amygdalarum Ardore inspice *Tonsillarû morbos*.

Heic verò eam tantùm, quæ in radice Linguae, ac membranâ pituitariâ Faucium occurrit, siccitatem, cum rubore atque ardente dolore conjunctam intelligimus, quæque in Febribus Continuis sæpenumero occurrit, ac *Prunellæ* nomine venire consuevit. *Prunella.*

Ortum verò hæc Affectio ducit à Lymphæ pituitosæ falso-acris crassitie est stagnatione, indeque productâ simul circulationis sanguinis impeditione in vasculis capillaribus; quale quid sæpe in Febribus continuis, præcipuè malignis, occurrere solet; præprimis quando simul tubuli faucium à potu fortè gelido, vel à deglutitione Liquoris ardentis acris spirituosus, vel ab inspiratione aëris nimis gelidi, æstuante per Febrim aut aliâs corpore, constringuntur, & angustantur. *Causa*

Symptoma est partim ex Ægrotantis relatione, partim ex ipsâ Faucium inspectione cognoscibile; periculosum certè in Morbis sive Febribus malignis, utpote facile in Gangrænam transiens, nisi succurratur citò, atque circulatio humorum ibidem restituatur. *Diagnosis & Prognosis*

In *Curatione* proin humores visciidi incidendi, crassi attenuandi, acres mitigandi, constrictio tubulorum laxanda, circulatio humorum restituenda. Scopos hos non ita difficulter attingemus, modò decenter & ordine in remediorum præscriptione & usu procedamus. Itaque, nisi alvus probè, etiam in ipsâ Febri fuerit aperta, *Clyisma* quoddam detergens, aperiens & temperans injiciatur. *Curatio.*

tur statim ; deinceps raminae sub Lin-
quâ Venae incidantur. Intus verò ad
Lympham probè diluendam, fluidio-
remq; reddendam *medicamenta anti-*
catarrhalia, diaphoretica, blandè vo-
latilia sunt præscribenda, sudorque
hinc expectandus : v. gr.

℞. $\frac{1}{2}$ n. diaph.

Dent. apr. ppt.

Crystall. alb. ppt. ana. ℥ij.

Nitri perlati vel $\frac{1}{2}$ iat.

Salis volat. C. C. purific. aa. ℥j.

M. f. Pulv. subt. div. in 6. dos. æqu.
ad ch. mane ac vesp. cum vehiculo con-
venienti exhibendas. Vehiculum esse
potest Aqu. Brunellæ, Scabios. Card.
bened. Endiv. Succis. Ulmar. Taraxac.
Portulac. Lactuc. Vel Decoctum ra-
dic. Gramin. Acetos. Fragar. Herbar.
Scabios. Brunell. Anserin. Agrimon.
Numular. Passular. Hordei integr. Ra-
surae C. C. aut simil.

Vel sequens haustus aliquoties
propinari potest.

℞. Bolor. Fimi Caballi Avenâ nu-
trit. num. 3. aut 4.

Affunde Aquæ Graminis, Brunell.
Endiv. Scabios. Card. bened. Flor. Acac.
vel Ptisanæ ordinar. ℥iiij. Stent per
horam aut bihorium, exprime dein Li-
quorem, eumq; Saccharo nonnihil edul-
coratum hauriendum offer, & quidem
bis de die. Loco Fimi caballini sumi
potest Stercus ovillum aut caprillum.

Vel ℞. Aqu. Scabios.

Succis.

Plantag. ana. ℥j.

Mixtur. simpl. ℥j. vel 3℥.

Roob Sambuc. ℥ij.

Bezoard. min. gr. xv.

M. detur ad Vitrum pro dosi sæpius
repetendâ, cum expectatione sudoris.

Vel ℞. Aqu. Brunell.

Agrimon. ana. ℥i℥.

Syrup. Granat. acid.

de Nymph. ana. 3℥.

Roob Sambuc.

Spir. Nitr. dulc. ana. 3℥.

Ebor. sine igne ppt.

$\frac{1}{2}$ n. diaph. ana. ℥j.

M. d. ad Vit. Sumatur unâ vel
duabus dosibus.

Vel ℞. Bezoard. min. 3j.

C. C. philos. calc.

Mandib. Luc. pisc. ppt.

Unicorn. mar. ppt. ana. ℥ij.

Nitr. $\frac{1}{2}$ iat.

Myrrhæ elect. ana. 3℥.

Sacch. rosat. tabul. 3ij.

M. f. Pulv. subt. d. ad Scatul. Dosis
m. ac vesp. 3℥. cum Vehiculo convenienti.
Externè dein Gargarismata discutien-
tia in usum sunt vocanda, ex nitrosis
succulentis & mucilaginosi parata ;
v. gr.

℞. Aqu. Brunell.

Spermat. Ranar. ana. ℥℥.

Succi Sempervi. major. vel

Teleph. rec. express. ℥iiij.

Roob Moror.

Dianuc. ana. ℥i℥.

M. d. ad Vit. Usurpetur calidius-
culè gargarisando.

Vel ℞. Cancror. fluviatil. concisor. &
contus. num. 6.

Herb. Brunell.

Scabios.

Flor. Malv. hortens.

Ligust. ana. Mj.

Incis.

Incis. coqu. in s. q. Aqu. fontan. Colat. ℥j.

adde Roob Moror. ℥i℥.

Sambuc. ℥℥.

Salis armoniac. ℥i℥.

M. d. ad Vit. pro Gargarismate.

Vel ℞. Aqu. Semperv.

Brunell.

Fl. Ligustr. ana. ℥iiij.

Succi Cancror. fluviat.

Semperviv. ana. ℥i℥.

Roob Dianuc. ℥j.

Nitr. ppt. ℥j.

M. d. ad Vit. pro Gargarismate.

Vel ℞. Rad. Glycirrhiz.

Alth.

Carlin. ana. ℥℥.

Herb. Succis.

Salv.

Foliorum tenerior. Rubi Sylv.

Flor. Malv. arb. ana. Mj.

Incis. coque in s. q. Aquæ fontan. Colat. ℥j.

adde Mellis rosac. ℥i℥.

Roob Moror.

Dianuc. ana. ℥j.

M. detur. ad Vit. pro Gargarismate.

Vel ℞. Decoct. Rapar. ℥x.

Roob dianuc. ℥j.

Sal. armon. ℥j.

Nitr. purif. ℥℥.

M. d. ad Vit. pro Gargarisatione.

Vel ℞. Aqu. Brunell. ℥vj.

Plantag. ℥iiij.

Succi Semperviv. ℥ij.

Aceti Vin.

Roob dianuc. ana. ℥j.

Spirit. Vin. campb. ℥℥.

M. d. ad Vit. pro Gargarismate discutiente.

Post singulas gargarisationes Eclegma aliquod venit lingendum, v. gr.

℞. Roob. dianuc. ℥℥.

Syrup. Gran. acid.

Violar. purp. ana. ℥j.

Aqu. Brunell. ℥vj.

℥ n. diaph.

Spec. diatrag. frig. ana. ℥℥.

M. d. ad Oll. Cochleare plenum lambatur.

Vel ℞. Syrupi de Semperviv. ℥j.

Nymph.

Rub. id. ana. ℥vj.

Aqu. Flor. Ligustr.

Endiv. ana. ℥℥.

Ocul. ☉. ppt. ℥℥.

Bezoard. miner.

Nitr. ℥ iat. ana. gr. xv.

M. d. ad Vit. Lambatur cochlearum.

Vel ℞. Syrup. Ribium.

Acetosell.

Roob Dianuc. ana. ℥vj.

Sambuc. ℥ij.

Aqu. Succis. ℥j.

℥ n. diaph. ℥j.

M. d. ad Ollam ; sumatur cochlearum.

Collum externè ter vel pluries quotidie inungatur calidè sequenti Oleo vel Linimento resolvente :

℞. Ol. Amygd. dulc. ℥j.

Rosar. ℥℥.

Spir. Sal. armon. q. s. ad consistentiam Linimenti.

Misc. d. ad Oll.

Vel

Vel R̄. Ungt. Populeon.

de Alth. ana. ℥℞.

Olei Chamom.

Philosoph.

Scorpion. ana. ℥ij.

Misce detur ad Oll.

R̄. Olei Amygdal. amarar.

Chamomill. ana. ℥iij.

M. d. ad Vitr.

Vel R̄. Olei è flor. Slotan. ℥vj.

Lumbr. terr. ℥ij.

Lilior. alb. ℥℞.

M. d. ad Vitr.

Dein & Emplastrum de Meliloto, de Mucilagin. vel Cataplasma ex Nido Hirundinum, Fimo caprill. columbin. Absynthio, Althæâ, Anetho, Marrubio albo, Melissâ, recent. contusis, cum Pinguedine porcinâ aut Melle & Lacte factum imponitur. Album græcum ob fœtorem repudiamus. Vel

R̄. Pulv. radic. Alth.

Malv.

Irid. flor.

Flor. Chamom.

Melilot.

Sambuc.

Semin. Fœni græc.

Lin. ana. ℥℞.

Misce & cum Lacte coquatur ad Pulvis consistentiam, addendo

Unguent. de Hyoscyam. ℥ij.

Applicetur crebrò calidè. Sunt & qui cum fructu Lanam nigram succidam circa collum ponunt.

Faucium
excoria-
tio.

FAUCIVM EXCORIATIO est membranæ sive tunicæ glandulosæ Palati erosio ab humoribus falso-acribus corrosivis originem ducens. Hæc

excoriatio aliquando etiam Tonsillas, atque Uvulamprehendit. Subinde cum vel sine ardore, ut plurimum verò cum Raucedine Hominem molestat.

Humores salino-acres & corrosivi sunt, qui talem Excoriationem producunt, quique vel cum sanguinis massâ ad tubulos membranæ affectæ delabuntur, v. gr. in Scorbuto, Lue venerâ, inunctionibus mercurialibus &c. vel per os deglutiuntur, quemadmodum sunt Spiritus salino-acres volatiles Salis armoniaci, Urinæ, Nitri, Sulphuris, Vitrioli. Quandoque & Vomitus aut exscretio valida pituitæ acris in transitu membranam excoriare observata est. Huc etiam contribuere valet Gargarisatio nimis vehemens & crebra.

In conspectum prodit hæc Fau-cium læsio, modò palatum inspicere & perlustrare velis: molesta est, Raucedinem inferens, atque, si deglutire acida vel salsa oportet, insigni plus minus dolore affligens. Scorbuticis, Leprosis, Lue Gallicâ infectis haud infrequens; apud quos Homines etiam crebrò redit, ac interdum lentè curatur, præprimis si exulceratio vel caro luxurians simul advenerit.

Si Curationem feliciter instituere atque expedire cupias: id primò, secundò ac tertio agendum erit, ut excoriata pars iterum consolidetur, huncque in finem omnia impedimenta è medio tollantur. Consolidationem obtinere licet Cibis ante omnia mucilaginosi, quemadmodum sunt Juscula hordeacea, farinacea, avena-
cea,

cea, Oryzacea, contusis Cancris, Cochleis, nec non Herbis Plantaginis, Pimpinellæ, Scabiosæ, Lactucæ, Portulacæ, Endiv. Cichor. Borraginis alterata; Ova item sorbilia, aliaque similia. Dein & Gargarisma mucilaginosum in usum trahendum, cavendo tamen, ne vehementiâ quadam Gargarisationis fauces nimis commoveantur ac torqueantur; v. gr.

℞. Cancror. fluv. contus. num. 6.
Herb. Plantag.

Alth. ana. Mj.

Lich. petr. Mß.

Flor. Rosar. rubr. Pj.

Semin. Psyll. ʒiij.

Incis. & contus. coqu. in s. q. Aqu. font. Colatur. ʒvj. adde Roob dianuc. ʒiß.

Mell. rosac. ʒj.

Misc. d. ad Vitr. ac tepidè usurpetur crebrò.

Vel solum Decoctum Raparum cum Cremore Hordei mistum gargarisari potest. Vel

℞. Radic. Alth.

Symphyt. ana. ʒij.

Herbar. Sanic.

Pyrol.

Flor. Ligustr. ana. Mj.

Cochlear. sine testis concisar. num. 9.

Incis. coqu. in s. q. Aqu. fontan. Colat. ʒx. adde

Syrup. Capill. Vener.

de Lich. petr. ana. ʒj.

M. d. ad Vitr. & frequenter gargarizetur.

Post gargarisationem, vel aliâs quoque sequens Eclegma lambi potest sæpius:

℞. Syrup. de Lich. petr.

Alth. Fern. ana. ʒvj.

Roob Dianuc. ʒß.

Sambuc. ʒiß.

Aqu. Plantag. ʒiß.

Spec. diatrag. frig. ʒj.

Magist. ʒ n. diaph. ʒß.

M. d. ad Vitr. Usurpetur per cochlearia.

Pro' potu ordinario concedi potest Decoctum radic. Gramin. Hordei integr. Rasur. C. C. & Passular. minor. A Cibis acribus, falsis nimium, acidis abstineatur. Motus corporis vehementiores, atq; æstus aëris caveantur maximè. Vino, Spirituumq; ardentium potui serio est interdendum. Alvus naturâ vel arte quotidie libera esse debet. Venæsectio in Plethoricis, aut ubi sanguis in aliquali æstu est, non amittenda.

FAUCIVM EXVLCERATIO

Faucium
exulceratio.

est unitatis membranæ palati solutio ab humoribus acribus salino-corrosivis facta. Morbus frequens illis, qui scorbuticâ, aut venereâ sanguinis intemperie laborant, apud quos ejusmodi humores acres & corrosivi ad tunicam palati squamosam delabuntur, inibi què obhærentes corrosionem instituunt, & sic Ulcusculum modò unum, modò plura excitant, saniosam pituitam acrem fundentia. Salivatio cum Mercurio instituta similem quoque affectionem palati, ni præcaveamus, efficit. Luxurians subinde Caro, ut plurimum alba & solida, ex ulcusculis Faucium nascitur, quando succus nutritius allabens

bens copiosior admittitur, & in substantiam solidam spongiosam albam concrefcit.

Humores illi acres, qui talem producunt morbum, è primis viis Massæ humoralis communicantur; chylus itaque simili charactere imbutus, à Cibis falsis, acidis, acribus, à Potu acescente, à saccharatis, mellitis suppeditatus maximâ in culpâ erit; præprimis si nativa vel adventitia temperies scorbutico-hypochondriaca præcesserit. Concubitus dein cum hominibus Lue venereâ infectis huc contribuit, postquam scilicet sanguis hâc ratione totus fuit infectus, & salibus corrosivis imbutus. Tandem Inflammatio in Abscessum abiens Ulcus etiam post se relinquit, pro variâ humorû acrimoniâ varium.

Diagnosis.

Cognitu facilis hæc Exulceratio, modò palatum inspiciamus. Admittit tamen illa differentias varias respectu tam magnitudinis, quàm vehementiæ, temporis, aliarumque circumstantiarum. Etenim Exulceratio alia *superficiaria* est, alia *profunda*, ac *sinuosa*; alia *simplex*, alia *multiplex*, pluribus in locis contingens, aut cum carie subjectorum ossium, vel saltem cum luxuriante albâ rubrave carne conjuncta; alia *recens*, alia *inveterata*; alia *benigna*, minimè serpens, alia *maligna*, serpens, & exedens, *cancrofa*.

Prognosis

Interdum brevi facileque sanatur, si benigna nimirum, ac recens fuerit, difficulter autem sanabilis, quæ inveterata est, maligna, cancrofa, fistulosa, serpens; hæc enim len-

tam plerunque Febrim, ac mortem hecticam post se trahit.

Curatio absolvitur Ulcerosæ partis deterfione seu mundificatione, carnis, si quæ adest, corruptæ & excrefcentis sive luxuriantis consumptione, ac tandem consolidatione. *Deterfio* fit per *Gargarismata* ex abstergentibus concinnata, quemadmodum sunt *Decocta Radicum Gentianæ, Aristolochiæ rotund. ver. Angelic. Vincetoxic. Herbar. Absynth. Abroton. Sanicul. Pyrol. Millefol. Card. bened. Cent. min. v. gr.*

R̄. Radic. Aristoloch. rot. ver.

Rhabarb. Monach.

Gentian. ana. ʒß.

Herb. Marrub. alb.

Artemis.

Brunell. ana. Mj.

Summitat. Absynth.

Cent. min. ana. Mß.

Incisa coque parum in

Aquæ commun. vel

Plantag. ʒiijß.

Vin. alb. veter. ʒßß.

Colaturæ adde

Mellis rosac. ʒij.

Essentiæ è Myrrhâ, Aloë, Croco

& Rhabarb. cum Spirit.

Vini tartarificatio extract. ʒß.

Misce detur ad Vitrum, ac inde sæpius Os & Palatum tepidè eluatur.

Vel simpliciter *Rapæ* cum *Salviâ, Scabiosâ*, aut *Tanaceto* in *Aquâ* ac *Vino* decoquuntur, *Decocto Mel rosaceum* cum *Roob Sambuc.* permiscetur, & ita frequens gargarificatio instituitur. Finitâ autem tali *Faucium* elotione *Syrupus Papaveris rhæad. Violar.*

*Violar. purp. de Nymphæâ, Sceletyrbi-
cus, de Absynthio, cum Aquâ Plan-
tag. Taraxacon. Ulmar. Melle rosaceo,
Roob Dianuc. & Sambuc. junctus
cochleatim exhibetur. Vel Syrupus
è Decocto Cochlearum, Bellid. minor. ac
Plantagin. cum Saccharo fit, ac lam-
bendus sæpè traditur.*

Si luxurians adfuerit Caro, eaque
albicans, *speckicht*, corrosivis illam
detergere vel absumere remediis ten-
tabis; partem etiam forfice rescin-
dere studebis. Corrodentia usur-
pantur primò lenia, v. gr. *Aqua Cal-
cis viv. cum Essentiâ Aloës, Myrrh.
Pyrethr.* quibus tangitur sæpius Caro
luxurians calidè, ac palatum dein ite-
rum *Aquâ Pulegii, Salviæ & Cent.
min.* eluitur. Quibus nil efficienti-
bus ad *Unguentum Ægyptiacum* cum
Melle rosaceo permiscendum atque in-
ungendum, sed brevi rursus exspuen-
dum & eluendum acceditur. Si adhuc
efficacius desideretur remedium, *Spi-
ritus Vitrioli, Nitri aut Sulphuris* vel
per se adhibebitur cum penicillo, vel
prius *Melli rosaceo* commiscebitur.
Imò sunt, qui in casu necessitatis,
etiam *Lapidem infernalem, Butyrum
Antimonii, Mercurium præcipitatum,
vel Aquam phagedænicam* subinde ad-
movent, moxque iterum eluunt re-
medii corrodentis particulas. Alii
planè *actuali canterio* exurunt ejus-
modi excrementas.

Quando autem ita absumta est
omnis caro luxurians vel corrupta,
tum ulterius detergens & mundifi-
cans in usum trahendum, atque hunc
in finem *Lapis medicamentosus Crollii*

*Decocto radic. Aristol. Imperator. Ul-
mar. atque Gentianæ* dissolutus fre-
quenter adhibetur; vel locus ulce-
ratus sæpius tangitur *Essentiâ Myrrh.
Aloës &c.* ac deinceps *Mel rosaceum*
cum *pulvere Rubricæ fabrilis* adhibe-
tur donec consolidatio sit facta.

Quod si Exulceratio sinuosa aut
fistulosa fuerit, non alio quàm dicto
modo procedendum est in curatione;
si verò os cariosum subtus latuerit,
corrodentibus remediis *Ulcus* ampli-
ficandum est, usque ad ipsum os,
huic dein sæpius linteolum *Oleo de-
still. ac Pulvere Piperis, Euphorbii, Ireos
Florent.* imbutum admovetur, donec
exfoliatio cariosæ portionis facta fue-
rit, osque nudum ac sanum apparue-
rit. Hoc dein carne obtegetur novâ,
sicubi siccè tantum linteola fuerint ap-
plicata, aut non nisi prius conspersa
Pulvere radic. Ireos flor. extiterint.

Consolidatio demum promovetur
solo *Melle rosaceo, Roob Dianucum,*
cum *Pulvere Boli Armen. ½ nii diaph.
Rubricæ fabril.* ter pluriesve per diem
admoto.

Intus in tali Affectione aliquoties
*Infuso Fol. Senæ cum Rhabarb. vel Pi-
lulis purgantibus cum Mercurio dulci,*
vel *Syrupo de Cich. cum Rhab.* corpus
evacuabitur. *Decoctum traumaticum*
vel *Infusum fol. Théë, Sanicul. Virg.
aur. &c.* postea diu bibetur.

Si *cancrosum* fuerit *Ulcus*, exe-
dens, serpens, vel planè non tangen-
dum, vel *Decocto folior. Solani, Salv.
Geran. robert. Flor. Melilot. hortens.
Cochlearum nudarum cum Mercurio
dulci,*

dulci, ac *Magister. Saturni*, sæpius quotidie per longum tempus eluendum erit.

FAVCIVM CARO LVXVRIANS, vid. *Faucium Exulceratio*.

FAVI, vid. *Achores*.

Febris in genere.

FEBRIS in genere est præternaturalis quædam sanguinis fermentatio, cum lassitudine, siti, appetitu ut plurimum abolito, æstu corporis, pulsu celeri & frequenti, aliisque symptomatibus Hominem affligens.

Causa.

Oritur plerunque à circulatione sanguinis in capillaribus hinc inde vasculis impeditâ: quod impedimentum nascitur vel vitio feri sanguinei, acorem, crassitiem, & visciditatem quandam adepti; vel vitio pororum cutis & vasculorum capillarium, constrictorum à frigore qualicumque externi aëris, aut ab Aquâ frigidâ, cui sese forsan Homo immergit intempestivè; vel vitio humorum corrosivorum sanguini fluiditatem nimiam, imò dissolutionem malignam sive totalem conciliantium. Ut adeo diversæ causæ ad eundem scopum producendæ Febres colliment; primò enim *Aër* vel nimis æstuans sanguini fervorem aut dissolutionem, vel nimium frigidus eidem crassitiem, & visciditatem, simulque transpirationem cutis insensibilem præpediendo, accumulationem feri conciliat, sicque Febrim suscitât. *Cibi* sive boni sive mali copiosè nimis, vel intempestivè ingesti, chylum

crassum, lentum, ac viscidum exhibent, unde sanguis similis evadit. *Somnus* & *Quies* nimia humores accumulât. *Vigiliæ* & *Corporis exercitationes* magnæ vehementesque sanguini acrimoniam conciliant, ad producendos æstus febriles aptam. Neque *Ira* excessiva, *Terrorq;* panicus è numero causarum eximuntur, quando talium Mentis passionum ope *Spiritus animales* nimis agitantur, fibræ Cordis & Vasorum sanguivehorum ita percelluntur, aut crispantur, ut hinc facile motus humorum circulatorius perturbetur, illique hinc inde in suo transfluxu libero præpediantur.

Symptomata febrilia quamplurima sunt, sed facile tamen dictis è causis explicabilia. *Æstus* enim corporis totius ferventi sanguini debetur, per totum corpus circulanti. *Horror febrilis* Lymphæ acidæ, fibras panniculi carnosî constringenti & crispanti, adscribitur. *Sitis* à Salivæ defectu, ac Linguae ariditate suos plerunque natales trahit. *Appetitus abolitus* oritur à Lymphæ gastricæ inertia, crassitie, vel penuriâ, ob quam irritatio fibrarum Oesophagi contingere nequit. *Lassitudo* adest in corpore toto propter crassitiem humorum, indeque oriundam spirituum insufficientem quantitatem aliâs nervos omnes suâ elasticitate expandentem. *Dolor Capitis* stagnationi sanguinis, vasa membranasque molestè tendenti adscribitur. *Pulsus celer & frequens*, *Agrypnia*, spirituum & sanguinis agitationi vehementi attribui solet.

Urinæ.

Urinæ rubræ sunt plus justo, ob sulphureas particulas cum salinis copiosioribus intimius commistas. *Anxietas præcordiorum* vel saburræ cruditas stomachicarum, vel æstuantis sanguinis tardiori per pulmones decursui ortum debet. *Mentis alienatio* denique ab inordinato spirituum, ac fibrarum cerebri medullarium motu provenire unicè videtur. Hæmorrhagiam Narium aliarumve partium vel ab æstu copiosi sanguinis, vasa per nimiam tensionem rumpente, vel ab acrimoniâ ejusdem tubulos erodente deducimus. Constipatio alvi à crassitie vel penuriâ Lymphæ intestinalis; *Fluxus autem Ventris* à feri sanguinei nimiâ fluiditate originem trahit. Ut alia præteream.

Febris cujusque præsentia cognoscitur ex pulsu celeri ac frequenti, siti, urinâ plus justo tinctâ, lassitudine totius corporis, appetitu prostrato, tanquam è signis pathognomonicis, quibus dein plurima alia symptomata pro complexionum aliarumve circumstantiarû ratione junguntur. Plerunq; Febris à frigore, vel horrore aut etiam rigore per horam plus minus durante incipit, quem dein sequitur æstus toti⁹ corporis, sitis, anorexia &c.

Februm differentie sunt multivarie, etenim 1. Aliæ sunt *benignæ*, quæ cum mitibus, aliæ *malignæ*, quæ cum vehementibus symptomatibus homines affligunt, quæque sæpius *contagiosæ* & *epidemicæ* evadunt. 2. Aliæ sunt *continuae*, à principio ad finem sine intermissione durantes, aliæ *intermittentes*, quæ uno vel alte-

ro die intermittunt, ac de novo redeunt. Continuae *benignæ* sunt *Ephemera*, *Lactea*, *Hæctica*, *Lenta*, *Synochus*, & *Causus*: *malignæ* sunt *Morbus Hungaricus*, s. *Febris castrensis*, *Febris pestilens*, *Pestis*, *Sudor Anglicus*, *Variolæ*, *Morbilli*. Singulæ differentie seorsim in sequentibus pertactantur.

Circa Curationem is omnium *Curatio* optimè versabitur Medicus, qui post evacuatas primas vias, sanguinisque extractionem, lentorem humorum optimè incidere, sanguineo sero debitam fluiditatem conciliare, ejus acrimoniam edulcorare, dissolutionem imminuentem præcavere, ac denique symptomata probè mitigare studebit.

FEBRIS LACTEA, est Febris *Febris lactea* continua ut plurimum *Ephemera*, aliquot post partum diebus, cum levi horrore, æstu hinc, aliisque symptomatibus febrilibus subsequenter, Puerperas, dum Lac in Mammis confertim prorumpere incipit, affligens.

Accidit nimirum aliquot post partum diebus cum horrore, quem calor totius, plus minus intensus, sitis, mammarum intumescencia, lumborum dolor, inquietudo, vigiliæ, lassitudo, appetitus imminutus, subsequuntur. Quandoque simul Inflammatio aut Erysipelas Mammarum jungitur. *Diagnos.*

Producitur hæc Febris nunc à *Causa* Chylo tantillum crudiore, in Massam humoralem justo copiosius influente, & turbationem instituyente: nunc à retentis Lochiis, & aliqua parte in sanguine

fanguinem regurgitantibus ; nunc à chylosis particulis , copiosè & velut cum impetu in tubulos mammarios, nondum satis pervios irruentibus : nunc tandem ab ipsâ Uteri inflammatione , quæ si pertinacior sit , malignam simul atque deleteriam post se trahit Febrim. In omnibus enim hisce casibus intestinus particularum Massæ sanguineæ motus invertitur, vel certè augetur dum interea circulatorius ejus motus offendiculum inveniat.

Prognosis

Si *Prognosis* spectes , nisi Uteri obtingat inflammatio, aut alias Massa sanguinea crudioribus admodum particulis turgeat, Febris lactea neque periculosa est , neque diu durans. Si verò Lochia supprimantur pertinaciter, febris difficilior redditur, inque ardentem non rarò periculosam aut malignam mutatur.

Curatio.

Quoad *Curationem*, in principio statim si Alvus segnior aut prorsus suppressa extiterit , vel *Suppositorio*, vel *Clysmate emolliente* sollicitabitur, & commodè evacuabitur. *Suppositorium* concinnari potest vel ex *Globulis moschatis*, *Oleo Oliv.* intinctis, vel ex *Melle cocto* cum tantillo *Croci*; vel ex *Radic. Petroselin.* aut *Scorzoneræ*. *Clyisma* verò componetur ex decocto *Radicum* atque *Herbarum emollientium*, cum *Oleo rosaceo*, vel *violaceo*, atque *Melle* ; v. gr.

℞. Decoct. rad. & Herb. emoll. ℥j.
Mell. rosac. ℥i℥.
Ol. Amygd. d. Lil. alb. ana, ℥j.
Salis Gem. ʒ℥.

M. f. Clyster statim injiciendus.

Postea statim ad *diaphoretica* accedendum ; ubi m. ac v. *Lac Lun.* *C. C. philos. ppt.* ʒ nium *diaph.* *Oc.* *St.* ppt. *Ebur ppt.* *Unicorn. fossil.* *Te.* *sigillat.* ac similia ad ʒ℥. cum liquore conveniente exhibeantur ; simulque *Mixtura diaphoretica cochleatim* fapius propinetur, ex *Aqurs destilla.* *Fumar.* *Flor. Sambuc.* *Ulm.* *Scabi.* *Card. bened.* *Syrup. Fl. Tunic.* *Rub.* *Corall.* *Rib. de Beton.* *Bezoard. min.* *C. phil. ppt.* aliisque pulveribus anterecensitis sudoriferis confecta, v. g.

℞. ʒ n. *diaph.* ʒj.
Cryst. alb. ppt.
Lact. Lun. ana. ʒij.
C. C. phil. ppt. ʒij.

M. f. Pulv. subt. div. in 8. dos. æquales ad ch. m. ac v. sumendas.

℞. *Aqu. Fl. Samb. Scab. ana.* ʒi℥.
Syrup. Capill. ♀ r. ʒvj.
Bezoard. min. ʒj.
Matr. Pert. ppt. ʒ℥.

M. d. ad Vitr. Sumatur per cochlearia.

Si sudor subsequatur, quemadmodum impediri non debet , tum abstergendus ille diligenter venit , indusiumque probè siccatum admittendum. Mammæ ab externo probè muniantur frigore. Ciborum victus non nisi *Juscula* carniū, eaquē optima concedantur. Loco *Vini* bibat decoctum *Rasur. C. C.* cum *Hordeo*, & si placet *Hederâ terrestr.* vel *Aniso*, & *Liquirit.* *Ira*, *Metus*, *Tristitia*, *Motus* aut obambulatio nimia extra lectum fugiantur. Si *Lochia* non fluant, aut malè fluant, eo medendum est modo quem

quemadmodum suo loco demonstrabitur.

FEBRIS EPHEMERA sive **DIARIA**, πυρετὸς ἐφήμερος, est Febris continua benigna per diem tantum unum durans, nonnunquam verò etiam ad plures dies sese extendens, cum frigore aut horrore incipiens, & in æstum, tandemq; ipsum sudorem, aliamve crisin terminans.

Afficiuntur itaque primariò, sicut in Febris in genere omnibus, humores corporis circulantes, præternaturaliter fermentantes, secundariò autem Partes quoque solidæ.

Proximè Febris qualiscunque ephemera producitur à Lymphâ aliquâ austerâ, plus minus viscidâ ac tenaci, in vasis capillaribus, tubulisve lymphaticis Glandularum, ipsisque etiam vasculis earundem excretoriis hinc inde obhærente, stagnante, ac ita circulatorium sanguinis motum impediens. Lympha autem illa neque copiosa, neque insigniter acris aut viscida est, quoniam sic non Ephemeram, sed intensiorem continuam Febrim efficeret.

Occasionem porrò Ephemeræ præbet interdum subita pororum cutaneorum constipatio à frigore aëris externi, ad æstuans fortè, vel calidum satis corpus admissi, unde per regurgitationem, aut retropulsionem molecularum plurium statim humoralis latex in motu progressivo præceditus intestinum motum vehementiorem sive turbationem aut turgentiam quandam plus minus insi-

gnem adipiscitur, ipsamque adeo Ephemeram producit.

Antecedenter verò ad Lymphæ visciditatem contribuit Chylus minus probè in Ventriculo digestus, aut malè in Intestinis elaboratus, sive deinde id contingat liquoris gastrici, sive Diætæ vitio; quandoquidem & Cibi crassiores atque dyspepti, & Potus quicunque immodicè vel intempestivè ingurgitati, & exercitationes corporis nimiae, & Passiones tandem animi vehementiores, inprimis statim à pastu obvenientes, Ventriculi coctionem turbando, crudiorum ut plurimum Chylum producere possunt.

Pro varietate autem causarum plus minus fortium *Ephmera* differentias consequitur, ut alia quidem per 24. tantum horas duret, alia verò ad duos vel tres dies haud interrupto tenore extendatur, & *Ephmera plurium dierum* vocetur. Si verò ejusmodi Febris ultra aliquot dies mitibus cum symptomatibus perdurat, tum *Synoches*, vel *Continens* ejusque nunc *simplicis*, nunc *putridæ* nomen adipiscitur.

Quoad *Diagnosin*, incipit hæc Febris cum horrore nunc leni, nunc fortiore: sequitur hinc æstus totius corporis, cum lassitudine, siti; præcedente etiam quandoque vel somno graviore, vel frequenti oscitatione. Pulsus celer & frequens, in Plethoricis simul vehemens, æqualis, ordinatus. Interdum quoque junguntur nausea, oris amaror, vomitus, anorexia, cephalalgia, vertigo, vigiliæ,

Differentia.

Diagnos.

giliae, alvi segnicies, saliva viscida, & pauca, lingua sicca, inquietudines; urinæ evadunt croceæ sive plus justo tinctæ, crassæ, modò turbatæ, modò claræ.

agnositi

Quantum ad *Prognosin* attinet, Ephemera sæpius eodem modo, iisdemque cum symptomatibus, ac Febris maligna, Hominem affligere solet; proin minimè fidendum, & prægressa diæta sedulò venit examinanda, è cujus circumstantiis prudens Practicus facilè judicabit, num pejus quid, quam Ephemera, metuendum sit. In genere tamen Ephemera, si talis est & manet, nihil in se discriminis habet, quin Ægro sese maturè in lectum componente multoties intra 24. horas, frequenter & intra secundum, tertiumve diem cessat. Solvitur autem nunc sponte, nunc remedium debitorum usu; & quidem vel per sudorè, vel per diarrhoeam, vel per Narium Hæmorrhagiam. Aliquando etiam, ubi scorbutica salia, aliæve heterogeneæ particulæ in sanguine luxuriant, in Tumores adenosos, Furunculos, Abscessus, Erysipelata crurum aut brachiorum, Capitis intumescencias, Tubercula, Pustulas, aliæve Exanthemata cutanea terminatur. Reperiuntur homines, qui ob peculiarem humoralis Massæ dyscrasiam, vel levissimum ob errorem diætæ in Ephemeris cadunt.

curatio.

Quod si proin Febres contagiosæ grassantur, tum *Curatio* sicut in his instituenda venit. Aliàs verò statim ad primas vias attendendum, ex iisque causa antecedens cautè expellen-

da est, & quidem per lene vomitorium, ubi cruditates in stomacho nauseabundæ deprehenduntur; vel per lenitivum, si in Intestinorum tractum expansæ vel dispersæ notabuntur. Pro vomitorio inservire apud Adultos possunt seqq.

R̄. Oxyssacch.emet. Danj. Lud. ʒiij.
ad ʒß.

Aqu. Endiv.

Portulac. ana. ʒij.

Syrup. de Nymph. ʒj.

M. d. ad Vitr. pro dosi matutinæ.

Vel R̄. Crem. Fri ʒß.

Salis Abs. vel Card. ben. gr. vj.

Fri emet. gr. ij.

M. f. Pulv. subt. d. ad ch. pro dosi jejuno ventriculo capiendâ.

Pro lenitivo inserviunt Syrupus de Cich. cum Rhab. ad ʒiijß. Syrup. Ros. sol. compos. ad eandem dosin; Syrup. Ros. sol. s. Syr. Fl. Pers. aut Acac. Infusum Fol. Senæ cum vel sine Rhab. ad ʒiij. Vel

R̄. Radic. Scorzonæ, ʒiijß.

Herbar. Succis.

Agrim. ana. Pj.

Fol. Sen. opt. mund. ʒß.

Rhab. elect. ʒij.

Tamarind. pulpæ ʒvj. aut

Crem. Fri ʒj.

Semin. Fenic. ʒiij.

Incis. & cont. coque in s. q. Aqu. font. Colatur. ʒiij.

adde Syrup. Ros. s. s. ʒß.

Detur ad Vitr. pro dosi.

Vel denique Panacææ solutiv. alcalinæ doses aliquot, v. gr. tres, pluresve, quotidie mane cum tenui emulsione

Emulfione semin. 4. frigid. maj. capi-
piendo unam dosin continentem
scrupulos quatuor. Quòd si tamen
sanguinis inflammatio aut turbatio
gravior sit, tutius in principio statim
Clysmata infundentur, verb. gr. in
Adultis

℞. *Radic. Alth. Lil. alb. ana. ʒß.*

Herb. Malv. Mercurial.

Salv. Parietar. ana. Mj.

Flor. Chamomill. Miß.

Baccar. Juniper. Semin. carv.

Semin. Aquileg. ana. ʒj.

Incis. & contus. coqu. in s. q. Aqu.
font. Colaturæ ʒbj. adde

Mell. rutac.

Ol. Lil. alb. ana. ʒj.

Salis communis ʒj.

M. F. Clyster statim injiciendus.

Vel ℞. *Juscul. Carn. salit. ʒbj. adde*
Succ. Bet. recent. express. ʒiß.
Mell. rosac. ʒj.

Ol. Olivar. ʒiß.

M. F. Clyster statim injiciendus.

Alvo sic laxatâ *Venæsectionem* in
Plethoricis, iisve, quibus caput val-
dè dolet, pulsusque vehemens ac
plenus existit, non reformidamus,
modò ne crisis jam aliqua incipiat in
quamcunque partem corporis fieri.
Quandoque etiam *Cucurbitulæ cum*
scarificatione Venæsectioni substitui
possunt.

Deinceps verò unum aut alterum
diaphoreticum exhibeatur, ex *Anti-*
mon. diaph. Corall. rubr. ppt. Dent.
apr. ppt. Ocul. ʒ. ppt. Crystall. alb.
ppt. Corn. Cerv. phil. ppt. Bezoard.
min. Ebor. ppt. Pulver. Pannon. rubr.
& similib. cum *Roob Samb. Aqu. Fu-*

mar. Card. bened. Cherefol. Scab. Suc-
cisæ, aliave conveniente concinnan-
dum, v. gr.

℞. *Aqu. Succis. Cichor. ana. ʒj.*

Syrup. Capill. ♀ r. ʒß.

Diasc. Frac. ʒj.

$\frac{1}{2}$ n. *diaph.*

Ocul. ʒ. ppt. ana. gr. 15.

M. d. ad Vitr. Propinetur pro dosi
quotidie bis repetendâ.

Vel sequ. sumatur.

℞. *Aqu. Lactuc.*

Endiv.

Portul. ana. ʒj.

Syrup. Rub. id.

Corall. ana. ʒiij.

Bezoard. min.

C. C. phil. ppt.

Pulv. Pannon. rubr. ana. ʒß.

M. detur ad Vitr. pro dosi sæpè repe-
tendâ.

Indeque sudor pro *Ægri* commodi-
tate, vel copiosior saltem transpira-
tio insensibilis exspectetur; quibus
contingentibus Febris omnis solve-
tur, & promptè dissipabitur. Illâ
verò dissipatâ per aliquot nihilomi-
nus dies, autumnali præsertim ac hy-
berno frigido tempore, liberum *Æ-*
grotus vitare aërem debet, donec
appetitu plenè restituto nihil amplius
quoad recidivam Febris metuere pos-
sit. Si Ephemera solvitur in *Cutis*
exanthemata, pustulas, erysipelas,
capitis tumorem &c. tum *pulveres*
diaphoretici per aliquot dies m. ac v.
ab *Ægro* sunt capiendi, simulque
Mixtura quædam *diaphoretica* sicut
in aliis Febris cochleatim est propi-
nanda,

nanda, donec omne symptoma fuerit discussum. Pro Appetitûs, fortè adhuc deficientis, restitutione *Pulverem comendam⁹ stomachicum Birckm. vel Pulverem fol. Tanacet. Radicis Cichor. Tarax. fol. Card. bened. Absynth. &c. cum Sale essential. Citri, Limonium, Acetosell. Radice Aron. Corticib. Citr. &c.* Vel haustus unus atque alter *Aqu. stillat. Apii selini, Scabios. Nasturt. aquat. Card. bened. bibatur.* In *Dietâ Juscula* capiantur *carnium*, item *avenacea, hordeacea, farinacea*, herbis quoque *Lactuc. Acetos. Portulac. Endiv. Agrimon. Scabiosæ &c.* alterata.

Pro *Potu ordinario Ptisana* concedatur. Si Erysipelas, Furunculus, aut quid aliud Febri successerit, ei medebimur, sicut suis locis indigita-
vimus.

Febris
lenta

FEBRIS LENTA est Febris continua cum lassitudine, dysorexiâ, aliisque symptomatibus minus vehementibus paulatim Hominem consumens & emacians, à præternaturali massæ humoralis, serique sanguinei lentore, & acrimoniâ ortum trahens.

Fe-
brica.

FEBRIS HECTICA verò est Febris continua lenta, itidem Hominem lentè consumens, sed ab internæ alicujus partis exulceratione, infarctu, aut scirrho, vel à Fistulâ, Pædarthrocace, similive etiam externarum partium morbo originem ducens. Diversa autem nomina pro causarum varietate fortitur, quod si enim illa

sequitur ulcus Pulmonis, tum *Phthisis*; si ab obstructione tubulorum mesaraicorum, *Atrophia*; si à Lymphæ in Thoracis vel Abdominis cavitatem exundatione oriatur, *Hydrops pectoris*, vel *Ascites*; si ab exulceratione alius visceris, aut Fistulâ proveniat, *Hectica simpliciter vel fistulosa*; si porrò vermibus dorsalibus, aliisque succedat, *Comedones*, aut *Tabes* vel *Hectica verminosa*; si denique à seminis perpetuo fluxu ortum ducat, *Tabes dorsalis* vocari consuevit.

Unde concludere licet, gradua-
lem quandam existere inter *hecticam lentamq;* Febrim differentiam, ut *hectica* quidem omnis simul includatur *lentam*, sed *lenta* tamen etiam sine *hecticâ*, i. e. internâ alicujus partis viscerisque læsione contingere possit. Etenim Pars affecta in *Febri lentâ*, unde corporis nascitur tabes, non est nisi Massa humoralis, visciditate ac lentore quodam acriusculo pollens, & nullum adhuc internæ corporis parti solidæ læsionem afferens, quam deinceps cum temporis tractu, maximè per errores Diætæ, simul viscus unum alterumve infarciri vel exulcerari possit. In *Febri hecticâ* autem non solum massa sanguinea acris admodum & viscida observatur, sed & modò hæc modò illa pars solida simul læditur. Imò & externarum quarundam partium Fistulæ, Ulcerave cacoëthea sæpius *Hecticam* talem post se trahunt.

Utraque tamen Febris *immediatè*, atque *proximè* inducitur per particulas acido-plus minus acres, crudas, ac viscidas,

viscidas , sanguinem in continuâ quadam , lenique turbatione ita tenentes , ut non solum cum difficultate quadam per tubulos transmittatur, sed insimul insufficientes exhibeat moleculas nutritias, aptas poros solidarum partium subeundi, inibique obhærescendi. Suggestuntur autem sanguini illæ particulæ acres antecedenter, in *lentâ* quidem *Febri* ex ipsis primis viis , in quibus per varios in victûs ratione reliquâque Diætâ commissos errores , pituitosi crudique obperturbatam digestionem humores cumulati fuerunt. Quibus adde & Lumbricorum in ventriculo aut intestinis progenitorum copiam , nutrimentum sedulò absumentem. Sic non rarò Febris quædam plus minus maligna, aut continua imperfectè soluta talem post se trahit *lentam Febrim*, remanente præternaturali sanguinis crassitie nonnihil acri. Sicut etiam aliàs *Hecticam* post se relinquit, si materia morbifica corrosiva in partem quandam internam fuerit præcipitata , inque eâ corrosionem exulcerativam instituerit. *Macies* verò siue *consumptio* evenit, quatenus circulus in tali morbo humoralis massæ sui calore excessivo plus dissolvit, excutitque particulas nutritias , antea poris impactas , easque sic mobiliiores redditas, per insensilem copiosè abigit transpirationem. Cum autem mensium suppressio interdum ab eadem, quâ lenta Febris, causâ inducatur, occasionem dedit falsò credendi, eandem hecticæ vel lentæ simul apparentis Febris causam existeret. Fe-

bri hecticæ interim materiam suggerunt Ulcera sinuosa ac fistulosa tam internarum quàm extern. partium, spina ventosa, Comedones & Crinones, Seminis aut Urinæ nimia profluvia, infarctus internorum viscerum , imò & ipsæ serosi humoris extravasationes, unde particulæ crassiores, salino-acres & corrosivæ in sanguineum laticem quâ datâ portâ intromissæ , vel inibi relictæ nutritium ejus succum minuunt , corrumpunt , aut etiam corrosivum reddunt , nutritioni partium minimè convenientem.

Quoad *Diagnosin*, *Febrim lentam* *Diagnos
is
Febris
lenta.* indicant appetitus imminutus , virium languor , carnis tarda consumptio , pallidus faciei color , frigora extremorum vel etiam totius corporis facilia , horripilationesque frequentes , pulsus frequens, justo celerior, atque naturali debiliior , urinæ splendidæ, magis flavæ, sæpè & crassiores lixiviosæ , saliva nonnihil viscida , aut vappida , plerunque ingrati saporis ; præterea nulla læsæ cujusdam partis internæ signa, sed solius lentoris sanguinæ massæ indicia adsunt , qualia quidem existunt, præter jam dicta , etiam alvi segnities, levis interdum cordis palpitatio ; arteriarum visibilis in collo aut fronte pulsatio, mensium aut hæmorrhoidum suppressio , quandoque & capitis obscurus , aut magis intensus dolor , somnus perturbatior.

Febrim hecticam autem produnt *Hectica.* pulsus frequens & celer , respiratio offensa, vires quotidie magis deficientes , consumptio totius paulatina,

urinæ lixiviosæ, splendentes, sitis frequens, salivæ penuria, appetitus magis quàm in *Lentâ* imminutus, somnus irrequietus cum frequenti sudore colliquante: quibus simul junguntur symptomata læsionem alicujus partis, ut plurimum internæ graviores subsequens, suisque locis exponenda, v. g. in Phthisi, Scirrhus Hepatis vel Glandularum Mesenterii &c.

Prognosis

Si *Prognosis* spectes, uterque Affectus tanto periculosior, quanto magis eorum causa morbifica est radicalis. Lenta Febris hinc facile in hecticam mutatur, per erosam vel obstructam quandam glandulosam partem, & sic tandem lethalis evadit, quæ per se neminem è medio sustulisset; hectica verò non sanatur, nisi pars affecta eandem fovens suæ integritati fuerit restituta: facilius autem est, lentum atque viscidum sanguinem, qui Febrim producit lentam, ad pristinum suum vigorem volatilitatemque balsamicam reducere, quàm læsionem visceris interni corruptivam aut scirrhusam emendare. Si Ager summè emaciatus existit, viribusque exolutus, & nocturnis sudoribus diffuat, tum citato ad mortem gradu progreditur.

Curatio Hectica.

In *Curatione* Febris *hectica* quidem peculiarem heic medendi methodum non requirit, quando pro sui causâ non nisi alium quendam Morbum agnoscit, cujus sanandi ratio suo proin loco exponitur.

Lenta.

In *lentâ* autem Febri unicè prope modum eo adnitendum est, ut san-

guinis massa à suo lentore ac visciditate pituitosâ liberetur, ac subtilitati balsamicæ restituatur; quod quidem fieri debet partim per ea, quæ liquoris gastrici naturalem volatilitatem reparare valent, partim per ipsius humoralis massæ attenuationem, blandè volatilibus alcalino-salinis remediis perficiendam. Quamobrem ante omnia ventriculum & intestina oportebit eluere, vomitorio quidem, si cruditates stomachi nimis viscidæ id requirant, & vires Aegri permittant; sed heic comendamus *leniora*, aut fractâ dosi exhibita, quando tutius arbitramur, repetitos vomitus excitare, quàm unâ vice corpus nimis exagitare; Syrupus itaque emeticus Angel. Sal. Tartarus emeticus cum Crem. Fri, Antimonio diaphor. aut Arcano dupl. Mynsicht. nec non Aqu. bened. Ruland. Oxysacch. emet. D. Lud. Radix Asari pulveris. cum Mercur. dulc. & Sale quodam lixiv. mira præstare possunt. v. g. in Adultis.

R. Oxysacch. emet. vel

Syrup. emet. A. Sal. ʒiij. ad ʒß.

Aqu. Fœnic. ʒiij.

M. detur ad Vitr. pro dosi matut.

Vel R. Aqu. bened. Rul. ʒß. ad ʒvj.

Syrup. de Nymph. ʒij.

Tinct. Corall. vel

ʒ niii ʒß.

M. detur ad Vitr. pro dosi matutinâ.

Vel R. Pulv. Ipecacuann.

vel Radic. Asar. ʒß.

Crem. Fri gr. iij.

M. f. Pulv. subt. d. ad ch. pro dosi matutinâ.

Vel R. Crem. Fri ʒß.

Fri

¶ *ri Vitriolat.* gr. iiii.

Salis Absynth. gr. iij.

Gumm. Gutt. gr. j.

¶ *ri emet.* gr. j.

M. f. Pulv. subt. d. ad ch. pro dosi.

Si autem locus vomitorio nullus est, blandè catarthicum per vices exhibetur; ubi Veterum more tutius *Infusum fol. Sen. ac Rhab.* vel *Syrup. quendam purgantem* justâ dosi unciarum duarum vel plurium dari credimus, quàm quævis acriora, è resinosis inprimis parata pharmaca, v. gr.

℞. *Syrup. Ros. f. f. vel de Cich. cum Rhab.* ʒiij.

Aqu. Nasturtii aquat. ʒvj.

Fl. Acac. ʒß.

M. d. ad Vitr. pro dosi matut.

Præmissis verò his statim ad antihectica præscribenda Medicus se accingat; quæ quidem varia à variis commendantur; à nobis tamen omnium optima fuerunt deprehensa, quæ blando sale volatili alcalino magis quàm fortiter oleoso, lentorem totius massæ humoralis corrigere, volatilitatem menstrui stomachici resuscitare, sicque digestionem meliorem stabiliendo, chylumque sensim laudabiliorem producendo, sanguinem laticem pristino vigori, florique restituere apta sunt. In hunc censum referimus *Succos plantarum anti-scorbuticarum recenter expressos & filtratos*, ad tres uncias m. ac v. exhibendos, vel *Aquas earundem plantarum destillatas*, sex unciarum dosi m. ac v. per plures hebdomadas propinandas: inprimis ex *Cochleariâ, Nasturt. hortens.* vel *aquat. Beccabungâ,*

Piperitide, Chelidonio maj. & minor. Ulmar. Trifol. fibrin. Cardamin. Cherefol. Plantag. aquat. Fenicul. Inprimis heic prodest *Destillatum Hippen-terorum cum herbis nasturcinis m. ac vesp. ad ʒij. vel tres sumtum.* Poterunt verò semper post assumptos ejusmodi potus Juscula hauriri, modò horæ intervallum intercedat. Talibus tamen remediis simul intercalare licet stomachica, aliâq; acidum absorbentia aut invertentia, viscidumque incidentia ac resolventia, sub formâ *Pulverum* aut *Pilularum*, è terreis salinis, blandè aromaticis aut sulphureis composita, quemadmodum sunt; *¶rus Vitriolatus, Arcanum dupl. Myns. Salia Helen. Ononid. Cent. min. Absynth. Angel. C. C. phil. ppt. Croc. Mart. aperit. Bezoard. min. Diaph. Martial. ʒ vial. Specif. antihect. Poter. Ebur ppt. C. C. phil. ppt. Salia volatilia* qualiacunque v. g. *C. C. Viperar. Fulig. Milleped. &c. Radic. Angelic. Chelidon. maj. Raphan. rustic. Aron. Ireos flor. Zedoar. Pulvis folior. Pilosell. Rutæ murar. Trichomanes, Extract. Trifol. fibrin. Cochlear. Fumar. Absynth. v. gr.*

℞. *ʒn. diaph.* ʒij.

Specif. antihect. Pot.

Radic. Ireos Flor.

Fol. Trichoman.

Ocul. ʒ. ppt. ana. ʒj.

Arcan. dupl. Myns. ʒß.

Sacch. alb. ʒß.

M. f. Pulv. subt. d. ad Scat. Dosis ʒß. vel ʒij. man. ac vesperi.

Vel ℞. *Ebor. f. igne ppt.*

Specif. stomach. Poter.

C. C. phil. ppt.
Fol. Pilosell. ana. ʒj.
Radic. Zedoar. ʒß.
Salis volat. Fulig.
Semin. Anis. ana. ʒj.
Sacch. cand. alb. ʒj.

M. f. Pulv. subt. d. ad Scat. Dosis ut supra.

Vel R̄. Extract. Trif. fibr.
Absynth. ana. ʒß.
Zedoar. ʒß.

Diaph. ʒial.
Cinnab. ʒ n. opt. ana. ʒij.
Essent. Trifol. fibr. q. s.

M. f. l. a. Pilulæ granor. duor. pondere, inaur. d. ad scatul. Dosis 10. vel 12. m. ac v.

Subinde per aliquot dies *Sal volatile oleosum Sylvii*, vel simile quaecunque aliud simul usurpari potest, dos. 15. 18. 20. guttarum.

In *Dietâ*, si Vinum noceat dilutum, Ptisana ordinaria bibatur. Cibi sumantur succi boni, facile coquibiles, Nasturtio, Raphano rusticano, aromatibusque blandè aromatizzati: saccharata, verò caseosa, acida, austera, mellita admodum nocent. Juscula frequentia optima. Tristitia, Ira &c. fugiantur.

Si Menses vel Hæmorrhoides sint obstructæ, suo modo medebitur. Inprimis heic aliqua Venæsectio institui potest, vel Cucurbitulæ cum scarificatione dorso applicabuntur.

FEBRIS SYMPTOMATICA est ea species Febris, quæ morbum alium ceu causam suam sequitur, ejusque proin Symptoma vocari potest:

vel quæ grave aliquod Symptoma pro suo comite habet. Hinc etiam pro Morborum varietate diversa nomina sortitur, & nunc *phlegmonodes*, si Inflammationi succedit: nunc *typhodes*, sive *stupida*, si vel obstructionem Cerebri, vel Erysipelas alicujus Visceris interni sequatur, & stuporem aliqualem comitem habeat: nunc *Lipyrria*, si Inflammationem quandam internæ partis insignem subsequatur: nunc aliis etiam nominibus exprimitur, quemadmodum in sequentibus proximè descriptionibus patebit.

FEBRIS PHLEGMONODES s. **INFLAMMATORIA**, est Febris continua benigna, plus minus intensa, quæ Inflammationi partis cujusdam externæ superaccedit, eaque curatâ simul tollitur. Sed hæc nihilominus quædam interna remedia quoque postulat diaphoreticâ, qualia in *Febri Ephemera* commendata fuerunt.

FEBRIS TYPHODES, est Febris continua maligna, cum stupore, aut mente attonitâ, originem ducens ab Erysipelate cujusdam partis internæ, vel etiam obstructione Glandularum cerebri; eamque prorsus curationem exposcit, quæ in *Febri maligna* est descripta.

FEBRIS LIPYRIA, est Febris continua maligna ab Inflammatione erysipelaceâ, vel etiam Gangræna cujusdam partis internæ originem ducens, ac ita affligens, ut interna penè

penè omnia perpetuo æstu quasi exurantur, externa autem frigeant. Curatio eadem cum Curatione Febris malignæ.

FEBRIS EPIALA est species Febris intermittens, & quidem quotidianæ, in quâ uno eodemque tempore in eadem parte calor & frigus simul excitantur, & aliquandiu percipiuntur, originem ducens ab obstructione Glandularum subcutaneorum per pituitam quandam acidouiscidam & viscidam, in sudorem difficulter solubilem. Cessat hinc, quamprimum Febris ipsa curata aut profligata erit. Vide titulum de *Febri quotidiana*.

FEBRIS SYNCOPALIS, est Febris continua maligna, cum Syncope sive gravi animi deliquio periculose affligens, & ab interceptis ad musculum Cordis spiritibus animalibus originem ferè ducens: cujus Curatio proin ad Febrim quoque malignam pertinet.

FEBRIS ASSODES est Febris continua maligna, cum inquietudinibus, ardore cutis pruriente, jestigationibus membrorum, anxietate, cardialgiâ, fastidio rerum omnium, atque tensione Hypochondriorum conjuncta, & orta à particulis valde mordacibus, pungentibus, & acerbis cum massâ humoralis jugiter circulantibus, ac in extremitate vasculorum suis spiculis vicinas quasque fibrillas membranaceas assidue roden-

tibus & lancinantibus. Hinc in curatione requirit valdè diluentia, absorbentibus sociata remedia.

FEBRIS ELODES sive **SV-DATORIA** est nunc maligna continua, cum colliquativo sudore conjuncta, aliàs **SVDOR ANGLICVS** dicta; nunc Febris hectica, in quâ homo perpetuo ferè, inprimis nocturno sudore diffluit, & emarcescit. Prioris curatio suo loco exponetur, posterioris autem medela superius jam est indigitata.

FEBRIS PESTILENS est Febris continua maligna, cum gravissimis symptomatibus, inprimis autem maculis, varii coloris in cute efflorescentibus, linguæ nigritie, anginâ, delirio, vertigine, convulsionibus, vomitu, diarrhoeâ, narium hæmorrhagiâ, subinde etiam bubonibus pestilentibus hominem graviter affligens. Cujus genesis atque curatio sub Febri maligna in genere spectanda, utpote cum quâ coincidit.

FEBRIS PETECHIALIS est Febris continua maligna cum Petechiis, sive maculis parvis nunc nigris, nunc lividis, aut cœruleis, nunc etiam rubicundis per totam cutis peripheriam dispersis conjuncta; ac à particulis salino-corrosivis viscidis in extremitate tubulorum cutaneorum obhærentibus oriunda. Cujus curationem quoque eandem esse credimus cum Febris malignæ extirpatione.

FEBRIS

Hunga-
rica.

FEBRIS HVNGARICA s. **MORBVS HVNGARICVS** aut **CASTRENSIS** est Febris pestilens cum insigni Capitis dolore, imò & Phrenitide, aliisque malignis symptomatibus, milites in Hungariâ ut plurimum gravissimè invadens; plerunque à verminosâ sanguinis corruptione originem trahens; & eandem cum Febri maligna curationem admittens.

Hemitry-
tans.

FEBRIS HEMITRITÆVS est Febris continua maligna, alternis quibuscunque diebus plus minus graviter, cum vehementibus symptomatibus Hominem excrucians. Ad Malignas proin spectat, inferius paulo explicatas.

Febris
synochus.

FEBRIS SYNOCHVS SIMPLEX, est Febris *continua benigna*, seu præternaturalis Sanguinis effervescencia, plerunque cum frigore, aut horrore incipiens, hincque in Æstus continuum transiens, & siti, lassitudine, appetitu prostrato, aliisque symptomatibus minus periculosus aut vehementibus comitata, ortum ducens ab humoribus crudis, viscidis, acido-acribus Massæ sanguineæ crasin turbantibus.

Ætiolo-
gie.

Etenim si vel transpiratio cutanea subito, aut diu multumque impediatur, vel sudor longius profluens confestim reprimatur; vel stomachus aliquandiu malè concoquens crudum sanguini transmittat chylum, vel alio quocunque modo crudiores particulæ humoralis Massæ infundantur,

sicque eadem ad turgescentiam repletur, vel assurgat, tum primò crassior ejusmodi sanguis in minimis canaliculis transitum non inveniens retrofilit; postea verò plurimis in locis retrocurrens, ac succedentium aliarum guttularum sanguinearum motui resistens, paulatim turbationem instituit, sive motum intestinum plus min⁹ auget, unde sanguis præternaturaliter effervescens Febrim accendit, *benignam* quidem illam, eo quòd heterogeneæ particulæ sanguinis non admodum acres & corrosivæ sint; *continua* verò simul, quoniam eadem particulæ continuò in sanguinis latice permanent usque ad declinationem vel finem morbi; cum è contrario in *intermittentibus* Febribus secretio fiat humoris turgescentis in quolibet paroxysmo, per sudorem sive per insensibilem transpirationem.

Quoad *Diagnosin*, Febris hujus præsentiam designat subitanea vel paulatina invasio cum horrore, per horam plus minus durante, quem sensim calor totius corporis insignis sequitur, atque comites simul habet sitim, lassitudinem, & anorexiam. Hisce verò symptomatibus non usque adeo vehementibus etiam junguntur subinde Nausea, Vomitus, Oris amaror, Cephalalgia, Vigiliæ, nonnullaque alia accidentia, quæ non cessant primo aut secundo die, sic enim *ephemeram* tantum Febrim indigitarient, sed subsistunt per octo, decem pluresve dies, dissimili tamen cum vehementiâ, usque dum morbus sive per sudorem, quod frequentius con-

tingit.

tingit, siue per largum Urinæ vel Alvi fluxum, siue etiam per Hæmorrhagiam narium, siue per paulatimam insensibilem transpirationem solvatur. Distinguitur à Febri malignâ, quòd in hâc Symptomata omnia vehementiora, atque insuper longè periculosiora, propter humoris peccantis vim corrosivam & deleteriam, observentur.

Quantum ad Prognosin, Febris hæc uti benigna est, ita non malum exitum portendit, si verò in Diætâ errores contingant, tum etiam in malignam ac lethalem mutari potest.

In Curatione statim à principio oportet primas eluere vias, quod præfente nausæâ atque gravante dolore stomachi non melius quàm emetico perficitur: v. g. pro Adulto:

℞. Crem. Fri ʒß.

‡ n. diaph.

Salis Cent. min. ana. gr. v.

Fri emet. gr. ij.

M. f. Pulvis subtil. d. ad ch. sumatur statim pro dosi.

Vel ℞. Syrup. emet. Angel. Sal. ʒiiß. vel ʒß.

Aqu. Cichorii ʒij.

Cinnam. bugl. ʒiß.

M. ad Vitr. sumatur pro dosi.

Vel ℞. Radic. Asar. pulv. ʒß.

Crem. Fri ʒß.

M. f. Pulv. subt. pro dosi.

Vel ℞. Crem. Fri gr. vj.

Salis Absynth. gr. iij.

Gumm. Gutt. gr. viij.

Olei dest. Mac. gutt. j.

Sacchar. gr. iv.

M. f. Pulv. subt. d. ad ch. pro dosi.

Si ob varia impedimenta non licet vomitum instituere, tum Clyisma unum aut alterum primâ atque 2. die morbi injiciatur, v. gr.

℞. Radic. Cichor. Lil. alb. ana. ʒß.

Herb. Portulac.

Branc. ursin.

Agrimon. ana. Mj.

Flor. Melilot. Mß.

Semin. Carvi ʒij.

Incis. & contus. coqu. in s. q. Aqu. font. colaturæ ʒxij. adde

Olei Olivarum ʒiß.

Electuar. lenit. vel

de Hierâ Logad. ʒvj.

Salis commun. ʒij.

M. f. Clyster statim injiciendus.

Juxta Clyisma tale ad incidendas & præcipitandas cruditates stomachi magno cum fructu tres vel quatuor doses Pulveris seqq. ordinabuntur, quæ vicem Vomitorii aut Purgantis præstare innoxie possunt.

℞. ‡ nri diaph.

Ocul. ʒ. ppt.

Salis Absynth.

Card. bened. ana. ʒß.

M. f. Pulv. subt. in 4. dos. æqu. ad chart. dividendus, quarum dosis m. ac v. cum vehiculo Aquæ destill. Scabiosæ vel Cherefol. aliisve dabitur.

Vel ℞. C. C. phil. ppt.

Bezoard. min. ana. ʒß.

Flor. Sal. armon. hæmat.

Salis Centaur. min. aa. gr. xv.

M. f. Pulv. subt. in 3. dos. æqu. divid. ad ch. m. ac vesp. sumend.

Horâ dimidiâ vel integrâ post pulverem propinetur Jusculum, neque sudor vel expectetur, vel cum incom-

H h h

modo

modo proliciatur, sed naturæ totum operationis negotium permittatur.

Postmodum verò statim, ubi Vi-
res constant, pulsus fortis ac plenus
est, *Venæsectio* una, vel etiam secun-
da est administranda, ac deinceps ad
sudoriferorum præscriptionem & ex-
hibitionem deveniendum, quorum
tamen usu non magnâ statim vi su-
dor exprimatur, sed paulatim intra
aliquot dies expectetur spontanea
ejus eruptio, utpote quæ sic facilius,
atque felicius contingit, modò plu-
res sudoriferorum doses, sensim in
sanguinem intromissæ, crudiores ejus
particulas multum attenuârint, quâ
certè attenuatione nondum factâ su-
dor non nisi magno cum labore, imò
irrito plerunque conatu extorquebi-
tur, dum heterogeneæ particulæ fe-
briles nondum ad ejusmodi secretio-
nem sufficienter præparatæ, ac à vi-
sciditate suâ liberatæ sunt. *Diapho-
retica* autem seqq. sub formulis ordi-
nari possunt:

℞. Ebor. ppt.

C. C. phil. ppt.

℥ nîi diaph. ana. ℥iiij.

M. f. Pulv. subt. divid. in 8. dos. æqu.
ad ch. m. ac v. dandas.

Vel ℞. ℥ nîi diaph. aut

Bezoard. min.

C. C. phil. ppt.

Dent. apr. ppt.

Ocul. ☉. ppt. ana. 3℞.

M. f. Pulv. subt. in 6. dos. æqu. ad
ch. dividendus.

Si alvus segnior fuerit Pulveres ita
parentur.

℞. Magist. ℥ nîi diaph.

Ocul. ☉. ppt. ana. ℥ij.

Lapid. prunell. ℥j.

M. f. Pulv. subtil. in 4. dos. æqu.
divid. ad chart.

Vel ℞. Pulv. bezoard. Senn.

Bezoard. min. ana. ℥iiij.

Nitr. ℥ iat. ℥ij.

M. f. Pulv. subt. in 8. dos. æqu. di-
vid. ad ch.

Si verò alvus laxior extiterit, pul-
veres sequentes magis proficui sunt.

℞. Bol. armen. vel

Terræ sigillat.

Unicorn. fossil. ana. ℥iiij.

℥ nîi diaph. ℥ij.

M. f. Pulv. subtil. in 8. dos. æqu. ad
ch. divid. atq. m. & v. dand.

Vel ℞. Corall. rubr. ppt.

Mandib. Luc pisc. ppt. ana. 3j.

C. C. usti ppt. ℥ij.

Radic. Tormentill. ℥j.

M. f. Pulv. subtil. in 6. dos. æqu. ad
ch. divid.

Hi pulveres cum Emulsione amyg-
dalinâ seqq. dabuntur.

℞. Amygdal. dulc. rec. excort. 3iiij.

Semin. Cucum.

Card. bened.

Nap.

Aquileg. ana. 3j.

Aqu. Bursæ pastor.

Agrimon.

Ulmar. ana. 3ij.

F. l. a. Emulsio, cui adde

Sacch. ros. tab. 3ij.

D. ad Vitr.

Alias intercalari potest *Mixtura*
cardiaco - diaphoretica per cochlearia
sumenda; v. gr.

℞. Aqu.

Rx. Aqu. Succis. Borrag.
Card. mar. Flor. Acac.
Syrup. Rub. id. ana. ʒj.
Ebor. f. ign. ppt.
Matr. perlar. ppt.
Bezoard. min. ana. ʒj.
Misc. d. ad Vit.

Hiscæ per unum vel alterum diem diligenter usurpatis, observatoque bono Diætæ regimine, si sudor, vel major transpiratio succedat, tum naturæ hic conatus promovendus adhuc est continuato diaphoreticorum usu, quem tamen ita moderari oportet quoad doses, ut nullus inde sudor colliquativus succedat, vires nimio-
 perè atterens, aut planè exhaustiens.

Quando autem solutio Morbi per alias contingit secretiones, tum hæc non statim veniunt sistendæ, sed potius Naturæ vires ita corroborandæ, ut faciliè illas ferre, atque hinc simul ab omni morbo liberari queat. Quem in finem profunt nunc *Mixturæ roborantes*, nunc *Electuaria cardiaca*, prout Æger ad hoc aut illud magis remedium sumendum propensus est.

Rx. Aqu. Borrag. Bugloss.
Fl. Acac. ana. ʒj.
Syrup. acetos. Citr. ʒvj.
Julep. rosac. ʒij.
Confect. Alk. ʒij.
Matr. Perl. ppt.
Unicorn. fossil. ana. ʒj.
Misc. d. ad Vit. sumatur cochleatim.
 Vel *Rx. Conserv. Ros. rubr. f. Vitriol.*
Anth. ana. ʒvj.
Nuc. Ind. cond.
Conditur. Cydon. ana. ʒj.
Corall. rubr. ppt.

Bezoard. min. ana. ʒʒ.
Confect. Alk. ʒij.
Syrup. Fl. Tun. q. s.

F. Mixtura ad formam Opiatæ, d. ad Oll. ac subinde Nucistæ magnitudo de eâ lambatur.

Quoad Diætam, profunt hæc maxime Juscula carniū optima, item hordeacea, avenacea, herbis etiam, si placet, quibusdam utilibus alterata, quemadmodum *Acetosa hortens. Cherrefolium, Bttrago, Lactuca, Pimpinella &c.* A Vino abstinendum, eiusque loco *Decoctum Liquirit. Hord. Passular.* vel etiam *Cichorii* bibendum. Tandem aër temperatus seligendus, & ab *animi passionibus* sibi valdè cavendum. Ubi Morbus fuerit solutus, ac ciborum appetitus non nihil rediit, corpus est *Syrupo* quodam *laxativo* expurgandum, sicque Curatio omnis finienda.

FEBRIS ARDENS I. CAUSVS *Febris ardens.*
 est Febris continua benigna fortior, cum vehementi capitis dolore, ardore insigni totius corporis, vigiliis, atque siti inextinguibili, oriunda à feri sanguinei magnâ viscositate, circulationem humorum in vasorum extremitatibus præpediente, ac eorundem crasin admodum turbante. Quando hæc Febris exacerbationes aliquas quotidie, vel alternis diebus patitur, tum continua quotidiana vel tertiana audit.

Generatur hæc Febris planè sicut *Causa.* Synochus simplex, veruntamen in eo differententia existit, quod serum in *Causa* longè viscosius existat, secretionē

tioque Lymphæ in glandulis quamplurimis difficilius contingat ; hinc enim, propter majorem humorum in vasis Meningum stagnationem, indeque factam obstructionem membranarum fibras tendentem, & arterias quoque majores prementem, cephalalgia insignis, dolor valdè pulsans, atque oris siccitas magna, cum siti inextinguibili, virium lassitudine molestissimâ, & æstu corporis totius ingenti oboritur. Graves in Diætâ commissi errores, comestationes & computationes insignes, ira vehemens, exæstuatio corporis nimia in motu excessivo, Aëris deniq; æstus maximus huic morbo ansam crebram præbent.

Diagnos.

Signa diagnostica, quibus hæc Febris à Synocho simplici dignoscitur, sunt in ipsâ definitione expressa ; si enim præter ordinaria Febreos symptomata, maximus totius corporis æstus, isque nonnihil durans percipitur, si setiam vehemens ac pulsans capitis dolor perseveret, cum maximâ sive clamorâ siti, & anorexiâ atque vigiliis perpetuis, tum protinus hunc Morbum appellare licebit *Febrim ardentem s. Causum*. Benigna tamen hæc febris adhuc est, quoniam nec magna statim in principio est virium jactura, nec anxietas pectoris observatur, nec etiam inquietudines, atque jectigationes insignes, vel deliria heic deprehenduntur, quæ aliàs solent esse malignitatis indicia.

Prognosis

In *Prognosi* tamen notandum, quòd hæc Febris in malignam & lethalem mutari facile possit, si vel in

curandi methodo, vel in diætâ errores committantur. Aliàs verò etiam per se periculosa satis esse solet, quia acuta est, sua tempora brevi satis spacio absolvens ; unde juxta *Hippocratem*, atque teste etiam experientiâ Causi intra 14. dies aut liberando aut perimendo Ægrum decernuntur. Funestum etiam ferè morbum esse prædicunt ætas senilis, aut puerilis, urina turbida sine sedimento, vel intense rubicunda ac tenuis sine nubeculâ, pulsus parvus ac debilis, oculi torvi, vigilæ perpetuæ, hæmorrhagia, diarrhœa, aliæve secretiones sine levamine, imò cum majore virium jacturâ, convulsivi motus atque tremores artuum, titubatio linguæ, quotidiana denique exacerbatio, cum virium deperditione perpetim majori.

In *Curatione* prorsus eâdem ratione est procedendum, quemadmodum in *Synocho simplici*, ut heic duntaxat nobis sit ratio habenda symptomatum maximè urgentium. Itaque juxta usum *remediorum antifebrilium* præcedenti titulo descriptorum, pro *Capitis dolore Epithemata* fronti applicentur, parata ex *Angelicâ erraticâ, Verbenâ, Melissâ, Portulacâ, Malvâ, Hederâ terrestri, Sempervivo, Verbenâ, Majoranâ, Rutâ, Baccis Juniperi*, quantum quidem recentes haberi possunt ; nec non è *Cochleis, vel Cancris vivis, Micâ Panis*, ac similibus invicem contusis, ac insuper *Albumine Ovor. permixtis*, simulque *Aceto rosaceo, rutaceo, sambucino, prophylactico, vel Spiritu Vini aut theriacali camphorato* calente perfusis.

sis. Sunt tamen, qui melius habent ex seqq.

℞. *Aqu. Solan. Rosar. alb.*
Spermat. Ranar.
Spirit. Vin. Camph.
Aceti rutac. ana. ℥i℔.

*M. ad Vitr. sæpius calefiat, ac lin-
 tea eidem immersa, expressaq; calidi-
 usculè fronti applicentur.*

Temporibus verò inungitur sequ.

℞. *Ungt. de Alab. vel*
Popul. ℥ij.
Ol. Sem. Hyosc. expr. 3j.
Camphor. ℔℔.

Laud. opiat. gr. iiij.
M. f. Ungt. detur ad Oll.

Plantis pedum apponuntur quo-
 que *Radices Raphanorum* contusæ,
 cum *Rutâ*, *Fermento panis* atq; *Aceto*.
 Alii etiam cum fructu *Lienem Bovis*
recenter extractum in duo dividunt, &
 admovent. Si his non obstantibus
 dolor perseveret, protinus vertex ca-
 pitis est detondendus, ac postea *Pul-
 lus gallinaceus*, vel *Columba viva* per
medium secta, adhuc calens applican-
 da, inibique per tres quatuorve ho-
 ras relinquenda, donèc foetidum odo-
 rem exspirare incipiat. Applicant
 nostrates etiam carpis manuum *Radi-
 ces Petasitidis, Imperatoriæ, Angeli-
 cæ, Pæoniæ, recentes*, in taleolas dis-
 sectas; vel frusta *Citri succulenta* cum
Luto, Limo, Telis Araneæ, &c.
Venæsectio non semel tantum, sed
 aliquoties etiam administrari potest,
 urgente *Cephalalgia* & æstu sangui-
 nis. *Cucurbitulæ* quoque cum scarifi-
 catione dorso, *Hirudines* ano appli-

cantur interdum. *Raminas* denique
venas cum fructu aperies.

Interea intus sequentes *Pulverum*
diaphoreticorum doses exhibeantur.

℞. ℥nii diaph.
Lapid. prunell. vel
Nitr. ℥niat. ana. ℔j.
Bezoard. min. ℔℔.
Camphor. gr. vj.

M. f. Pulv. subtil. in 2. doses æqu.
divid. ad ch. sumantur m. ac vesp. cum
Aqu. Verben. Portulac. Lactuc. Endiv.
Succis. & simil.

Vel ℞. *Ocul. ☉. ppt.*
Diaph. ʒvial.
Ebor. ppt.
Nitr. ℥niat. ana. ℔j.
Cinnab. nat. opt.
Camphor. ana. gr. xij.
Sacch. alb. ℔j.

M. f. Pulv. subt. in 4. dos. æqu. m.
ac v. sumendas dividendus.

Vel ℞. *Spinar. Viper. ppt.*
Pulv. Pannon. rubr. vel
Bezoard. Senn.
Unicorn. mar. ppt.
℥n. diaph. ana. 3j.

M. f. Pulv. subt. divid. in 8. dos. æqu.
ad chart.

Si *Convulsiones* metuantur, uni-
 cuique dosi adhuc tria vel quatuor
 grana *Cinnab. ℥nii correct.* addenda
 veniunt. Imò & *Diaphoreticum lu-
 nare* ad grana quinque permiscebitur.

Ad sitim temperandam *Infusum*
fol. Théæ, Betonic. Hed. terr. atque
Veronicæ non est contemnendum.
 Prodest tamen & *Tinctura Rosarum*
 seqq.

Hhh 3

℞. *Res.*

℞. Ros. rubr. pugillos duos, & Frustum
Mali citrei succulenti.

Affunde Aqu. ferventis Miß. Stent
tamdiu, donec Rosæ albæ, ipsaq; Aqua
maximè rubicunda evaserit: tandem
solve in eâ Sacch. albiss. ℥iv. & adde

Spirit. Nitr. q. s. ad grat. aci-
ditatem.

D. ad Vitrum ac
inde sæpius aliquot unciae biban-
tur. Aliàs quoque Julepus unus &
alter seqq. hauriatur.

℞. Aqu. Lactuc. Verben.

Syrup. Ribium vel
acet. Citr. ana. ℥j.

Spirit. Sulphuris vel Nitr. q. s.
ad grat. acid.

M. ad Vitr. Detur pro dosi.

Vel Emulsiones diaphoretico refrige-
rantes per Morbi decursum frequen-
ter dabuntur, utpote à quibus hetero-
genea massæ humoralis salia commo-
dissimè obtunduntur, absorbentur,
& ad secretionem faciliorem præpa-
rantur; v. gr.

℞. Nucl. Persicor.

Amygd. dulc. rec. exc.

Semin. Melon.

Cucum. ana. ℥iß.

Card. bened.

Napi ana. ℥j.

Aqu. Taraxac.

Succis. ana. ℥vj.

Scabios. ℥j.

Endiv. ℥ß.

M. f. l. a. Emulsio, cui
adde Syrup. de Nymph. ℥iß.

Magist. ½ n. diaph. ℥j.

M. d. ad Vitr. Exhaustur spacio
duodecim horarum.

Si alvus constipata fuerit sæpe-
tum serum Lactis tamarindinatum ad
aliquot haustus convenit. In Debi-
litatibus Mixturæ cardiacæ dabun-
tur, præcedenti ac sequenti sub Titu-
lo commendatæ.

In reliquis curatio instituenda
prorsus sicut in Syncho simplici, vel in
Febri malignâ.

FEBRIS MALIGNA, aliàs
etiam *Lues Hungarica*, *Febris epide-
mica*, *petechialis*, *pestilentialis*. *Lues
castrensis*, est Febris continua, valde
acuta, cum symptomatibus vehe-
mentibus hominem periculose inva-
dens, & citò suum cursum sive ad sa-
lutem, sive ad mortem absolvens; ori-
unda à plurimis particulis acido - cor-
rosivis, sanguineæ massæ crasin non
solum turbantibus, sed ipsius lethale
dissolutionem continuè molien-
tibus. *Hungarica* vocatur *Lues*, eo
quòd in Hungariâ olim familiarissimè
grassaretur, præprimis inter milites;
unde etiam *castrensis* adpellatur. *Epi-
demica* quoque dicitur, ἐπιδήμιος
πυρετός, quia populariter, commu-
niter grassatur, *Maligna* denique au-
dit propter symptomata gravia, ve-
hementia seu periculosa conjuncta.

Si generandi modum inspiciamus,
dicendum, Homines per ali-
quod temporis spacium sive ex Aëre
malignis qualitatibus contagiosis in-
fecto, sive ex Cibis facile corruptibili-
bus, atque insuper, prout in Militum
castris contingere solet, per Vermi-
culorum ovula conspurcatis, quo-
tidie comestis, sive ex fructibus ho-
ræis,

ræis, inprimis verò prunis cujuscunque generis, Malis armeniacis & persicis nondum perfectè maturis, sive tandem è potu Aquarum stagnantium, paludosarum, ovulis Insectorum frequenter scatentium, plurimas particulas heterogeneas, nunc acidiores corrosivas, nunc etiam verminosa ovula in suis humoribus colligere, atque cumulare, quæ dein postmodum ad turgescentiam usque collecta, vel aliàs à spirante Æthere peculiariter maligno in motum præternaturalem suscitata, primùm quidem hinc inde sanguinis particulas aliter commovere, mox turbare, denique in capillaribus vasculis cohibere, sicque *Febrim* accendere solent, eamque *malignam* non *benignam*, quoniam turbatio hæc primo statim impetu secretiones glandularum plerarumque valdè impedit, sicque vehementiora symptomata excitat; imò humoralis massæ dissolutionem lethalem simul valdè molitur, eamque non rarò velociter præstat, si videlicet ipsæ particulae corrosivæ & venenatæ, instar venenarum Animalium, volatilitate quadam totum illicò sanguinem pervadant, ac ubique vincula naturalis particularum texturæ suis spiculis discindant; unde separatio necessaria contingit molecularum sanguinis, congelascentibus hinc grumosis, illinc verò serosis diffluentibus. Plerumque tamen simul à particulis venenatis, acutos admodum angulos habentibus, in tubulorum variorum extremitatibus, glandulisque adeo ipsis inflammatiunculae

gignuntur, sphacelum post se trahentes certissimum, nisi stagnantes moleculæ circulatorio motui maturius restituantur. Evenit etiam non rarò, præcipuè in gregariorum Militum corporibus, ut ovula Insectorum minima, paulatim in sanguine ipsorum vivificata, ac Vermiculos reptiles exhibentia, minimos glandularum tubulos non solum faciliè obstruant, sed etiam interdum planè erodant, atque hinc extravasationem humorum excitando Abscessum producant, eumque nunc majorem nunc minorem, prout verminosæ ejusmodi materiæ minor vel major collectio facta erit. Abscessuum ejusmodi ruptorum materiam si per microscopium inspicias, atque adcuratè examinabis, deprehendes sæpius, esse congeriem infinitorum Vermiculorum viventium.

Febris hæc in principio non statim ab aliis Febribus dignosci potest, quando & *Synochus simplex*, & *Ephemera Febris* eodem plerumque modo Hominem, cum frigore nimirum, sive etiam horrore, ac subsequente totius calore, siti, anorexiâ, interdum & pallore faciei, invadere solent. Quod si verò alii jam homines eadem in Urbe Febri malignâ decumbant, suspicio semper haberi debet, simili morbo & hunc affligi, quando febrilis insultus ipsumprehendit. Interim hoc notandum, quòd *malignæ* Febres ut plurimum in principio statim vehementiora habeant symptomata, quàm aliæ quæcunque Febres; etenim Lassitudo plerumque mox adest
summa,

Diagnos.

summa, & anxietas quædam vel angustia præcordiorum, cum inquietudine, cephalalgia ac vigiliis urgere incipi, quibus dein secundâ morbi tertiave die, citius tardiusve, deliria mentis junguntur, nunc ridicula illa cum risu multo, aut garrulitate conjuncta, nunc verò iracunda, oculis torvis, & furore sive rabie comitata, in quâ vix teneri in lectis possunt Ægri, quin semper evadere, hinc inde oberrare, adstantes verberibus aut morsibus impetere, aliisve damniis afficere conantur, quandoq; nec sibi met ipsis parcentes, sed diversa mala, mortemque etiam desperantium instar sibi intentantes. In hoc verò statu quasi stupidi sunt Ægri, nullum sentientes dolorem, imò nec sitim: hinc lingua palatumque exiccata sive arida facta pelliculam adquirunt nigricantem, & Anginam lethalem sæpius post se trahunt. Interdum dilucida in deliriis nanciscuntur intervalla, atque rationis omnis compotes, remedia, aliaque facilius admittunt, brevi tamen iterum in deliria recedentes. Reperiuntur etiam hoc morbo laborantes, quibus nulla ferè, aut levicula tantum obtingunt deliria, quique solâ pectoris angustia, ab adstantibus magis, quam semetipsis perceptibili, usque ad mortem premuntur, à sanguinis coagulatione in rubis majoribus circa Cor oriundâ. Pulsus celer est, frequens, nunc fortis & plenus, nunc debilis ac parvus, Urinæ variæ, semper tamen justo plus tinctæ.

*Differen-
tia.*

Quod si autem hisce & aliis com-

muniorebus symptomatibus febrilibus superaccedunt Maculæ per totum corpus efflorescentes, sive dein rubicundæ, sive lividæ, sive purpureæ aut nigræ, sive magnæ sive parvæ fuerint, *Febris* appellabitur *petechialis*, quandoquidem ista exanthemata *Petechiarum* nomine venire solent. Si sudore perpetuo, frigido calidove diffuat Æger, tum *Febris* hæc vocatur *Sudor Anglicus*.

Quando autem in his aut illis glandulis subcutaneis Tumores elevantur insigniter livescentes aut nigricantes, vocari morbus consuevit *Febris pestilens*; tumores autem illi nuncupantur *Bubones pestilenciales*. Interdum verò loco Bubonum in unâ vel pluribus cutis partibus exurgunt exanthemata nigerrima, sicca, dura, intensissimè ardentia, quæ *Anthraces* nuncupantur, ipsaque *Pestis* sunt, ex quâ Homines citò intra paucos certè dies moriuntur, nisi ipse Anthrax, molles partes prorsus siderans ac mortificans, à profundiore carne sanâ perfectè separetur, ac decidat, sicque simul ipsa *Febris pestilentialis* statim diminuatur aut cesset.

Usque adeo ut omnes hæc malignæ Febres species non nisi gradu malignitatis intensiore vel remissiore inter se differant, habito nimirum respectu ad causam morbificam, sive salia plus minus corrosiva, humoralem Massam non solum inquinantia, sed insuper nunc magis nunc minus turbantia aut dissolventia.

In *Prognosi* circumspectus heic esse debet Medicus quàm maximè; fallit enim

enim hæc Febris sæpissimè, ut certum de ejus exitu judicium ferre nescias; dicam tamen sincerè, quæ hæctenus in Praxi meâ circa hunc morbum observaverim. Lethalis plerunque evadit Febris, si obesumprehendit Hominem, si vehementi exagitatum irâ, si cacochymicum, aut visceris alicujus labe & teneritudine aliâs laborantem: si pulsus in principio statim parvus, debilis, languidus, celer ac frequens extiterit; si angustia pectoris, vox titubans, dyspnœa, languor virium maximus, summa anorexia, ariditas linguæ, angina, mens sibi non constans, ratiocinationis, memoriæque defectus, vigiliæ perpetuæ, jectigationes membrorum frequentes, deliria Ægrotum vexent. Si in ejus vultu post primos morbi dies cadaverosi quid apparet; si titivilitia legat, convulsionibus prehendatur; si ex præscriptis remediis alexipharmacis aut diaphoreticis nulla secretio contingit, sive per sedes, sive per urinam, sudorem, hæmorrhagiam, aut abscessum; vel si ex ejusmodi secretionibus nullum Æger levamen, sed potius majorem excacerbationem percipiat: si subinde paulo ante mortem appetere incipit, citra consequentiam melioris statûs. Si sudore colliquativo diffluet; si non sitiat, cum sitire debeat; si urinæ semper turbidæ sint, crudæ, crassæ, intensè rubicundæ, sine enæoremate: si petechiæ non tam rubræ, quàm lividæ, nigricantes, violaceæ, aut flavæ eruperint: vel si Bubones, Anthraces, hinc inde appareant, neque

vel perfectè suppurentur, vel à sanâ carne probè separentur: si deliquia animi crebra accedant: si decumbant indecorè, ac citra consuetudinem; si urinæ insciis profluant in lectum; si lethargo tandem prehendantur incorrigibili. Hæc certè signa sunt futuræ mortis præcipua; quod si enim contraria magis eveniant, atq; præscripta, assumtaq; remedia effectum quendam laudabilè, expectatumq; producant, tum melius adhuc de futurâ salute sperandum venit. Terminari solet aliquando in Abscessus externos, qui facilè sanantur; sed si in pectoris, pulmonis, aut visceris alius interni Abscessum mutetur, tum difficilior curatur, & plerunq; hecticam Febrim excitat. Degenerat quandoque etiam, si nulla fuerit crisis facta, in Febrim lentam simplicem.

In *Curatione* quarumcunque Februm malignarum partim ad primas vias, partim ad naturam humoris peccantis, partim denique ad Symptomata est attendendum, omnibusq; ita circumspèctè prospiciendum, ut Morbi vires citò frangantur, ipseque tandem perfectè expungatur. Hanc igitur medendi methodum observabis, si felix esse cupias in hoc Morbo profligando. Primâ morbi die, vel etiam secundâ, si nausea magna adest cum cardialgiâ, oris amarore, similibusque symptomatibus cruditates primarum viarû præsentis indicantib⁹, exhibere licet *Vomitorium*, nisi sit aliquid, quod insigniter contraindicet; Vomitorium autem sequenti similive alio modo scitè præscribetur:

℞. Rad. Ipecacuanh. ʒʒ. vel ʒij.
 Crem. Tart. vel
 Salis essent. Acetosell. gr. vj.
 M. f. Pulv. subt. d. ad ch. pro dosi
 cam frequentibus iusculis, aut Infuso
 fol. Théë superbauriend. Vel

℞. ʒ niii diaph.
 Crem. Tart. ana. ʒʒ.
 Tart. emet. gr. ij.
 M. f. Pulv. subt. d. ad chartam. Su-
 matur quâvis horâ pro dosi.

Vel ℞. Pulv. pannon. rubr. ʒʒ.
 Salis Cent. min. gr. v,
 Mercur. vit. corr. gr. iij.
 M. f. Pulv. subt. de ad ch.
 Vel ℞. Syrup. emet. Ang. Sal. ʒiiijʒ.
 Aqu. Scorzoner.

Borrag. ana. ʒij.
 M. ad Vitr. d. pro dosi.

Quod si operatio hujus Medica-
 minis intra spacium quinque vel sex
 horarum videatur absolutum, tum
 sequens Potio alexipharmaco-diapho-
 retica est exhibenda, & aliquoties ite-
 randa:

℞. Aqu. Burs. pastor. Succis.
 Card. bened. ana. ʒj.
 Eleſt. diascord. Fracast. ʒj.
 Terr. sigillat. ʒj.

M. f. Potio d. ad Vitr. sumatur pro
 dosi.

A Catharticis studiosè est caven-
 dum, quoniam plerumque majores
 in sanguine turbas excitant, aut si
 nihil operantur, tempus inutiliter
 terunt. Ubi verò nullus emeticis est
 locus, non reformidanda sunt Clys-
 mata, eaque statim in principio repe-
 titis si opus vicibus infundenda, se-
 quenti ferè aut simili modo parata:

℞. Radic. Petasitid.
 Angelic. ana. ʒiiijʒ.
 Alth. ʒʒ.

Herb. Agrimon. Galeg.
 Sanicul. ana. Mj.
 Flor. Calendul.

Melilot. ana. Mʒ.
 Semin. Anis.
 Angelic. ana. ʒij.

Incis. & contus. coque in s. q. Aqu.
 fontan. Colatur. ʒxj. adde
 Olei rutac.

rosac. ana. ʒvj.
 Mellis violac. ʒ. Sal. gemm. ʒiijʒ.
 M. f. Clyster statim injiciendus.

His peractis Galli & Itali ad Ve-
 næsectiones devenire solent, easque
 sæpius intra triduum vel quatrimum
 iteratas; Verùm methodum hanc in
 Germaniâ semper lethalem observa-
 vimus. Si tamen ad sanguinis mis-
 sionem devenire velimus, protinus
 id semel tantum, & quidem primâ
 solum vel secundâ Morbi die fiat; nec
 in omnibus subjectis, sed tantum
 in Plethoricis, aut illis, qui aliâs Ve-
 næsectionibus sunt adsueta, quique
 pulsum habent magnum, vehemen-
 tem & fortem, simulque Capitis do-
 lore insigni excruciantur.

Interea Medicus occupatus erit
 unicè in debellando Morbi veneno,
 turbatione sanguinis tollendâ, disso-
 lutione ejus præcavendâ, particulis
 heterogeneis segregandis, sicq; æqua-
 bili humoribus consistentiâ ac motu
 reddendis. Quod fiet, si noctu diu-
 que alexipharmacorum remediorum
 exhibitione pugnabit, simulq; symp-
 tomatibus valde urgentibus circum-
 spectè

ſpectè occurret. Itaque m. vesp. ac noctu Æger continuè capiet pulverem ſequentem aliquem:

℞. Pulver. pann. rubr. ʒß.

‡ nīi diaph. ʒij.

M. f. Pulv. ſubtil. in 12. doſ. æqu. ad chart. divid.

Vel ℞. Ebor. ſine ign. ppt.

C. C. phil ppt.

Terr. ſigillat.

Crystall. alb. ppt.

Bezoard. min.

Lapid. prunell. ana. ʒij.

M. f. Pulv. ſubtil. in 8. doſ. æqu. ad chart. divid.

Vel ℞. Pulveris Viperin. ʒj.

‡ nīi diaph.

Ocul. ʒ. ppt. ana. ʒß.

Salis Cichor. ʒj.

M. f. Pulv. ſubtil. in 4. doſ. æqu. ad ch. divid.

Vel ℞. ‡ n. diaph.

Unic. marin. ppt. ana. ʒj.

Salis eſſent. Card. bened. ʒj.

M. f. Pulv. ſubtil. in 4. part. æqu. divid.

Vel ℞. Bol. armen. ppt.

Pulv. bezoard. Senn. ana. ʒj.

Bezoard. min.

Nitr. ‡ iat. ana. ʒß.

M. f. Pulv. ſubtil. in 9. doſ. æqu. ad ch. divid.

Sed & ſequens aliqua Mixtura diaphoretica cochleatim eſt exhibenda ſingulis ferè ſemihoriis:

℞. Aqu. Card. bened. ʒiß.

Taraxacon.

Burf. paſtor.

Syrup. Ribium ana. ʒj.

Elect. diſcord. Frac. ʒj.

Pulv. pann. rubr.

Unicorn. foſſil. ana. ʒß.

M. ad Vitr.

Vel ℞. Aqu. Papav. rhead.

Acetoſ.

Fumar. ana. ʒj.

Syrup. Rub. id. ʒvj.

Mithridat. Damocr. ʒiß.

‡ nīi diaph.

Matr. perl. ppt. ana. ʒj.

Julep. roſac. ʒij.

M. d. ad Vitrum.

Vel ℞. Aqu. Scabioſ. flor. Sambuc.

Ulm. ana. ʒiß.

Succi Citr. rec. ʒj.

Syrup. Berber. ʒß.

Terr. ſigillat.

Bezoard. min. ana. ʒß.

Rot. Man. Chriſt. perl. ʒiß.

M. ad Vitr.

Sæpius Emulſiones diaphoreticæ ſimul profunt cum Pulveribus alexipharmacis ſingulis ſex horis ſumen-
dæ : v. gr.

℞. Amygd. dulc. rec. exc.

Semin. Melon. ana. ʒj.

Card. bened.

Lactuc. ana. ʒij.

Aqu. Scab.

Calendul. ana. ʒiß.

F. l. a. Emulſio, cui adde

Syrup. de Nymph. ʒß.

Detur ad Vitrum pro doſi ſingulis ſex horis repetendâ.

Vel ℞. Nucl. Perſic.

Pineor. ana. ʒij.

Semin. Cucum.

Napi ana. ʒiiij.

Aqu. Cichor.

Galeg.

Aqu. Card. Mar. ana. ʒj.

F. l. a. Emuls. cui adde

Syrup. Capill. ♀ r. ʒß.

Detur ad Vit. sumatur ut supra.

Hiscē remediis utendum est per aliquot dies, ac inde vel fudor, vel symptomatum aliqua remissio exspectanda; quale quid si contingat, protinus in eorundem medicaminum usu pergendum; sin verò nulla morbi solutio vel eminus conspiciatur, ac symptomata potius augeantur, imprimis pectoris angustia, inquietudo, &c. tum sequentes pulverum doses exhibendæ veniunt, Mixturaque alia convenientior præscribenda: v. gr.

℞. ʒ niii diaph. ʒij.

Matr. Perl. ppt. ʒj.

Lapid. Bezoard. orient. ver. gr. jx.

M. f. Pulvis subt. in 3. dos. æqu. ad ch. divid.

Vel ℞. Pulv. Pann. rubr. ʒiß.

Bezoard. min.

Nitr. ppt. ana. ʒß.

Camph. gr. iv.

Sacch. ros. ʒß.

M. f. Pulv. subt. div. in 2. dos. æqu. ad ch. iterandas aliquoties donec effectus inde percipiatur.

Vel ℞. Oss. de Cord. Cerv. ʒj:

Unicorn. mar. ppt.

Pulv. bezoard. Senn.

Cinnab. ʒ n. opt.

Nitr. ʒ iat. ana. ʒß.

Camphor. gr. vj.

M. f. Pulv. subt. d. ad ch. in 2. dos. æqu.

Vel ℞. Pulv. bezoard. Senn. ʒij.

Viper. ppt.

Lapid. prunell. ana. ʒj.

Camph. gr. iv.

M. f. Pulv. subt. div. in 2. dos. æqu. ad ch.

Vel ℞. Unic. mar. ppt. ʒj.

Regul. ʒ n. medic. ʒij.

Myrrh. elect. ʒß.

Arcan. duplic. ʒj.

M. f. Pulv. subtil. divid. in 6. dos. æqu. ad ch.

Vel ℞. Bezoard. miner. ʒij.

Lapid. bezoard. occid. ver.

Cinnab. nativ. opt. ana. ʒß.

Salis essential. Rub. id. gr. xv.

M. f. Pulv. subtil. in 3. dos. æqu. ad ch. div.

Vel ℞. Dent. aprin. ppt.

Pulveris viperin. ana. ʒß.

Salis volat. Succin.

Cinnab. ʒ n. opt. ana. gr. xv.

Sacch. ros. tab. gr. xij.

M. f. Pulv. subtil. in 3. dos. æqu. ad ch. divid.

℞. Aqu. Borragin. ʒiß.

Scorzoner.

Petasitid. ana. ʒvj.

Syrup. acetos. Citri ʒß.

Rub. id. ʒij.

Confect. Alk. compl. ʒiß.

Mixtur. simpl. D. Lud. ʒß.

M. ad Vit. detur frequenter cochleatim.

Vel ℞. Aqu. Nasturt. aquat.

Plantag.

Ulm. ana. ʒj.

Syrup. Corallor. ʒvj.

Spirit. volat. viperar. ʒß.

ʒ niii diaph.

Ebor. ppt. ana. ʒj.

Cinnab. nat. opt. ʒß.

M. ad Vit.

Vel R.

Vel R̄. *Aqu. Bugloss.* ℥ij.

Flor. Acac.

Apii ana. ʒvj.

Syrup. Ceras. acid. ℥℞.

Confect. Alk. inc. ʒj.

Spirit. volat. C. C. vel

Ebor. ʒij.

‡ *nii diaph.*

Pulver. pannon. rubr. ana ʒ℞.

Rot. Manus Christ. perl. ʒi℞.

Misc. ad Vitr.

Quod si *Vigiliae* atque *Deliria* vel continua, vel frequentia adsint, mira præstabunt *Pulveres camphorati* superiores aut sequentes:

R̄. *Dent. aprin. ppt.* ʒij.

Salis essent. Acetosell. ʒj.

Cinnab. ‡ *n. correct.* ʒ℞.

Camph. gr. vj.

Sacchar. perl. ʒ℞.

M. f. Pulv. subt. in 3. dos. æqu. divid. ad chart. atq. cum Emulsione quâdam superiore vel Ptisanâ dandas.

Vel R̄. *Nitr.* ‡ *niat.*

Sacch. rosat. tab.

Bezoard. min. ana. ʒj.

Camphor. gr. vj.

M. f. Pulv. subt. in 2. dos. æqu. div. ad chart.

Vel R̄. *Pulv. pannon. rubr.* ʒij.

Lapid. prunell. ʒ℞.

Cinnab. nat. opt. ʒj.

Camphor. gr. viij.

M. f. Pulv. subt. in 4. dos. æqu. ad ch. m. ac v. sumend.

Accedentibus *Convulsionibus*, aut variis saltem convulsivis moribus, tremoribus, atque jectigationibus membrorum iidem pulveres camphorati profunt. Naribus *Ruta recens*

contusa, *Liqu. C. C. succin. Spir. Sal. arm. urinos. Pennæ accensæ*, ac similia admoventur, sed insimul in omnibus hisce symptomatibus sequens vel similis aliqua *Mixtura alexipharmacospasmodica* cochleatim propinanda.

R̄. *Aqu. Verben. vel Flor. omn.*

Ulmar. ana. ʒj.

Flor. Til.

Burs. pastor. ana ʒvj.

Syrup. Pæon.

anodyn. ana ʒ℞.

Ebor. ppt.

Dent. aprin. ppt.

Ægagropil. ppt. ana gr. xv.

Cinnab. nat. opt. ʒ℞.

M. d. ad Vitr.

Externè verò partim fronti applicetur *Epithema* ex *Baccis Juniper. Micâ panis*, *Rutâ virid.* invicem contus. & *Aceto calido* conspersis. Vel etiam *Acetum rutaceum*, aut *rosaceum* cum *Album. ovor.* & *Aquâ Ros.* permixtum, calefactumque apponatur frequenter. Vel paretur *Mixtura* ex *Aqu. Heder. terrestr. Rosar. Solani, Spermat. Ranar. Majoran. Verben.* cum *Aceto rosaceo* & *Album. ovorum.* Vel seqq. *Emulsio* in hunc usum concinnetur:

R. *Nucl. Persic.* ʒij.

Semin. Cucum.

Cucurbit.

Papav. alb.

Hyoscyam. ana ʒj.

Aqu. Lactuc. ʒij.

Portulac.

Salviæ.

Solan. ana ʒj.

*F. l. a. Emulsio, cui adde
Aceti rosac. ℥j.*

Detur ad Vitr. & applicetur calidè.

*Temporibus autem subinde seqq.
Unguentum illinatur :*

℞. Ungt. de Alabastr.

Populeon. ana ℥ij.

Ol. express. Hyoscyam. ℥j.

dest. Rutæ.

Rorismar. aa. ʒß.

M. d. ad Pyxidem.

*Plantis pedum applicari possunt
Raphanus vel domest. vel sylv. Cepæ,
Allia, Ruta, Imperatoria, Fermentum
panis, Lutum, Bacc. Juniper. Acetum,
Radix pyrethri. Carpis manuum ap-
ponuntur taleolæ Pomi citrei cum
Aqu. Ros. Albumine ovor. Croco, Ver-
benâ recent. Rutâ rec. Vel Acetum
rosac. aut rutac. cum Telis aranear.
Croco, Baccis Juniperi &c.*

*Nonnunquam accidit, ut somno-
lencia continua Ægrum teneat, sive
cum, sive absque delirio : atque hoc
in casu internè quidem volatilia non
sunt negligenda, sed reliquis dia-
phoreticis fixis adjungenda ; Cam-
phora tamen heic non usurpanda.*

℞. Aqu. Fumar. Fl. Sambuc.

Carlin. Scorzonæ. aa. ʒvj.

Syrup. flor. Tunic. ℥j.

Confect. Alk. compl. ʒij.

Spirit. C. C. vel Viperar. vol. ʒß.

℥nii diaph.

C. C. phil. ppt. ana ʒj.

Sacch. ros. tab. ʒj.

M. ad Vitr. detur cochleatim.

℞. Bezoard. miner.

Pulveris Viperar. ppt. ana ʒß.

Salis volatil. C. C. purior. ʒß.

*M. f. Pulv. subtil. in 3. dos. æqu. a
ch. div. singulis quadrihoris detur dos
cum Aqu. dest. Nast.*

*Externè autem capilli capitis de-
radantur, atque nunc Columba ve-
Pullus gallinac. per medium sectus im-
ponatur, nunc sacculus sequens Vin-
incoctus, & expressus tepidè applice-
tur, nunc etiam Spiritus Ceras. nigr.
Lumbr. terr. Lil. convall. Anthos. Tind.
Castor. cum Spir. Salis arm. par. Lique-
C. C. succin. &c. cum Aqu. Majoran.
lintheis exceptus sæpius imponatur.
Sacculus verò sequenti modo pa-
retur :*

℞. Radic. Angelic. Imper. aa. ʒß.

Herb. Betonic. Mij.

Majoran.

Chamædr.

Flor. Paralys.

Lil. convall. ana Mj.

*Incis. & contus. insuantur nodul-
interpassato.*

*Si dein sudor vel mador totius
corporis per hæc remedia apparere in-
cipiat, cum incipiente levamine, a
symptomatum diminutione ; in pri-
mis ubi sopor cessat paulatim, tum
bona sperare licet : somnolentiâ verò
continuante protinus ad Vesicatorio-
rum applicationem est deveniendum
eaque vel nuchæ & brachiis, vel utri-
que brachio & cruribus applicentur
quæ ubi Vesicas excitant, & feri suf-
ficientem quantitatem cum mitiga-
tione symptomatum extrahunt, bo-
num sæpius est, si verò siccam, du-
ram, ac lividam cutim reddunt, sine
ullo levamine symptomatum, malum
signum est credendum.*

Aliàs

Aliàs verò sudore apparente, continuandum semper in usu diaphoreticorum, sed ita tamen procedendum, ne sudor inde colliquativus cum Ægri pernicië oboriatur.

Quando *Alvus constipata* est valde, tum Clyisma emolliens, refrigerans atque detergens injicietur, v. gr.

℞. *Radic. Alth.*

Lil. alb.

Gramin.

Acetos. ana ʒiij.

Herb. ʒ. emollient.

Betæ vel Blit. rec. aa. Mj.

Semin. Lactac. ʒiij.

Lini ʒß.

Incis. & contus. coqu. in ʒ. q. Aqu. font. Colatur. ʒßj. adde

Elect. lenit. ʒj.

Ol. Olivar. ʒij.

Salis commun. ʒj.

M. f. Clyisma statim injiciendum, idemq; si opus, repetendum.

Intus etiam *Oleum Olivarum* optimum ad tres pluresve uncias, vel certe *Jusculum carnis* propinari potest, in quo manipuli aliquot recentis *Malvæ*, *Mercurialis*, atque *Acetosæ* vel *Acetosellæ* decocti fuerunt. In Potu ordinario dissolvere quoque licet *Lapidem prunellæ*, vel *Succum Citri*, *Limonum*, *Acetosellæ*. Loco Clysmatum intervire quandoque solent *Suppositoria* ex *Melle* cum pulvere *Croci* & *Sale communi*, vel ex *Sapone*, *Sevo*, *Lardo*, cum *Croco* & *Saccharo*.

Fluxus Alvi nimius, quæ *Febris* est *cacatoria*, si ægrotantis vires exhaurire incipiat, protinus ille sistendus erit; intus igitur propinare oportet

pro potu ordinario *Emulsionem Amygdal. dulc. cum Decoct. radic. Scorzoneræ*, *Tormentill. Bistort. & C. C. usti factam*, vel cum *Aquâ*, in quâ *Ferrum ignitur*, aut *frustum Panis tostii* fuit demersum. Pulvis autem sequens dabitur:

℞. *Bol. Arm. ppt. vel*

Terr. sigillat.

Unicorn. fossil. ana ʒß.

Ebor. ust. ppt.

Myrrh. elect.

Specif. stom. Poter. ana ʒj.

M. f. Pulv. subt. div. in 6. dos. æqu. div. ad ch. Singulis autem tribus horis cum Emulsione dosis exhiberi poterit.

Intercalabitur simul *Mixtura Cardiacodiaphoretica*; v. gr.

℞. *Aqu. Burs pastor.*

Ulmæ.

Polygon. ana ʒj.

Syrup. de Ros. sicc.

Flor. Tunic. ana ʒiij.

Conf. Hyac. inc. ʒj.

Matr. Perl. ppt.

Corall. rubr. ppt. ana ʒj.

Tinct. antiphthis. ʒß.

M. detur ad Vitr. Exhibeatur cochleatim.

Regioni Stomachi applicari debet *Empl. de crustâ Panis*, cum *Tacamahacâ*, *Mastiche* & *Nuce mosch.* ulterius exaltatum.

Si autem *Dysenteria*, sive *Febris dysenterica*, planè Hominem prehendat, ea medendi methodus observabitur, quæ in *Dysenteria malignâ* uo loco est commendata.

Respirandi difficultas, & *præcordiorum* *Anxietas* ubi accessit, periculosum

Dysenteria.

Quæ in Dysenteria & Anxietate facienda.

Febris
præfo-
cans.

sum maximè est symptoma, plerun-
que futuram mortem prælagiens;
vocant aliqui Febrim *asthmicam*,
præfocantem, ubi sequentia profunt:

℞. *Sperm. cet. rec.* ʒj.
d. ad ch.

*Solutum in Jusculo carnis, vel In-
fuso folior. Nasturt. aquat. propinabi-
tur pro dosi, & aliquoties repetatur.
Vel sequens Pulvis usurpabitur.*

℞. *Pulv. bezoard. Senn.* ʒj.
‡ n. diaph.
Salis volat. Viper. ana ʒʒ.
Sacch. rosat. ʒj.

*M. f. Pulv. subt. div. in 6. dos. æqu.
ad chart. Singulis sex horis capiatur
dosis cum Aqu. Card. bened.*

*Vel ℞. Bezoard. miner.
Ossis de Cord. Cerv. ana* ʒij.
*Sal. volat. Ebor. puriss.
Auri horizontal. ver. ana* ʒʒ.
*M. f. Pulv. subtil. div. in 4. part.
æqu. ad ch. sumendas ut supra.*

*Vel ℞. Pulv. Pannon. rubr.
Spinar. viperar. pulv. ana* ʒʒ.
*Salis volat. C. C. puriss.
Croci Solis subtiliss. trit. vel
Diaphoret. solar. ana* ʒʒ.
Cinnab. ‡ n. opt. ʒj.
*M. f. Pulv. subt. div. in 4. part. æqu.
ad ch. sumendas ut supra.*

*Loco Pulverum concedi potest
vel Tinctura bezoard. vel Spiritus theri-
acalis camphoratus, vel Mixtura simpl.
Danj. Lud. ad gutt. 30. pluresve m.
ac vesp. cum Aqu. Scab. Nasturt. Bec-
cabung. &c.*

*Mixtura quoque sequens cochlea-
tim danda:*

℞. *Aqu. Nasturt.* ʒvj.
Beccab.
Cardiac. off. ana ʒj.
Syrup. Bell. min. ʒvj.
Spir. Sal. arm. urinos.
Matr. Perl. ppt. ana ʒʒ.
Conf. Alk. compl. ʒj.
M. d. ad Vit.

*Cordis Regioni ac Pectori appli-
cabitur sequ.*

℞. *Spir. Anth.*
Ceras. nigr. ana. ʒij.
Theriac. camphor. ʒj.
Conf. Alk. compl. ʒij.
*M. d. ad Vit. Sæpius calefiat, & fru-
stum Panni scarlatini, si haberi que-
at, immersum ei expressumq; applicetur.*
Vel ℞. Radic. Angelic. ʒj.

Imperator.
Galang.
Irid. florent. ana ʒʒ.
Herb. Meliss. Mij.
Ocymi.
Origani.
Puleg.
Flor. Borrage.
Rosar.
Violar. ana Mj.
Semin. Anis.
Nasturt.

Baccar. Junip. ana ʒiij.
Cinnam. opt. ʒʒ.

*Incis. & contusa tenuiter insuantur
nodulis duobus interpassatis, qui dein
alternatim Aceto loimico sive bezoardi-
co calefacto immersi, atq; expressi pecto-
ri applicentur.*

*Hæmorrhagia qualiscunq; Ægro
contingens naturæ conceditur, si vi-
res inde non frangantur; contrarium
ubi*

ubi notabitur, sistenda illa erit, interne dando *Emulsionem Amygdal. dulc. cum Aquâ Plantag. Polygon. Acetos. Urtic. faciendam*, addito singulis trihoriiis scrupulo uno *Terr. sigillat. Unicorn. fossil. Bol. Arm. ppt. C. C. ust. ppt. vel sequ.* Opiata per vices sumenda præscribetur:

℞. *Conserv. Ros. rubr. ℥l. ʒiβ.*
Roob Ribium.

Cydon. ana ʒij.
Conf. Hyac. inc. ʒj.
Bol. Arm. ppt. ʒij.
Sangu. Drac. ver. ʒj.
Syrup. Fl. Tun. q. s.

F. *Mixtura ad form. Opiat. d. ad Oll. & singulis bihoriiis cuspis cultri plenus capiatur.* Vide etiam, quæ sub Titulo de *Hæmorrhagiâ narium* commendata extant.

Linguae ariditas, scabrities, ardor ac scissura remediis non acribus & aromaticis, sed mitioribus nullo Sale imprægnatis emendatur, quæ inter maximè prodest sequens vel simile *Gargarisma*:

℞. *Folior. Scabios. Malv.*
Brunell.

Flor. Malv. hortens.
Verbas. ana Mj.

Semin. Anis. Fœnic. ana ʒiβ.

Ficuum ping. par. v.

Hordei mundat. ʒj.

Cancror. fluviat. viv. num. x.

Incis. & contus. coqu. in s. q. vel t̄ij.
Aquæ fontanæ; Colaturæ adde

Syrup. de Jujub.

Portulac. ana ʒiβ.

Roob Dianuc. ʒj.

M. d. ad Vitr. Sæpius inde Os gargarisetur calidè.

Prodest & Linctus emolliens atq; lubricans, v. gr.

℞. *Diacod. Montan.*

Syrup. Gran. acid. ana ʒj.

Mell. rosac. ʒvj.

Aqu. Plantag. ʒiβ.

Specier. diatrag. frig. ʒiβ.

M. d. ad Fictil. ac inde frequenter cochleare plenum lambatur.

Vel ℞. *Mucilag. Semin. Cydon. Aquâ Rosar. fact. ʒβ.*

Aqu. vel Succ. Semperviv. recens express.

Syrup. Viol. purpur. ana ʒiβ.

Acetos. Citr. ʒβ.

M. d. ad Ollam. Lambatur sæpè cum contuso Liquitiæ baculo.

Vel ℞. *Syrup. de Semperviv.*

Gran. acid.

Viol. purpur. ana ʒj.

Roob Dianuc. ʒβ.

Sambuc. ʒij.

Misc. detur ad Ollam; lambatur sæpè cum baculo Liquirit.

Vel *Frusto Lardi, contusis Sempervivi majoris, Acetosæ, Quercus, Plantaginis, Althææ, Rubi sylvestr. Brunellæ, Numulariæ &c. foliis Lingua sæpissimè fricatur.* Vel *Lapis Prunellæ Aquâ calente solvitur, additur Mucilago Gumm. Tragac. aut Semin. Cydonior. Aqu. Malv. extracta, cum Syrup. Acetosell. & Lingua arida, æstuansque hâc mixturâ creberrimè ilinitur.*

Ubi *Lingua obducta est squalidâ, albâ, nigrâ veluti pelle, tum iterum vel Butyrum cum Melle rosaceo, vel*

Lingua obducta viscosa cur.

K k k

Lardum,

Lardum, vel Oleum Amygdalar. dulc. illinitur, indeque emollita sive pellicula, sive pituita commodo instrumento vel cochleari extergitur.

*Faucium
ardor.*

Faucium ardor, inflammatio, sive Prunella, die Bräune im Halß, corrigitur sectione Raninarum venarum, atque Gargarismate sequi.

℞. Herbar. Scabios.

Brunell.

Succis.

Flor. Malv. hortens.

Ligustr.

Fol. Rub. sylv. ana. Mj.

Incisa misce & coque in s. q. Aquæ font. Colaturæ ℥ij. adde

Syrup. Granat. acid.

Roob Moror. ana. 3vj.

Dianuc. 3j.

M. d. ad. Vitr. Calidè hinc Os & Fauces sæpè eluantur.

Vel ℞. Aqu. Brunell. 3viii.

Sperm. Ranar. 3iiii.

Muccilag. Semin. Cydon. Aqu.

Plantag. fact. 3vj.

Mell. rosac. 3iβ.

Roob Sambuc. 3β.

Spiritus Vin. camphor. 3ij.

M. detur ad Vitr. Usurpetur ut superius.

Vel Lapis Prunellæ Aqu. Malvæ solvitur, miscetur Succus Semperviv. major. rec. expressus, vel Succus aut decoctum Cancrorum stuviatil. contusor. cum Roob Moror. Dianuc. &c. & hoc Fauces tepidè atq; blandè sæpius eluantur. Extus Oleum Amygd. dulc. vel Rosar. Violar. Lilior. alb. collo bis vel ter quotidie antè illinitur, Lanaque succida desuper applicatur.

Bubo si quis retro Aures, sub Axillis, aut alibi enascatur, omni arte maturabitur, aperietur, Ulcus hinc factum detergetur, atq; tum demum ad Cicatricem promovebitur. Vide titulum de Abscessu; maturantibus tamen remediis Theriaca semper addetur.

Ad compescendum Furorem nimium, qui Convulsiones non rarò post se trahit, Julepi aciduli profunt, non secus atque camphoratus Pulvis unus alterve supra descriptus.

℞. Aqu. Lactuc.

Portulac.

Endiv. ana. 3ij.

Syrup. Rub. id.

Berber. ana. 3j.

Spir. Nitr. q. s. ad grat. acidit.

M. f. Julep. d. ad Vitr. pro dosibus aliquot.

Potui ordinario Succus Citri, Ribium, Acetosellæ permiscebitur. In Jusculis Lactuca, Endivia, Acetosa decoquantur. Epithemata refrigerantia Fronti, Carpis manuum ac Plantis pedum applicabuntur. Capiti raso Columba viva per medium secta, rejectis capite, alis & pedibus imponitur, ac per trihorium vel ultra relinquitur, postea aufertur, & Caput detergetur Linteo calente. Si furere pergat Ager, vinculo brachiis pedibusque injecto compescetur.

Sudor excessivus s. Febris colliquativa temperabitur, si Julepi refrigerantes, vel Emulsio Amygd. dulc. subinde propinabitur, & quidem semper cum 15. guttulis Tincturæ antipthisc. Pulvis etiam sequens in hunc finem dabitur:

℞. Uni-

℞. Unicorn. fossil.
Corall. alb. ppt.
Terr. sigillat. ana. ℥ij.
Nitr. ꝑ iat. ℥j.
Sacchar. cand. alb. 3j.

M. f. Pulv. subt. d. ad ch. Dosis singulis triboriis cuspis cultri cum Potu ordinario.

Vomitio nimia f. Febris vomitoria, compescitur sequenti Pulvere:

℞. C. C. ust. ppt.
Specif. stom. Poter.
Sal. Absynth.
Cichor. ana. ℥j.

M. f. Pulv. subt. in 4. part. æqu. divid. ad ch. Mane ac vesp. dosis capiatur cum Jusculo non salito.

Extus Emplastr. de Crustâ Panis, cum Tacamahacâ Stomachi regioni applicatur, prius tamen inunctæ Balsamo Peruviano, cum Oleo Menthæ, ac Nucistæ expresso. Haustus Acidularum subinde simul concedetur.

Si Cephalalgia magna adfuerit, remedia usurpabuntur, quæ sub titulo Cephalalgiae laudata sunt, à causâ calidâ oriundæ. Inprimis autem propinabitur frequenter Infusum fol. Théæ, Betonic, & Scabios. cum Pulvere alexipharmaco, & Specif. cephalic. Mich. capilli Capitis deradentur. Epithemata fronti applicabuntur. Vesicatoria pro re natâ in usum trahentur.

Quando Febris est tussiculosa, Tussis adest vehemens cum vel sine excreatione, remediis adjungetur Syrupus de Jujubis, Farfar. Bellid. minor. Diacod. Montan. Pectus inungetur Axungia Capon. cum Oleo Ver-

bas. Chamomill. Spermate Ceti &c. Vocant nonnulli Febrim catarrhalem.

In Animi Deliquiis f. Febre Synco-
pali, extus ea admovebuntur, quæ suo loco præscripta sunt; intus verò sequens Mixtura cardiaco-diaphoretica cochleatim propinabitur:

Animi deliquis.

℞. Aqu. Cardiac. offic.
Flor. Til. ana. 3j.
Aurant. 3ss.
Syrup. Corallor. 3vj.
Conf. Alk. compl. 3j.
Matr. Perl. ppt. 3ss.
M. d. ad Vitr.

Ubi Singultus adest frequens atque molesta, signum ferè est rosionis sphacelosæ Oesophagi, adeoq; funestum, hinc Arcanum duplicatû Myns. Cinnabaris nativa opt. vel Antimon. correct. cum Succis Nasturtii, Beccabung. Urtic. Scabios. ac Spiritu Vini camphor. aliquoties dabuntur. Scrobiculo autem Cordis Spiritus Anthos camphorat. cum Spiritu Lumbr. terr. Diascord. Fracast. Mithrid. ac similibus calidè sæpius applicabitur.

Febris singulosa.

FEBRIS VERMINOSA, est Febris continua Lenta à Vermibus, Intestinatorum maximè, oriunda. Lumbrici enim intestinales cumulati non solum chylum absorbere possunt, sed & eundem sæpè ita corrumpunt, viscidoque acrem reddunt, ut tandem in sanguine nimium congestus vascula capillaria obstruendo Febrim excitet, eam aut lentam, neque cum vehementibus admodum symptomatibus, utut in recessu subinde malignis, affligentem.

Febris verminosa.

Ætiologia.

Diagno-
sis.

Pueros frequenter, rarius Adultos hæc Febris invadit, & quidem utplurimum sensim gliscendo augetur. Incipit ferè cum vagis horripilationibus, pergit verò cum calore non adeo æstuante, siti modicâ, obtuso capitis dolore, rosionibus ventris, inquietudine, quandoque & sopore turbulento, deliriis, motionibus spasmodicis, anxietatibus, loquelæ impotentiâ, anorexiâ, fastidio ciborum, nausæâ, ac vomendi cupidine.

Prognosis

Atque hæc symptomata si durent sine intermissione, vel etiam augeantur, nullis per alvum aut vomitum prodeuntibus Vermibus, accedentibus convulsionibus, tum vel citi⁹ non dum emaciati moriuntur Ægri, vel lentâ Febri paulatim contabescunt, ac tandem intereunt. Si autem vermes five vivi, five mortui excernantur, atque hinc loquela redeat, symptomata minuantur, appetitus utcunque accedat, tum Æger sensim pristinam sanitatem recuperare poterit.

Curatio.

Curationem hinc ita institues, ut juxta antifebrilia etiam blandè laxantia anthelmintica in usum vocentur. Proin Clysmata primùm injiciuntur detergentia, & Vermes ad Alvum allicientia:

℞. Herbar. ʒ. emoll. ana. Mj.
Semin. Anis. ʒiij.

Lini ʒvj.

Incisa & contus. coqu. in mediâ parte Lactis, & mediâ Aquæ, Colaturæ ʒvj. adde

Mellis simplic. ʒvj.

Syrup. Violar. purpur. ʒj.

M. f. Clyster Puero annor. 3. 4. vel 5. injiciendus, & aliquoties repetendus.

Intus verò hoc tempore Infusum anthelminticum laxans dabitur. v gr.

℞. Radic. Gramin. Scrophular.

Scorzoner.

Rhabarb. elect. ana. ʒj.

Herb. Scabios. Pj.

Fol. Senn. opt. mund. ʒiij.

Semin. Fenic.

Cyn.

Crem. Tri ana. ʒj.

Sacch. alb. ʒiij.

Incis. & contus. coqu. in s. q. Aqu. font. Colatur. ʒiij. d. ad Vitr. pro duabus dosibus, spatio 24. horarum Puero propinandis.

Interea pulvis dabitur antifebrilis, antispasmodicus, & anthelminticus simul; v. gr.

℞. C. C. ust. ppt.

ʒn. diaph. ana. ʒj.

Corall. rubr. ppt.

Radic. Filic.

Cortic. radic. Mor.

Cinnab. ʒ nī rectif. ana. ʒʒ.

Sacch. rosat. ʒʒ.

M. f. Pulv. subt. d. ad Scatul. Singulis trihoriiis cuspis cultri plenus cum Emulsione amygdalinâ propinabitur.

Pro potu ordinario concedetur Decoctum radic. Graminis, Scorzoner. C. C. ust. Passular. min. Semin. Anis. Vel Mercurius vivus per bihorium in Aquâ fontan. bulliat, sub finem adjiciendo species modò dictas. Juscula interim carniū, aliave concedenda; imò & Lac vaccinum vel caprillum cum incoctione Allii & Sacchari subinde exhibetur. Extus Abdomen Oleo Absynth.

Absynth. Anethi, Colocynth. cum Felle taurino calidè inungitur. *Umbilico* applicatur etiam *Mel cum Felle Tauri, Oleo dest. Absynth. Theriacâ, & Al-lio.*

FEBRIS CATARRHALIS est Febris continua benigna, à pituitâ vel fero falso, plerunque glandulas palatinas aut thoracis varias, ipsasque vesiculas Pulmonum opplente, sicque humoralis massæ circulationem tantillum impediēte, originem ducens.

Occasionem hinc præbent Cibi pluries assumti falsi, acidi, lenti, dyspepti, fumo siccati, Potus Cerevisiæ acescentis, aut Vini penduli, austeri. Mora frequens & diutina in Aëre frigido & humido.

Cognoscitur haud difficulter ex præsentia symptomatum febrilium non adeo vehementium; Tussis subinde adest plus minus sicca aut humida, ut & Dyspnœa, Cephalalgia obtusa, Dysorexia, Siticula, Interdum Gravedo, Lassitudo membrorum, Somnus inquietus, interruptus.

Benigna hinc est talis Febris, periculum ex sese nullum præfagiens, atque sensim Catarrho imminuto, tandem vel per sudorem, vel per alias vias evacuatione factâ, penitus evanescens.

Curatur hinc non nisi per Catarrhi viscidæ incisionem atque resolutionem, acris edulcorationem, superflui evacuationem, debilitati viscerum toni corroborationem; ac denique appetitûs imminuti revocationem; quibus indicationibus satisfieri

potest ante omnia per *Clysmâ emolliens ac detergens*, vel per *laxans sequi.*

℞. *Syrup. Fl. Acac. vel*

Persic. vel

Ros. sol. comp. cum R. A.

& S. ʒij.

Aqu. Beton. ʒj.

Scab. ʒʒ.

Elect. è Succ. Ros. ʒiʒ.

M. f. Potio d. ad Vitr. pro dosi matutina.

Vel ℞. *Diacydon. lucid. ʒʒ.*

Aqu. Verben. q. s.

M. f. Potiuncula d. ad Vitr. pro dosi mane jejuno stomacho sumendâ.

Postea *Infusum fol. Théè cum Betonic. Chamædri, Trifol. fibrin. & Flor. Ros. rubr. mane ac vesp. ad aliquot vascula propinabitur, cum vel sine sequenti Essent.*

℞. *Essent. Succin.*

Betonic.

Lignor. ana. ʒiʒ.

M. d. ad Vitr. Dosis 20. ad 30. gutt. pro dosi.

Vel exhibebitur *Pulvis sequens:*

℞. *Corall. rubr. ppt.*

Eboris phil. ppt. ana. ʒij.

Radic. Ireos flor.

Pulv. fol. Beton. ana. ʒj.

Majoran.

Flaved. Cort. Aurant. ana. ʒʒ.

Sacch. cand. alb. ʒj.

M. f. Pulv. subt. d. ad Scatul. Dosis singulis sex horis ʒij. cum Aqu. Betonic.

Extus vertex Capitis & Nucha illinatur bis vel ter quotidie *Oleo è flor. Slotan. cum Oleo still. Succin. Bacc. Juniper.*

Si *Tussis* adfuerit, *Syrupus Bellidis minoris*, *Papav. rhead.* de *Jujubis*, *Tussilag.* *Heder. terr.* *Scabios.* *Nicotianæ succo*, *Oxymel simpl.* vel *squillit.* per *cochlearia* lambendus dabitur, cum vel sine *Oleo Amygdal. dulc. rec. expr.*

Ad *Asthma* autem dissipandum, *respirationemque liberiores reddendem Decoctum* sequens convenit:

℞. *Radic. Ireos flor.*

Aristol. rot. ver.

Scill.

Scrophul. ana. ʒiij.

Fol. Heder. terr.

Scabios.

Veron.

Flor. Bell. min. ana. Mj.

Bacc. Junip.

Semin. Anis. ana. ʒiij.

Ficuum pingu. par. iv.

Incis. & contus. Coqu. in Aqu. font. Mens. iij. ad quartæ partis consumt. In Colaturâ Album. ov. clarific. dissolv.

Oxymelit. squillit.

Syrup. de Erys. Lob. ana. ʒij.

M. d. ad Vitr. Dosis singulis octo horis Cyath. ʒiiij. calidè.

Sed & Spir. Salis arm. anisat. Spirit. Cochlear. Nasturt. Sal. volat. oleos. Sylv. man. ac vesp. ad gutt. 25. cum Aqu. Veronic. dari solet non sine insigni effectu.

FEBRIS PVERPERARVM, est *Febris lactea*, de quâ supra actum.

FEBRIS ARTHRITICA est *Febris continua*, cum atrocibus satis membrorum, imprimis Articulorum, doloribus Hominem excrucians. Sen-

tiunt hunc dolorem in omnibus ferè membris simul, sicque differt à *Dolore Podagricorum & Arthriticorum*, quibus non nisi in uno tantum vel altero Articulo simul obtingit dolor.

Originem verò ducit à sanguine acri, falso, in minimis canaliculis tardius decurrente, hincque æstuan- te ac fibrillas ubicunq; nerveas, mem- branaceas vellicante.

Facile cognoscitur ex ipsius Æ- grotantis relatione, neque periculi quid portendit, modò per sudoris aut Renum vias salia ferocia sanguinis eliminantur.

Curatio omnis absolvitur *Clysmatis emollientis ac detergentis* inje- ctione, etiam reiteratâ, sanguinis per incisam brachii pedisve venam de- tractione, deniq; Remediorum diu- reticorum & diaphoreticorum crebrâ exhibitione, cum expectatione su- doris quotidiani; v. gr.

℞. *Ocul. ʒi. ppt.*

Crystall. alb. ppt.

Lumbr. terr. ppt.

† *n. diaphor.*

Dent. aprin. ppt. ana. ʒj.

M. f. Pulv. subtil. div. in 10. doses æqu. ad ch. m. ac vesp. cum Infuso fol. Thée capiendas.

Pro ordinario potu cedat *Deco- ctum radic. Gramin. Filic. Scorzoner. Passular. min. C. C. ras.*

FEBRIS VRETICA est *Diabe- tes cum Febri continuâ conjuncta*, de quâ vide suo loco.

FEBRIS PURPURA est *Febris continua benigna aut maligna cum volatice*

volatico rubore & ardore cutim variis in locis occupante affligens, atque à Lymphâ salino-acri extremos tubulos sanguivehos crispante oriunda. Curatur non nisi ut *Febris Synochus*, extus *Farina* probè siccata cum *Camphora*, *Cretâ alb.* & *Bolo* mista applicatur.

FEBRIS INTERMITTENS est Febris, siue calor totius corporis præternaturalis non continuè, sed per certum temporis intervallum duntaxat durans, dein nunc ex toto, nunc maximâ parte intermittens, & postea novo cum paroxysmo recurrens. Tempus intermissionis ἀπουεξία vocatur, quæ perfecta est, si Febris omnino cessat, ac demum post aliquod temporis spatium redit; imperfecta autem, si Febris non ex toto remittit.

Reditus Febris nuncupatur *Paroxysmus*, παροξυσμός, latinè *exacerbatio*. Atque hæc quidem si quotidie recurrat, *Quotidiana*, si diebus alternis, *Tertiana*, si denique tertiâ quavis die post præcedentem paroxysmum redeat, *Quartana* appellari Febris consuevit.

Febres autem qualescunque *intermittentes* nullam pro sui causâ putredinem agnoscere videntur. Etenim Serum Sanguinis in ejusmodi Morbis lentorem atque visciditatem ab interfluente acido quodam sale errante sibi comparavit. Ista autem qualitas, quantum à resolvente humorum putredine distet, iis maximè notum est, qui doctrinam de fermentatione, digestionem & putrefactione resolvente

probè callent. Plerunque autem Serum siue Lympha hæc aciditate errante pollens in viscidum atq; lentum humorem commutatur in Mesenterio, Pancreate, Ventriculo, Intestinis, aliisve partibus glandulosis Abdominis.

Quòd si proin Febris intermittens nidulari incipit, tum 1. errans Lymphae acidum, undecunque transmissum, chylo & hinc ipsi sero Sanguinis in vasis sanguineis, qualiumcunque coctionis viscerum, commiscetur. 2. Humores acido imprægnati magis lenti, crassi ac viscidi evadunt. Hinc 3. sequitur talium humorum stagnatio, adeoque simul vasculorum, & glandularum oppilatio. 4. Ad certa temporis intervalla humor ille viscidus colligitur, locumque pristinum replet. 5. Statis autem temporum periodis, mediante robore naturæ, siue motus oscillatorii vasculorum, humor ille excutitur, & sanguineæ massæ affunditur. 6. Ubi dein ob disproportionatam consistentiam, & figuram acidarum particularum rigidam cum Sanguine circulando, in extremis tubulis obhæret, atque fibrillas tubulorum vicinarumque nervosarum, præcipuè in cute & panniculo carnosio, austeritate quadam constringendo & crispando modò frigoris lenis, modò horroris aut etiam rigoris alicujus sensum producit; qui per horam unam alteramve durat, donec videlicet ob constrictos plurimos tubulos sanguis regurgitans 7. Motum in reliquo sanguine circulante intestinum auctiorem vel intensum magis reddendo æstui febrili ansam dederit,

derit, sub quo denique 8. plurium pauciorumve horarum spatio Febreos materia morbifica evicta, soluta, ac præcipitata sub formâ sudoris prodeat, sicque paroxysmo febrili finem imponat. Hæc autem omnia in uno Paroxysmo febrili contingere solent, & quando cessarunt, ἀπυρεξία adest sive quies à Febri, tamdiu durans, donec in fomite sive loco affecto nova materia febrilis collecta similem prorsus effectum, sicut antea, edat, sicque paroxysmum novum producat.

Febris
quotidia-
na.

FEBRIS QVOTIDIANA est Febris intermittens singulis diebus certâ ferè horâ recurrens, & cum levi frigore, æstu, siti, lassitudine aliisque symptomatibus Hominem affligens.

Pars af-
fecta.

Afficiuntur in hoc morbo primariò humores, dein & ipsæ per consequens solidæ partes.

Causa.

Gignitur autem à pituitâ viscido-acidiusculâ ipsam sanguinis Massam percurrente, atque singulis 24. horis ita replente, ut hinc sensim effervescentia s. Ebullitio febrilis oboriatur, tamdiu durans, donec illæ particulæ heterogeneæ deflagrârint, & vel per insensilem transpirationem, vel per sudorem præcipitatæ Paroxysmum febrilem finiverint. Pituitosæ autem illæ particulæ è primis maximè viis suppeditantur; quando videlicet in his per aliquantum tempus cruditates ejusmodi ex nimia ingurgitatione ciborum potusque non adeo laudabilis per coctionem Ventriculi imminutam fuerunt collectæ.

Facile hæc cognoscitur Febris ex ipso tempore affligendi, & durationis spatio. Plerunque sub meridiem aut vesperam Paroxysmi accedere solent. Pueris quàm Adultis familiarior est morbus, Symptomataq; non adeo vehementia obtinet. Paroxysmus ut plurimum 5. vel 6. horis finitur, totaque Febris non adeo diu durat, modò Æger obediens, Medicusque sanandi peritus extiterit. Appetitus in paroxysmo nullus, extra eum verò exiguus est: præterea Paroxysmus à frigore magis quàm horrore incipit, ultra dimidiam horam plerunque durante; subsequitur calor totius corporis, cum siti, lassitudine, stomachi gravitate (ut propterea Vulgus appellare consueverit, *daß truckende Fieber*) subinde & Cephalalgia aut Ventris Torminibus, quibus per quinque sex aut plures horas durantibus succedit mador, vel sudor, Paroxysmo finem imponens.

Morbus proin, si benè ac diligenter tractetur, minimè periculosus est, licet interdum Ægros emaciet; si verò negligitur, in Cachexiam vel Hecticam facile transit, & mesaraicarum Glandularum obstructionem post se trahit.

Quoad medendi Methodum, statim in principio eo adnitendum, ut primæ viæ expediantur, atque à pituitosarum cruditarum saburrâ liberentur; quem in finem Puero sexenni statim summo mane, quo quidem extra Paroxysmum febrilem versatur, exhibebis sequ.

R. Mer-

℞. *Mercur. dulc. opt.* ʒß.
Scammon. ℥rat. gr. vj.
 ʒ n. *diaph. gr.* iv.
Radic. Aron. pulv.
Crem. Fri ana. gr. j.
Sacch. alb. gr. iv.

M. f. Pulv. subtil. d. ad ch.

Vel ℞. *Syrup. de Cich. cum Rhab.* 3vj.

Aqu. flor. Acac. ʒß.

Cinnam. bugl. ʒß.

Scam. ℥rat. gr. iiij.

Mercur. dulc. opt. gr. viij.

M. ad Vit. & detur pro dosi.

Postea tentandum unicè, ut Liquor gastricus à præternaturali visciditate, & crassitie fixâ liberetur, concoctio naturalis restituatur, sicque tota sanguinis Massa ad meliorem volatilitatis statum redigatur. Hunc in finem m. ac v. sequentium medicaminum unum vel alterum exhibeatur:

℞. *Rad. Irid. florent.*

Aron. pulveris.

Chelidon. maj. ana. ʒß.

Cinam. opt. ʒß.

ʒ n. *diaph.*

Ocul. ʒ. ppt.

Diaph. martial. ana. ʒij.

Salis Cichor. ʒj.

Sacch. alb. ʒiiij.

M. f. Pulv. subt. d. ad Scatul. Dos-

is ʒj. ad ʒß. cum Syrup. de Fumar.

Vel ℞. *Ebor. ppt.*

Diaph. ʒial. ana. ʒj.

Bezoard. miner. ʒß.

Pulv. flor. Centaur. minor. ʒj.

Sacch. alb. ʒiiij.

M. f. Pulv. subt. d. ad Scatul. Dos-

ʒj. cum Aqu. destill. Card. bened. Fæ-

nic. Scab. Nasturt. vel cum Potu ordinario, aut cum Vino generoso Aquâ diluto. Si Æger cum vehiculo detrectet assumere pulverem, tum poterit ille cum potu ordinario permisceri, & sic paulatim exhiberi. Si planè non arrideat, tum præscribi potest sequens:

℞. *Succ. ex Herb. recent. Beccab.*

Urtic. urent. Plantaginis, &

Nasturt. aqu. expr. ac filtr. ʒj.

Julep. rosac. ʒij.

M. ad Vit. Detur singulis mane ac vesperi extra paroxysmum pro dosi, donec Febris cesset.

Vel ℞. *Aqu. dest. Chelid. maj.*

Nasturt.

Apii selin.

Cherefol. ana. ʒij.

Fumar.

Card. ben. aa. ʒiß.

Sacch. alb. ʒij.

M. ad Vit. Dentur m. ac v. ʒij.

Pro potu ordinario concedatur Decoctum *Agrim. vel Rad. Gramin. & Scorzon. cum Liquirit. Anis. Vel etiam Decoctum Mercur. vivi* seqq. modo paratum:

℞. *Mercur. vivi purgat.* ʒiiij.

Aqu. fontanæ q. s.

Coque per bihorium, sub finem adjice

Radic. Liquirit. ʒiß.

Semin. Anis. ʒj.

Passul. min. ʒß.

Colatur. filtrat. Miß. d. ad Ampull. vitream.

Quod si ex usu horum remediorum octidui spacio Febris nec cesset,

nec minuatur denuo purgans exhiberi potest, Puero sexenni v. gr.

R̄. Rhab. opt. ʒß.

Mercur. dulc. gr. vj.

Scammon. ʒrat. gr. iiij.

Crem. ʒri gr. j.

Sacch. alb. gr. vj.

M. f. Pulv. subt. d. ad ch. & exhibeatur mane jejuno stomacho cum Sympo violaceo, aut Decocto ordinar. ac postea usque ad meridiem subinde Jusculum detur.

Vel R̄. Diacydon. lucid. ʒij.

Aqu. Fœnic. ʒiß.

Card. Mar. q. s.

M. f. Potiuncula d. ad Vitr. pro dosi matutinâ.

Postmodum in usu remediorum supra dictorum pergatur, usque ad Febris ablationem & Appetitûs restitutionem.

Poterit tamen ad certiore restitucionem sequens etiam Pulvis m. ac v. exhiberi cum vehiculo qualicumque commodiore:

R̄. Cortic. Peruv. optim. ʒß.

Salis Absynth. ʒß.

M. f. Pulv. subt. div. in 12. dos. ad ch. m. ac vesperi dandas.

Si æstivum est tempus, & Ægrotus ad perfectam ἀπυρεξίαν deveniat, audacter immitti potest extra paroxysmum Balneo Aquæ dulcis, cui incoctæ sint Herbæ quædam Cephalicæ mollientes, ac inibi non adeo fervidè ad horam unam vel alterâ detineatur; incredibile enim est, quantum ejusmodi Balnea energieam Remediorum juvent ac promoveant, ipsum Ventriculi menstruum restituant, atq;

primas insuper vias eluant. Si tandem alicui placebit usus *Essentiæ* cujusdam *spirituosæ*, quemadmodum *Trifolii fibrini*, *Nasturt. aquatic. Cochleariæ*, *Apii selini s. Paludarii*, ut & *Tincturæ* ʒiii, 8. ad 12. guttularum dosi m. ac v. institutus, ei non refragabor. In Adultis autem dupla, triplave dosi omnium observanda venit.

In Dietâ Juscula imprimis commendentur carnea, apud Adultos quoque, nisi insigniter adversentur, Herbis nasturcinis alterata. Fugiantur omnia acida, omnia sale nimis condita, pastæ farinacea saccharata, fructus horæi copiosi, dyspepta omnia, quæque chylum admodum crassum & viscidum exhibere possunt. Interdicatur vocacitati nimie, potui gelido, Balneis frigidis, aliisque corporis refrigerationibus nimis.

FEBRIS TERTIANA est Febris intermittens s. effervescentia Massæ humoralis, singulis alternis diebus Ægrum novo cum rigore, æstu, siti, aliisque symptomatibus febrilibus affligens.

Primariò quidem afficitur humoralis Latex, secundariò autem omnes ferè partes solidæ simul patiuntur. Fomes tamen s. focus hujus Febreos in variis Abdominis, præcipuè Hepatis, glandulis latere communiter creditur: ego in Ventriculi & Intestinorum Glandulis vitium imprimis latitare arbitrarer.

Producitur enim hic Morbus à fermentitiis quibusdam particulis bilioso-acidis & salino-fixis, è primis viis

viis bidui semper spacio in Massam sanguineam ad turgescientiam usque transmissis, atque hinc, eandem turbando, febrilem paroxysmum excitantibus. Ansam verò præbet ut plurimum coctio seu chylicatio Ventriculi perversa, aut specifico aliquo modo alterata, quæ sensim Chylum minus laudabilem, minusque perfectum gignendo Sanguinem ad hunc morbum prædisponit, ita ut postmodum levi datâ occasione, sive per cohibitam insensilem transpirationem, sive per animi pathemata, sive aliis modis turbatus Febrim hanc accendat. Aëris, Ciborum, Potûs mutatio ad producendam hanc Febrim multum contribuit. Qui Belgium primò salutant, frequentes hanc Febri corripuntur. Duplex Tertianæ hinc duplicem fomitem habebit, ita quidem, ut è quolibet duorum dierum spatio subministretur materia febrilis sanguini circulanti, pro excitando paroxysmo; cumque plus ex uno fomite, quàm ex altero fortè subministretur, hinc paroxysmus unius diei dissimilis erit Paroxysmo sequentis aut præcedentis diei, quoad modum affligendi, & symptomatum conditionem, dum materia vel acrior, vel copiosior, minusve talis eorum vehementiam mutare solet.

Ante tertium Paroxysmum vix certus esse Medicus potest de hac Febri. Dein etiam affligendi modo & tempore ab aliis facillè discernitur. Incipiunt autem Paroxysmi hujus Febreos cum insigni rigore, quem cæruleus unguium color, dorsi horri-

pilationes, vigiliæ & inquietudines antecedunt. Rigor ille durat communiter ad horam unam, aliquando ulterius extenditur, subinde ita fortis, ut non dentes solùm concutiat, atque stridentes reddat, sed & cum ipso corpore simul lectum tremere faciat. Rigorem sensim remittentem excipit Æstus totum corpus divagans, nunc major, nunc minor, nunc diuturnior, nunc brevior: huic sese jungit interdum varia anxietas & inquietudo, amarororis, nausea, imò & vomitus humorum biliosorum & acrium, quando in febrili insultu folliculi Fellis fibræ spasmodicè contractæ suam omnem bilem in Duodenum, hinc & aliquâ sui parte in Ventriculum eructant. Accedit his simul sitis ingens, cum ipso sæpius rigore incipiens; hinc & quosdam simul affligit Cephalalgia, atque Lumborum magnus dolor, alios verò ab his symptomatibus liberos videas. Rarius etiam simul deliria in summo æstu accedunt, diu tamen non durantia. Vidimus, quod rarum est ac malignitatem sapit, quibus in quolibet ferè paroxysmo tormina ventris, convulsiones universales, vel anxietas pectoris cum suffocationis metu, valdè molestum, imò & discriminis plenum reddebant paroxysmum. Omnes & extra Paroxysmum, & intra ipsum, lassitudine totius, appetitu vel prostrato, vel insigniter imminuto vexantur. Sunt qui in Paroxysmo post sedatam sitim dormire possunt, alii verò etiam per 16. pluresque horas ita inquieti existunt, ut dormire

dormire prorsus nesciant. Postquam, autem hæc Symptomata ad 8. 12. pluresve horas durârunt, tandem expirante calore Sudor ut plurimum erumpit largus, per quem febrilis materia magnam partem deflagrans Paroxysmo finem imponit. Sudor ille plerunq̃ue ita foetet, ut Ægro ipsimet magnum fastidium pariat. Raræ sunt illæ Tertianæ, quæ sine rigore aut frigore incipiant, ac eæ in Glandulis subcutaneis nullas obstructions agnoscunt.

Febris *tertiana* autem nunc *simplex* est, alternis tantum diebus Hominem affligens; nunc *duplex*, singulis diebus eundem exercens, quæ dignoscitur à *Quotidianâ* intermittente, quod hæc stasis quotidie horis iisdem cum symptomatibus accedat; *Tertianæ* autem duplicis periodi tales sint, ut primi diei paroxysmus respondeat quoad omnia tertii diei paroxysmo; secundi autem diei paroxysmus similis sit quartæ diei paroxysmo. *Quartana* triplex è suis quoque signis cognoscitur.

Prognosis.

Quoad *Prognosin*, Febris hæc est ut plurimum absque periculo; imò in Juvenibus creditur Sanguinis depuratoria. Icterus superveniens eam solvit. Vernalis aut æstivalis *Tertiana* citius, quàm Autumnalis & hyberna curatur; hæc enim non raro in *Quartanam* aut *Tertianam* duplicem degenerat. Senibus autem hic Morbus quandoque lethalis evenit. Quo citius in Urinis signa coctionis apparent, eo Febris brevior aestimatur; coctionis præcipuum signum est

nubecula globosa in medio Urinæ adparens; si verò hoc signum tardius comparet, tunc Febris quoque longior evadet. Vehementiores in principio Paroxysmi morbum brevior fore designant.

In *Curatione* primò conveniunt alterantia incisiva, quæ crudos primarum viarum humores incidunt, atque præparant; v. gr.

R̃. $\frac{1}{2}$ nîi diaph. 3℔.

Nitr. $\frac{1}{2}$ niat.

Flor. Sal. arm. hæmatit. ana. gr. xv.

M. f. Pulv. subt. in 2. dos. æqu. ad ch. divid. Dentur spatio 12. horarum cum haustu Aquæ Cichor. vel Taraxaconis.

Vel R̃. Ocul. $\overline{\text{O}}$. ppt.

Nitr. $\frac{1}{2}$ niat.

Salis Cent. min.

Absynth. ana. ʒj.

M. f. Pulv. subtil. divid. in 4. dos. æqu. ad ch. sumantur m. ac vesp. cum Aqu. Card. bened. vel Jusculo non salito.

Postmodum si ex secundo vel tertio paroxysmo certus es de præsentia hujus Febreos, *Vomitorium* dandum; v. gr. in Adulto:

R̃. Oxyfacch. emet. 3℔.

Aqu. Borræg.

Plantag. ana. 3iij.

Cinam. bugloss. 3ij.

M. f. Potiuncul. d. ad Vitr. & exhibeatur unâ vice mane diei vacui, vel 6. horis ante paroxysmum, superhauriendo Juscula aliquot. Vel, si malit Æger pulverem, sequentem da:

R̃. Crem. $\overline{\text{P}}$ ri gr. xv.

Salis Centaur. min.

Bezoard.

Bezoard. min. ana. gr. v.

¶ Priemet. gr. ij.

M. f. Pulv. subt. d. ad ch. & exhibetur pro dosi.

Vel Infusum Croci Metallor. aut Vitri ʒ nīi, ad duas uncias mane jejuno stomacho bibendum exhibetur.

Vel Ipecacuanhæ pulvis subtilissimus ad ʒß. concedi potest, superhauriendo frequentia Juscula carniū non salita, aut Infusum folior. Théē. Rustici nostrates verno quidem tempore Gemmas Sambuci duodecim plus minus, recentes sumunt, instar Acetariorum accommodant, ac ita comedunt, indeque ἀνω καὶ κάτω purgantur.

Aliās autem frustum Tabaci per noctem immergunt tribus quatuorve uncias Vini albi, hocque postridie mane bibunt, ac ita vehementer purgantur, ut Febrim hinc omnem omitant sæpius.

Quando autem per vomitum reici nequit saburra primarum viarum, tum catharticum dabitur, v. gr.

℞. ʒ n. diaphoret.

Salis essent. Card. ben. vel Acetosell. ana. ʒß.

Diagrydii.

Nitri ʒ iat. ana. gr. viij.

M. f. Pulv. subt. detur pro dosi mat.

Vel ℞. Radic. Jalapp. ʒj.

Crem. ¶ Pri.

Mercur. dulc. opt. ana. ʒß.

Scammon. sulphur. gr. iij.

M. f. Pulv. subt. d. pro dosi mat.

Post hæc si Plethora aliqualis adest, & Ager magnum in paroxysmo estum, vehementiaque symptomata atatur, tum aliquot horis ante pa-

roxysmum Vena secari potest; quæ tamen absente Plethorâ, Cephalalgia, aliisque vehementibus Symptomatibus nullum locum habet. Postmodum aliquot horis ante Paroxysmum sequens vel similis potio haurienda propinabitur:

℞. Aqu. Card. bened. Fumar.

Nasturt. ana. ʒj.

Syrup. Rub. id. ʒß.

¶ Pri ʒ lat.

Bezoard. miner. ana. ʒj.

Misc. f. Potio d. ad Vitr.

Dein antifebrilia in usum vocentur, qualia sunt nobis usitatissima & omnium optima.

℞. ʒ nīi diaph.

Specif. antifebr. Croll.

Ocul. ʒ ppt.

Flor. Sal. arm. hæmat. ana. ʒß.

Caryphyllor. aromat. gr. xij.

Sacch. opt. gr. xxiv.

M. f. Pulv. subtil. in 6. dos. æqu. ad ch. divid.

Sumantur m. ac v. extra paroxysmum cum Jusculo, vel Aqu. Cherfol. Endiv. Fænic. aliave.

Vel ℞. Conchar. ppt.

Bezoard. min. ana. ʒij.

Salis Card. bened.

Centaur. min. ana. ʒj.

Ol. still. Garyoph. gutt. iij.

Sacch. alb. ʒß.

M. f. Pulv. subtil. dividendus in 6. dos. æqu. ad ch.

Vel ℞. Ebor. ppt. ʒij.

ʒ nīi diaph. ʒiß.

Salis Absynth.

Cichor.

Flor. Sal. arm. hæmat. ana. ʒß.

Ol. stillat. Garyoph. gutt. viij.

Sacch. alb. 3j.

M. f. Pulv. subtil. in 12. dos. æqu. ad ch. divid.

Vel R. Regul. ʒ n. medicinal. aut

Magist. ʒ n. diaphor.

Corall. rubr. ppt.

Salis Tabaci ana. ʒij.

M. f. Pulv. subt. div. in 4. part. æqu. ad ch. Sumantur m. ac vesp. cum Aqu. Taraxac. Ulmar. Nasturt. Urtic. aut simili.

Quod si Pulverum formam quis fastidiat, huic magno cum successu similes pulveres cum Extracto Absynth. Gentian. Helen. &c. & Essentiâ Myrrh. in Pilularum formam reducere, harumque dein ʒj. vel 3ß. cum vehiculo aliquo suprâ dicto concedere possumus.

Si Decoctum amarum Ager non respuat, ei sequens parabimus :

R. Radic. Gentian. Aristol. rot. ver.

Calam. aromat. ana. 3ß.

Herb. Anserin. Scabios.

Card. bened. ana. Mj.

Summit. Centaur. min.

Flor. Calendul. ana. Mß.

Semin. Anis. Nasturt. hortens. ana. 3ij.

Cortic. Peruv. opt. 3j.

Incis. & cont. coqu. in Mensuris duabus Vini & Aquæ : de Colaturâ m. ac vesp. hauriantur Unciæ quatuor.

In Paroxysmo ipso ad mitiganda symptomata cochleatim præscribe :

R. Aqu. Scabios. Plantag.

Borrag. ana. 3j.

Syrup. Rub. idæi.

Flor. Tonic. ana. 3iij.

Confect. Alk. inc. 3j.

Matr. perl. ppt.

Bezoard. min. ana. ʒj.

M. ad Vitr.

Quando Anxietas & Dyspnœa hancce Febrim comitantur, tum Sperma Ceti ad 3j. aliquot horis ante Paroxysmum in Jusculo dabitur. In ipso autem Paroxysmo :

R. Aqu. Consol. regal.

Ulmar. ana. 3ij.

Syrup. Acetosell. 3vj.

Succi Citr. rec. expr. 3ij.

Spirit. Salis arm. anis.

Cinnab. nat. opt. ana. 3ß.

M. d. ad Vitr. capiatur cochleatim.

Si Convulsionες erumpant, sequens Mixtura præscribitur ;

R. Aqu. Fl. Til.

omn.

Calendul. ana. 3j.

Syrup. de Semperviv.

Pæon. ana. 3ß.

Tinct. Castor. cum Spirit. Sal. arm. par. 3ß.

Essent. Opii liquid. ʒß.

Ungul. Alc. ppt.

Cinnab. ʒ n. corr. ana. ʒj.

M. d. ad Vitr. cochleatim præbeatur. Extus adhibe, quæ sub titulo de Convulsionibus laudata sunt.

Quod si his per octiduum usurpatis Febris non minuatur, tum ad fortiora antifebrilia deveniendum, qualia sunt ; v. g.

R. Radic. Gentian.

Cortic. Chinkinn. ana. 3ij.

ʒ n. diaph.

Flor. Sal. arm. hæmat. ana. 3j.

M. j.

M. f. Pulv. subt. in 6. dos. æqu. div. ad ch. Sumantur m. ac v. cum haustu Vini generosi, in quo prius per aliquot horas Pulvis immersus jacuit. Vel

Rx. Flor. Centaur. min.

½ n. diaph.

Alum. rup. ana. 3ß.

Ol. still. Gargoph. gutt. ij.

Sacch. opt. ʒj.

M. f. Pulv. subtil. in 3. dos. æqu. ad chart.

Vel Rx. Fol. Card. bened.

½ n. diaph. ana. ʒij.

Nuc. moschat.

Flor. Sal. arm. hæmat. ana. ʒj.

Piper. alb. ʒß.

Sacchar. alb. ʒj.

M. f. Pulv. subtil. in 4. dos. æqu. ad chart.

Vel quod nunquam penè fallit:

Rx. Cortic. Peruv. opt. 3ß.

Salis Absynth. 3ß.

M. f. Pulv. subtil. in 6. dos. æqu. ad ch. div. Utere mane ac vesperi extra Paroxysmum, cum hausti Vini albi generosi.

Rustici Helvetii subinde mediam pulveris Piperis nigri vel albi drachmam cum haustu Vini, vel cum Cochleari pleno Spiritus Vini mox in rigoris febrilis principio deglutiunt, & ita Febrim abigunt.

Ufus talium remediorum, inprimis Corticis Peruv. continuandus est, etiam post abactam Febrim, ne reeat amplius, quod aliàs fieri assolet.

Vel dentur Juscula succis Herbarum antiscorbuticarum alterata, aut ipsi succi soli sumantur, expressi è recentibus Urticæ urentis, Na-

sturt. aquat. Plantaginis utriusq, Cherrefol. Cochleariæ, Beccabung. Taraxacon. Apii Macedonic. Raphani rustican. &c. quorum succorum dosis ad ʒij. vel plures extenditur, atque pro luitu etiam Saccharo edulcoratur, hincque per decem aut plures dies m. ac v. bibitur. Vel Infusum Chinkinnæ seqq. modo paratum hauriri potest, ceu infallibile Febrifugum:

Rx. Cortic. Chinkin. opt. 3ß. vel 3vj.

Cinnam. opt. 3j.

Salis Centaur. min. 3ß.

M. f. Pulvis subtiliss. cui affunde Vini albi veteris Mens. j. Stent in Vitro clauso per plures dies, & quotidie bis agitentur. Tertio hinc die m. ac v. extra paroxysmum cyathus hauriatur unciarum 5. vel 6. liquoris agitatione probè turbati, quia simul Pulvis ipse sumendus est ad Febrim optimè fugandam. Etsi autem ab haustis sic aliquot hujus remedii dosibus febriles Paroxysmi emanent, redeunt tamen plerunque post aliquot hebdomadas, ad quod præcavendum ulterius in usu ejusdem medicaminis est persistendū; donec appetitu perfectè redeunte, omnis recidivæ metus sit abactus. Succedanea Chinkinnæ sunt varia, sed suo tamen effectū non ita probata.

Rx. Cortic. median. Fraxin.

Radic. Gentian. ana. ʒiij.

Summit. Absynth.

Centaur. min. aa. 3iß.

Flor. Sal. arm. hæmat. 3j.

M. f. Pulv. subtiliss. cui affunde

Vini alb. generos. ʒiv.

Stent in loco tepido, subinde agitando; postmo-

postmodum sume sicuti Infusum Chin-
kinæ.

Vel ꝛ. Lign. Colubrin. ʒij.

Cortic. median. Sambuc.

Radic. Gentian. ana. ʒiʒ.

Salis Absynth. ʒj.

Sacch. alb. ʒiij.

M. f. Pulv subtiliss. cui affunde

Vini alb. optim. tenuis ℥iij.

Stent in loco tepido, hinc m. ac v. ʒiij.

vel ʒiv. de Liquore turbido hauriantur.

Si Homo plethoricus vel pituito-
sus fuit, simul ipsi commendari pote-
rit usus Balnei alicujus mineralis alu-
minoso-argillacei, cui etiam ferventi
Æger in ipso febrili Rigore insidere,
& postea in eo manere poterit per æ-
stum ipsum febrilem, quoad vires
permiserint. Expertus hoc sum in me-
met ipse, plurimisq; aliis hucusq; fui.
Si verò Cholericus, aut Melancholi-
cus fuerit, tunc post antifebrilium
usum Acidularum potus concedatur,
quibus alii substituunt Serum Lactis
cum Tamarindis factum, in quo bul-
lierint Herbæ quædam antiscorbuticæ,
v. g. Fumaria, Cherefol. Agrimon. Ur-
tica, Apium selinum, Plantago &c.

Ad minimum sex horis ante pa-
roxysmi insultum nihil ciborum assu-
mere convenit. Pisces, Caseus, O-
va, Caro suilla, Lac, Fructus horæi,
Placentæ, omniaque pingua fugian-
tur. Die vacuo Vinum concedatur,
ni caput inde gravetur, die febrili au-
tem omittatur. In rigore febrili ni-
hil bibatur, in æstu autem potus non
ita gelidus concedatur. Subinde fo-
lia Cochleariæ, Acetosæ, Nasturtii,
Semperivi major, vel orbiculi pomi

Citri ingerantur sicco Ori ac masticen-
tur ad fallendam sitim.

Externè sæpius de collo suspen-
dunt Camphoram nodulo inclusam
Carpis manuum verò applicabis seq

ꝛ. Telas aliquot Araneæ.

Diascord. Fracast. ʒij.

Fuligin. splendid. ʒiʒ.

Radic. Allii ʒʒ.

Rad. Raphan. rustic. rec. ʒj.

Incis. & contus. in formam Cataplas-
matis redige, linteo superinduc, & ap-
plicato tam carpis manuum, quàm plan-
tis pedum, ubi addi potest insuper fer-
mentum Panis, atq; Acetum. Quidam
radices incisas Plantaginis carpis ma-
nuum quotidie semel apponunt
Alii ad superstitiosa confugiunt, qua
interdum citò supprimunt Febrim
sed cum sequenti Ægrotantis damno
& hecticâ sæpi⁹ Diathesi subsequente

Quando Cardialgia cum Paro-
xysmo simul accedit, linimentum se-
quens scrobiculo Cordis, Manuum-
que carpis inungito, bis vel ter de die.

ꝛ. Terebinth. clar. ʒj.

Fuligin. splend. ʒij.

Telas aliquot Araneæ.

Milleped. viv. numer. 20.

Flavedinem cortic. unius Citri
recens raspatam.

Ol. Scorpion. q. s.

M. f. Linimentum, d. ad Pyxid.

Plantis verò Pedum Herbæ recen-
tes Bursæ Pastor. Erysim. Gratiæ Dei,
Millesfol. Plantag. Heder. terrestr. in
formam Cataplasma. cum Albumine
ovor. & Farinâ redactæ tepidè appli-
cantur.

In *duplici Tertianâ* eadem conveniunt remedia , modò extra paroxysmum & in paroxysmo decenti ordine dentur.

FEBRIS QVARTANA est Febris intermittens , sive Effervescencia sanguinis præternaturalis , quarto quoque die cum horrore , calore , reliquisque symptomatibus febrilibus Hominem affligens , eumque mitius , quam Tertiana solet , exercens.

Subiectum seu *Focus* hujus Febreos communiter est Ventriculus , Pancreas , Lien vel Hepar , quarum partium glandulæ in hoc malo plerumque obstruuntur.

Est autem Febris quartana aliquando *simplex* , in quâ paroxysmus quarto quoque die tantùm contingit : aliquando est *duplex* , quando post duos quosvis febriles dies vacuus intercedit : tandem etiam est *triplex* , quando singulis diebus novus paroxysmus accedit , ita quidem ut paroxysmus primæ diei respondeat paroxysmo quartæ , paroxysmus secundæ diei paroxysmo quintæ diei &c.

Originem ducit Quartana *proxime* à succo acido-austero pituitoso , non nihil viscido , qui in sanguinem singulis quatuor diebus , quocunque demum ex foco emissus , ejus mixturam turbando , novum paroxysmum suscitatur , tamdiu durantem , donec febrilis materia , quâ datâ commo- diore portâ deflagrârit. Ut adeo hunc facillè in Morbum labantur , qui per aliquod tempus vitiosa usi diætâ , cruditates pituitosas , acido-austeras ,

plus minus viscidas in sanguine collegerunt , easque ad hoc aut illud viscus glandulosum præcipitari concesserunt.

Si *Diagnosin spectes* , paroxysmi *Diagnos.* quarto quoque die statis periodis , *sis.* versâ vel eâdem diei horâ accedunt , atque Hominem eo ferè modo , licet non adeo vehementi , quo Tertianæprehendunt , cum horrore nimirum ultra horam semper durante , hinc sequente æstu , siti &c. Præcedunt tamen quemlibet paroxysmum multæ oscitationes , pandiculationes Lumborumque molesti dolores. Paroxysmi sæpè ad 24. horas extenduntur , atque ut plurimum terminantur in sudores largos , acidum olentes. In principio Morbi anorexia ferè adest , deinceps autem intermissionis diebus Ægri evadunt famelici , quo fit , ut non tam emacientur , quàm in Tertianâ. Febris hinc etiam diuturnior existit Tertianâ , quandoque ultra annum durans. Urina multum variatur , modò enim cruda , aquosa , tenuis , albicans ; modò crassa , lixiviosa , turbata ; modò cum pauciore , modò cum copiosiore sedimento apparet. Pulsus in paroxysmo major , citatior , febrilis , extra eum verò tardus , & lentus est. Color faciei pallidus redditur. Affligit magis Adultos , quàm Pueros , eos verò potissimum , qui vitiosâ diætâ quoad cibum potumve Stomachi chylicationem turbârunt , ac inde crudum , viscido-pituitosum chylum cumulârunt.

Quartana Febris semper diuturna , *Progn.* *sis.* præ-

M m m

præprimis circa Autumnum affligens, quæ non rarò per totam insequentem Hyemem, nullis obediens remediis durat. Reperiuntur etiam qui ultra annum, imò ad biennium usque hoc malo excruciantur. Periculo tamen caret in Subiecto minus impuro; in fordido autem corpore Scirrhus viscerum, Atrophias, Hydropes, Cachexias, Hæcticas, aut si mitius agitur cum Ægro, Scabies fœdas post se trahit. Solutio felicior circa Æquinoctia contingit. Ex Quartanis simplicibus, duplices vel triplices redditæ, periculosæ aut valdè diuturnæ sunt.

Curatio.

In Curatione obstructions glandularum referandæ, eumque in finem remedia incidentia, attenuantia, aperientia atque volatilifantia sunt præscribenda. In principio hinc dabis purgans; v. g. sequens:

℞. Mercur. dulc. opt. ℥j.
Vitæ correct. gr. ij.

Extract. cathol. ℥℞.

Bezoard. min. gr. iv.

Ol. stillat. Garyoph. gutt. j.

F. l. a. Pilulæ num. xv. in aur. d. ad ch. & sumantur 6. vel 8. horis ante paroxysmum pro dosi.

Vel ℞. Mercurii dulc. opt. ℥j.

Flor. Sal. arm. martial. gr. iv.

℞is. ʒ nii correct. gr. ij.

ʒ n. diaph. gr. vj.

Conserv. Ros. rubr. non ☉ lat. 3j.

M. cum Saccharo f. Bolus pro dosi.

Vel ℞. Radic. Ipecacuanh. ʒ℞.

F. pulv. subt. d. ad ch. pro dosi mat.

Vel pro re natâ Infusum Fol. Senneæ atque Rhabarbari propinetur. Nonnulli etiam Vinum medicatum

purgans expetunt, quibus seqq. vel simile ordinari potest.

℞. Radic. Aristol. rot. ver. ʒ℞.

Fenicul.

Vincetox. ana. 3ij.

Cortil. Cappar. Tamaric. aa. 3j.

Herb. Agrimon. Anserin.

Chamædr. ana. Mj.

Summit. Centaur. min.

Absynth. ana. M℞.

Fol. Senn. opt. mund. 3j.

Fibr. rad. Helleb. nigr.

Rhab. elect. ana. 3ij.

Cortic. Winteran. 3j.

Semin. Anis.

Salis Card. bened. ana. ʒij.

Incis. & contus. indantur nodulo ex Sindone rubrâ, cui affunde

Vini albi Veteris Mj.

Aqu. fontan. fervent. M℞.

Postea singulis matutinis, exceptâ die febrili Cyathus unciarum sex vel 8. ex hauriatur.

Deinceps ad Paroxysmos diffundendos Antipyretica seqq. præscribi possunt, vel quotidie danda, vel aliquot duntaxat ante paroxysmum horis capienda, quibus accenseri possunt & ea, quæ in Febri tertianâ commendata notantur:

℞. Fri ☉ lat. ʒj.

Flor. Sal. arm. Ente Veneris aur.

Martis imprægnator. ʒ℞.

Cinnab. ʒ n. opt.

Bezoard. min. ana. gr. v.

M. f. Pulvis subtil. aliquot horis ante paroxysmum cum Aquâ aliquâ destillatâ capiendus.

Vel ℞. Bezoard. min. gr. xv.

Flor. Sal. arm. hæmatit.

Cinnab.

Cinnab. nativ. opt. ana. ℥ss.

M. f. Pulv. subt. pro dosi.

Vel R̃. ℥nii diaph.

Salis Centaur. min. aa. gr. xv.

Ol. still. Garyoph. gutt. ij.

Sacch. alb. ℥ss.

M. f. Pulv. subt. d. pro dosi ad ch.

Vel R̃. Cortic. Chinkinn. subt. pulv. ℥j.

Flor. Sal. arm. hemat. gr. iv.

Conserv. Bellid. min. ℥iiij.

Cum Sacch. f. Bolus pro dosi quotidie bis capiendus, donec Febris dispereat.

Vel R̃. Cortic. Chinkinn. opt. ℥iiss.

Ol. stillat. Garyoph. gutt. ij.

Salis Absynth. ℥ss.

Conserv. Beton. ℥j.

Cum Saccharo f. Bolus d. ad ch.

Magis æstimare soleo liquidam huius remedii formam, quæ certò Febrim tollit, ita ut rarò amplius redeat; aut si redeat, mox iterum tribus vel quatuor remedii dosibus assumtis profligabitur; v. gr.

R̃. Cortic. Chinkinn. subtil. pulv. ℥j.

Cinnam. opt. pulv. ℥ij.

Salis Card. bened. ℥j.

Mixtis affunde Vini albi veteris & generosi ℥iv. stent in loco calido, subinde agitando, hinc quotidie m. ac v. ℥iv. ad ℥vj. Liquoris turbidi bibendas offer, idq; per octiduum; secundâ septimanâ Æger semel duntaxat quotidie Infusum hauriet, etiamsi jam Febris liberatus existat. Tertiâ autem hebdomadâ alternis solùm diebus ejusdem Remedii dosi exhibebitur. Atque hâc certè methodo Æger in totum à Febris ita liberabitur, ut non amplius postea recurat, quemadmodum post alia medicamina, ipsumque etiam

Peruvianum Chinkinnæ corticem avarâ manu, aut minus frequenter usurpatum fieri assolet. Opiatæ etiam formâ Galli eundem Corticem assumunt; v. gr.

R̃. Conserv. Ros. pallid.

Violar. purp. ana. ℥j.

Pulv. Cort. Chinkinn. ℥vj.

Diaph. martial. ℥ij.

Syrup. aperit. Minder. q. s.

F. Mixtura molliuscula d. ad Oll. de quâ Æger vacuis diebus singulis trihoris Castaneæ magnitudinem capiat.

Circa Corticem Peruvianum notabis, eum si adulteratus fuerit, & effectus planè, effectum nullum laudabilem edere, Febrimque minimè tollere. Quamobrem semper præscribendus est optimus. Dein redit subinde Febris, postquam aliquandiu remisit; verùm abigenda semper eodem remedio. Si appetitus bonus, Urina naturalis, alvus respondens, somnus tranquillus, vix amplius redeunt Paroxysmi febriles.

Febri abactâ sequens vel simile Remedium laxativum exhibere necesse est, ad reliquias educendas.

R̃. ℥n. diaph. non elutriat. gr. xxv.

Crem. Fri ℥ss.

Scammon. ¶ rat. gr. v.

Ol. still. Fenicul. vel Garyophyll. gutt. ij.

Sacch. alb. ℥ss.

M. f. Pulv. subt. d. ad ch. pro dosi.

Vel R̃. Mercur. dulc. opt. ℥j.

Bezoard. min. ℥ss.

Resin. Jalapp. gr. viij.

Crem. Fri gr. ij.

Conserv. Ros. rubr. s. Ol. ℥j.

M m m 2

Cum

Cum Saccharo fiat Bolus d. ad ch. pro dosi matutin.

Vel R̄. Aqu. Taraxac. vel Cichor. vel Cent. min. ℥iv.

Syrup. Violar. ℥j.

Salis polychrest. ℥ij.

M. f. Julepus pro dosi matutinâ.

Sudori post Quartanam nimium excrucianti occurrere licet seqq.

R̄. Conf. Ros. rubr. ℥i℥.

Confect. Hyac. ℥i℥.

Conditur. Nucist.

Cynosb. ana. ℥j.

Unicorn. fossil.

Terr. sigill. ana. ℥ij.

Syrup. Cydon. q. s.

M. f. Electuar. d. ad Oll. singulis sex horis capiatur magnitudo Nucistæ.

Vel R̄. Tinctur. antiphthif. Garm. ℥iij. d. ad Vitr.

M. ac Vesp. sumantur xvij. guttulæ cum Aquâ Plant. & Syrupa Viol. purp.

Vel R̄. Terr. sigill.

Corall. rubr. ppt.

Unicorn. fossil.

Diaph. martial. ana. ℥ij.

Rad. Tormentill.

Caryophyllat. ana. ℥j.

Sacch. cand. alb. ℥ij.

M. f. Pulv. subtil. d. ad Scat. Dosis m. ac v. ℥℥.

Si diuturnæ Quartanæ Anasarca supervenit, Decoctum Granorum Coffee tostorum sæpius usurpandum, ac interea seqq. Pilulæ purgantes semel vel aliquoties sumendæ sunt:

R̄. Mass. pilul. hydrop. Bont.

Mercur. dulc. opt. ana. gr. xv.

Crem. Fri gr. ij.

Aris Antimon. correct. gr. j.

M. f. cum Ol. stillat. Garyophyllor. Pilulæ num. xij. pro dosi.

In Diætâ ab acidis, fixis, nimium salitis, concoctu difficilibus; imò à nimia ciborum assumptione cavendum. Nasturcina hortensia, prout sunt Paludapium, Cherefol. Nasturt. hortens. Raphanus rusticanus, Borrago &c. sint in deliciis. Denique ad profligandam tanto certius efficaciusque hanc Febrim etiam Balnea Aquæ dulcis profunt, aut Thermæ in Balneo quotidie semel aut bis per aliquod tempus usurpatæ; illarum enim ope viscida nostri corporis fortiter resolvuntur, obstructions glandularum referantur, ac ita febrilis materia prorsus destruitur.

Ad profligandam Febrim quartanam Medici cujusdam Angli sequens Remedium fuit:

R̄. Vini rubri boni ℥ix.

Infusum Ollæ terreæ probè vitratæ coque ad ebullitionem unam, postea immitte

Corticis Peruvian. optimi pulverisat. ℥ij.

Baccar. Juniper. contus.

Summitat. Centaur. min. incisor. ana. ℥j.

Olla hinc probè tectâ stet in Cineribus calidis per octo horas; Liquorem postea decantatum in Vitris benè clausis ad usum repone; relictis autem speciebus adhuc quatuor Vini libras affunde, frigideq. affusas sine, donec potio prior absoluta fuerit, ac dein mane & vespere ad uncias quatuor bibe; Prius autem coctum & præparatum Vinum sequenti modo in usum trabe.

Nimirum

Nimirum unâ vel duabus horis ante finem paroxysmi febrilis Æger bibet Liquoris supra dicti quatuor circiter uncias, atque ita singulis trihoriiis vel quadrihoriiis continuabit, cibos suis temporibus capiendo, ut inter potionem & pastum semper sit intervallum duarum horarum.

Notandum autem, decem aut duodecim accessus Febreos esse prætermittendos, antequam hoc Remedium usurpetur. Corpus etiam prius debet esse purgatum, atque Venæsectio præmissa. Per duos quin & menses post usum remedii neque purgandum est corpus, neque Clysteres dandi, neque Venæsectio administranda. Abstinentum à Cibis crudis, Lacticiniis, Acetariis, Fructibus horæis, & omnibus dyspeptis. Vino utendum albo, penetrante, bono, diuretico, sed non immodicè aut intempestivè. Omnis tristitia & melancholia procul absit, & animus semper ad hilaritatem sit compositus.

Ad destruendum autem penitus fermentum febrile, impediendamque recidivam, Liquor de novo est componendus, atque post ablatam etiam Febrim, per plures adhuc dies bis vel ter quotidie cyathus exhauriendus. Denique aliquot adhuc Vini Mensuræ residuis speciebus affundi, atque sine coctione præcedaneâ bibi possunt; quâ certè methodo Recidivæ metus omnino discutietur. Si Pueri aut Infantes hâc Febri laborent, idem Remedium juvare poterit, fractâ pro ætatis ratione dosi exhibitum, cumq; Vino Aquâ diluto paratum.

FEBRIS QVINTANA, SEX-TANA, OCTANA, &c. sunt Febres intermittentes, quæ singulis quinque sex, octo &c. diebus recurunt, & Hominem placidè affligunt. Rarissimæ sunt hæc Febres, & eodem modo, quo reliquæ Intermittentes producuntur, videnturque habere fomitem non ita amplum, unde febrilis materia tardius ipsi Sanguini ad sufficientiam præbetur pro excitando novo paroxysmo. Curatio eodem modo est instituenda, quo sanari posse & solere Quartanam supra notavimus.

*Febris
quintana,
sex-
tana &c.*

FEBRIS ALBA, CHLOROSIS, *Chlorosis.*
Pallidus Virginum Color, Icterus albus, est febricula continua lenta, ab intemperie sanguinis pituitoso-acido-viscosâ ortum ducens, atque pallidum corporis totius colorem, cum aliquali tumore oedematoso, artuum lassitudinem, menses non rarò suppressos, lumborum frequentem dolorem, cordis palpitationem, aliaque symptomata post se trahens.

Primario itaque vitium hæret in ipsâ massâ humorali; si quid verò si-ve obstructionis, sive mutati coloris, in reliquis contingat partibus, id non nisi *secundario* accidit. Plerunque tamen accusari heic solet Uterus cum Vaginâ uterinâ, vel etiam Partibus feminis elaborationi dicatis, à quarum obstructione reliqua ferè humorum labes deducitur.

*Pars aff-
secta.*

Causa proxima Chloroseos est Intemperies sanguinis pituitoso-acido-viscosa & salina, in quâ nimirum par-

Causa.

riculæ balsamico - oleosæ volatiles sunt suppressæ, aut inviscatæ; molecule autem pituitosæ, viscidæ, salino - acidiusculæ nimium prædominantur, simulque levem humorum turbationem continuam instituunt. *Antecedens* causa plerunque sunt est glandularum Vaginæ uterinæ, Uterive ipsius obstructio, hincque liquoris genitalis in sanguine retentio: stimulatior quoque ad Venerem, quæ cum non conceditur, tristitiam parit Mensium item suppressio, nunc sponte facta, nunc arte etiam nefandâ à meretricibus imprægnationem præpedire conantibus procurata: imò & Foetus vix dum concepti artificiosa exturbatio. Ut plurimum tamen in Virginibus innocentibus chylus nimis pituitosus, & viscidus subinde & acriusculus ad sanguinem delatus, prædictæ Sanguinis intemperiei, hinc & turgescentiæ ejusdem leni, atque glandularum Vaginæ uterinæ obstructioni, nonnunquâ & ipsi Mensium emanationi ansam suppeditat. *Procatartica* causæ sunt victus sive esus crassus admodum & pituitosus, fructuum horæorum oleorum s. herbarum hortensium, aquoso magis & terrestri, quàm volatili aut sulphureo principio gaudentium, aliorumque ciborum nimis salforum acidorum, fumo induratorum, vel similium difficilis digestionis, & succi viscido - pituitosi existentium. Vina vappida, crassa, austera, vel Cerevisia similis qualitatis. Aëris crassioris & frigido - humidioris frequentior usus. Tristitia, Mœror, Terrores, & Anxietates Cordis, Somni

longiores. A quibus omnibus causis Intemperies sive Cacochymia illa induci valet, in quâ Spiritus vitales ita sunt irretiti, ut sufficientem quantitatem spirituum animalium exhibere minimè possint. Ab istâ autem Spirituum penuriâ, non secus atque à sulphureo - balsamicarum molecularum depressione omnia, mox in signorum diagnosticorum numero recensenda, symptomata producuntur.

Cognoscitur haud difficulter Affectus ex Faciei, totiusque corporis colore pallido & subalbido, interdum etiam plumbeo, livido atque virescente. Cui junguntur in his aut illis subjectis tumor vel inflatio hypochondriorum; membrorum gravitas & lassitudo; respiratio nonnihil difficilis; frequens ciborum fastidium; pedum circa malleolos intumescencia; corporis totius laxa mollietates, ac levis, quasi oedematosa, inflatio, adeoque & faciei tumor tantillum aquosus, palpitatio cordis, palpebrarum, perceptio pulsationis articularum in temporibus, atque collo; pulsus nonnihil celer & parvus; creber dolor capitis gravans; sensuum tarditas & aliqualis torpor; somnolentia; ructus frequentes; borborygmi ventris, præprimis à pastu; crebræ horripilationes cutis; excreta inconcocta, ac pituitosa; urina crassa, plerunque cruda, subinde magis splendens, raro plus tinctorum; mensium obstructio tandem simul interdum jungitur.

Affectus diuturnus magis, quàm periculosus, præsertim si nondum altas egit radices. Inveteratus autem

ad graviores etiam morbos anſam præbet, velut ad Aſthma, Cachexiam, Anaſarcam, Hydropem, Sterilitatem, Febrim lentam, Phthiſin. Si menſtruus Fluxus ſtato quoque tempore contingit, atque debitâ etiam quantitate prodiſcit, tametiſi colore minùs naturali appareat, meliorem tamen ſpem priſtinæ ſalutis facit. Suppreſſi verò ſi ſunt menſes, difficulterque revocari poſſint, malum deterius eſt. Si Filia Veneri indulgeat, atque per liquoris vaginalis acrimoniam ad eandem ſtimuletur, conjuſio morbum curabit, ni in melancholiam hyſtericam, vel uterinum furorem incidere velit.

Curatio ferè inſtituitur, quemadmodum in Febrili lentâ. Ante omnia *Vomitorium* exhibeatur, ſi Venter ſcateat viſcidis admodum, pituitofiſque humoribus, & quidem in hunc finem dabuntur vel *Syrup. emet. Ang.* *Sal.* ad ʒʒ. vel grana duo ꝑri emet. cum *Salis Angel.* aut *Absynth.* granis ſex & decem *Crem. ꝑri*: vel *Ipecacuanhæ pulvis* ad ʒʒ. vel aliud etiam exhibebitur. Si tamen magis in Intesti-
nis cruditates deprehendantur, tum *Vinum medicatum* potius juvabit, v.g. paratum ex *Radicib. Enul. Angelic. Calam. arom. Scill. Aristol. rot. ver. Chelidon. maj. Caryophyllat. Petasitid. Herb. Betonic. Artemiſ. Fumar. Scabioſ. Borrag. Cochlear. Naſturt. Origan. Meliſſ. Thèe, Agrimon. Veron. Hyſſop. Flor. Roſ. rubr. Calendul. Bacc. Laur. Semin. Aniſ. Fœnic. Naſturt. Aquileg. Fol. Senæ, Rhabarb. Agar. trochiſcat. Hellebor. nigr. Cortic. Winter. Cina-*

mom. Zingib. Spic. ind. Sale Absynth. Centaur. min. Card. bened. Limatur. Chalyb. in petiâ ligat. &c. Ex quibus debitâ doſi inter ſe combinatiſ ſaccu-
lus conſiat, atque *Vinum album vetus, Aquag. fontana* æquali menſurâ ſuperaffundantur, hincque ſinguliſ matutiniſ cyathuſ exhauriatur.

℞. *Radic. Angel.*

Aristol. rot. ver.

Vincetox. ana. ʒʒ.

Herb. Meliſſ.

Trifol. fibr.

Card. bened. ana. Mj.

Bacc. Laur.

Semin. Fœnic. ana. ʒij.

Fol. Sen. opt. mund. ʒj.

Rhab. elect. ʒiij.

Radic. Helleb. nigr. ʒij.

Cortic. Winter. ʒj.

Salis Artemiſ. ʒiij.

Incisiſ, contuſiſ & ſacculo inditiſ affunde

Vini albi opt. ℥iiij.

Aquæ font. ℥iij.

Stent per noctem in loco tepido, dein quotidie mane cyathuſ unciarum quatuor exhauriatur.

Si quæ verò ejuſmodi remedium ſaſtidiat, huic aliquotieſ *Pilulæ purganteſ* offerentur ex *Extract. cathol. vel Pilul. cochiar. cum Mercur. dulc. & Ol. ſtillat. Piper. vel Maciſ.*

℞. *Extr. cathol. vel*

Maſſ. pilul. maroc. ʒj.

Mercur. dulc. opt. gr. xv.

Reſin. Scammon. gr. iij.

Ol. ſtillat. Mac. q. ſ.

M. f. l. a. Pilulæ num. 15. inuratæ dentur pro doſi matut.

Imò

Imò ipsa Jalapæ resina ad 7. vel 8. grana in Spiritu Ceras. nigr. Meliss. Anis. vel Aquâ vit. Matthiol. soluta, & aliquot drachmis Syrup. violacei aut flor. Tunic. diluta atque edulcorata felicissimè corpus purgabit.

℞. Spirit. Anth. vel

Aqu. vit. Matth. 3j.

Resin. Jalapp. gr. viij.

Solutis leni igne adde

Syrup. viol. purpur. 3ij.

D. ad Vitr. pro dosi.

Suafores tamen sumus, ut purgationi præparantia quædam, crudita- tumque incisoria remedia præmittan- tur, quemadmodum sunt Crem. ꝑr. Flores Salis armon. martial. vel hæma- it. Salia Absynth. Card. bened. Cent. min. Angel. Tamar. ꝑrus Olat. Ocul. & simil. ad 3j. vel 3ß. data. Imò ipsum Elix. propriet. s. acido cum Tin- cturâ Antimon. vel Martis aperit. Vel Sal volatil. oleosum Sylv. ad gutt. 20. m. ac vesper. optinè quoque præparat. Post purgationem, subinde repeti- tam, alterantia incidentia atque vola- tilifantia in usum diuturnum voca- buntur, quæ inter maximi æstima- mus Destillatum ex Herb. Beccabung. Meliss. Nasturt. aquat. Cochlear. Raph. rustican. Fimo Caballi avenâ nutriti, quorum invicem mistorum Aqua de- stillata ad 3. vel 4. uncias m. ac v. hau- riri potest. Hujus loco tamen alii malunt Juscula Herbis nasturcinis al- terata, vel Succos iisdem ex herbis expressos, filtratosq; ad 2. vel 3. uncias pro dosi m. ac vesp. per plures hebdo- madas propinatos. Quandoque & Decoctum Radic. Bryon. Aristoloch.

Vincetox. Chelidon. maj. Pimpinell. Pe- tasitid. Doronic. Enul. Ireos florent. A- ron. Herb. Veronic. Anserin. Meliss. A- grimon. Sabin. Amarac. Rorism. Thym. Marrub. alb. Cortic. Aurant. vel Citr. Semin. Dauc. Anis. Cardamom. Flor. Ros. rubr. Genist. Calendul. &c. bono cum successu in usum trahi potest. Sequens Infusum aut simile chaly- beatum rarò fallit in hoc Affectu:

℞. Radic. Mutellin.

Ireos flor.

Aristoloch. ana 3ß.

Herb. Betonic.

Meliss. ana. Mj.

Summit. Amarac.

Rorismar. aa. Mß.

Spic. Indic.

Cinam. opt.

Semin. Anis. ana 3ij.

Incis. contusis & sacculo illigatis af- funde

Vini alb. vet. ℥iiij.

Aqu. fontan. ℥j.

Mane ac vesperi hauriantur unciae tres post pastum.

℞. Rad. Galang. Cyper. ana 3ij.

Fol. Marrub. alb. Agrim. aa. Mj.

Cardamom. Mac.

Cort. Winter. ana 3ij.

Semin. Fœnic. 3iß.

Scoriar. Ferr. vel Magnet. 3vj.

Incis. & contus. affunde Vini alb. ℥iiij. & utere ut supra.

Verùm hisce aut similibus reme- diis jungimus quoque nunc Essentias, nunc Pilulas aut Pulveres Sanguineæ massæ balsamicum florem exaltantes: qualia sunt v. g. Tinctura Mart. ape- rit. Tinct. ʒnii. Elix. vitæ Matthiol. Spirit.

Spirit. Salis armon. anisat. aut fœnicul. Sal. volat. oleos. Sylv. Spiritus matric. qualiscunque, Spirit. Sanguinis humani, Cochlear. Meliss. Nasturtii, vel aliud quodvis haud ingratum, Essent. Cort. Aurant. Croci, Helen. Galang. Zedoar. Cinamom. vel Garyophyll. aromatic. Extract. Gentian. Absynth. Calam. aromat. Marrub. alb. Beton. Artemis. Diaph. mart. vel Zivial. Crocus Mart. aperit. Vitriolum Mart. Ocul. ☉. ppt. Ebur. ppt. Sal. volat. C.C. Succin. Viperar. Corall. rubr. ppt. Terr. sigillat. Cassia lignea vera, Radix Acon. vel Ireos flor. Species aromat. & quævis aromata, Pulv. stom. Birckmann. E quibus etiam cum Conserv. Ros. rubr. ☉. Beton. Flor. tunic. Calend. & Condit. Nuc. indic. Zingib. &c. Electuarium concinnari, atque ter vel quater de die magnitudine nucistæ exhiberi potest.

Quod si Fœmina aliàs plethorica fuerit, ac subinde æstibus volaticis torqueatur, *Venæsectionem* administrare haud metuimus. Æstivo tempore autem tales personas, convenientibus prius remediis præparatas, nunc ad *Thermas* ♄reas, si frigidiores sint, nunc si calidiores bonoque stomacho gaudeant, ad *Acidulas Sualbacenses* ablegare solemus. Cum *Acidulis* tamen subinde *Balneo* quoque insideant; vel absoluto *Acidularum* potu, *Thermarum* quarundam *Balneo* per octiduum, vel longius tempus utantur.

In *Diætâ* fugiantur omnia dyspepta, cruda, falsa, fumo liccata, acida, aquosum & pituitosum chy-

lum præbentia. *Cibi* verò *Aromaticis*, atque *Plantis nasturcinis* sint semper alterati. Pro potu concedendum *Vinum rubellum, bonum*. A singulis partibus utatur vel *Decocto gran. Coffée tostor. vel Infuso folior. Thé, vel Rore Solis, Elixir. Citr. aut Apii selin.* aliove Liquore sulphureo non admodum forti, sed digestionem tamen juvante. *Animus* curis, tristitiâ, odio, sit vacuus. *Exercitia* corporis commendantur frequentia. *Laconica* quoque & sudatoria *Balnea* singulis hebdomadis in usum trahantur.

FEMORIS LVXATIO, vid. *Luxatio.*

FICVS, FICOSIS, & FICATIO Ficus est Excrescientia carnea, non ita magna, plerunque indolens, nonnihil subinde pruriens, rubescens, à succi nutritii lenti ac visceri copiosiore admissione & stagnatione, in Palpebris, Mento, Digitis, Ano, Pudendis muliebribus, ubi aliàs etiam *Condylomata* vel *Mariscæ* appellari solent, enascens.

Ficus appellantur hæc Exanthemata, vel quòd colore fructum *Ficum* æmulentur; vel quòd materia è suppuratis talibus excrescientiis prodiens, acinos *Ficum* referat. Productio autem ejusmodi *Tuberculorum*, non secus atque eorum *Curatio* cum *Condylomate* coincidit, ut adeo Lectorem eo loci ablegare cogamur, ubi de *Condylomatibus* agitur.

FICVS CANCROSVS est Ex- Ficus
cancro-
sur. crescentia carnosâ, dura, lividis atq; vari-

varicosis venis confita, nunc major nunc minor, cum acerbissimo dolore scindente & pungente Hominem miserè excrucians, & nunc in Oculi Bulbo, nunc in Mammis, nunc in Labiis, nunc in aliis glandulosis locis exurgens, & à fero salso, acido-corrosivo plus minus fixo, spiculis suis acutissimis scindente, nervosasque fibrillas jugiter pungente proveniens.

Cum ergo Affectus hic ab ipso Cancro quoad genesin, diagnosin, prognosin, & curam nihil differat, huc quoque trahenda erunt, quæ suo loco notavimus.

*Assura
Papilla-
rum.*

FISSVRÆ PAPILLARVM, s. *Rhagades*, sunt rimulæ, scissuræ vel Ulcuscula in Papillis lactantium Puerperarum ut plurimum enascentia, & partim ab ipsâ Infantum suctione fortiore, partim à succis circulantibus acrioribus, è corpore Nutricis eo delabentibus, oriunda. Occasionem simul præbentibus fibrillis affectæ partis nimium teneris atque delicatis.

Affectus Puerperis primiparis ferè proprius, subinde tamen etiam Virginibus, aliisque Fæminis contingens.

Causa.

Producuntur tales Fissuræ à lymphâ qualicunque falsa acri, sub tempore suctionis stagnante, sensim hinc tubulos erodente, sicque findente & exulcerante. Quandoque & ipsum Lac salso-fervidum ad incommodum contribuit. Si teneri sunt papillarum tubuli, Infansque fortius fugat, tum eo facilius roduntur, aut rumpuntur. Antecedenter verò accusatur sanguis,

chylusve maternus, salibus acribus nimium refertus, & imprægnatus; vel etiam motu intestino satis rapido fervidior redditus; unde febricitantibus quoque Fœminis facilius hoc malum obtingit. Tandem & Caco-chymia scorbutica aliave salso-acris; sicut & ipsa lactentis Infantis saliva iusto acrior, & fervidior similiter ad Affectum contribuere valet.

Facile cognoscuntur ex Fæminarum querelis, dolent maximè papillæ, cum Infans fugit, aliquid subinde sanguinis emanat. Quin si caco-chymia salso-acris in Puerperis hæreat, aliquando prorsus erosæ decidunt, aut in suctione ab Infantibus auferuntur. Durant subinde diu, nec ita facile sanantur, quoniam consolidatio à suctione frequenti impeditur, non secus atque à succis allabentibus. Quæ Fœminæ autem dulcem sanguinem habent, aut fibras Papillarum admodum firmas, in illis hoc malum citius sanatur.

Ad sanandas Papillarum Rhagades intus quidem humores edulcorandi vel absorbendi sunt, in quem finem *Emulsiones* frequentes ex *Seminib. Lactuc. Endiv. Melon. Cucum. Cucurbit. Amygdal. dulc. cum Aqu. Nymph. Endiv. Portulac. Succis. Ulmar. Lactuc. Fumar.* paratæ & potæ maximè conducunt. Sed insimul *Pulveres* dentur absorbentes, ex *Unicorn. fossil. Coralliis ppt. Ebore ppt. Terr. sigill. Bolo armenat. g nio diaph. Bezoard. mineral. C. C. f. ign. ppt. Ocul. 30. ppt. & similibus, cum Emulsione vel Infus. fol. Thée, Veron. &c. data. Pro Potu*

Potu ordinario Decoctum C.C. Hord.
Radic. Filic. Graminis, Liquirit. Sem.
Anis. Lign. Sassafr. concedendum.
A Cibis falsis, & acrioris aromatici
succu abstinendum. Vini usus inter-
mittendus. Alvus quotidie respon-
deat, naturâ vel arte.

Externè Venæsectionem in Pletho-
ricis suademus. Dein ipsis Papillis
frequenter inungantur hæc aut illa
Linimenta, qualia v. g. sequentia esse
possunt:

℞. Butyr. recent. non salit. Aqu.
plantag. optim. lot. 3vj.

Mucilag. Semin. Psyll. Aqu. Pru-
nell. fact. 3iij.

Pulv. rad. Consolid. maj.

Terr. sigillat. ana. 3ß.

Lapid. Hæmat. ppt. 3j.

M. f. Ungt. d. ad Oll.

Vel ℞. Cremor. Lact. dalc. 3ß.

Succ. Cancror. fluvial. recent.
express. 3ij.

Pulv. Rad. Alth. 3j.

Bol. armenat. 3j.

M. ad Oll. & inungatur frequenter.

Vel ℞. Mucilag. sem. Psyll. 3ij.

Gumm. Arab. 3j.

Ceræ alb. novæ 3j.

Pingued. Gallin. 3ß.

Ol. rosac. q. s.

Misce & inunge frequenter.

Vel ℞. Medullam Cruris vaccini, Tere-
binthinam & Mel; incalescant
in linteo, eo dein quod inde re-
sudat, fissuras inungito.

Vel ℞. Ol. Rosar.

Lil. alb. ana. 3ß.

Sem. Pap. alb. expr. 3ij.

Laventur cum s. q. Aqu. Sperm. Ran.
Plantag. aut Rosar. alb. Post admisce
Aqu. Calc. viv. q. s.

Agitentur invicem donec fiat Un-
guentum, cui adde

Sacch. Saturni 3j.

Magist. $\frac{1}{2}$ n. diaph. 3ij.

Camphor. 3ß.

Albumin. Ovi parum vel di-
midii.

Agitentur iterum probè ad formam
Unguenti, quod frequenter Papillis in-
ungendum.

Vel ℞. Ol. rosac. 3ß.

Mastich. elect. 3j.

Ceræ flav. 3ß.

Dissolutis invicem super ignem ad-
misce

Bol. Armen. ppt.

Extract. liquirit. ana. 3ß.

M. f. Linimentum.

Vel ℞. Butyr rec. Aqu. Ros. & Ulmar.
probè loti, & ita cocti, donec
nullum amplius strepitum e-
dat 3vj.

Album. Ovor.

Mucilag. gumm. Tragac. vel
Semin. Cydon. Aqu. Ros. fact.
ana. 3j.

M. f. Linimentum.

Vel ℞. Medull. Crur. vitulin.

Axung. canin. aut Muris alpin.
ana. 3iij.

Mucilag. semin. Cyd. Aqu.
Ros fact. 3ij.

M. ad Ollam.

Vel ℞. Pingued. Hirc. 3ij.

Olei Ovor. 3ß.

Amygd. dalc. frig. expr. 3ij.

N n n 2

Tut.

Tut. ppt. 3ß.

Magist. Saturni 3ß.

M. ad Oll.

Vel R̄. Ol. Ovor. 3ß.

Amygd. dulc. 3j.

Ceræ 3ij.

Myrrh. 3j.

M. ad Vitr. Illinatur sæpè.

Vel R̄. Ungt. diapomphol.

nutr. alb. ana. 3iij.

Ol. Hyperic.

Ovor. ana. 3iß.

Mucilag. sem. Cydon. Aqu. Ros.

fact. 3ij.

M. ad Ollam.

Vel R̄. Fol. Teleph. Brunell.

Betonic.

Veron.

Origan.

Sanicul.

Rad. Pimpinell. ana. 3j.

Liquirit. 3iß.

Incis. coqu. in s. q. Butyr. recent. Cum Butyri transmissi per column 3iß. misce Mucilag. sem. Psyll. Aqu. Ros. fact. 3ß.

Nonnullæ Puerperæ melius habent, ficubi folia Telephii, Aristol. rotund. Quercus tenera, Plantaginis latifol. Verbasco. Althææ, Sanicul. Alehy-mill. similiave recentia sæpius applicant. Aliæ levamen percipiunt ex inspersione Pulverum v. gr. Sacchari cand. alb. cum Tutia ppt. Lapid. calami. ppt. Sacchar. Saturn. $\frac{1}{2}$ nio diaphoret. Pulvere folior. Saniculæ, Quercus, Plantag. Verbasco. Radic. Alth. Liquir. Rhabarb. Symphyt. Myrrhæ, Mastichis. Vel Linteola Succo Folior. Symphyt. Verbasco. Plantagin. Solan. Aqu. Sper-

mat. Ranar. Brunell. Plantagin. Solan. Chelidon. major. Hierac. cum Mucilag. Gum. Trag. Aqu. Plant. extr. immersa sæpius tepidè applicant.

Præservationis gratiâ aliquot ante partum hebdomadis vel mensibus Gravidæ inungat papillas quotidie vel Oleo Amygd. dulc. rec. expr. vel Oleo Ovor. Vel Butyro rec. non salito, cum Spiritu Vini mixto, vel Oleo rosaceo, vel Calicibus cereis Resinâ Abietis plenis, & Papillis impositis. Cum dein fugendas primùm præbet Mulier papillas, statim à suctione Spiritu Vini camph. abluantur.

In ipso puerperio portentur Calices plumbei, vel stannei, vel argentei perforati, atque papillâ Vaccæ recens mactatæ obtekti, quâ ratione fugere Infans commodè potest, neque dolorem Matri inferre, cum labiis ipsam papillam non attingat.

Si his omnibus malum non mitigetur, tum una Papilla erit sananda sola, & interea altera Infanti præbenda. Curabitur citò, si sæpius de die Aqua Plantag. & Solani, vel Ulmarie, in quâ Mercurius dulcis est solutus; veletiam Aquâ nostra phagedænicâ abluatur, atque insuper mucilaginoso quodam Unguento probè inungatur, superimposito simul Calice cereo. Curata sic Papilla probè vel Lacte, vel Oleo Amygd. dulc. aut Ovor. abluta surgenda præbebitur; ac deinceps altera quoque curabitur. Sed interna remedia diaphoretica absorbentia, edulcorantia, minimè omittantur.

Quæ Fœmina singulis puerperiis malo hoc excrucietur, illa ad præcavendam

vendam incommoditatem extra tempus in gravidationis *Potu Acidularum* utatur. Dum verò gravida est, ab omnibus falsis, acribus, acidisque cibis sibi temperet, & quandoq; haustum *Aqu. Nymph. Cichorii* aut *Lactucæ* capiat.

FISSVRÆ ANI sunt solutiones continuitatis circa exitum Intestini recti ab humoribus falsis acribus, cuticulam & cutim exedentibus, exortæ, atque hominem in sedendi vel obambulandi actu molestantes. Humores illi acres quandoque ex Intestinis per modum Diarrhœæ defluunt: interdum è Massâ sanguineâ, scorbuticam aut veneram cacochymiam adeptâ, ad glandulas cutaneas partis affectæ præcipitantur; aliquando etiam inter equitandum, vel fortiter obambulandum æstivo tempore, dum corpus sudat, cutis Ani finditur, & excoriatur, præprimis si frictio partis instituitur, urgente pruritu.

Fissuræ istæ à *Lue venereâ* oriundæ intus quidem postulant remedia anti-venerea, extus autem *Unguenta* vel *Linimenta* admittunt, sub præcedenti titulo commendata, quibus tamen *Mercurium* vel *dulcem*, vel *præcipitatum album* cum *Floribus sulphuris* permiscere possumus. A scorbuticâ diathesti oriundæ Fissuræ per interna antiscorbutica, externa verò absorbentia balsamica sanantur. Fissuræ ab excoriatione per frictionem partis nimiam productæ, aliam non requirunt curam, quàm quidem *Intertrigo*, de quâ suo loco.

FISSVRÆ LABIORVM sunt Fissura labiorum. continui solutiones itidem à salino-acribus humoribus lymphaticis ortum ducentes, quando nimirum illi in tubulis Labiorum angustissimis, occasione vel frigoris externi adstringentis, vel sanguinis circulantis fervidi, crispantis, aut exiccantis, obhærent, atque cutis superficiem corrodingo findunt. Adscribuntur hæ Fissuræ à Veteribus subinde Hepatis intemperiei calidæ, ab aliis verò scorbuticæ cacochymicæ. In Febribus certè continuis non rarò excitantur; sed & illis sæpè contingunt, qui calente corpore per aërem frigido-humidum, vel frigidum duntaxat, peregrinari necesse habent, & diu antea libero aëre non fuerunt usi.

In *Curatione* intus quidem con- Curatio.ducunt plures diaphoretico-absorbentes pulveres, ex $\frac{1}{2}$ *nio diaph. Corall. alb. vel rubr. ppt. Ocul. ☉. ppt. C. C. phil. calc. Crystall. alb. ppt. Nitr. ppt. Diaph. ʒ. vial. &c. compositi*, & mane atque vesp. cum *Aquâ Plantag. Ulmar. Lactuc. Endiv. Portulac. Syrup. Violar. purp. de Nymph. Portulac. & Capillor. Vener. dati*. Extus autem *Linimenta* conducunt ad *Fissuras papillarum* superius commendata; vel *Unguentum pomatum*, *Ungu. rosac. Axungia bædina*, cum *Antimon. diaph. Bolo Armen. Mercur. dulc. Album. Ovor. Mucilag. Gummi. Tragac. permixt.* Quibus in pertinaciori malo vel substitui, vel addi potest *Oleum destill. Cerae, Saponis, Philosoph. cum Balsam. de Copaibâ*, vel *Tolutano* aut simili.

*Fistula
in genere*

FISTULA est Ulcus sinuosum, angustum, intus & extus callosum, sæpius indolens, ac profundos in partes cuniculos agens, liquorem plus minus aquosum continuè fundens.

*Differen-
tia.*

Variant autem Fistulæ pro multitudine *sinuum*, dum aliæ unicum tantum, aliæ plures sinus habent: pro diversitate *temporis*, quâ aliæ aliis antiquiores: pro *loco* denique, cujus gratiâ aliæ ad tendines & membranas, aliæ ad ossa ipsa cariosa terminantur.

Causa.

Sequuntur hæc Ulcera plerunque Abscessus profundiores, Exulcerationes sordidiores, Fracturas, Contusiones, Puncturas; quatenus massa sanguinea *Ægrorum* acido-acrior ad partes exulceratas continuè liquorem ferosum acido-austerum demittit, qui postmodum sese intra musculorum membranas insinuat, ac morâ sui acidior redditus paulatim nutritium al-labentem succum ita coagulat, ut finum postea, callosum ac duriusculum efformet. Cumque ipsemet ille liquor acquisitâ majori acrimoniâ ulterius rodendo serpit, nunc rectâ nunc obliquâ lineâ, tum simul sinus fistulosus vel in longum augetur, vel etiam ad latera multiplicatur. Imò tandem quoque ad vicina ossa transit, eaque radendo cariosa reddit.

*Diagno-
sis.*

Quod *Diagnosin* attinet, labia Ulceris fistulosi plerunque sunt albicantia, callosa; quandoque, si Fistula notæ deterioris sit, cœrulea, vel livida. Dolor adest, quando membranæ sensibiles arroduntur; nullus verò percipitur, quando interni sinus

jam sunt callosi. Labia dein Fistularum interdum sicca duraque sunt, interdum madentia. Materia saniosa è Fistulâ prodit nunc cum nunc sine aliquali sibilo, estque modò crassior, modò tenuior ac limpidior, nunquam tamen verum & perfectè laudabile pus. Stylo sive plumbeo, sive cereo exploratus pro more Fistulæ sinus, si ad Musculum tendit, fundum animadvertetur molle, nec admodum sensibile, sed sæpe tamen sanguinem fundens, vel leviter tactum. Si stylus tendat ad Os, tum durum quid & asperum styli admotione persentietur: si verò ad Nervos penetret, tum magnus excitabitur dolor, materiaque prodiens nonnihil oleosa apparebit: imò ipse motus partis dolorificus existet. Si Ossa stylo deprehendantur aspera, & inæqualia, signum est cariei illorum, prodiensque ichor plerunque tenuis, foetidus, atque nigrescens erit. Tandem si ad vasa sanguinea magis terminetur Fistula, materia purulento-sanguinea sæpius profluet sine foetore. Quemadmodum si terminatur intra tendines articulorum, sanies lenta ac viscida prodibit instar albuminis Ovi.

Quoad *Prognosin*, Fistulæ omnes curatu pronunciandæ sunt difficiles, inprimis autem illæ, quæ à sanguine caco-chymico, salino-acri foventur: quin ipsa etiam inde effluens sanies acris subinde, multâ sui parte sanguini reassusâ, in pulmonem, hepar, mesenterium, pancreas præcipitatur, ibidemque inflammationem & exulcerationem hecticam, *Ægris* certè funestam,

nestam, parere solet. Fistula, quæ ad Articulos non secus ac ad partes internas terminatur, prorsus incurabilis est. Quo diutius duravit, quoque sanguis Ægri magis impurus est, eo etiam minus sanabilis existit. Quæ ad Os cariosum tendit Fistula, non nisi carie extirpatâ curatur. Fistulæ ani quoque curatu difficillimæ, præprimis si profundius penetrent, haud tamen semper impossibiles.

In *Curatione* non solum sinuum callositas auferenda, Ulcusque probè eluendum, ac detergendum, sed & Caries ossis, si quæ adest, tollenda; acidum corrumpens, & erodens invertendum; totaque adeo Massa sanguinea edulcoranda, & à particulis acido-acribus salino-corrosivis liberanda. Itaque in omni Fistulâ, cujuscunque demum loci fuerit, primò purgans præscribi potest ex *Massa pilul.* è *succin. Craton. Extract. Cathol. vel Pauchymag. Croll. cum Mercurio dulci compositum*: v. gr.

Rx. Extr. Cathol. ʒβ.

Rhabarb. gr. 8.

Mercur. dulc. opt. ʒj.



Resin. Scammon. gr. iiij.

Ol. stillat. Succin. q. s.

F. l. a. Pilulæ num. 15. Sumantur mane pro dosi, & repetantur aliquoties.

Sunt qui *Vinum* quoque medicatum, vel potius *Apozemata* purgantia non sine fructu iis præscribunt, quibus talia non sunt adversa. Post purgans dein *Fonticulus* quoque in commodiore loco excitetur: & simul *Decoctum* aliquod sudoriferum, ac siccans in usum quotidianum præscribatur,

compositum ex *Radicib. Dictamni Cret. Aristoloch. Caryophyllat. Carlin. Apii, Virgæ aureæ, Scrophular. Pimpinell. Bistort. Scabios. Ulmar. Sarsaparill. Chin. Lign. Sassafr. Santal. Quercin. Guajac. Herbis Geran. robert. Vinc. pervinc. Alchymill. Beton. Millefol. Virg. aureæ, Sanicul Pyrol. Ophioglossi, Veronic. Nasturt. aquat. Flor. Ros. rubr. Calendul. Beton. Semin. Anis. Hyperici, Perfoliat. Urtic. Plantag. &c.* Quorum invicem incisorum atque contusorum manipulus *Mensuræ uni* sive libris quatuor *Aquæ fontis* incoqui, deque colaturâ ʒiv. mane ac vespere calidè propinari poterunt. Sed hoc *Decocto* Æger per plures menses utatur, si quidem curationem sperare velit. Quandoque & cum eodem vel simili decocto utiliter sumuntur *Tinctura ʒnii, Tinctura ʒtis aperitiva; Liqueur martialis niger; Tinctura antiphthis. Garm. Essentiæ traumaticæ* qualescunque, v. gr. è *Gramine Parnassi, Balsamo Indico, Myrrh. Stora-ce, Strobilis aut Gemmis Pini arboris, Foliis Quercus teneriorib., Geran. robert. Virgæ aureæ, Hyperico, Numulariâ, Trifolio fibrin. Plantag. Bellid. minor. Ophiogloss. &c.* cum superaffuso *Spiritu Vini tartarificato* paratæ, de quibus 20. vel 30. guttas pro dosi capere licet. Si quis verò malit *Pilulâ*, ex similium plantarum *Extractis*, cum *Diaph. ʒvial. Succin. alb. ppt. Unicorn. fossil. Corall. dabuntur.* Imò & ipsi hi *Pulveres absorbentes* non sunt contemnendi, inprimis ex ʒn. diaph. *Croc. mart. aperit. Diaph. martial. vel ʒvial. Ebor. ppt. Unicorn. fossil. Corallius*

rallius ppt. Succ. ppt. C. C. phil. ppt. Ocuc.  Matr. perlar. ppt. Terr. sigill. vel Lemn. Bol. armenat. Bezoard. mineral. Pulv. Lichen. petr. Veronic. Berton. Ophiogloss. Virgæ  Orea. Semin. Hyperic. Plantag. Urtic. Absynth. Card. bened. &c. parati. Ab horum tamen pulverum usu aliquandiu continuato desistere iterum oportet, si observamus appetitum inde imminui, qui autem facile iterum exhibitione Pulveris Stomach. Birckm. vel Salis essential. Card. bened. aut Acetosell. Crem. Fri, & $\frac{1}{2}$ nii diaph. restituitur. Si quis Thermas Fabarienses, Plumbarias, aliasve bibere gestiatur, huic illæ protinus concedi possunt, ceu satis quoque ad massæ sanguineæ correctionem utiles, sed necesse est, ut simul illæ Balneo usurpentur. Nonnullis Acidularum potus conveniens est, quibus præsertim stomachi vigor robustus. Aliàs quoque Succus vel Aquæ stillat. Plantarum antiscorbuticarum conducere possunt, quotidie per plures hebdomadas potæ.

Exterius eo statim adnitendum, ut acido-corrosivus humor sinuum extergatur, & sic Ulcus siccetur. Quo facto callositas sinûs absumenda, sicque occasio danda, quò nutritius bonus succus iterum affluat, & cicatricem funditus acceleret. Ulcus itaque aperiendum, fons ejus explorandus, mundificandus, os cariosum corrigendum, separandum, sicque tandem consolidatio promovenda.

Curatio
Fistula
non profunda,

Quòd si ergo Fisiula profunda non sit, nec ad Os cariosum, vel tendinem aut nervos, sed ad solos muscu-

los vel vasa sanguinea terminetur, hincque sanies frequenter rubicunda & cruenta emanet: tunc ostium Fistulæ vel turundis è Gentianâ, Hellebor. nigr. Bryon. Aristoloch. Rhabarbar. Medull. Sambuc. aut Spongiis, Mastiche Myrrhæ imbutis, dilatandum. Turundas etiam solubiles (Quellmeisse) usurpare licet; v. gr. \mathcal{R} . Picis \mathcal{C} Cera ana. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. Liquatis super igne immisce Myrrhæ pulverisat. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$. Mercur. præcipitat. rubr. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. Immerge dein spongiam, eamq; simul prelo submitte, fortiterq; pressam exicca, & Turundas convenientes discinde. Si etiam Turundas componere licet e Melle cocto cum Succis recent. expressis Chelidon. Allii, Cochlear. Nasturt. Hellebor. nigr. admiscendo Cineres Tabaci vel pulverem radic. Angelic. Gentianæ Helleb. nigr. Fol. Sabin. Aristol. rot. Geran. robert. Myrrh. Aloës &c.

Lanceolâ tamen etiam cautè ad aliquam qualem profunditatem ostium Fistulæ incidendum, si non ad ipsum fundum & fontem; statimq; more solito albumine Ovi & Pulvere stegnotico, vel Crepitu Lupi deligandum. Postmodum callositas aperti sinûs paulatim auferenda, in quem finem sequenti sæpius optima notavimus:

\mathcal{R} . Aqu. Calc. viv. $\mathfrak{z}\mathfrak{vj}$.
Lixiv. sarment. Vit. $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$.
Unguent. Ægyptiac. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{ss}$.
Mellis rosac.
Succi Chelidon. maj. rec. expressi ana. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.
Mercur. sublimat. gr. xx. ana. xxx.

Misc

Misce & coque singula invicem, ad aliqualem diminutionem, postmodum applica aut insperge. Vel

R̄. Mell. rosac.

Ungt. Ægyptiac. ana ʒj.

Balsam. Indic.

Essent. Helleb. nigr. Myrrh.
Aloës ana ʒij.

Mercur. dulc. ʒj.

Misce omnia in formam Unguenti, quod Fistulæ cum carptis linteis filis immitti potest.

Vel etiam Aqua phagedænica ad ʒvj. sumi potest, eaque tepidè inspergi atque applicari. Componitur ex Aquâ Calcis vivæ, cum affusione Aquæ mercurialis, donec Liquor flavus atque turbidus evaserit. Aqua mercurialis autem nihil est aliud nisi solutio Mercurii sublimati in Aqu. Plantag. vel Chelidon. vel aliûs commodæ. Potest & cum eadem Aquâ phagedænicâ Mel rosaceum atque Spiritus vini camphoratus permisceri. Vel Digestivo comuni ex Terebinth. Ovi vitello solutâ factò sociabuntur Ungt. Ægyptiacum, Mercurius præcipitatus ruber, Myrrha, Aloës, Oleum C. C. vel Fri stil-latitium foetidum, Cinis Bufonum Ficuum.

Ad extersionem verò Ulcerum talium, acidique omnis corruptivi destructionem, prodest injectio frequens Decocti Majoran. Plantag. Pilosell. Ulmar. Veronic. Thée, Absynth. Centaur. min. Croc. Myrrh. Thuris, Rhabarb. Ciner. Bufon. Tabac. in Aquâ fontan. facti, atque insuper Melle rosaceo vel rutaceo, ac Balsam. Fri terebinth. permisti. Vel Cauterio actuali

callus exuratur, tandemque scalpello eximatur. Vel Tinctura Aloës, Myrrh. Mastich. Aristoloch. Calam. aromat. Galang. Cyperi, cum Spirit. vini Frisato extracta, in usum vocari potest. Si Callus est ablatus, fundum sinûs fistulosi probè extersum, nullaquæ amplius corruptio sive ossis, sive carnis adsit, tum cicatrix consueto more inducitur, cavendo tamen semper ab unctuosis. Siccæ autem deligationes, ferè optimæ sunt. Emplastrî loco inserviet semper Empl. diapalma, vel diacalcitheos.

Si Fistula tendat ad Os cariosum, tum per incisiones repetitas, aut aliam sinuum dilatationem, Caries detegenda, eaque, si possibile, actuali cauterio exurenda, vel insperfo saltem pulvere Euphorbii, Gargophyllorum aromatic. &c. exiccanda, hincquæ spontaneæ separationi, quæ post aliquot ferè hebdomadas demum contingit, permittenda. Carie autem separatâ & expulsâ, si Os appareat probæ notæ, atque albicans, siccè duntaxat cum filis linteis deligandum, donec accedente sensim succo nutritio meliore cicatrix superinducatur: osse autem jam carne obtecto fila carpta simplici digestivo ex Terebinth. Vitell. Ovor. solut. Tutia ppt. Castor. Melle rosaceo, Axung. Muris alpini, Myrrhâ, Colophon. &c. inungi possunt, antequam ulceri indantur.

Si Ulcus fistulosum terminatur ad Nervos, Membranas, aut Vasa sanguinea, tum detecto ejus fonte, insersiones cum blandioribus decoctis Plantarum aromaticarum & traumaticarum

Curatio
Fistula
cum Osse
carie.

Curatio
Fistula
tendentis
ad Nervos,
Tendines,
Vasa,

carum in Aquâ factis fieri possunt : in quem finem inserviunt *Sanicula*, *Alchymilla*, *Plantago*, *Marrubium album*, *Betonica*, *Aristolochia*, *Sabina*, *Millefol.* *Origanum*, *Thymus*, *Majorana*, *Ocymum*, *Geran. rob.* *Vinca pervinc.* *Chamomill.* *Melilot.* *Semina Fœnicul.* *Anis.* *Garyophyll. arom.* *Nux mosc.* *Camphora.* Decocto etiam superius allegatæ *Essentiæ*, amaricantes inprimis *balsamicæ*, vel *Balsamus Sulphuris terebinthinatus* admisceri possunt. Fila dein carpta liquoribus hisce immersa Ulceri immittuntur, donec cicatrix proba induci, & funditus enasci incipiat.

*Fistula
ad car-
nem fun-
gosam
tendens
Curatio.*

Fistulâ prodeunte è carne fungosâ, albicante, Lardi æmulâ, excrescentiam hanc paulatim prius absumes & erodes, pro re natâ vel Butyro $\frac{1}{2}$ nii, vel Mercurio sublimato, aut præcipitato, vel Pyrapyro nostro fermè indolente. Hinc commendata superius digestiva, vel etiam *Hildani digestivum* cum *Balsamo* $\frac{1}{2}$ ris *terebinth.* vel *Fila* solùm carpta *Essentiæ traumaticæ* alicui cum *Balsamo peruviano* intincta, ad perfectam usque sanationem usurpentur.

*Fistula
Articulorum
Curatio.*

Si *Fistula cuniculos* egit intra *Articulos*, eorumq; tendines, tum eunt electione cautè est procedendum, vel illa etiam prorsus omittenda, atque orificio *Fistulæ* externo probè dilatato, *Tinctura traumatica* quædam cum *Aqua phagedænicâ* inspergi potest, quâ nihil operante *Fistula naturæ* permit-tenda, ceu incurabilis, & *Fonticuli* loco habenda, cavendo, ne orificium exterius cicatrice obducatur, sicque

materiæ effluxus præpediatur. Simul tamen *Diæta exacta* est tenenda, cujus ope liquores circulantes ab omni corrosivitate liberi evadant, & ad *Fistulam* appellentes, ulteriorem corrosionem, doloremque non excitent, ac ita *Hæcticam* qualemcunque impedian.

Deligatis verò sic *Fistulis* superintegitur ab his hoc, ab aliis aliud; quemadmodum sunt *Emplastr. diachalcitheos Hildani*, *diasulphuris Ru-land. de Cerussâ*, *Opoteldoch à Cardilucio in Officin.* *Sanit. descriptum*, *Diapalm.* aliave. Inter remedia *Illustriss. Matronæ Fouquet* sequentia reperiuntur haud contemnenda; v. g.

\mathcal{R} . Olei Oliv. rec. opt.
Axung. agnin.
Lithargyr. Arg.
Resin. Pin.
Sangu. Dracon. aa. \mathfrak{z} iiij.
Virid. Aeris \mathfrak{z} ij.
Cera flav. \mathfrak{z} j.
Acet. Vin. \mathfrak{z} ib.

Coque invicem, donec Acetum exhalârit, tandem in Emplastri formam redige.

Vel \mathcal{R} . Ol. Oliv. opt. \mathfrak{t} bj.
Cera nov. \mathfrak{z} iiij.

Solve & coque parum invicem, tandem admisce

Cinnab. factit.
Minii ana \mathfrak{z} ib.

Agita invicem & misce, usq; dum refrixerint, ac Emplastri formam induerint.

Vel \mathcal{R} . Ol. Olivar. opt. \mathfrak{t} bb.
Ceruss. Litharg. ana. \mathfrak{z} j.
Picis Burgund. \mathfrak{z} bb.

Cera

Ceræ flav. ℥iij.

Myrrh. pulv. ℥j.

Picem ac Ceram in Oleo dissolve, probeq; solutis ac parum coctis immisce reliqua in pulverem subtilissimum redacta, agita tamdiu, donec frigescente in in Emplastrum abierint.

Sunt, qui æstivo tempore *Thermarum* usum commendant, de *Ære* *⊙ari*, *Alumine*, vel *⊙lo*, & *Argillâ* participantium. Inprimis verò *Fabarienses Rætia*, *Schintzenacenses* sive *Habsburgica* ditionis *Helvetico-Bernensis*, *Wisdadenses Germanicæ*, *Burbonenses Burgund.* aliæve heic commendabiles sunt. *Wildbadenses Würtemberg.* *Carolinæ Bohem.* etiam bonæ.

In *Dietâ* à falsis, à concoctu difficilibus, fumo induratis, succo acrisalino gaudentibus, Vino austero, alioque largius poto, *Cerevisiâ* acscente: ab *Aëre* item frigido, humido; à *Venere*, ab *Irâ*, *Tristitiâ*, à *Motibus* vehementibus corporis est abstinendum.

FISTVLA ANI est *Ulcus* sinuosum in *Ano* exortum, nunc uno, nunc pluribus sinubus gaudens; & modò tenuem aquosam modò purulentam crassiolem, albicantem, minus olentem; modò fœtidam obscuri coloris saniem fundens.

Producitur ut plurimum ab *Hæmorrhoidibus* cœcis, inflammatis, in *Abscessibus* abeuntibus; ab acceptis, maleque curatis *Vulneribus*; ab humoribus denique corrosivis, inprimis ex sanguine venereâ Lue infecto ad *Partem* afflictam defluentibus, & pri-

modò inflammantibus, hinc circumcirca rodentibus, atque exedentibus. *Occasionem* malo præbent *Temperies* vel *Intemperies* sanguinis melancholica, *Venus* nimia, *Luesque* venerea.

Differentiæ ejusmodi *Fistularum* *Differentiæ* variæ apparent, dum aliæ aliis profundiores existunt; ita nonnullæ terminantur solum in *Musculos* podicis; aliæ ad canalem *Intestini* recti abeunt, illumque nunc imperforatum relinquunt, nunc etiam vel in *Sphincteris* musculi tractu, vel supra eundem perforant, ut sic sæpè excrementitia materia per sinum fistulosum transeat. Aliæ porrò *Fistulæ* sinum unum eumque rectum, aliæ obliquum; aliæ plures aliæ pauciores sinus obtinent. Quandoque ad *Os* usque penetrant illudque cariosum, vel non cariosum; interdum ad tendines, vasa, membranas musculorum terminantur, sicque diversam curandi methodum requirunt. Aliæ tandem dulcem, aliæ magis acrem & corrosivam materiam, saniemque diversi subinde coloris fundunt.

Cognoscuntur facile tales *Fistulæ* *Diagnos.* ex ostio ac sinu *Ulceris* calloso, indolenti, ichoreque sanioso, tenui magis & varii coloris, quàm albo, crasso &c. continuo profluente. *Stylis* verò immixtis *Ulceris* profunditas, inæqualitas, ac multiplicitas explorari & observari potest, tanto id melius, si simul incisiones *Syringotomis Instrumentis*, quibus ad fundum usque *Ulceris* deveniri debet, fiant, quâ ratione

tione patefiet quoque, ad quamnam partem Ulcus terminetur.

Prognosis.

In *Prognosi* hoc tenendum, dubios atque diversos eventus fortiri Ani Fistulas, ac citius faciliusque curabiles esse, quæ non profundæ sunt, quæ ad musculos magis quam ad tendines, membranas, aut ossa terminantur; quæ itidem rectum non perforant Intestinum; quando denique sanguis Ægroti nullâ corrosivâ, venereaque qualitate & cacochymiâ est inquinatus; in hisce enim casibus Fistulæ nunc citò satis, si benè tractentur, nunc etiam, si vel Chirurgus negligentior, vel Æger inobediens fuerit, nonnisi plurium mensium spacio sanantur. Quando autem massa humoralis Ægroti jam corrosivâ saniei fistulosæ qualitate est infecta; quando Fistulæ inveteratæ, sordidæque admodum sunt, quando profundos egerunt cuniculos, & rectum quoque Intestinum penetrârunt, tum illæ plerumque immedicabiles sunt in ejusmodi subjectis, ac tandem Hecticam, Phthysin, aliusque generis Tabem lethalem post se trahunt.

Curatio.

In *Curationis* talium Ulcerum principio statim exhiberi debet purgans ex *Rhabarbari* 3j. cum *Terebinthinâ* in *Bolos* aut *Pilulas* redactâ, vel ex seqq. *Pilulis*:

℞. Extr. panchym. Croll. ʒj.
Cinnab. ʒ n. corr. ʒß.
Magist. Jalapp. gr. iij.
Ol. still. Succ. q. s.

M. f. *Pilulæ* num. 15. unâ vice mane jeuno stomacho sumendæ, & aliquoties, si opus esse videbitur, repetendæ.

Operatione feliciter succedente, ad ordinationem *Decocti traumatici* pergendum, ejusque usus ad plures menses ferè commendandus. Parabitur illud partim ex *Lignis quercino, Sassapbr. Santal. Guajac. Radic. Sals. parill. Chinæ, Caryophyllat. Aristoloch. Petasitid.* partim ex *Herbis Sanicul. Pyrol. Ophiogloss. Ulmar. Alchymill. Thée, Veronic. Artemis. Betonic. Trifol. fibrin. Plant. Beccabung. Nasturt. Flor. Bellid. min. Rosar. rubr. Calendul. Semin. Anis. Hyperic. Plantag. Urticæ.* Qualia ingredientia invicem incisa & contusa in *Aquâ fontan.* per unam vel alteram horam coqui, ac de colato postmodum *decocto* ʒiv. vel v. m. ac v. propinari debent. Quod si simul vel *Tincturas*, vel *Essentias*, vel *Pilulas* etiam *traumaticas* assumere quis velit, quemadmodum præcedente capite exposuimus, eidem simul illæ cum fructu ordinari poterunt.

Externè verò sinus fistulæ, si Anum ejusque Sphincterem non contingat, *turundis* è spongiâ præparatâ, aut *Radice Gentianæ* factis est dilatandus; hinc aliquot post diebus Syringotomo ad fundum usque incidendus; *Vulnus* dein stupâ albumini Ovi intinctâ, pulvereq; *Boli armen.* alioque *stegnotico* conspersâ, vel etiam plumaceolis eodem modo paratis replendum, atque *Empl. diachalcith. diaphulph. Rul.* vel *diapalmæ* tegendum. Postridie, cum Hæmorrhagiæ metus præterit, in deligatione stylo explorandum, num non alii adhuc adsint sinus? nam & hi forent postea quoque incidendi. Quod si autem ad fundum

fundum & radicem s. fontem Fistulæ hac ratione pervenimus, tum radix ista probè eluenda venit remediis capite præcedenti allegatis: insimul tamen *Unguentum digestivum Hildani*, vel *commune*, cum *Tutiâ*, *Aloë*, *Myrrhâ* & *Colophonio* mixtum adhibebitur, vel etiam *Unguent. saturninum* substituendum, cui *Elixir* sive *Tinctura amara aloëtica*, aut *Myrrhæ*, *Aloës*, *Rhabarbari*, *Garyophyllor. aromat.* &c. pulvis pro lubitu sit permixtus. Si verò magis è re videbitur esse, pulvilli vel sicci, vel pulvere etiam *Folior. Geran. rob. Aristol. rot. ver. Sabin. Ophiogloss. Radicum Imperator. Rhab. Caryophyllat. Gentianæ maj. Consolidæ majoris, Terræ sigill. Unicornu fossil.* conspersæ immituntur; quibus tamen pulveribus felicius plerunque caremus quàm utimur, cum nimis siccando dura Ulceris labia ut plurimum reddant. Extus imponantur *Emplastra* superi⁹ comendata sub Titulo de Fistulis in genere.

Si Fistula penetravit ad ipsum *Intestinum rectum*, imò illud ipsum quoq; jam perfodit, tum incurabilis à multis habetur, soli que naturæ permittitur. Ab aliis verò, corpore & sanguine Ægroti, maximè obediens, per plures hebdomadas vel etiam menses optimè præparato edulcorato & correcto, sanatio talis Fistulæ feliciter tentata & absoluta fuit, per incisiones debitâ cum circumspectione factas, usurpatoque post sedatam Hæmorrhagiam *Unguento de Betonicâ*, *Melli rosaceo*, vel *communi digestivo* permisto, additâ semper

Tincturâ Aloës, Myrrhæ, &c. amarâ, donec deterfio seu mundificatio probè facta sit. In incisione cavendum, ne totius Sphincteris musculus discindatur. Tandem per remedia siccantia & epulotica consolidatio & cicatrix talis inducenda, quæ non dura sit, sed mollis, quò reliqua Sphincteris pars non discissa suo fœces retinendi munere adhuc benè defungi queat.

Si quæ Caro in Ulcere luxuriat, tum illa vel *Canterio actuali*, vel *Alumine ustō*, aut *Mercurio præcipitato*, aut *Pulvere radic. Pyrethri, Euphorbii, Imperatoriæ* &c. frequenter inspersâ, sensim auferetur ac consumetur.

Fistulæ supra sphincterem Ani ad Intestinum rectum penetrantes difficulter quidem citra totalem ejusdem musculi discissionem curantur. *Celeberrimus* Marquette tamen post dilatatum optimè sinum Fistulæ, non nisi partem sphincteris pertudit, callositates dein omnes ignito ferro enecavit, tandem mundato convenienter Ulcere, felicem solo cum *Unguento de Tutiâ* ac de *Betonicâ* cicatricem superstruxit.

Injectiones superius de Fistulis in genere propositæ & heic quàm optimæ sunt. Diæta quoque instituitur sicut superiore capite de Fistula in genere dictum.

FISTVLA LACRYMALIS,
vid. *Ægilops*.

FISTVLA ARTICVLORVM,
vid. *Pædarthrocæ*.

*Fistula
Tibiae &
Femoris.*

FISTULÆ TIBIÆ AVT FEMORIS, sunt Ulcera sinuosa in istis partibus ab affluxu & stagnatione humorum serosorum, salino-acrium & corrosivorum enata, & saniem aquosam, plus minus sordidam continuè fundentia. Cum autem hæ eandem cum Fistulis in genere, de quibus supra, genesin, & curationem sortiantur, hinc Lectorem eo remitemus.

*Fistula
Thoracis.*

FISTULA THORACIS est Ulcus sinuosum & callosum in pectoris quacunque parte hærens, & varios agendo cuniculos, tandem plerunque ad Os cariosum hujus vel illius Costæ terminans.

Causa.

Producitur ut plurimum ex levi primùm Ulcere, sed propter Humorum massam scorbuticam, acido-corrosivam sensim cacoëtheo reddito, cujus ichor corrosivâ suâ occultâ qualitate paulatim erodendo, cuniculos sinuosos egit, imò tandem etiam costam cariosam reddit. Observavi in Puellâ 15. annorum, nondum menstruatâ, Empyema sinistri Lateris ex Pleuritide oriundi, cujus pus sensim inter costam sextam, ac septimam musculos erodendo, exedendoque tandem extus supra costas Abscessum formavit, qui ruptus in Fistulam Thoracis abiit, Ægrâ curationis omnia requisita admittere & tolerare nolente; serò tamen cum sapere inciperet, post annum demum incisis Fistulæ sinubus, separatis costis cariosis, exterso probè Ulcere, sanguine etiam optimè per interna edulcorato, feliciter curata fuit.

Quòd *Diagnosin & Prognosin* attinet, cognoscitur facile talis Fistula ex signis Fistularum communibus. Sed curatu difficillima est, partim quia facile incidi nequit, propter arterias Cordi propiores, quæ simul fortè searentur: partim quia muscoli Pectoris in perpetuo sunt motu, à quo consolidatio impeditur. Hinc Ulcus tale manans evadit, sæpè per plurimos annos instar Fonticuli durans, donec tandem vel alius morbus accedens, Hæctica imò subsequuta Hominem è medio tollat.

Curatio instituitur sicut & in reliquis Fistulis, *Dietâ* siccante, acido-corrosivo resistente: *Potionibus vulnerariis*: *Injectionibus* cum *Unguent. Ægyptiaco* permistis: *Incisionibus*, *exterioribus*, *siccantibus*. Tubulus aureus vel argenteus, vel plumbeus immittitur, foraminibus multis pervius, per quæ ichor transfluere queat. *Spongia* etiâ magna, *Vino & Aqu. vitæ* imbuta, subinde si non semper applicatur ad Fistulæ orificium, ut Æger naribus & ore obturatis per illum subinde saniem excernat, vel ut ichor ab ejusmodi Spongiâ continuè absorbeatur. In reliquis eadem, quæ in aliis Fistulis remedia usurpantur.

FISTULA GINGIVARVM est Ulcus sinuosum in Gingivâ enatum, & ad maxillæ portionem cariosam frequenter tendens, subinde etiam inter solas membranas calloso sinu subsistens.

Occasionem huic Ulceri frequenter præbent Dentes corrupti & cariosi, atque

atque inprimis corrosivus humor ad radicem dentium ex sanguine depositus, & circumcirca exedens: De- fluxiones & Stagnationes feri salso- acris in tubulis Gingivarum circa Dentes, vel etiam alibi in Tunicâ glandulosâ Os intus cingente factæ, & nunc Abscessum, quandoque re- currentem, nunc Ulcus semper aut crebrò fluens, primùm simplex, mox, ubi Offa cariosa evadunt, sinuosum & fistulosum producentes. In qui- bus casibus semper Cacochymia scor- butica & seroso - salso - acris præcede- re solet, tanquam causa antecedens.

Quoad *Diagnosin* & *Prognosin*, cognoscitur hic Affectus ex signis Fi- stularum generalibus. Si cariosum est Os, subinde cum Ichore pessi- mè olente frustula cariosa prodibunt. Curatu facilior est, si cacochymia hu- morum non magna, & firmas, pro- fundasque malum radices nondum egit.

In *Curatione* Dentes, si in radi- cibus suis foveant humorem corrosi- vum, evellendi sunt, cavitas hinc probè extergenda; si maxillæ subsint cariosæ, aut perforatæ, injectionibus extergendæ, vel ubi possibile, exu- rendæ; dein siccè deligandum Ul- cus, quandoque tamen *pulvilli* vel *fila carpta Spiritui Vini camphorato*, cum *Balsamo Peruviano* permisto im- mergenda & applicanda. Si verò duntaxat Ulcus in Tunicis subsistat, tum incisio primùm illius facienda, dein extersionibus, atque elotioni- bus cum *Decocto Agrimonie*, *Melle ro- saceo*, *Balsamo Indico*, *Essent. Myrrh.*

& *Garyophyll.* *Alumine* &c. *Cauterio* quoque *actuali* curatio, cicatricisque inductio maturanda. Intus denique ea, quæ in aliis Fistulis, methodus medendi observabitur, nec absimilis: Diæta instituetur.

FLATVS STOMACHI ET IN- TESTINORVM seu ABDOMINIS sunt congregationes particularum æ- rearum cum pituitâ viscidâ in spumæ vel bullarum numerosarum formam coactarum, atq; Ventriculum & Inte- stina promiscuè distendentium, hinc- que varia, quandoque molesta atque dolorosa, symptomata producentium.

Ab ejusmodi enim Flatibus, quando plus minus copiosè sunt col- lecti, non solum ructus aut crepitus Ventris frequentes molestique, sed &, ubi exitum difficilem aut nullum inveniunt, tensio inflatioque Abdo- minis, sive Ventriculi aut Intestino- rum spasmodico-dolorosa, murmu- ra & borborygmi Abdominis crebri, Colica flatulenta subinde spasmodica, Alvi suppressio, Anxietas Pectoris, Respiratio difficilis, Agrypnia, In- quierudo, Tristitia atque Melancho- lia producuntur. Ut adeo hæc ipsa Symptomata totidem Signa Flatuum Abdominis *diagnostica* esse soleant. Miros enim sæpè effectus edit colle- ctus & obstructus alicubi Flatus, di- stendit valdè membranas vi suâ ela- sticâ, dolorem sæpè excitat acerbum tensivum, diuturnum, si nullus Fla- tui exitus citò concedatur; diu au- tem sæpius inter membranas conclu- sus hæerere potest. Aliquando dolor

Flatus
Abdo-
minis.

Diagno-
sis.

non

non est adeo acerbus, quem excitat, sed gravantis instar, & inquietudinem excitantis.

Ætiologia.

Quod *Causas* attinet, non arbitror, aliunde produci Flatus quàm à liquore gastrico nimis acido, vel austeriusculo, viscido, cibos assumptos malè digerente, atque in crudum, lentum, crassum chylum mutante, cujus particulæ aëreæ dein in libertatem suam haud probè vindicatæ aggregantur, atque viscido quasi mucosalino circumdatæ in spumam aut bullas majores, minores, plures paucioresque mutantur. Liquorem gastricum sensim acido-viscidum reddunt cibi potusque simili charactere pollentes, alvi excrementa frequenter retenta, curæ animi ac sollicitudines, terrores, mœstitia diuturna, temperamentum melancholicum, graves morbi prægressi, somnus & quies corporis modum excedentes. Hinc Melancholici, vitam sedentariam agentes, Helluones & Lurcones, alvi segnitie continuâ afflicti, malo huic maximè sunt obnoxii. Materiam Flatuum copiosam exhibent Cibi sic dicti flatulenti, Phaseoli, Fabæ, Pisa, Rapa, Brassica vel Beta muricata, Fructus horæi, Cerevisia crassa, Mustum vinaceum, Carnes duriores, aliaque in quibus multum aëris compressi hæret. Contribuunt huc quoque Aër frigido-humidus, si quis in eo diu versatur, Balnea Aquæ frigidæ, aliæve pedum aut ventriculi refrigerationes. Ova Formicarum comesta insignem flatuum copiam exhibent.

Affectus hic non simpliciter molestus aut dolorosus per se est. Juvenibus, & majoris ætatis, utriusque etiam sexûs hominibus, obesos magis quàm macilentos, voraces quàm parciores victu utentes molestant. Sed insuper, nisi corrigatur, pejora mala post se trahere solet, Colicam nimium flatulentam, aut spasmodicam, Passionem iliacam, Alvi suppressionem ac segnitiam, Tympanitidem denique funestam.

In *Curatione* proin eo maximè respiciendum, ut flatus expellantur aut educantur potenter, ut dein etiam Stomachi Liquor digestivus emendetur, ac ad naturalem suam temperiem falso-volatilem redigatur, ut denique Diæta carminativa vel Flatibus resistens instituat. Educuntur Flatus per *Clysmata carminativa* felici ut plurimum successu, qualia esse possunt seqq. vel similia:

R. Radic. Angelic.

Lil. alb. ana ℥ss.

Imperator.

Galang. ana ʒij.

Herb. Parietar.

Malv.

Pulegii.

Calaminth.

Summit. Aneth.

Flor. Chamom. ana Mj.

Baccar. Laur. ʒss.

Semin. Nasturt. ʒiiij.

Lin. ʒvj.

Incis. & contus. coqu. in q. s. Aqua fontan. Colatur. ℥ss. adde

Elect. de Bacc. Laur. ʒss.

Mell. anthos. ʒj.

Ol. Cha-

Ol. Chamomill. ʒß.

Salis Gemm. ʒß.

M. f. Clyster tepidè injiciendus.

Vel R̄. Radic. Alth.

Malv.

Meu. ana ʒß.

Herb. Violar. Mij.

Meliss.

Menth.

Origan. ana Mj.

Flor. Chamom. Miß.

Semin. Cannab. ʒiij.

Anis. Aneth.

Carv. ana ʒj.

*Incis. & contus. coqu. in s. q. Aquæ
font. Colatur. ʒß. adde*

Mellis mercur. ʒj.

Olei Aneth. ʒij.

Salis Fri ʒj.

*M. f. Clyisma tepidè injiciendam, ac
pluries repetendum.*

*Sed & intus danda, quæ flatu-
lentas cruditates eliminare valent,
v. gr. in Adultis:*

R̄. Syrup. Ros. sol. compos. cum R.

A. & Senn. ʒij.

Confect. Hamech. ʒiß.

Aqu. Fœnic. ʒiß.

*M. f. Potio d. ad Vitr. Sumatur ʒj
mane pro dosi.*

Vel R̄. Syrup. de Cich. cum Rb. ʒiß.

Elect. è Succ. Ros. ʒij.

Aqu. Cherefol. ʒiß.

Spir. Anis. ʒj.

M. detur ad Vitr. pro dosi mat.

Vel R̄. Spir. Anis ʒj.

Juniper. ʒj.

Magist. Jalapp. gr. viij. vel ix.

Solutis leni igne adde

Syrup. Capill. ♀ r. vel

Violar. purp. ʒiijß.

Detur ad Vitr. pro dosi mat.

Vel R̄. Panacææ solut. alcal. ʒvj.

Scammon. ʒrat. gr. xij.

Ol. stillat. Anis. gutt. vj.

*M. f. Pulv. subt. div. in 6. dos. æqu.
ad chart. Quotidie mane capiatur dosi
cum tenui Emulsione Amygd. dulc.*

*Evacuato semel aut pluries cor-
pore, id quod etiam Vino medicato
pro lubitu expediri aliàs potest, ea
aliquamdiu in usum vocari debent,
quæ flatus qualescunque potenter
discutere, acidum primarum viarum
destruere, & Liquori gastrico tempe-
riem suam naturalem conciliare va-
lent. Carminativa sunt talia, &
blando sale volatili alcalino, vel anti-
scorbutico oleoso pollentia, è qui-
bus sequentes aut similes Formulas
remediorum componere licet, v. gr.
dum maximè torquent Flatus:*

R̄. Cortic. Aurant. sicc.

Ocul. ʒ. ppt. ana ʒij.

Elæosacch. Anis. ʒj.

*M. f. Pulv. subt. d. ad Scat. Dosis
m. ac v. ʒj. plus minus.*

Vel R̄. Corall. rubr. ppt. ʒß.

Specif. stomach. Poter.

Diaphoret. ʒvial. ana ʒij.

*Salis volatil. C. C. vel Ebor.
purif. ʒij.*

Flavedin. Cort. Aurant. ʒj.

Elæosacch. Fœnic. ʒj.

*M. f. Pulv. subt. d. ad Scat. Dosis
ut supra.*

Vel R̄. Aqu. Chamomill. ʒiß.

Cortic. Aur. cum Vino

Malvat. destill. ʒj.

Ppp

Elæo-

Elaosacch. Fœnic. ʒij.

Misce detur ad Vitr. Sumatur per cochlearia.

Vel R̄. Aqu. Fœnicul.

Anis.

Chamom. ana ʒj.

Puleg. ʒß.

Spirit. Sal. arm. anis. ʒij.

Elaosacch. Citr. ʒiijß.

Essent. Opii liquid. gutt. xv.

M. d. ad Vitr. Detur per cochlearia frequenter.

Vel R̄. Aqu. Cherefol.

carmin. Dorncreil. aa. ʒij.

Elaosacch. Aurant. ʒiij.

Theriac. cœlest. gr. viij.

Misc. ad Vitr. Detur cochleatim.

Vel R̄. Aqu. Meliss.

Card. bened. ana ʒiß.

Aneth.

Syrup. de Cinam. ana ʒß.

Spiritus theriacal. camphor. ʒiß.

Anis. ʒj.

Essent. opii Langel. gutt. vj.

M. d. ad Vitr. Sumatur per Cochlearia.

Vel R̄. Aqu. Nasturt.

Scabios. ana ʒiß.

Syrup. Cort. Aurant. ʒvj.

Spirit. vol. C. C. vel

Succin. vel

Ebor. ʒij.

Corall. rubr. ppt. ʒß.

Misc. d. ad Vitr. Sumatur ut supra.

Vel R̄. Aqu. Fumar. Endiv. ana. ʒj.

Vit. Matth. ʒvj.

Spirit. Nitr. vel Salis dulc. ʒij.

Elaosacch. Anis. ʒij.

M. detur ad Vitr. Sumatur cochleatim.

Profunt quoque *Aqua Vitæ rubra* *Gieffensis*, *Aqua Vitæ Mulier.* *Aqua physogona*, *Zedoariæ composita*, subinde per cochleare unum vel alterum data; *Essentia carminativa Wedel.* ad gutt. 20. 30. quotidie aliquoties exhibita; *Tragæa post pastum ad cochleare plenum*; *Species diagalang. dianisi, diacumini, diacubebæ. diacalaminth. diacinamom. diatrion pipereon,* ad ʒj. cum *Saccharo* pro lubitu assumpta; *Olea destillata Anis. Fœnic. Cumin. Carv. Angelic. Calam. aromat. Zedoar. Piperis, Cherefol. Cortic. Aurant. Nuc. mosch. de quibus octo, decem aut duodecim guttæ Saccharo*, si lubet, commixtæ cum *Jusculo*, vel alio Vehiculo aliquoties dari possunt:

R̄. Specier. Imper. vel Arom. ros. ʒij. diatr. piper. ʒj.

Pulv. radic. Angel. vel Imperator.

Semin. Aneth.

Anis. ana ʒij.

Corall. alb. ppt.

Rasur. Ebor. ana ʒß.

Sacch. alb. ʒiij. vel ʒiijj.

M. f. P. subt. d. ad Scat. Dosis ʒj. vel ʒiß. man. ac vesp.

Vel R̄. Specier. Diagalang.

Dianis.

Diacalaminth. vel Diacum. ana ʒj.

Specif. stomach. Poter.

Ocul. ☉ ppt. ana ʒiij.

Flaved. Cort. Aur. ʒj.

Semin. Fœnic. ʒß.

Sacchar. alb. ʒiij. ad ʒiijj.

Misc. f. Pulv. subt. d. ad Scat. Dosis ut supra.

Externæ

Externè Flatus Intestinatorum discutere valent *Sacculi ex Carminativis compositi*, qui calidè, quantum fieri potest, Abdomini sæpius applicentur. *Sacculis* induntur *Radices Meni, Angelic. Imperator. Baccæ Juniper. Semina Cannabis, Aneth. Cumin. Carvi. Fœnic. Avenæ, Milii, Herbae Anethi, Absynth. Abroton. Menth. Matricar. Meliss. Puleg. Calaminth. Origan. Ocym. Flores Chamomill. &c.* Sacculi ita repleti & calefacti postea toti Abdomini applicantur. Vel admoveatur *Operculum terreum* probè calefactum sæpius inter duo linthea. Olea itidem *Anethi, Galban. Absynth. Matricar. laurinum, juniperinum, Chamomill. Carvi, Cumini, & similia* toti Abdomini calidè inunguntur. *Pulvis Seminis Anethi, Carvi, & Anis. cum Ol. destill. Chamomill. Bacc. Juiper. Melli* subigitur, putamini *Nucis Juglandis* immittitur, hinc *Umbilico* alligatur.

Æstivo tempore ad corrigendum *Liquorem stomachicum Thermae piperinae, Plumbarienses, aut Carolinae in potu ac balneo* non ita frequenter usurpatæ profunt. Vel *Acidulae* potius conveniunt. Vel *Aquæ destillatæ Matricar. Meliss. Nasturt. Cochlear. Menth. Beccabung. Trifol. fibr. Cherefol.* quotidie bis ad *℥iiij.* plurium hebdomadarum spatio bibantur, idque cum aliquâ superiorum *Essentiarum* vel *Tincturarum.* Vel *Succi earundem Herbarum recent. express. & filtrati* ad *℥ij.* per idem temporis spatium hauriantur.

FLVOR ALBVS MULIEBRIS, ^{Flvor albus.} sive GONORRHÆA est inordinatus ac modò continuus, modò interruptus lymphæ plus minus viscidæ & acris, è Glandulis Cervicis atque Vaginæ Uteri exstillantis, per pudenda muliebria effluxus.

Pars affecta sunt Glandulae nunc ^{Pars affecta.} Cervicis Uteri, nunc Vaginæ, inprimis autem glandulosum Prostatarum muliebrium corpus à Graeffio circa ductum Urinarium detectum & descriptum, ichorem illum mucaginosum effundit. Similis hinc Affectus Gonorrhææ Virorum, in quâ talis quoque liquor è Prostatis exulceratis continuè effluit.

Gonorrhæa autem hæc alia simplex ^{Differentia.} est sive benigna, in quâ ut plurimum sine notabili dolore, aut vaginæ exulceratione materia profluit; interdum tamen etiam in Lumbis, aut Inguinibus gravans percipitur dolor, vel lancinans in ipsis pudendis, si acrior fuerit, & falsa nimis materia; quanquam in coitu cum Viris nullum incommodum patiantur, neque ipsis Viris Gonorrhæam concilient. Alia est maligna, virulenta, & venerea, ab impuro coitu contracta, quæ non sine dolore, exulceratione, ac exco-riatione pudendorum contingit, continuo durat, materiam subinde livescentem profundit, ipsisque Viris sub coitu statim communicatur; imò tandem, nisi præcaveatur, in Luem veneream abit.

Causa proxima est tubulorum ^{Causa.} glandulosorum Vaginæ aut Cervicis erosio, unde Lympham mucosam

per Arterias advectam facilius & continue propemodum elabi patiuntur, instar Fonticuli. Fluor indefinens est, quando tubuli Glandularum excretorii in suis extremitatibus discifas prorsus fibras circulares obtinent, ob quam causam etiam Fluor hic sæpè curatu difficilis existit.

Eroduntur autem Tubuli in Gonorrhæâ *simplici* quidem ab ipsius lymphæ vaginalis per Glandulas secretæ glutinositate salfuginosâ & acri; quam Lympham sanguinis massa suppeditat Cacochymiâ serosâ, vel scorbutico-pituitosâ infecta: hanc verò Diæta non nisi prava chylum crudum ac pituitosum exhibens in Fœminis producit. Ipsa dein hæc Cacochymia quo major atq; profundior est, eo etiam durabiliorem & longiorem Fluorem suscitât. Contribuunt ad idem malum mollior & laxior fibrarum textura, item Cachexia, excretiones per nares, glandulas salivales, &c. imminutæ; Venus immodica; acrimonia seminis masculini; Sterilitas prægressa; Partus difficilis; Abortus frequentes. Imò contagium, quando Fœmina eisdem Balneo cum aliâ Fœminâ hoc malo laborante insidet. Reperiuntur Fœminæ, quibus fluor iste per triduum aut quatrimum ante vel post menses non sine dolore & cruciatibus lumborum & inguinum obtinuit; quando vel sub orgasmo menstruo Lymphâ illa glandulosa acrior evadit, & tubulos perrumpit; vel ipse etiam menstruus sanguis acrior exi-

stens dilacerat ostiola tubulorum Vaginæ.

Maligna Gonorrhæa excitatur non nisi ab impuro coitu, in quo per semen virile, corrosivo venereo characterē infectum, tubulorum glandulorum ostiola promptè eroduntur, vagina exulceratur, virus etiam venereum tandem cum ipso circulante sanguine communicatur.

Quoad *Diagnosin*, effluit nunc continuo, nunc interrupto etiam cursu, materia ut plurimum mucosa, modò albi aut cineritii coloris magis; modò serosa, modò etiam saniosa ac flavescens, deterioris semper notæ existit. Si Fluor benignus est, indolens quoque simul apparebit: aliàs autem, ubi humoralis massa cacochymiâ falso-acri fuit inquinata, & ipse fluxus simul acris redditur, suâque corrodingi vi internam Vaginæ superficiem exulcerat, ac subinde odorem foetidum exspirat, inprimis si virulentus ac ♀ eus est fluor, ab impuro coitu contractus. Malum quod profundas jam egit radices, per intervalla quoque magnum lumborum & inguinum cruciatum excitat. Diuturnus etiam Fluxus maciem post se trahit; Faciei totiusque cutis color in Chlorosi magnâ ac inveteratâ ferè pallet: Menses evadunt decolores. Affectus adultis promiscuè Fœminis, Virginibus, maritatis ac Viduis infestus.

In *Prognosi* tenendum, Malum recens non periculofum, & facilius curabile esse, quàm inveteratum; per plures tamen menses, annosve si he-nignum, moderatum atque indolens fuerit,

fuerit, citra noxam insignem durare potest; ut hinc Fœminæ verecundæ atque Virgines pudibundæ plerunque nullas de eo querelas moveant. Quandoque in Cacochymicis fluor hic salubris magis est, & circulantium humorum purgamentum, ut, si ipsum impedias, natura sæpe periculosiorem in pectore aut alibi exitum fonticulumque manantem instituat. Præterea Fluor iste sterilitatem frequenter inducit. Si materia acris est, & corrosiva, non solum molestas exulcerationes, inflammationes, aut excoriationes Genitalium excitat, sed & non rarò Atrophiam, Hecticam, Hydropem, Catarrhos suffocativos &c. arcessit. Inveteratus Fluor longo demum remediorum usu etiam difficulter sistitur. Si Gonorrhœa est virulenta & ♀ ea, simul Marito per concubitus communicabitur; sicut vicissim Maritus Gonorrhœâ virulentâ, aut ipsâ Lue ♀ eâ, infectus, simili labe Uxorem in coitu inficit. Diutius durans etiam benign⁹ Fluor, cum insigni Inguinum ac Lumborum dolore, membrorumque lassitudine, plerunque insanabilis est, & Patientes lentâ morte consumit.

In Curatione causa antecedens, siue humorum dyscrasia mox corrigenda, per edulcorantia, volatilitantia, & balsamicas sanguinis particulas exaltantia. Vascula Vaginæ uterinæ erosa sananda, exulcerationes mundificandæ & cicatrice obducendæ. Remedia diu usurpanda, antequam feliciter operentur.

Quod si ergo Fluor blandus est,

pituitosus, minus malignus aut dolorificus, diu etiam durans, tunc Ægræ facillè vomenti *emeticum* exhibeatur, quod non tantum saburram Ventriculi expellit, sed totum corpus exagitando, massamque humoralem invertendo subinde Fluorem è vestigio sistit. Vomendi gratiâ dabitur *Gutta gamandra ad gr. viij. cum Crem. Tri gr. xij. Ol. stillat. Nucistæ gutt. ij. Sacch. gr. vj. in pulverem coactis. Vel Tartarus emeticus D. Ludovici ad gr. ij. cum Salis Cent. minor. & Crem. tart. ana ʒß. Ol. stillat. Fœnic. gutt. j. Sacch. gr. iv. vel OxySaccharum emet. D. Læd. aut Syrup. emet. Angel. Salæ ad ʒiij. vel ʒß. cum semunciâ Aqu. Borræg. & ʒj. Aqu. Cinnamon. bugl. Si Vomitus locus est nullus, tum catarthica dabuntur, & quidem sequ. Pilulæ non semel tantum, sed aliquoties exhibebuntur:*

R̄. Extr. panchym. Croll.

Mass. Pil. è Succ. Crat. aa. gr. xij.

Mercur. dulc. opt. ʒß.

Resin. Jalapp. gr. ij.

Ol. still. Rorism. q. s.

M. f. l. a. Pilulæ num. 15. Inaur. d. ad Scat. pro dosi matutin.

Si quæ Fœmina non fastidit *Apozemata* vel *Vina emetica*, eidem concedi poterunt, ex incidentibus, resolventibus, & antiscorbuticis, cum *Rhabarbaro*, *Foliis Senæ* &c. parata, additâ etiam *Chalybis limaturâ* in petiâ ligatâ.

Purgato verò corpore internè plurimum prodest sequens vel similis *opiata* per mensem, aut etiam diutius usurpata;

PPP 3

R̄. Con-

R₂. *Conserv. Fl. Ros. rubr. vitriol.*

Tunic. ana 3vj.

Pulv. Fl. Lamii alb.

Ros. rubr. ana 3j.

Diaph. martial.

Corall. rubr. ppt.

Unicorn. fossil. ana 3ij.

Syrup. Fl. Tun. q. s.

F. *Mixtur. ad formam Opiatæ*, detur ad Oll. Ter quotidie magnitudo Nucistæ capiatur.

Varia Decocta profunt, inprimis *Lignorum*, cum plantis aromaticis *Rorismarini, Majoran. Origan. Calaminth. Ocym. Meliss. Marrub. alb. Veronic. Matrisylv. Scolopendr. Chamædr. Chamæpith. Centaur. min. Semin. Aquileg. Anis.* quæ quidem *Vino & Aquæ* possunt incoqui, & ad 3iiij. m. ac vesp. quotidie propinari. Si acris scorbuticus fluor est, profunt magis *anti-scorbutica*, inprimis *Aqua è Nasturt. aquatic. Plantag. Chamædr. Lamii flor. albo, Roremarino, Amaraco, Beccabung. Cochlear. Ulmariâ, Urticâ urente, Trifol. fibrin. Raph. rustican. Marrub. alb. Fumar. &c. destillata*, & quotidie m. ac v. dosi 4. unciarum propinata. Si *Succus* magis arrideat talium *Plantarum*, & is cum fructu potabitur, sed dosi 2. vel 3. unciarum. Juxta hæc tamen profunt quoque nunc *Pilulæ terebinthinatæ*, inprimis si acris, vel etiam *♀eus & virulentus* sit fluxus; compositæ è *Terebinth. Diaph. martial. Succino alb. ppt. ♀ n. diaph. Corall. ppt. Terr. sigill. Camphor. Extract. Marrub. alb. Centaur. min. Trifol. fibrin. Consolid. Betonic. Absynth. cum Ol. stillat. Succin. vel Rorismarin.*

aut *Chamæpith.* Nunc *Tincturæ & Essentiæ*, v. gr. *Sal volatile oleosum Sylv. Spirit. Salis arm. urinosus*, cum *Oleis destillatis Amarac. Chamæpith. Succin. Anis. &c.* in *Spiritu vini* prius solutis, & demum invicem cohobatis, oleosus redditus. *Tinctura* $\frac{1}{2}$ nii, *Tinctura Corallor. Martis aperit. Essent. aperitiv. Moebii, Tinctur. anti-phthis. Garm. Elix. propriet. s. acid. Essent. Galang. Zedoar. Cinamom. Trifol. fibrin. Garyophyll. Elix. vit. Mat-thiol.* qualia quidem pro diversitate volatilitatis & efficaciae guttarum plurium pauciorumque dosi exhiberi possunt cum liquoribus ante dictis. *Thermarum Fabariensium* aut *Plumbariarum* potum in frigidioribus pituitosis, *Acidularum* autem in biliosis complexionibus conducere credimus.

Si *venereus* est prorsus *Fluxus*, curabitur uti *Gonorrhœa virulenta*, de quâ suo loco.

Externè suademus nec *Venæsectiones*, nec *Hirudines*, sed, si Fluor diu jam duravit, *Fonticulum* unum vel alterum in brachio aut pedibus, excitatum. Dein *Clysteres uterini* blandè adstringentes & sanantes, prius tamen detergentes non sunt formidandi, si antea corpus benè præparatum fuerit. Pro istis verò *Clysteribus* inservit maximè *Decoctum* cum *Vino rubro* factum *Lignorum*, ut & *Herb. Matrisylv. Sanicul. Alchymill. Rorismarin. Vinc. pervinc. Gratiol. Geran. Robertian. Consolid. regalis, vel mediæ cæruleæ*; quorum usus convenit maximè hyberno tempore, aut

verno

verno & autumnali. Æstivo autem profunt *Balnea* egregiè *sulphurea* & *aluminoso-argillacea*, quemadmodum sunt *Badenses Helveticæ Thermæ*, item *Carolinæ, Plumbariæ, Wisbadenses, Schintzenacenses* sive *Habsburgenses, Wildbadenses*, &c. *Sacculi ex Herbis aromaticis* parati *Vino incocti*, & publi frequenter calidè applicati, haud parum quoque profunt. *Lumbis applicetur Emplastr. de Galbano*, aut de *Cicutâ*, vel *Unguent. Comitissæ* inungatur.

In *Dietâ* cavendum à frequentioribus jusculis, lactiniis, cibis aquosis, pituitosi succi plenis, falsis, acidis, fumo siccatis; cavendum sibi ab Irâ, Tristitiâ, ab extremorum refrigerationibus nimis. Venus in principio curationis etiam frequentior permessa; sed in subsequenti curatione est illicita; post quemlibet coitum tamen urinâ propriâ Uteri vagina mox eluatur, etiam per injectionem cum siphone. Pro potu ordinario prodest *Decoctum ligni Buxi, Sassaphras, Sem. Anis. Rad. Liquir. cum Vino bono rubello* mistum. Post quemlibet pastum vel *Decoctum Gran. Coffée tostorum*, vel *Infus. Thé, Beton. Amara. Rorismarin. vel Ros solis, Liqueur citratus* aut *Aurantiorum noster, Vinum Hispanicum*, aut *Malvaticum* pro digestionem promovendâ conducit; quem in finem aliæ quoq; *Elix. vitæ Matthiol. aliæ Liqueorem Angelicæ, vel Corticum aut Florum Aurant. Citrive*, vel *Apii selini spirituosum saccharatum* &c. cochleatim bibunt. Aliæ verò magis inclinant in usum

Tragematum, quibus proin sequens cedat; v. gr.

Rx. *Spec. dianth. 3ij.*

diatr. Santalor.

diarrh. Abb. ana 3j.

Pulv. flor. Lamii alb.

Tunic.

fol. Quercûs tenerior. ana 3iij.

rad. Caryophyllat.

Tormentill. ana 3iij.

Rasur. Ebor. 3vj.

Terr. sigillat. 3ß.

Cinam. opt. 3j.

Semin. Fœnic. 3iij.

Sacch. alb. 3vj.

M. f. Pulv. subt. d. ad Scat. Dosis m. ac vesper. 3j. ad 3ij. cum frusto Panis Vini rubro emollito.

Vel Rx. *Specier. arom. rosat.*

diamarg. frig. ana 3iij.

Flaved. Cort. Aurant. 3iij.

Nuc. mosch. 3j.

Radic. Bistort. 3iij.

Pulv. fol. Pilosell.

Pyrol.

Sanicul. ana 3j.

Corall. rubr. ppt.

Unicorn. fossil. ana 3ß.

Diaph. mart. vel lunar. 3ij.

Ol. stillat. Rorismar.

Amar. aa. gutt. xij.

Sacch. alb. 3vj.

M. f. Pulvis subt. d. ad Scat. Dosis ut supra.

FLVXVS COELIACVS, vid. *Cœliacus Fluxus.*

FLVXVS HÆMORRHOIDVM NIMIVS, vid. *Hæmorrhoidum Fluxus nimius.*

FLVXVS

*Fluxus
hepaticus.*

FLVXVS HEPATICVS, *Dysenteria hepatica*, est frequens materiæ copiosæ fluidæ, carniū loturæ similis, per alvum dejectio. Differt à *Dysenteria*, in quâ vel sincerus sanguis parvus & valdè rubicundus cum tenesmo frequenti rejicitur. A *Fluxu hæmorrhoidali* autem discrepat, quoniam in hoc similiter sanguis floridus, magis minusve copiosus, in cachecticis quoque serosus ut plurimum ante fœces excernitur, rarò post illas; in *Fluxu hepatico* autem non nisi post fœces, ac interdum etiam sine his rejicitur.

*Pars
affecta.*

Hepaticus Fluxus dictus fuit, eo quod Veteres credebant, Viscus Hepatis in hoc maximè laborare; quod tamen experientiæ atque structuræ corporis mechanicæ repugnare quilibet facillè videt, si modò œconomiam ejus examinare volet. Utut enim in Hepate forsan aliquarumpantur vasa, sanguis tamen potius in cavum Abdominis, quàm in Intestinorum canalem fluit. Sed rationi sanæ convenientius est, si dicamus, sanguinea vascula Intestinorum membranas perreptantia, & ad plexus horum glandulosos disseminata heic rumpi, aut erodi, ex iisque deinceps serosum maximè sanguinem diffluere.

Diagnos.

Rarus est *Fluxus hepaticus*, à nobis tamen observatus; in quo mera ferè aqua sanguine diluta, adeoque carniū loturæ similis, plus min⁹ copiosè haud infrequenti dejectione excernitur. Tormina heic propemodum nulla adsunt, eaque levissima tantum acce-

dunt, quando stimulus dejiciendi adest; nulla quoque cum excretis in hoc morbo prodeunt mucosa Intestinorum ramenta. Durat autem Fluxus non semper, sed per aliquot dies remittere, iterumque accedere solet. Color faciei in progressu hujus Morbi pallidus atque cachecticus evadit, vires enervantur, languor membra prehendit, appetitus minuitur, cor palpitare, tandemque simul delinquere incipit. Dejectiones ut plurimum solæ, vel post Fœcum excretionem contingunt. Febris continua sive maligna, sive lenta, vel præcedit aliquando, vel succedere profectò potest.

Quod *genesin* hujus Symptomatis concernit, penè dixerim, in hoc casu Sanguinis crasin naturalem planè dissolvi, eumque maximè fluidum, exaltatis particulis aquoso-seroso-salsis, depressis verò sulphureis, reddi, hincque diffluere facillè, & per ruptas erosasve vasculorum extremitates in cavitatem Intestinorum effundi; non secus atque hoc contingere videmus in Hæmorrhagiis Narium, ubi sponte quoque vascula sanguinea aperiuntur, quando æstuans nonnihil sanguis eo decumbit. Sanguinis crasin atque texturam naturalem dissolvit copiosum Sal volatile acido-acre, paulatim sive ex aëris intemperie, sive à cibo potuve, sive à vehementi frequentique spirituum in gravioribus animi pathematibus, sive à Febri quadam malignâ, sive ab assumpto, admissoque Veneno aliquo cumulatum. Quando autem sal tale ad sufficientiam coacervatum est, tum acrimoniam

niam inducere, atque compagem particularum sanguinis intimius solvere, imò consistentiam ejus lacteam in seroso-aquosam mutare incipit. Sub hoc autem statu in circulum decurrens Sanguis, ubicunque demum in corpore vascula satis tenera, & extremitates eorundem in cutim valde exertas deprehendit, ibi quoque erodit facile vel rumpit, & ita Hæmorrhagiam instituit. Hepaticus itaque tum Fluxus contingit, quando nimirum vasculum unum plurave in canale Intestinorum satis patula & prominentia existunt, magis quàm in aliis partibus corporis. Si verò tum fortè in Naribus aut Pulmone, aut Utero patuerint, tum inibi potius quàm in Intestinis rumpuntur, atque Narium, Pulmonis aut Uteri Hæmorrhagia, non autem Fluxus hepaticus contingere solet. Quo magis interim dissolvitur Sanguis, eo frequentior & copiosior etiam hic Fluxus evadit, ut à levi etiam corporis mentisque agitatione de novo vascula aperiantur. Tandem cachectico-scorbutica Sanguinis intemperies huic Affectui occasionem præbere potest. In moribus Animalium rabidorum, sicubi saliva eorum spirituosò-acris vulneri immissa, sanguinique circulanti communicata fuerit, ejus mox crasin dissolvere quoque, sicque necem inferre conatur.

In Prognosi non admodum benignè de Morbi hujus exitu judicare licet, utut enim indolens sit, perniciosus nihilominus ob sanguinis dissolutionem ceniètur, in Leucophlegma-

tiam, Hydropem aut Tabem facile transiens, vel citius etiam vires exolvens, & vitæ terminum abbrevians; præprimis si Febris continua, malignave quoque juncta fuerit.

Curatio hinc melius institui nequit, quàm ea exhibendo remedia, quæ blandâ vi adstrictivâ totalem molecularum sanguinis dissolutionem impedire, & particulas acido volatiles acres salinas inde expellere: imò quæ simul fibrarum laxatum tonum corroborare, aut rupta consolidare vascula possunt. Primo itaque omnium, si Febris nulla adsit, laxante blando remedio acres è sanguine particulas eliminabimus, quale potest esse sequens:

R. Radic. Scorzonæ.

Filic. ana ʒj.

*Incisa & mixta coque parum in
Seri Lactis bubul. vel*

- Aqu. Graminis aut Plantag. q.s.

In colaturâ postmodum infunde

Myrobalanor. opt. ʒß.

Rhabarb. elect. ʒij.

Semin. Fœnic. ʒj.

Stent per noctem in loco tepido, sequenti aurorâ coquantur parum, & colaturæ ʒiij. adde

Syrupi de Nymph. ʒß.

*Detur ad Vitr. Hauriatur mane unâ
vice cum regimine Diætæ.*

Vel R. Rhabarb. opt. ʒj.

Crem. Fri ʒß.

*M. f. Pulv. subt. d. ad ch. Sumatur
pro dosi mane cum Jusculo farinaceo.*

Præmissio laxante mox dabuntur blandè adstringentia, vel absorbentia, diaphoretico-diuretica. *Venæsectio*

Qq q

simul

simul in Brachio instituetur, vel Cucurbitulæ cum scarificatione dorso applicabuntur, sicubi quædam sanguinis abundantia adfuerit:

℞. Tinct. antiphthific. ʒiij.

Detur ad Vitr. Dosis 20. vel 24. gutt. bis vel ter de die cū Aquâ Plantag.

Vel ℞. Tinct. Martis adstring. vel styptic. alius ʒiib.

D. ad Vitr. Dosis ut supra.

Vel ℞. Essent. Trisol. fibr.

Plantag. ana ʒib.

Catechu ʒj.

Misc. d. ad Vitr. Dosis 20. vel 30. guttæ cum Aquâ Burs. Pastor.

Vel ℞. Aqu. Tormentill.

Plantag.

Polygon.

Urtic. ana ʒij.

Syrup. de Rosis sicc.

Myrtin. ana ʒj.

Spirit. Vitriol. ʒb.

M. d. ad Vitr. Singulis sex horis duæ hauriantur uncia.

Electuarii forma si desideretur, sequens aut similis concedetur:

℞. Conf. Ros. rub.

Plantag. ana ʒj.

Condit. Cynosb. ʒij.

Bol. Arm. ppt. ʒj.

Sangu. Drac. ver. ʒij.

Sem. Hyosc. ʒb.

Syrup. myrt. q. s.

M. f. Elect. d. ad Oll. Dosis magnit. castaneæ singulis sex horis.

Vel ℞. Conserv. Ros. rub. vitriol.

Fl. Tunic.

Acetosell. ana ʒb.

Conditur. Cydonior. ʒiij.

Nuc. mosch. ʒj.

Unicorn. fossil.

Terr. sigillat. ana ʒib.

Syrup. Corall. vel Capill. ♀ r. q. s.

M. f. Elect. d. ad Oll. Sumatur magnitudo Nucistæ singulis sex horis.

Pulveris formulæ sequentes inservire possunt:

℞. Lapid. Hemat. ppt.

Bol. Armen. ppt. aa. ʒiij.

C. C. ust. ppt.

Ocul. ʒb. ppt. ana ʒij.

Pulv. flor. Ros. rubr. vel Tunic.

Fol. Sanic.

Sem. Plantag. aa. ʒb.

Sacch. alb. ʒij.

M. f. Pulv. subt. d. ad Scat. Dosis in. ac v. ʒb. cum Jusculo farinac.

Vel ℞. Radic. Tormentill. Bistort.

Terr. sigillat.

Unic. fossil. ana. ʒj.

Sangu. Drac. ver. ʒb.

M. f. Pulv. subt. d. ad ch. Dosis & usus ut supra.

Vel ℞. Spec. diatriumsantal. ʒj.

Gumm. Arab.

Thuris mascul.

Mastich. elect.

Semin. Urtic.

Perfoliat. ana ʒij.

Corall. rubr. ppt. ʒij.

Diaph. martial. vel

Croc. Mart. adstring. ʒj.

Laud. opiat. gr. vj.

Sacch. cand. alb. ʒj.

M. f. Pulv. subt. d. ad Scat. Dosis ʒb. vel ʒij. bis aut ter de die cum Emulsione Amygd. dulc.

His

His addimus *Succos ex Urticâ urente, Plantagine angustifoliâ, Trifol. fibrino, Borragine, Numulariâ, Sanicula, & similibus* recentè expressos, filtratos, atque duarum unciarum quantitate bis quotidie cum *Conserv. Rosar. antiquâ* propinatos. Vel ex *Equiseto, Polygono, Bursâ Pastoris, Plantag. Urticâ urente, Summit. Hyper. Tamar. Cupress.* Foliis tenerioribus *Quercûs, Fimo Caballi &c.* cum affusione *Aquæ Plantagin.* Aqua destillari, hæcque dein m. ac. vesp. ad ℥iiij. per plures Hebdomadas propinari potest. Imò & *Acidularum potus* moderatus quovis anni tempore simul concedetur.

Externè inter sympathetica remedia Angli laudant multi *Pulverem è Vitriolo Romano* sub radiis solaribus ad albedinem calcinato paratum, ac *sympatheticum* dictum, fœcibus excretis immissum. Item *Buſonem* siccatum, sacco sericeo inclusum, atque sub alis vel supra scrobiculum Cordis gestatum. Nec non frustum *Ligni è Fraxino* primùm arboreſcente, ac eâ, quâ Sol Tauri signum ingreditur, horâ rescissum, atque manu detentum. Alii monile ex *Lapide Hæmatite, Coralliis rubris*, ipsoque *Ligno dicto Fraxini* factum de collo suspendunt. *Bursa* denique *Pastoris, Foliaq; Urticæ urentis* contusa atque *Plantis pedum & Volis manuum* sæpius applicantur non sine fructu.

FLVXVS LACRYMARVM CONTINVVS, vid. *Epiphora.*

FLVXVS LOCHIORVM NIMIVS, vid. *Lochiorum Fluxus nimius.*

FLVXVS MENSIVM NIMIVS, vid. *Mensium Fluxus nimius.*

FOETOR *Corporis humani* ^{Fætor corporis} *ventis* est odor teter & horridus, è membris his illisve quorundam hominum exhalans, atque vicinorum adstantiumve nares molesto sensu percellens.

Equidem in genere totum corpus eorum Hominum foetere observatur, qui sordidi existunt, multum sudant, sudores suos non abstergunt, aut eos in suis indusiis siccari permittunt, neque indusia valdè mutant; quique corporis sordes minimè abluunt; quemadmodum Rustici, Bajuli, Nautæ, Lignorum Fissores, variæque conditionis Opifices sunt. Sed & aliquando in Febribus malignis atque pestilentialibus, transpirationem vel sudorem graveolentem fundentibus, in Variolis maturis & jam siccari incipientibus, *Fætor* è toto corpore exhalat. Apud lautioris verò sortis Homines subinde hæc aut illa pars quoque *Fætores* ex se quendam exspirare notatur; hinc enim *Fætor anhelitus*, sive *Narium, Oris, Aurium, Capitis* Achoribus fluentibus vel *Tineâ, aut Phtiriasi* laborantis, *Alarum, Inguinum, Pedum, Partium ulcerosarum.*

Fætor autem ejusmodi variè olet, & modò hircum, modò allium aut cœpas, modo aliâs res graveolentes suo odore refert. *Hircus Alarum* vocatur, quando sub Axillis continuè emanans sudor Hirci odorem repræsentat.

Causa.

Causa Foetoris cujuscunque nostri corporis in genere videtur esse sulphur sanguinis maximè exaltatum, sive à volatilibus salis alcalini acidive particulis solutum, & unâ cum illis dein in auras externas exhalans. Quando igitur ejusmodi particulæ salino-sulphureo-volatiles in circulante humorum massâ copiosius solutæ, per glandulosas harum illarumve partium vias deinceps exitum continuè inveniunt, tum inibi secretæ in auras expirant, foetentemque odorem excitant. Facit autem certa pororum in glandulis, aut particularum exhalantium configuratio, ut apud hos quidem per omnem cutim, apud alios verò tantum per glandulas axillares, aut inguinales, aut pedum cutaneas &c. copiosius expirent: ita quidem ut quo majorum partium motus & agitatio contingit, eo copiosior quoque foetorum exhalantium proventus excitetur. Quòd autem à sulphureo-salinis volatilibus, maximè solutis, & Hominum nares peculiariter ferientibus, atque molestantibus particulis, auram externam inficientibus atque occupantibus producat, argumento esse potest acidi & sulphuris volatilis commixtio, statim enim atque hæc conjunctio fit, particulæ in auras copiosè exhalant, & Foetorem de se spargunt.

*Narium
foetor
unde?*

Narium foetor, ex anhelitu foetente cognoscibilis, atque adstantibus ferè intolerabilis, vel à purulentâ sanie in Ozænâ, vel à muci narium viscido-tenacis morâ atque retentio-

ne intra nares angustas, vel aliter malè conformatas, diutinâ provenit, sub quâ particulæ tandem volatiles sulphureæ resolutæ id est, corruptæ & putrefactæ expirant, anhelitumque foetidum reddunt.

Foetor Aurium originem ferè debet continuo effluxui, vel puris, vel ichoris cujusdam excrementitii, sordidi, putridi, ac multum sulphuris resoluti ex sese emittentis. Infantibus ac Pueris familiaris.

Foetor Oris, indeque simul oriens Anhelitus foetens, à variis causis originem ducit; inter illas verò numeramus ante omnia halitus Pulmonis exulcerati putridos, in expiratione vicinum aërem externum petentes; quemadmodum hujus rei testimonium præbent invictum Pneumonici aut Phthisici, præprimis si continuè remediis internis utantur, quibus Flores sulphuris permixti sunt. Sed & huc contribuunt Liquores & Cruditates Ventriculi corruptæ, nidorosæ, è cibis facilè putrescentibus, alliis, cepis, raphanis, carnibus ac piscibus falsis, mollibus, laxâ carne pollentibus enatæ, & per gulam exhalantes. Porro ejusmodi foetentem ex ore halitum efficiunt copiosa Fumi Tabaci suctio; nec non Dentes carioli, foedoque muco tartareo obliniti; Dentitio Infantum difficilis; Salivatio arte procurata, in Scabie, Pforâ, Lue venereâ &c. Gingivæ Scorbuto corruptæ, Ulcera foeda & cacoëthea Palati; Aphthæ, & Pustulæ per oris partes dispersæ.

Foetor

Fœtor Alarum, Inguinum, Perinæ, obscænarum Partium ac Pedum, provenit ex earundem partium sudore ferè continuo, sulphureo-salinas volatiles moleculas ex sese copiosè mittente. Auget hinc talem Fœtorem, sicubi indusia vel tibialia, fœdotali sudore madentia, haud crebrò mutantur. Fluor etiam albus Mulierum subinde fœtidum quoque odorem de se exhalat, præprimis si venereus fuerit.

Fœtor Setaceorum, Fonticulorum, Achorum, originem debet itidem sulphureo-salinis particulis inde jugiter exhalantibus. Observavi ante triginta annos Scaphusii Helvetiorum, Fonticulum *Excellentiss.* *Hospitis mei Dn. D. Christophori Harderi*, piæ nunc mem. copiosiore, atque simul fœtentem admodum ichorem fudisse, quoties ipse tractandos ac visitandos quotidie habuit Ægrotos Febri malignâ laborantes, ubi certè miasmata Ægrorum maligna cum sanguine Medici communicata, sulphuris atque salis volatilis solutionem atque diffusionem moliebantur.

Fœtor denique ex Utero Puerperarum non rarò prodit insignis, quando vel secundinæ portio intra Uterum relicta, vel pars quædam ipsius substantiæ Matricis putrefacta, vel sanguinis grami corrupti atque in putrilaginem versi fuerunt, & ita paulatim per sinum pudoris excernuntur.

Diagnosis ejusmodi Fœtorum haud difficilis est, cum per se ex suis circumstantiis cognosci queant. Neque de eventu illorum tam malè judi-

candum, cum plus molestiæ apud Adstantes, quàm periculi in Ægrotantibus procreent. Saltem per se Fœtor talis nullum hætenus interemit Hominem; sed indicium tamen aliquando effectusque est Exulcerationis Pulmonis, similisque alius funestæ internorum viscerum. Quandoque curabile est malum, si causa ejus non est radicata valdè. Interim odor quoq; ejusmodi fœtens sive Narium aut Oris, sive Alarum aut Pedum apud unum vel alterum præprimis obesum Hominem adeo vehemens, & ingratus exspirat, ut sæpè aliquibus Adstantibus nauseam, cordis imbecillitatem, animi deliquium, angustiam & anxietatem præcordiorum conciliet.

In *Curatione* ad duo attendendum, nimirum ad diversitatem partium *Fœtorem* exhalantium, & ad varietatem causarum producentium. Quando igitur *malus* ejusmodi odor, v. gr. *Narium* aut *Oris*, à causâ quadam oritur inextirpabili, tum non nisi palliativa cura institui debet, in quâ ad Fœtorem vel abscondendum, vel aliter etiam corrigendum Naribus primò attrahenda præscribuntur suaveolentia; quemadmodum sub formâ quidem liquidâ sunt *Spiritus Anbaltinus, Angelic. Anthos, Melissæ, Fl. Rosarum, Aurantior. &c.* cum immersione *Cinamom. Garyophyllor. Moschi & Ambræ*. Sub formâ siccâ sunt *Pulveres errhini fragrantés, à Radicibus Ireos flor. Cyperi, Ligno Rhod. Santal. citrin. Ocymo, Melissâ, Majoranâ, Benzoin, Storac. calam. Moscho, Ambrâ,*

brâ gryf. similibusq; aliis compositi, quibus etiam Olea destillata Anisi, Fœnic. Rosar. Majoran. Rorismar. Ligni Rhod. Cinam. Garyophyll. Meliss. vel Balsamus apoplecticus fragrantiss. permisceri possunt. Imò Balsama ipsa, v. gr. Majoran. Rosar. Rorismar. Cinna- mom. Garyophyllor. arom. Meliss. & omnium loco Balsamus apoplecticus sæpè applicari vel inungi quoque so- lent.

Ore frequentissimè tenentur vel mastlicantur Trochisci de Gallia moscha- tã, Confectiones Seminis Anis. Fœnicul. Cinamom. Garyophyll. arom. vel Con- fectio Catechu moschata, cujus sequens est descriptio:

*Rx. Sacch. albiss. ʒiiij.
Succi Catechu ʒij.
Mosch. orient. ver.
Ambr. gryf. aa. gr. iiij. vel vj.
Mucilag. Gumm. Trag. Aqu.
Ros. fact. q. s.*

M. f. Trochisci minores; vel fiat Con- fectio in conulis instar Muscerdæ. Sæ- pius inde lambantur aliqui.

*Vel Rx. Sacchar. albiss. ʒvj.
Succi Catech. sive Japon. ʒiiij.
Conf. Alk. compl. ʒß.
Ambr. gryf.
Mosch. orient. ver. aa. Spir. Ro- sar. solut. gr. vj.
Ol. stillat. Cinam. gutt. vj.*

Cum Mucilag. Gumm. Trag. Aqu. Rosar. fact. fiat Massa, de quâ vel Tro- chisci, vel Muscerdæ sæpius lambendæ.

*Fœtoris
Aurium
& Capi-
tis cura.*

Fœtor Aurium tollitur faciliè, si fluxum earum purulentum aut icho- rosum abstuleris, quemadmodum sub titulo de Aurium Ulcere habetur.

Ita quoque Fœtor Capitis ex Achoribus, aut Tineâ cessat per se, sicubi tales Affe- ctus fuerint ex arte curati.

Fœtorem quoque Narium, ab O- zænâ productum aut Polypo, non facile profligabis, nisi hos radicitus extirpaveris morbos; cumque hoc aliquando impossibile sit, cura tan- tum palliativa erit adhibenda. Quod si autem mucus in Narium summita- te, naturâ vel casu quodam angusta- tâ diutius obhærescat, & putrescat, tum ille omni arte emolliendus atque extergendus erit. Hunc in finem corpus aliquoties ante omnia vel Vino medicato, è Plantis cephalicis, aperien- tibus composito; vel Pilulis ex Mas- sâ Pilul. marocostin. tartarear. è Succin. Craton. Extract. catholic. cum Mercur. dulc. vel Cinnab. ʒn. correct. ac Resinâ Jalappæ concinnatis, purgabis. Dein- cept verò extus summitas Nasi bis vel ter quotidie inungatur calidè Bu- tyro recenti non salito, eoque vel sim- plici, vel permixto cum Oleo Chamo- mill. Violar. Lilior. alb. Rosar. Verbasc. Succin. Aneth. Lavendul. Ipsis verò Naribus crebrò inspergi debet tepidè Aqua vel Lac tepidum cum incoctio- ne Folior. Alth. Atriplic. Betæ, Brassic. Malv. Meliss. Nicotian. Nasturtii a- quat. Beccabung. Majoran. Betonic. Flor. Lil. convall. Primul. Veris, Cyani, Consolid. regal. Semin. Nigell. Fœnicul. Anis. cum vel sine permissione Mellis rosacei, mercurial. violac. & aliquot granis Vitrioli albi.

Dum autem hæc extus fiunt, in- tus simul per aliquot hebdomadas Ju- scula m. ac v. propinanda sunt, Herbis Majoran.

Majoran. Mercurial. Numular. Borrag. Matrisylv. Pimpinell. Nasturt. Scabios. Lactuc. Beccabung. Fumar. Acetos. alterata. Vel Aquæ earundem Plantarum destillatæ, aut ipsarum siccatarum Infusa calentia diligenter in usum vocentur. Imò Balnea quoque Aquæ dulcis, vel Pediluvia cum incoctione Herbarum emollientium ac cephalicar. in usum trahuntur. Æstivo tempore Thermas Fabarienses similesve alias, in Balneo atque Potu consulerem.

A Dentium Carie oborta Graveolentia, requirit eorum evulsionem, vel inustionem, vel palliativam ad minimum curam desiderat, cum præscriptione & usu suaveolentium instituendam. Vide etiam Dentium Cariem.

Fætor à Putredine Gingivarum, Ulceribus & Ulcusculis, in Scabie fœdâ; Scorbuto, Aphthis, tolli potest sensim per Gargarismata & Oris collutiones calidas frequentes, è Radic. Aristoloch. rot. Bistort. Chin. Helen. Caryophyllat. Carlin. Succis. Virgæ aur. Sarsaparill. Vincetox. Lign. Quajac. Sassaphr. Herbis Artemis. Betonic. Brunell. Consolid. med. Succis. Numular. Sanic. Scabios. Florib. Bell. min. Ligustr. Malv. arbor. Alcææ, Calth. palustr. Seminib: Anis. Hyperic. Plantag. Urtic. Perfoliatæ, Myrrhâ, Mastiche, Nitro, Alumine pauco, in Vino & Aquâ invicem coctis, atque insuper Melli rofaceo, Roob Dianuc. Juniper. vel Sambuc. permistis. Adde his usum fragrantium Confectionum supra commendatarum.

Fætor Oris ab usu Fumi Tabaci corrigitur eluendo Os cum Aquâ calente simplici, vel destillatâ Malvæ, Scabios. Borrag. Veron. Fœnic. Naphæ, Rosar. quibus adde Trochiscorum supra descriptorum usum.

Fætor Oris ab halitibus stomachi proveniens vel emetico exhibito, vel purgante per inferiora remedio aliquoties dato tollitur. Deinceps verò Tragma stomachicum in usum trahetur, v. gr.

R. Spec. Arom. rosat. diamb.

diamosch. dulc. ana ʒj.

Rasur. Ebor.

Specif. stom. Poter. ana ʒij.

Semin. Anis.

Fœnic. ana ʒij.

Flaved. Cortic. Aurant. ʒj.

Sacch. alb. ʒiij.

M. f. Pulv. subt. d. ad Scatul. Dosis m. ac vesper. ʒj.

Fætor denique Alarum, Inguinum, Perinæi, Pudendorum ac Pedum, requirit primò usum Vini medicati purgantis: dein Venæsectio, si Corpus plethoricum, instituetur, vel Cucurbitulæ cum scarificatione dorso applicabuntur. Etiam Tragma superius ordinabitur. Pediluvia aut Balnea ex incoctione Herbarum Majoran. Beton. Calaminth. Serpill. Malv. Numular. Folior. Salic. Quercus, Pyrorum, Equiset. Polygon. Urtic. Hyperic. parabuntur, & in usum trahentur. Tibialia, indusia, focci quotidie mutabuntur. Pulvis denique Cinerum vel Scobis Aurichalci, Scoriar. Ferri, Lapidis calaminar. Tutia, Radic. Tormentill.

Ab usu Tabaci.

A Cruditatibus stomachi.

Fætoris Alarum, Inguinum, Pedum Curatio.

mentill. &c. applicabitur. Folia recentia *Quercus*, *Plantaginis*, *Hederæ arbor.* & similia imponentur. Unguentum de *Cerussa* vel *diapompholyg.* inungetur.

Fractura.

FRACTVRA est Morbus solutæ unitatis in partibus duris sive Ossibus, à causis externis scindentibus, contudentibus, terebrantibus, aliisve productus.

Differentia.

Species & Differentiæ Fracturarum sunt variæ, partim ab *ossium varietate*, partim à *symptomatibus*, partim à *causis*, partim à *diverso Fracturæ modo* &c. petitæ. Ratione *Ossium* Fractura alia est in *Cranio*, alia in *Costis*, *Vertebris*, alia in *Ossibus Femoris*, *Cubiti*, *Ulnæ & Radii*, *Humeri*, *Tibiæ*, *Claviculæ* &c. Alia in medio Osse, alia prope ejus caput, aut finem, vel in ipsâ extremitate: Alia in *Articulo* vel prope *articulum*, alia longius ab *Articulo* facta. Ratione *symptomatum* alia quidem sine his, alia verò cum *Vulnere*, aut cum *Dolore*, *Contusione*, *Inflammatione*, *Spinarum Ossium prominentia*; alia cum *Febre*, alia sine eadem. Ratione *modi* primò alia est *simplex*, in quâ unum tantum os frangitur, sine alius cujusdam partis insigni læsione; alia *multiplex, composita* vel *complicata*, in quâ vel plura simul ossa sunt fracta, vel *Luxatio*, *Vulnus*, *Contusio*, aliudve insigne accidens simul est junctum. Dein etiam ejusdem modi respectu exurgunt quinque notabiles illæ *Differentiæ*, quarum *prima* est, quando Os in transversum frangitur;

Secunda, quando Os secundum longitudinem finditur, ac rimam in dividitur, ita ut partes læsi ossis ab invicem non prorsus separentur; hæc vocari solet *Fissura* vel *Rima*, Græcis *χωλακηνδὸν Κάταγμα*. *Tertia* est, quando Fractura in unâ quidem sui parte rectâ linea contigit, in alterâ verò gibbosa est sive lunata, atque eapropter Fractura *Lunaria* vel *Isonica*, græcis *κάταγμα καλαμίδων* appellatur. *Quarta*, quando Os fractum in plura tenuia fragmenta instar farinæ aut frustorum putaminis nucum, comminuitur & confringitur, græc. vocatur *κάταγμα ἀλφιηδὸν, καρυίδων* vel etiā *Σύντριμμα*, *Contritio*. *Quinta*, tandem est, quando portio quædam Ossis κατ' ἀποκοπήν, per *confractiōnem* à toto planè est separata & ablata, unde *Catapotransis* nuncupatur.

Producuntur omnes Fracturæ non nisi à *causis externis*, violenter in Ossa incidentibus, sive dein contundant, sive pungant, sive scindant, sive alio modo Ossium continuitatem solvant. Occasionem hinc præbent saltus, casus ab alto, instrumenta secantia aut contundenita; ictus globulorum sclopetariorum, unde *Contritio* inprimis contingit.

Quantum ad *Diagnosin*, apprehenditur Fractura, si tacto ejus loco in unâ parte cavitas, in alterâ verò intumescencia, vel prominentia percipitur; si commoto paulum membro fracto crepitus, vel fragor aliquis in Fracturæ loco auditur: si pars vel brevior

brevior facta , vel contorta à motu musculorum sit ; si dolor adsit , atque impotentia motus musculosi in parte læsa : si spinæ fracti ossis continuè membranas superjacentes pun- gant , vel per apertam simul cutim emineant : si causæ Fracturarum præ- cesserint. Ut autem dignoscantur species Fracturarum , ad peculiare circumstantias est attendendum , ac ab illis iudicium de specie Fracturæ petendum ; omnium autem difficil- limè cognoscuntur *Fissuræ* vel *Rimæ*, quæ sine vulnere contingunt ; quod si tamen dolor profundus diu admo- dum Ægrum in loco affecto torqueat, membrum in motu nonnihil impe- diat, ac denique tumida aliquantum pars sit in loco Fissuræ, citra Inflam- mationem, tum Os subjacens fissum esse, audacter pronunciabis.

Quoad *Prognosin*, minus periculosa Fracturæ audiunt, quæ sunt recen- tes, simplices , & sine alio quodam symptomate factæ : quæ in medio ossis contigerunt ; quæ sunt trans- versæ , quoniam tales , si benè sint reductæ facilius aptâ ligatione conti- neri possunt : in quibus non multæ sunt prominentiæ acutæ, nec alia frag- menta minutiora : si ossa è suis sedibus non multum recesserunt ; si alteru- trum duntaxat os in Brachio aut Cru- re fractum est ; si Æger adhuc Juvenis, vel aliàs laudabili humorum circulan- tium dispositione gaudeat. Magis periculosæ verò sunt , quæ cum Lu- xatione, Vulnere, magnâ Contusio- ne, Dolore, & Hæmorrhagiâ insigni conjunguntur : quæ prope Articulos

eveniunt : quæ denique iis obtin- gunt , qui malignâ quâdam humo- rum intemperie & cacochymiâ labo- rant : vel quibus Febris admodum ardens superaccedit. Lethales tan- dem plus minus Fracturæ existunt, quæ in Vertebriis dorso accidunt , ac Viscera quædam interna spinis suis pungere , sicque Spasmos, Paralyfes, Febresque acutas excitare possunt : vel quæ in Cranio cum læsione Me- ningum insigni , aut extravasatione humorum factæ fuerunt.

In *Curatione* Fracturarum ad qua- tuor præprimis attendimus ; 1. Ut frustra ossis fracti , si quæ adfuerint prominentia, quàm citissimè suum in locum reponantur ; vel sicubi spina una aut altera prorsus ab osse avulsa sit , eadem per Vulnus extrahatur ; vel etiam si adhuc Ossi cohærens ita promineat , ut restitui haud possit, forfice pars ejus maximè prominens auferatur, quò reliquum dein os in- trorsum trudi tanto commodius queat. 2. Ut ossa reposita per convenientem Ligaturam immota conserventur, atque internascente callo iterum fir- miter cohærescant. 3. Ut omnibus symptomatibus , qualiacunque de- mum extus supervenerunt, tuta citaq; medela afferatur. 4. Ut Febris acu- ta vel præcaveatur, vel si adsit, debi- tis quoque remediis citò profligetur.

Repositio tamen *Ossium*, si Inflam- matio adest insignis , differenda est, donec hoc accidens fuerit discussum, quod quidem obtinetur facile , si *dis- cutientia fomenta* inflammatae parti ap- plicentur, qualia sunt ex *Camphora* at-

que *Gummi ammoniaco Spiritu Vin.* soluto parata; vel alia quôq; suo loco contra Inflammationem commendata remedia. Veteres Chirurghi heic pessimo facto *lintea Aceto immersa* applicuerunt, etsi enim hoc remedii genus non quidem, ut sibi imaginabantur, repellebat, sed tantillum discutiebat, quoniam tamen tardè admodum, nec semper tutò satis effectum istum edit, hinc melius longè atque prudentius *Aceti* usu abstinemus. Præterea si Hæmorrhagia insignis adfuerit, ei quoque per stegnoticorum appositionem, uti suo habetur loco, simul medendum est.

Repositio autem perficitur à Chirurgo, & quidem primò per ossis fracti in diversa extensionem; cum enim musculorum fibræ, ossis robore destitutæ, sequantur naturalem suam determinationem, & in se contrahantur, necessum est, per vim eas simul cum Osse fracto tantum elongare, quantum à naturali statu recesserunt. Fit hoc aut solis manibus, idque unius, pluriumve Hominum, vel habenis, sive lineis fasciis circumpositis, vel per trochleam trajecto fune. Sed hæc extensio tamen non nimia sit, ne Convulsiones inde subsequantur. Extensio sic satis membro succedit *διέσθωσις*, *conformatio*, s. *coaptatio*, quâ Chirurgus membrum, utraque manu comprehensum studet ad pristinam figuram reducere, impellendo illud hinc inde, ante, retro, & ad latera, donec extantes particulæ in suas cavitates & pristinas sedes fuerint reductæ; quod ex doloris

cessatione, ossis fracti in superficie æqualitate, & comparatione cum sano membro factâ, elucescit. Coaptata hinc Ossa conjuncta sunt tenenda, quod præstat proba deligatio sive per duas fascias sæpius circumductas (quarum altera brevior à dextris ad sinistram, sursum versus, altera duplo longior contrario modo incedat ac retrocedat) sive per ascialem Fasciationem cum spleniis institutam, cujus major est usus, si pars affecta crebram requirat inspectionem, ut cum Vulnus Fracturæ jungitur, aut cum Fractura est in Femoris medio, partè superiore. Ante fasciarum injectionem *Emplastrum diapalma*, vel *de Bolo*, vel aliud poros apertos tenens imponi potest; atque ad Inflammationem impediendam fasciæ prius immergi debent *Spiritui Vini*, in quo *Camphora* aut *Gummi ammoniacum* solutum est. Tandem ligatum sic membrum sive assulis ligneis, aut coriaceis involvitur sive in capsulâ ligneâ, aut coriacea, sive in pulvinari molliusculo reponitur, ita tamen, ut sæpius ratione succedentis, Inflammationis extremitas membri sursum erigatur & calcaneus ab omni compressione vel allisione ad lectum liber relinquatur.

In ligatione Assularum imprimis cavendum, ne arctè nimis illa fiat, quia sic facilè humorum impediretur circulatio, & Tumor cœruleus membri infra ligaturam, cum Gangrænâ, intensissimoque dolore subsequeretur. Quod si verò post ligatum membrum nullus ferè dolor amplius adsit, nisi

nisi in Fractionis loco, ubi nonnihil firmitus liganda pars est, (non tamen ut circulatio impediatur) tum certus esse potes de rectâ deligatione. Prima deligatio ita per triduum vel quadriduum relinquitur, nisi quædam symptomata solutionem ligaturæ requirant. Postmodum ad impediendam pustularum efflorescentiam, & pruritum ligatæ cutis discutiendum, singulis diebus semel, vel etiam bis Fracturæ ligatura solvenda, & de novo repetenda; sed insimul totus tractus ligari solitus Oleo rosaceo vel chamæmelino est inungendus, Emplastrum superimponendum, ascia hinc & assulæ injiciendæ sunt. Si pustulæ in parte effloruerint, tum vel Unguento camphorato albo, vel Essentiâ Myrrhæ, Aloës, atque Spirit. Vini camphorato locus affectus est illinendus. Octavo die Emplastrum Oxycroceum vel simile imponi potest ad Callum promovendum; intus quoque Osteocolla sæpius ad 3ß. vel ʒij. cum Jusculo propinanda. Atque hæc quidem in Fracturæ specie, Schi-dacidon dictâ, quæ sine Vulnere aut Luxatione contingit, observari possunt & debent.

Si Os est fissum, quod Germani vocant *ein Klackbruch*, tum tantillum materiæ succulentæ è Fissurâ effluit, quæ paulatim dein sæpius juxta ductum fibrarum versus Ossis articulum protruditur, inibi que exitum sibi quærit, quem si non brevi obtinet, acrimoniâ acquisitâ tendines, glandulas, ossa que ipsa arrodit, spinamque tandem ventosam indu-

cit, quam imperitiores sive Medici sive Chirurgi hætenus pro *Catarrho cephalico*, aliove nescio quo Affectu venditare, maleque curare non erubuerunt. Hæc itaque Fissura non ita statim, ut aliæ Fracturæ sanantur, quoniam nulla hic manualis operatio, extensio aut coaptatio requiritur, sed Chirurgus duntaxat symptomata vel præcavebit, vel debitis remediis discutiet, reliquumque soli Naturæ permittet. In principio hinc statim Emplastrum oxycroceum, vel aliud catagmaticum discutiens & roborans, non tamen inflammas aut exulcerans imponi, simulque fasciæ commodæ, prius Spiritui Vini camphorato immersæ injici debent, ita quidem ut os sic arctè ligatum, succos amplius nullos emittere, callique generationem longius extendere possit. Quod si tamen hæc deligandi formâ intra aliquot hebdomadas, quemadmodum fieri assolet, non omnis tumor cum dolore auferatur, sed hæc symptomata protrahantur, tum Emplastra magis discutientia reddi, simulque Fomenta ex Herbis cephalico-aromaticis, Vino rubro cum Camphorâ incoctis fieri, & aliquandiu applicari debent: non neglectis, quæ intus siccare & sanare valent, Lignorum decoctis, ipsaque etiam Osteocollæ exhibitione. Sed nec omittatur quoque Venæsectio in principio statim instituenda, unâ cum uno vel altero Clysmate. Quin & si diu admodum totalis sanatio fuerit protracta, atque Tumor ab incrassata materia substituerit, vel etiam Callus nodosus genitus sit, protinus suademus

usum *Thermarum sulphurearum* qualliumcunque, aliquoties institutum, præprimis autem *Plumbariarum Lothringiæ, Wisbadensiâ Hassiæ, Aquisgranensium Belgii, Piperinarum Rhetiæ, Badensium Helvetiæ, Leucensium Vallesiæ, Burbonensium, Carolinarum, Schlangenbadensium, aliarumve.*

Quod si verò *Æger Fissuram* fortè leviozem in principio nauci fecit, & ex hâc negligentia rorida quædam materia è fisso ossis ac periostii lacerari loco effluens tumorem quendam produxit, tum hic, si possibile, citò aperiendus, antequam ichor acquisitâ fortè corrosivitate circumcirca corrodendo fistulosum, incurabileque *Ulcus* excitaverit, & quidem incisio eo præcisè in loco est faciendâ, ubi *Fissura* contigit, sicque inflictum etiam profundum *Vulnus* ex arte curandum; curatio tamen ita instituenda, quemadmodum in *Fractura cum Vulnere*; videndumque num non ipsum os *Carie* infectum sit, antequam cicatrix inducatur, eaque propter *Vulnus* ad os usque prius dilatari convenit, tumque frustula ossis flavescencia aut nigra cariola vel forcipe auferes, vel cauterio exures, vel expectabis, donec per frustula minora paulatim cum pure prodierint. Separantur autem & prodeunt intra 30. & 40. dies, si *Æger* Juvenis, & frustum parvum; *Ægro* verò existente sene, cariola frusta ante 60. diem vix separabuntur. Quando denique in fine ossium sanorum sana caro incipit crescere, signum est, brevi separatam fore cariola ossis portionem. Ul-

cus interea, quemadmodum in *Carie* suo loco instructionem dedimus, deligabis; sed simul *Ægro* prædicere non intermittes, ex tardâ admodum hâc curationis methodo frequenter *Contracturas* articulorum provenire, claudosque *Homines* reddi.

In *Ossis Contritione*, quæ spinæ adhuc cohærent, neque punctiois sensu molestæ sunt, eæ debitâ membri extensione & coaptatione, si possibile, suo iterum restituuntur loco, debitisque ligaturis retinentur. Si autem festucæ ab Osse penitus separatae fuerint, atque musculos superjacentes, (nisi *Vulnus* sit factum, per quod prominent) continuè pungunt, tum locus statim incisione est aperiendus, atque festucæ instrumentis extrahendæ; quod tanto facilius fit, si per *Vulnus* simul factum eminnerint. Nisi verò auferas, protinus *Inflammatiô*, *Gangræna*, *Convulsiones*, aliaque mala subsequuntur periculosa. Notandum tamen, quod in *Contritione* ossium per sclopentarios globulos subinde *Ulcus* ad plures annos apertum maneat, donec omnia contriti ossis frustula, plus minus pungentia, fuerint eliminata.

Quando igitur *Fractura* est cum *Vulnere*, curatio semper diutius protrahitur, ob diversa *Vulnus* subsequencia symptomata, incommodioremque deligationem, quæ sequenti modo peragitur: exemptis nimirum aut resectis spinis ossium prominentibus, membrum extenditur, ossa fracta coaptantur, labia *Vulneris*, si nimis amplum, adducuntur, vel consuuntur;

suuntur. Si autem Vulnus, in contusâ præprimis parte, nimis arctum fuerit, tum incisione magis ampliatur, quò sanguini extravasato & coagulato exitus pateat. Vulnus ab aëris præcipuè frigidi, humidi, aut maligni accessu præcavendum, neque stylorum exploratoriorum ope & immisione exasperandum; nulla *pinguia* & *oleosa* apponenda, quorum loco extus applicantur *Balsamum Indicum*, vel *de Copaiba*, &c. cum *Mastiche*, *Oleo Terebinthin.* & *Essent. Caryophyllor.* quibus *fila carpta* immerguntur. Tandem *Emplastr. Opeteloch*, perforatum undique, circa Vulnus & Fracturam applicatur, prius tamen Partem *Oleo rosaceo* vel *Lil. convall.* illinendo. *Pulvilli* hinc *Lintei* desuper ponuntur; deinceps *linteum*, in extremitatibus utrinque fissum, *Spirituiq; Vini camphorato* immersum, toti membro obvolvitur, ita quidem, ut fissæ extremitates latus membri vulneratum respiciant. Porro fasciæ ita injiciuntur, ut vulneratus locus nonnihil apertus maneat, quò sic Vulnus quotidie bis deligari possit, absque reliquarum fasciarum solutione. Assulis tandem membrum involvitur, eâ quoque ratione, ut dum Vulnus deligatur, non opus sit, omnes simul tollere assulas. Assulæ autem vel capsulæ lignæ ejus longitudinis esse debent, quâ quidem supra & infra Fracturam sanas quoque membri partes involvant, imò simul ipsos Articulos superent, quò sic membrum in juncturis per pavores tempore somni

contingentes flecti nequeat, quoniam ab ejusmodi flexione facile partes ossis fracti repositæ & coaptatæ iterum elaberentur, atq; hinc vel tardiorē sanationem, vel informem callum producerent.

Quoad *Symptomata*, primum ratio habenda *Inflammationis*, *Tumoris* atque *Doloris*, quæ quidem vel præcaventur vel discutuntur, si *Fasciæ*, uti sæpius monitum, *Spiritui Vini camphorato* immergantur, calideque circumvolvuntur. Loco *Spiritus Vini* alii quoque *Rorem mineralem* sive *Phlegma Oli spirituosum*, alii *Elixir Balsamicum Job. Hellfrici Jüngken* commendant, quod hoc modo parare solet:

Symptomata.

Rz. Radic. Angelic.

Imperat.

Zedoar. ana ʒß.

Cubebæ. ʒij.

Garyophyll. arom. ʒj.

Croc. oriental. ʒß.

Castor. ʒß.

Gumm. Galban.

Asæ fætid. ana ʒj.

Benzoin. Storac. calam. ana ʒj.

Camphor. ʒij.

Incis. & contus. affunde

Tinctur. ʒris Mß.

Stent ita Infusa semper in Vitro bene clauso.

Victus immoderatus, & deligatio nimis laxa sæpius occasionem præbent *Callo* nimis magno, sive *ex-crescentiæ ossis* in loco Fracturæ, à nutrimenti ossei copiosiore affluxu vel admissione, proveniente, quæ suâ præternaturali eminentiâ incommoda

Callus ossis.

varia, in primis autem dolorem, quando tangitur producit, imò & nonnihil musculorum motum impedit. Callum hunc imminues impositione *Emplastri de Ranis Vigonis cum Mercurio*, cui desuper simul applicari debet *lamina plumbea*: Tandem & *fomentum emolliens* atque *discutiens* simul applicatur, & in Diætâ Aegro victus tenuis præbetur; hac enim ratione Callus sex mensium ætatem nondum excedens subinde intra 15. dierum spatium ita mollis reddi potest, ut Chirurgus postea membrum denuo extendere, ac in meliorem figuram aptare valeat.

Quandoque *Macies* & *Atrophia* in parte læsâ observatur, præcipuè cum ligatura in deligatione nimis stricta fuit: cui malo medemur *laxiore tantillum deligatione*, & *Fomentis ex decocto Althææ, Salvæ, Majoranæ, Chamomill. Puleg. Malv. Mercurial. Meliss. &c.* in *Aquâ factò* paratis.

Quod si Membrum fractum difforme, aut curvum intortumque evaserit, Chirurgi id sive imperitiæ sive negligentiae adscribes, nisi Ager admodum impatiens fuerit, membrumque benè aliàs repositum haud immotum tenuerit. Os femoris tamen paulò infra coxendicis juncturam ruptum, propter musculos nimis crassos & robustos sicque deligationem vix possibilem bonam, non nisi curvè & informiter quandoque curari potest, ut hinc claudicatio, propter pedem breviorē redditum, subsequi necesse habeat.

Notandum quoque, dum Articulis in Fracturæ curatione, nulla flexura permittitur, sub qualibet deligatione tendines eorum *Oleis emollientibus & roborantibus*, v. gr. *Chamomill. Hyperic. Aneth. Rosar. è floribus Slotani, &c.* esse illinendos, ne per longam adeo quietem *Contractura* subsequatur.

Pruritus, & *Mordicationes* à falso oriundæ fero, sicubi in loco doloris & læsionis persentiantur, ablutente *Aquâ calidâ*, vel etiam *muriaticâ*, aut ipsâ quoque *Urinâ* tolluntur. Si verò *pustulæ exulceratoriæ* efflorescant, inunctione *Olei Hyperic. Lil. alb. rosacei*, vel *Unguenti albi camphorati* dissipantur.

Febri continuæ Fracturis supervienti occurritur *Pulveribus & Mixture diaphoreticis* per aliquot dies usurpatis.

In Diætâ, præter *Decoctum Traumaticum* per aliquod tempus m. ac v. bibendum, atque *Osteocollam ad 3ß. cum C. C. phil. ppt.* aliquoties exhibitam, in principio vix nisi *Juscula* optima, etiam consummata, nec non *Hordeum, Orizam &c.* concedes; à *Vini* usu absterrebis; quandoque noctu ad conciliandum placidum somnum vel *Emulsionem Seminum frigidor. vel Julepum ex Aqu. Nymph. Lactuc. & Syrup. Violar.* propinabis. Ab Irâ, Terrore, ac aliis denique vehementioribus animi Pathematibus Aegrum tutum præstabis.

Atque hæc in genere de *Fracturis* observanda censemus, quæ deinceps ad Species quasvis earum applicari

cari poterunt. Harum verò singulorum deligationes, deligationumque & Fasciationum modi non tam ex libris, quàm ex ipsâ autopsiâ addisci debent.

FVNGVS est Tumor vel Excrecentia mollis, sensim ac sensim incrementum capiens, ex dilatatione vel laceratione tubulorum membranaceorum, ac inde extravasato succo nutritio plus minus sincero proveniens, & circa articulos ut plurimum imò & in oculis, cerebroque vulneratis, oboriens.

Quoad *Partem affectam*, enascuntur è Pericranio, Periostio, Membranis, aliisque nerveis tunicis, in Capite, Oculis, circa Articulos, & aliis locis.

Visui & Tactui facillè cognoscendus occurrit *Fungus*, cujus substantia non dura, ut in Ganglio aut Scirrho, existit, sed mollis, albicans, digito cedens, nullam tamen impressi digiti foveam relinquens, penè indolens. Primò exiguus existit, sed nunc citius nunc tardius incrementa capiens. Circa genu & molam s. patellam frequens, ipsumque non rarè Genu suo loco movens, & ita ad flexionem, siue contractionem, extensionem, ac ambulationem ineptum reddens.

Generantur Fungi è succo Nutritio, gelatinoso, è membranis laceratis, nimiumque distensis copiosius effluente, qui hinc sensim auctus, atque exhalantibus particulis aquosis condensatus in substantiam carnosam, spongiosam, mollem,

Fungi nomine antiquitus expressam, faceffit. Hinc non infrequenter è Vulneribus aut contusionibus Cranii, Meningum, Articulorum, aliarumque partium membranarum, ni caveamus, emergunt. Pro diversâ autem quantitate aut qualitate extravasati succi etiam Fungus *major minorve* apparet; vel *benignior* aut *malignior* certè evadit. Si succi dulces sunt minusque acres, etiam Tumor *benignus* erit, si verò acres illi fuerint, & corrosivi, tum Fungus erit *malignus*, magis dolens, imò cancrusus, deterior semper redditus, quamprimum applicueris remedium corrosivum.

Quoad *Prognosin*, Fungus benignus, ac indolens, ad plures sæpè ^{Prognosis.} annos sine ulteriore incommodo durare potest. Curatu sanè difficilis, diuturnitate verò temporis, si acrior fuerit redditus succus, in Cancrum, non secus atque Scirrhus, degenerare, vel etiam Tabem insensibiliter post se trahere valet. Qui è Vulneribus recens prodit Fungus, non adeo difficulter & brevi quoque temporis spacio dissipari potest, modò rectè tractetur.

In *Curatione* Fungorum diuturnorum citra Vulnera contingentium ^{Curatio.} internè quidem ante omnia *Purgans* aliquod *mercuriale*, cum *Mercurio* nimirum *dulci*, exhibendum, illudque aliquoties repetendum venit; paratum ex *Mass. Pilul. hydrop. Bont. Extract. panchymag. Croll. Mercurio dulc. Scammonii*, & *Jalappæ resinâ*, aut similibus aliis. Vel *Vinum medicatum*

catum, verno & autumnali præp-
mis tempore concedatur, in hunc ali-
umve modum; v. gr.

℞. Radic. Sarsaparill.

Scrophular.

Scabios. ana ʒiij.

Herb. Numular.

Ceterach.

Pyrol.

Scord. ana Mʒ.

Lign. Santal. citr.

Sassapar. ana ʒʒ.

Semin. Dauc. ʒiʒ.

Fol. Sen. opt. mund. ʒj.

Agar. trochiscat.

Rhab. elect. ana ʒiij.

Cortic. Vinteran.

Salis Card. bened. ana ʒj.

Incis. & contus. d. ad Nodul. ex sin-
don. rubr. cui affund. Vini albi veteris
& Aqu. fontan. ana ℥ij. Postea singu-
lis matutinis Cyathus ʒvj. exhauriatur.

Purgato autem sic corpore intus
quidem paulatim siccantia traumati-
ca, & viscosos humores resolventia
exhibeantur: quemadmodum sunt
Tinctura Mart. aperit. Tinct. ʒnii, Spi-
rit. C. C. essentif. Tinctur. ʒri essentif.
Essent. Lignor. Ireos flor. Chelidon. maj.
Imperator. Cinamom. Piper. Cubeb. Pil.
marin. ustæ, Spongiæ ustæ, Lapidesspongit.
calcinati, Cochleæ ustæ, & pulverisat.
Ocul. ʒ. ppt. ʒn. diaphor. Bezoard. min.

Externè commendamus Therma-
rum ʒearum usum diuturnum, ap-
plicationem Emplastrorum maximè
resolventium, v. gr. de Galbano, de
Ran. Vigon. cum tripl. Mercur. de Ci-
cut. de Succo Nicotian. cum Sale arm-

moniac. Sale Gemmæ; vel Cochleis
unâ cum testis calcinatis & pulverifa-
tis; Emplastrum item è Cicut. Betonic.
Alliar. Menth. Meliss. Pulegio, Gumm.
ammoniaco Spirit. Vin. solut. Camphorâ,
Succ. Solani inspissato, Rad. Bryon.
Aristoloch. Angelic. Scrophular. Impe-
rator. Pimpinell. Jalapp. Hellebor. nigr.
Spongiis combustis, Cinnabar. communi,
cum Pice, Terebinth. atque Cerâ invi-
cem mistis concinnatum, & ita co-
ctum, ne cuti nimis tenaciter adhæ-
rendo ejus poros maximè constri-
gat & obstruat. Si his nihil profe-
ceris, ad extirpationem est acceden-
dum, Ferris chirurgicis, peritaque
manu peragendam, quâ quidem se-
cundum artem debitè accircumspectè
factâ, si quid residui hæret in Vulne-
re materiæ, aut si quæ radix in fundo
lateat, è quâ malum repullulare de-
nuò posset, candente ferro exuratur,
tandemque Vulnus solito more sane-
tur. In hac tamen operatione præ-
ter externam cutim nihil incidendum,
foramen autem amplum faciendum,
ut materia omnis exprimi tanto com-
modius possit. Cavendum per omnia,
ne nervosi tendines quocunque modo
lædantur.

Quòd si autem Fungus è Vulnere
membranarum partium subito, &
vel unius noctis spatio enascatur:
tum eidem statim sicci inspergantur
pulveres ex Rad. Aristoloch. rot. ver.
Irid. florent. Angel. Calam. aromat.
Aron. Garyophyll. aromaticis, Fol. Sa-
bin. Lapid. & Chelis cancrorum com-
bust. Cochleis cum suis testis combustis,
quibus etiam aliquid de Sacch. Sa-

turni

turni vel *Terrâ* ☉ *li dulci*, pro re natâ addere licet. A fortioribus autem Cathæreticis abstinendum, dum ab iis malum valdè irritari solet.

Si *Fungus* tandem est *cancroſus*, intus quidem Cacochymiam ſcorbutico-acrem corrigentibus, velut in Scorbuto docetur, remediis, extus verò non niſi ſectiōe, citò tutoque inſtitutâ, malum extirpabis.

FVROR VTERINVS eſt Delirium ſubinde rabioſum, cum immani Veneris appetitu, à Spirituum animalium per corruptam ſeminalem materiam alteratione & agitatione perverſâ oriundum.

Originem huic animi Morbo præbet frequens titillatio, & irritatio Clitoridis, vicinarumque partium genitalium venerea, à quâ Spiritus animales in talem uſque motum cientur, unde appetitus ad Venerem exercendam ac ſatiandam ferè continuus, iſque cum furore quodam & delirio excitatur. Titillatio verò illa pudendorum contingit à ſero quodam ſpecificè acri, ſive, ut loqui malunt, corrupto ſeminali ſucco, è glandulis vaginalibus, vel etiam cervicis Uteri extillante, & determinato quodam modo fibras Clitoridis vicinarumque partium aſſiduè prope-modum lancinante, ac ad venereorum amplexuum deſiderium potenter ſtimulante. Affectus tamen non niſi Libidinoſasprehendit ſive Virgines ſive Viduas, concubitum venereum anhelantes, ac ſuâ cogitatione frequenter ruminantes. Alii cauſam

Affectûs altius petunt, nimirum ex ſero acido-auſtero ovula teſticulorum corrupente, indeque liquorem ad Sanguinem atque Spiritus animales transmittente, à quo poſtmodum deliræ venereæque cogitationes, æſtu quodam in vitalibus humoribus oborto, excitantur.

Non ſtatim hic cognoscitur Affectus, quia Fœminæ adhuc rationis compotes gravem atque inſolitum, quo excruciantur, æſtum venereum aliis aperire, & confiteri nolunt. Unde omnibus deſtitutæ remediis, malum firmiores quotidie radices agit, trititiam animi, ſuſpiria, melancholiam, inſomnes noctes, faciei pallorem, maciem &c. producit, tandemque ſpiritus ad impetuoſum motum evehendo, delirium & furorem excitat. In quo ſtatu dum miſera exiſtit Fœmella, nullum amplius ratiocinationi locum præbet, inquieta eſt, ſubinde garrula, & libidinoſorum conſortia affectans, non niſi Venerem meditando, venereasque cantilenas amans, legens, canens. Tandem ipſos quoque Viros ad concubitum trahere haud erubeſcit, quo denegato in furorem, ſeu Rabiem atque Maniam, perſito planè rectæ rationis uſu, miſerè delabatur; vel etiam penitus ad deſperationem adigitur, in quâ niſi cuſtodiat, ſibi met haud rarò necem inferre conatur.

In Curatione ad ſpirituum æſtum temperandum ante omnia Venæſectio ordinanda eſt. Poſtea verò ſtatim Vomitorium exhibeatur mediocriter, ex

Pro emetico, vel Radice Ipecacuanhæ,

S s s

Asari,

Diagnos.

Curatio.

Asari, cum *Cremor. Fri*, *Terr. sigillatâ* &c. Vel *Aqu. benedicta Ruland.* aut *Oxyfacchar. emetic.* propinetur. Cujus finitâ operatione sufficiente *Elixir quoddam uterinum*, cum *Essentiâ Castitatis Mynsichti* in usum vocabitur, paratum ex affusione *Spiritus Vini tartarifati* super *Radic. Bistort. Cichor. Scolopendr. Filic. Herb. Rut. Agrimon. Menth. Calaminth. Origan. Semin. Agn. cast. Fœnicul. Carv.* Vel iisdem speciebus affundi *Vinum album bonum*, & post aliquot dies destillari potest. Si ex *Seminibus Agni casti Aneth. Rutæ, Lactuc. Cannab. Hyperic. Carv. Aquileg. Herbis Menth. Melliss. Smaragd. ppt. Terr. sigill. Bol. Armenat. Unicorn. fossil. Arcan. duplicat. Myns. Lapid. prunell. Nitro* $\frac{1}{2}$ iato. *Nuce moschat. Mac.* atque *Saccharo* ad pondus omnium, pulverem conficies, ejusque m. & v. $\frac{3}{4}$ cum *Aqu. Nymph. Lactuc. Portulac. Solani*, exhibeas, sensim levamen sperare poteris. Vel

Rx. Nitr. $\frac{1}{2}$ iat.
Bol. Arm. ppt. ana $\frac{3}{4}$ ss.
Sacch. Saturn. $\frac{3}{4}$ j.
Camphor. gr. xvj.
Ol. still. Rut. gutt. iiij.
Sacchar. alb. $\frac{3}{4}$ ss.

M. f. Pulvis subtil. divid. in 8. dos. aqu. mane ac vesperi capiendas.

Vel *Tinctura antiphtis. Garm.* per plures dies ad *gutt. xij. aut xv. m. ac v.* exhibeatur. Vel etiam *Clyssus* $\frac{1}{2}$ nii, *Spiritus Salis* vel *Nitri dulc. Spiritus aperit. Penoti, Aqu. vel Essent. Castitat. Elixir. Ol. Myns. Tinctura Martis* cum *Aquâ & Cremore*

Fri per decoctionem & filtrationem solam parata, ad 10. pluresque guttulas usurpetur sæpius. Prodest dein quoque *Acidularum, Juleporum, Emulsionum, Succorum acidorum* potus. Hinc *Julepi ex Aquis Portulac. Lactuc. Nymph. cum Syrup. Rub. id. Rib. Berb. Emulsiones ex Seminibus Cannab. Aneth. Aquileg. Lactuc. Citr. 4. frigid. major.* cum iisdem *Aquis* parari & exhiberi possunt. Neque contemnendus venit usus *Balneorum Aquæ frigidæ. Sal essentielle Acetosellæ, Rutæ, cum Unicorn. fossil. & similib.* in pulvere sæpius sumtum pariter conducit. Inter hæc tamen per intervalla *Extracti Hellebor. nigr. grana 8. ad 10. ad corpus leniter expurgandum, cum Vino & Cremore Fri* sumantur. *Externè Lumborum regio* quotidie vel *Oleo Nymphaeæ, Rosar. Lilior. alb. vel Unguento saturnino aut santalino* cum *Camphorâ* illinatur. Vel *Folia Salicis, Nymph. Lactuc. Portulac. Rut. Vitic. Aneth. Menth. Solani* invicem recenter contusa, ac *Aceto* quoque perspersa, regioni *Pubis & Lumborum* frigidè, aut tepidè applicantur.

In *Dietâ* vel *Matrimonium* cum robusto, vegetoque *Homine* concedatur; vel omnes cibi, multum & acre semen flatuosum exhibentes plane vitentur. A *Vini* usu abstinenceatur; *Aromata* fugiantur. *Corpus laboribus* quotidianis fortibus delassetur. *Cucurbitulæ* cum scarificatione singulis mensibus applicentur. *Animus* à rerum venerearum cogitatione abstrahatur.

FVRFVRES, FVRFVRATIO, PORRIGO, est Scabies sicca s. squamosa aut furfuracea Cutis capillatæ capitis, ab excrementitiis salso sulphureis particulis in superficie extimâ cuticulæ coagulatis oriunda.

Afficitur plerunque cutis capillata capitis, quandoque & ipsa facies immunis non est. Adultos æquè ac Juniores, neutros tamen frequenterprehendit. Consistit autem totus Affectus in numerosis squamulis albicantibus, capillatam cutim Capitis inter ipsos crines occupantibus, eamque regentibus; quandoque sine, quandoque cum pruitu molestis. Interdum ultra capillos etiam frontem, faciemque invadit & defædat. Squamulæ nunc majores, nunc minores sunt, nunc copiosiores, nunc pauciores. Decidunt nonnunquam è crinibus per se, copiosius verò, si pectinentur illi. Fœminis quàm Viris familiariores Furfures, quoniam illæ capillos suos quotidie haud pectinant. Nonnullis etiam Viris haud infrequentes, qui videlicet, quòd capillamenta portant, capillatam Capitis cutim negligenter extergunt, licèt facilè ac multum sudent.

Producuntur autem furfuraceæ illæ Squamulæ à particulis salino-acidis sulphureis lentis per poros capillatæ cutis Capitis transudantibus, & circa radices pilorum statim inspissatis. Hinc qui capillos negligenter curant, sordesque capitis non quotidie pectinis ope auferunt, facilè tales Furfures colligunt; proveniunt autem illæ particulæ è massâ humorum ad

glandulas subcutaneas circulante; in superficie dein Cutis subsistunt facilè, propter sui aliqualem lentorem; inspissantur etiam, & in formâ albicantium crustularum condensantur, dum plurimæ particulæ aquosæ ob suam volatilitatem unâ cum subtilissimis alcalinis liberam citò petunt auram, atque crassiores saponiformes post se relinquunt.

Affectus exigui est momenti, ^{Prognosis.} dum præter defædationem nec periculum, nec alium ferè morbum portendit: potest tamen, si prorsus negligatur, ipsaque Squamularum salia acriora reddantur, in fœdam Capitis exulcerationem & Scabiem, vel Achores mutari, tantoque id magis, si in victûs ratione multum peccetur, ac inde sanguis cacochymicus, acidosalino-acris cumuletur.

In *Curatione* intus *purgans* ali- ^{Curatio} quod, per inferiora sufficienter evacuans, in principio statim ad causam antecedentem minuendam est præscribendum, v. gr. ex *Tabulis diacartham. Aniso laxativ. Passulis laxat. Extr. catholic. &c. paratum. Postmodum* externè statim *mundificantia* in usum trahenda, in quem finem conducit *Lixivium* qualecunque, vel etiam *Vinum*, cui *Apium, Nicotiana, Chelidonium majus, Scillæ radix, Beta recens, Cochlearia, Nasturtium, Gratiola, Salvia, Lupinorum grana, Centaur. min. Semin. Sinapi, Bacc. Juniperi* incocta sint. Aliis pro lotionem placet *Urina*, vel *Aqua* etiam *muratica*. Willisius *Oleum Fri per deliquium Oleo Nucum anaticâ* dosi permiscet,

miscet, atque sæpè illinit affectis locis. Prodest & *Decoctum Saponariæ, Persicariæ, Agrimonie, Parietariæ, Radic. Cucum. asinin. &c.* post ablu-tionem verò vel *Unguentum medica-mentosum Mynsicht.* vel *Oleum* supe-rius inungi potest. Vel *Furfures tri-ticei*, aut *siliginei* nonnihil calefacti **Capiti** affricantur, sicque squamulæ una cum *Furfuribus* postea decident, & pectinando auferentur. Laudant alii inunctionem *Olei Amygd. amarar.* *Olei* item *balanini, sesamini &c.* Do-læus suadet *Liquorem ex Sale Tri & Myrrhâ* in cellâ liquefactum, quo pars furfuracea illinatur, ac dein *decocto Lupinorum cum urinâ* parato ablua-tur. *Spiritus Reginae Hungariæ, Spi-rit. Melissæ, Vini rectificatus & Trisa-tus* quoque *Furfures* auferre possunt. Tandem internè simul sanguinem depurantia in usum vocentur reme-dia, quemadmodum sunt blanda diaphoretica, ac præcipitantia: v. gr. *Ebur ppt. ʒ n. diaph. Bezoard. miner. Pulv. Viperar. ppt. Tinctura ʒ nii tar-tarifata: Essentia Fumar. Lignor. A-quilegiæ, Betonica.*

Furunculus.

FVRVNCVLVS, DOTHIEŒ, Δοθιν, est Tumor plerunque inflam-matorius, ovi columbini magnitudi-nem vix excedens, in hâc vel illâ cor-poris parte cutaneâ à lymphæ san-guinisve extravasatione ac stagnatio-ne oriundus, tandemque, nisi discu-tiatur, in Abscessum & Ulcus ter-minans.

Diagno-

Promiscuè varias affligit **Cutis** partes, imprimis autem **Glandulas**

ejus, è quibus propullulare solet. Magnitudinem ovi columbini rarò excedit; rubicundus, & ardente, acuto, pungente, aut pulsante admo-dum dolore instar Inflammationum molestus est. Pueros, quandoque & Adultos intemperato, sordidoque victu gaudentesprehendit. Rarius discutitur, sed plerunque suppuratur, inque Abscessum, & Ulcus conver-titur. Si materia stagnans fuerit acrior, simul Febrim accendit conti-nuam, non rarò malignam; inter-dum tamen Febreos ephemeræ crisis existit. Reperiuntur etiam, qui plu-ribus simul Furunculis infestantur, vel qui Scabiem quoque conjunctam habent. Qui Variolis laborârunt, neque perfectè ab illis purgati fue-runt Infantes, ejusmodi Tubercula quoque plura vel pauciora subinde adquireunt. Observavimus & nos haud paucos, qui salso-pituitosâ in-temperie laborantes, post usum Bal-neorum sive domesticorum, sive mi-neralium, in ephemerâs inciderunt Febres, & nunc Scabiem, nunc Fu-runculos simul contraxerunt. Hæ-rent autem aliquando talia Tubercula in extimâ cute, interdum verò pro-fundius descendunt ad ipsam muscu-lorum substantiam. Contagiosis quoque temporibus, vel ubi sangui-nis massa corrosivis scatet particulis, malignitate non carent.

Causa ejusmodi Tuberculorum *caus* proxima est humor sanguineo-pitui-tosus, salibus acido-viscosis plus mi-nus inquinatus, atque in tubulis Glandularum cutanearum his illisve sta-gnans,

gnans, vascula distendens, sicque circulationem sanguinis eo loci impediendo Inflammationem produciens. Stagnans dein humor, si nimium expansi rumpuntur tubuli, confluit, atque per intestinum quendam sive fermentationis, sive putrefactionis motum in pus mutatur, Abscessumque format, mox sui apertione in Ulcus abeuntem. *Antecedenter* occasio huic morbo nascitur à circulante Massâ humoralis, quando in hac, propter advenientem chylum minus perfecte elaboratum, falsoque-pituitosum, plures particulæ fals-acidæ, fixiores, atque vicissim pauciores alcalino-volatiles fuerunt collectæ; unde in sero Sanguinis facile quædam crassities & viscositas tandem producitur, quæ datâ postliminiò ansâ constrictionis alicujus, in his illisve magis dispositis cutanearum glandularum tubulis Sanguini transfluenti obicem ponit, atque superiùs dictam accumulati humoris stagnationem efficit. Quod si autem Sanguinis vitium majus foret, tum etiam, loco Furunculi unius vel alterius, magni Bubones & Abscessus producerentur. *Benignus* est Furunculus, si materia stagnans magis dulcis & chylosa existit: *Malignus* verò, si salibus acido-acribus, plus minus volatilibus & corrosivis imprægnata fuit.

Quòd *Prognosis* concernit, nisi malignitas subsit, periculo omni ista Tubercula vacant; licet aliàs plerunque tardius suppurentur, neque facile in Gangrænam aut Sphacelum abeant, modò scitè tractentur. Si

impura admodum sit apud Ægrum humoralis Massa, tum vel plures simul efflorescunt Furunculi, vel uno curato, in alio mox loco novus emergit; unde Pueri non rarò ad Maciem disponuntur.

Curatio proin modò brevis modò diuturna est, & ultra mensem protrahitur, pro diversâ nimirum circulantium humorum dispositione & crasi. Attamen heic statim attendendum, utrum Febris aliqua præsens sit, vel absit? Etenim prægressâ aut præsentē adhuc Febri alvus quotidie vel naturâ, vel arte laxa esse debet; internè verò *blandorum diaphoreticorum*, & si opus fuerit, *alexipharmacorum* medicaminum usui est insistendum. Si absit Febris, *mediocre purgans* ante omnia, nisi insignis Furunculi inflammatio impedimento sit, exhibere oportet. Postea verò nihilominus internè quidem unum vel alterum diaphoreticum dabis, ex *§ n. diaph. Bezoard. min. C. C. phil. ppt. Ebor. ppt. Bez. ard. mart. & simil. cum Electuar. diascord. vel Roob Sambuc. Juniper. & Aqu. Fumar. Ulmar. Card. bened. Cheref. Scabios. Agrimonia, permistis. Externè verò in omni Furunculo primum discutientia ac resolventia, his verò nil operantibus maturantia sive Emplastra, sive Cataplasmata sunt adhibenda; quæ inter nobis hætenus satisfecerunt modò Empl. Norimberg. Gruberianum, Diach. cum Gumis, de Mucilaginibus, Gumm. ammoniac. Aceto solutum, & Emplastrum formâ impositum; modò Cataplasmata ex Melle, Succo Ceparum,*

vel *Chelidonia*, ac *Farinâ secalinâ*. Vel ex *Semin. Lini*, *Micâ panis*, *Herb. Malv. Parietar. Alth. Chamomill. Flor. Sambuc. Verbasc. Melilot. Malv. hortens. Ficub. Camphorâ*, *Croco &c.* in *Lactē decoctis* parata. Si suppuratus inde est *Furunculus*, apertusq; sponte aut arte, tum *digestivo* vel *simplici & communi*, vel *composito Hildani* cum turundis diligenter immisso, subinde & *injectione* cum *Urinâ* aut *Decocto Gratiolæ, Pyrolæ, Virgæ aur. Hyperici, Centaurii minoris*, si opus videbitur, factâ, atque imposito simul semper *Emplastro Diapalma*, vel *Opoteldoch* persanatur. Consule quoque de his *Titulum de Abscessu*.

GALLICA LVES, vid. *Lues venerea*.

Gan-
gion.

GANGLION, NODVS, Germanis *Überbein* est Tumor plus minus renitens, durus atque indolens, cuti concolor, à tubulorum tendinosorum expansione atque induratione post laborem imprimis, aut usum vehementem, in manibus pedibusque obveniēns. Vel etiam aliquando nihil aliud est, quàm insignioris ductus aquosi, involucri nervorum aut tendinum larga distensio, ab externâ contusione, aut nisu oriunda, in quâ tanquam in cystide *Lympha* ubertim congeritur, incrassatur, induratur, & subinde in tantam molem excrescit, ut ratione suæ geneleos pro *Aneurismate* vasorum *Lymphaticorum* possit.

Locus
affectus.

Ex quibus nunc patet, Affectum

hunc circa *Articulos* magis, quàm alibi progigni, imò ipsos tendinum tubulos, aut involucra, non secus atque vasa *lymphatica* occupare. Sed insimul clarum est, falsò à *Veteribus*, ipsoque *Dolao* perhibitum esse, *Ganglion* à contorsione & induratione tendinum provenire, cùm tale quid citra magnum dolorem, aut citra *Paralysin*, qualis in *Ganglio* verò nunquam observatur, contingere nequeat.

Cognoscitur autem hic Morbus ex tumore duro, indolente, (nisi quod inter laborandum tendines premendo lassitudinem membri gravativam producat) cuti concolore, tendinibus articulorum præcipuè inhærente; primùm quidem majoris pisi magnitudinem non admodum excedente, sed postea sensim adaucto, ita ut magnam sæpè molem exæquâsse visus sit: Tunc autem Tumor non solum durus & renitens, sed & inæqualis existit. Ad latera dein magis, quàm ad anteriora aut posteriora sub Cute mobilis est, quo quidem signo non secus ac sui duritie à *Meliceride*, *Fungo*, atque *Atheromate* facile dignoscitur. Cui adde, quòd *Fungi* etiam profundius lateant, atque ob latiorē basin in nullam ferè partem moveri commodè possint.

Producitur ferè *Ganglion* à *Causâ* aliquâ externâ violentâ; v. gr. ictu, casu, nisu tendinum vehementi, membrorum distensione, atque intorsione validâ, à motibus spasmodicis, sive convulsionibus; à pandiculatione, incisione, atque similibus; unde *Lympha* quædam pitui-

tave

tave dulcis, vel sub involucro tendinum, vel in tubulo quodam lymphatico obhærere, cumulari, inspifari, sicque Tuberculum ejusmodi durum excitare queat. Quin etiam eadem causa morbifica frequenter extravasari, iisdem in locis potest, & cum de succo cartilaginum vel ossium nutritio multum participet, tanto magis condensari, ac indurari, propriaque simul cystide includi valet.

In Curatione unicè ad indicationem curatoriam, quæ Tumoris est extirpatio diversimodè instituenda, attendere oportet.

Recentia proin Ganglia, in quibus materia nondum est indurata, sæpe per attenuantia, incidentia, atque resolventia protinus discutiuntur: in quem finem imponuntur *Lamina plumbea*, *Hydrargyro illita*: aut *Emplastra de Ranis Vigonis*, vel de *Cicutâ*, *Nicotianâve* cum triplo *Mercurii*: qualia *Emplastra* quoque *Oleis stillatitiis* è *Lateribus*, *Sapone*, *Cerâ*, *Ligno heraclio*, *Ligno sancto*, *Fungis*, aut *Spongiâ* paratis exaltari simul possunt. Nonnunquam evanescent, si validâ compressione cystis rumpatur, sed tum radice nondum oblitteratâ brevi nova incrementa sumit. Sequens etiam *Fotus* maximè utilis est:

℞. *Lixiv. Sarmentor. part. iiij.*

Aceti opt. part. j.

℥n. *crud. Alumin.*

Tutiæ, Ærug.

Lign. Sassaphr. ana q. sufficere putabis.

Coque invicem probè, atq; lintea postmodum huic liquori calefacto im-

mersa ter vel quater quotidie applica, usq; ad Tumoris discussionem.

Majora verò Ganglia, quæ discuti nequeunt, omnium optimè excinduntur; nimirum Cutis ad panniculum carnosum usque cruciatim inciditur, hinc elevato panniculo modò dicto, vel integra cystis Ganglii evellitur; vel filum circa radicem Ganglii trajicitur, quo totus postea Tumor constringitur, atque refecatur, radicem *Butyro* & *nii*, vel *Lapide infernali* tangendo. Vel tandem abscinditur, quantum commodè potest, & materia hinc omnis evacuatur, relictumque Vulnus aut Ulcus *Unguento Ægyptiaco*, *Tutiâ*, *Mercur. præcipitato*, cum *Digestivo* ordinario permixtis sanetur.

Quòd si autem de Articulorum v.g. Genuum, Cubitorum, horumque Tendinum vicinitate ita certus sis, ut sine eorundem manifestâ læsione excisio Ganglii fieri nequeat, tum à sectione protinus abstinebis, & sola resolventia atque discutientia, contra Fungos suo loco commendata, usurpabis; in quem finem quoque sequens valdè resolvens, & discutiens convenit *Emplastrum*.

℞. *Colophon. ℥iij.*

Ceræ nov.

Picis naval. ana ℥ij.

Terebinth. ℥j.

Gumm. Tacamahac. 3vj.

Elem. ℥ß.

Oliban.

Mastich. ana ℥ij.

Bol. armen. ppt.

Spongiar. ust. ppt.

Cochlear.

Cochlear. cum test. calcinat. & ppt. ana ʒß.

Flor. Balauſt. ʒiß.

Lumbr. terr. ppt. ʒij.

M. f. s. a. Emplaſtrum Oleo philoſoph. vel Lumbr. terreſtr. malaxand. Cui quoque ſi opus videbitur, Mercurius vivus ſubigi poteſt. Hoc autem Emplaſtrum alutæ ſuperinductum imponatur, impositumque per oſtidium relinquatur, donec novum applicetur: ſicque continuandum eſt, uſque dum Tumor ſubſideat. & evaneſcat. In diminutione Tumoris Emplaſtrum diachalciteos, vel Diaſulphuris Rulandi, vel de Sapone Tackenii, cui Mercurius quoque vivus, ac Oleum quoddam ſtillatitium addetur, eſt admiscendum. Attamen ante Emplaſtri cujuſcunque impoſitionem pars affecta inungi poterit Oleo C. C. rectificato, vel Oleo deſtillato Succini, Ligni heraclini, Baccarum Lauri aut Juniperi, vel Scorpion. Matthiol. Aut præmitti per plures dies debet Fomentum ex Vino, cui incoctæ fuerunt Radices Ariſtol. rot. Scrophular. Gentian. Herb. Abſynth. Abroton. Solan. Tabac. Artemiſ. Sabina, Meliſſ. Mentb. Bacc. Laur. Juniper. Semina carminativa.

Gangræna.

GANGRÆNA eſt partium corporis mollium inflammatio & incipiens corruptio cum livore, dolore ſummè ardente & pungente Hominem affligens, à ſanguine ſtagnante aciore, circulationem humorum etiam in vicinis quibuſcunque tubulis impediēte, oriunda.

Cauſa.

Cauſa proxima eſt ſanguinis lym-

phæque acrioris acido-corroſivæ ſtagnatio, atque maxima efferveſcentia in capillaribus quamplurimis mollium partium tubulis contingens; quæ ſi diu ſtagnet ac ſubſiſtat, ſimul non ſolum humorum per vaſa circulationem, ſed & ſpirituum animalium per nervos vel diſciſſos, vel nimis conſtrictos aut compreſſos influxum impedit, ſicque mortificationem aut Sphacelum tandem integrè producit. *Antecedens* verò cauſa eſt vel humor aliquis corroſivus, acido-auſtero-acris, tubulos & fibrillas vaſculorum, in ſpaſticas conſtrictiones, varicesque cogens, unde facile poſtmodum circulaſtio præpeditur, humoresque ſtagnant. Vel etiam eſt res aliqua externa comprimens, incidens, contundens, aut porrò frigus intenſum congelans; quoniam hæc omnia & humorum & ſpirituum influxum hebetare, impedire, atque hinc ſtagnationem inducere valent. Sic enim nihil novi eſt, à fortiore v.g. pedis fracti luxative ligaturâ Gangrænam membro induci. Nil novi quoque, hominibus per nives atque intenſum frigus diu proficiſcentibus, extremas ita congelari partes, ut vel ſtatim ſine præcedaneâ Gangrænâ ſphacelatæ emoriantur ac decidunt, vel quando poſt intenſum frigus illæ ſtatim igni admoventur, Gangrænam prius, quàm mortificentur, acquirant, inductâ in congelatum tubulorum humorem ſubitaneâ efferveſcentiâ, circulationem ſimul impediēte.

Diagnofis ſic habet. In principio Gangrænæ Inflammatio partis adest cum

cum ardentissimo dolore, intensissimo purpureo rubore, atque majore minoreve tumore. In augmento mali dolor ferè igneus redditur, rubor partis in livorem aut cœruleo-nigricantem colorem mutatur, vel etiam hinc maculæ lividæ, illinc verò non rarò pustulæ & vesiculæ efflorescunt, & in gangrænata parte comparent. Tandem si adhuc deterior reddatur Affectus, ac in Sphacelum abeat, pars nigrescere, dolorque omnis evanescere incipit. Neque verò solùm partes corporis externæ tali Morbo affliguntur, sed ei etiam obnoxia sunt partes internæ; ita enim in Phrenitide quidem Meninges, in Febribus malignis autem, Variolis, & similibus, non rarò Pulmones, Hepar, Lien, Intestina, Mesenterium, Pancreas, Omentum &c. gangrænantur atque siderantur, quod ipsa sæpius Anatome & exenteratio cadaverum nòs docuit.

Quòd *Prognosis* spectat, Affectus si internas in variis morbis occupat partes, non nisi ardore quodam percepto interno cognoscendas, plerunque funestus est, aut certè difficulter admodum curatur. Non nihil facilius autem sanatur, si externam quandam, eamque non ita magnam partem occupavit, neque diu adhuc duravit. Sed si intra primum vel secundum diem debita remedia non fuerunt adhibita, tum in Sphacelum Gangræna talis incurabilem transit. Quando igitur membrum incipit nigrescere, omni que sensu doloreque privari, signum est incipientis jam

mortificationis moxque secuturi perfecti Sphaceli.

In *Curatione* attendendum probè, *Curatio.* an ab internâ vel externâ causâ Affectus originem duxerit? Etenim qui ab internâ profectus est causâ, *internè* quidem ea requirit, quæ sudorem movendo sanguini debitam fluiditatem ac volatilitatem restituere, spasticas particulas obtundere, sicque motum circulantem humorum restituere valent. Atque in hunc finem *antifebrilia diaphoretica*, præprimis *gnata*, conveniunt *remedia*, quæ cum *Aquis destillatis*, ac *Diascordio Fracastorii*, aut *Mithridatio Damocratis*, *Roob Sambuci*, vel *Juniper.* exhiberi poterunt.

Externè autem locum habent *Fomenta spiritiosa*, tubulos constrictos relaxantia, poros cutaneos aperientia, & subtili, pernicipique particularum suarum motu vel calore viscidum quodvis resolventia; qualia sunt *Spiritus Vini camphoratus*, *Essentiâ Croci* pro lubitu simul tinctus, vel cum *Essentiâ Myrrhæ*, *Aloës*, *Absynth.* &c. permixtus. *Ros mineralis*, *Decoctum Scordii*, *Meliss.* *Salvia*, *Serpilli*, *Majoran.* *Menth.* *Betonica*, aliarumque plantarum aromaticarum, cum *Myrrhâ*, *Aloë*, *Absynth.* *Camphor.* &c. in *Vino* paratum. *Decoct.* *Scordii*, *Fumar.* *Card. bened.* *Scabios.* &c. cum *Aquâ muriaticâ*, vel etiam *Vino* factum. *Stercus vaccinum*, *caballinum*, vel etiam *humanum Cataplasmat*is instar impositum. Vel

R. Radic. *Aristol. rot.*
Imperator.

T t t

Vale-

Valerian.
Petasitid. ana ʒß.
Herb. Absynth.
Meliss.
Scord. ana Miß.
Flor. Calendul.
Chamom.
Melilot.
Baccarum Junip. ana Mß.
Semin. Lupinor. ʒß.
Myrrh. elect. ʒij.
Camph. ʒiß.

Incisa & contusa coque in Vini albi veteris q. s. in vase duplici, colatura hinc calida linteis excepta applicetur. Vel ʔ. Aqu. Calc. viv.

Spirit. Vin. camph. ana tßß.
M. & calidè applica, frequentissime repetendo.

Vel Spiritus matricalis Blancardi in hunc finem solus adhiberi potest, aut aliis etiam permisceri. Vel

ʔ. Aquæ Calcis viv. cum Liquore solutionis Mercurii sublimati in croceum colorem tinctæ tßj.

Adde pro lubitu

Spiritus Vini camphor. ʒiij.

M. d. ad Vitr. & usurpetur frequentissime applicando.

Prodest & Cataplasma factum è Scordio, Card. bened. Salviâ, Melissâ, Roremarino, Flor. Chamomill. Melilot. Radic. Aristol. Imperator. Angelic. Fim. equin. &c in pulverem redactis, & cum Vino coctis, hinc linteo crasse inductis, insuperque, antequam calidè applicentur, Spir. Vini camphorato, vel Spiritu matricali conspersis. Rustici laudant Cataplasma è Pomis dulcibus

putridis, cum Vino. Ita quoque Th. Bartholinus solam Aquam marinam pro fomento calido commendat: Ettmüllerus autem seqq laudat:

ʔ. Radic. Imperator.

Valerian.

Angelic, ana ʒj.

Herb. Scord.

Salv.

Absynth.

Flor. Sambuc.

Chamom.

Bacc. Juniper. ana Mj.

Myrrh. Camph. ana ʒij.

Incis. & contus. coque in Vini albi veteris Mensuris duabus, in vase probe clauso, hinc cola & utere pro Fomento. Sunt qui è Cancris fluviatilibus, Ranis, Lumbricis terrestribus, Cochleis vivis, cum Herbis Alliariæ, Agrimon. Geran. rob. Brunell. Solani, Sempervivi, Meliss. Scordii &c. contusis, atque cum tantillo Vini coctis Cataplasmata componunt & applicant.

Quod si Gangræna jam ad Sphacelum tendat, imò cutaneæ portiones jam sphacelatæ existant, tum scarificatio partis profunda est adhibenda, ad sanguinis usque missionem, & dein Cataplasmata jam memorata in usum trahenda, usque dum fide-ratæ portiones abscesserint, vel rescindi potuerint, & nova hinc cutis regenerari inceperit.

Si Gangræna à Frigore nimio originem traxerit, prius fricanda est pars Nive, aut Aquâ gelidâ, hinc demum inungenda sequenti Ungu.

ʔ. Axung. cervin. ʒj.

Olei Amygd. amar. ʒiij.

Spirit.

Spirit. Vin. camph. 3ij.

M. ad Ollam.

Tandem & superiora quoque remedia applicari poterunt.

In Gangrænâ à causâ externâ, v.g. Ictu aut Morsu animalium, Contusione &c. tum Scarificatio, & quidem cultellis profundè adactis, prodest, cum sanguinis probâ extrusione: postea Fomentum aliquod superius in usum vocetur.

Victus ratio instituaturs tenuis, sicut in Febribus: à Vino & Acidis abstinenceatur: frigida aura nusquam ad partem admittatur.

GARGAREONIS, *Gurgulionis*, *Uvulae*, vel *Columellae* Inflammatio est ejusdem Partis tumor, cum rubore, ardore, deglutiendi difficultate, & dysorexiâ conjunctus.

Pars affecta est Caruncula illa glandulosa coloris rubentis, figuræ oblongæ, supra rimam Laryngis, inter duas Amygdalas Palati propendens, vocis tono & articulationi formandæ, non secus atque exhibendo alicui muco pro lubricanda contignatione Palati dicata.

Producitur non nisi instar aliarum Inflammationum, à Lymphâ acido acri in glandulosâ substantiâ Uvulae stagnante, simulque sanguiferos capillares rubulos ita constringente, ut hinc circulatio sanguinis impediatur, ipsaque pars à cumulato magis, stagnanteque humore præternaturaliter tumeat, rubeat, ardeat, atque difficultatem in deglutiendo pariat; quoniam sub hac actione non potest non

ipsa Uvula inflammata dolorosè commoveri. Occasionem huic malo antecederet & remotè præbent salia acido-rigida vel austera circulantem massam subingressa, & ita specificè inviscantia, ut per tubulos Columellæ transire nequeant, sed inibi faciliè obhæreant, causamque proximam excitenti tanto id magis, quando simul Aër externus vel nimis æstuans per inspirationem ad Uvulam appellens, nimis siccare, vel frigidus admodum ejus fibrillas crispare, aut constringere potuit. Salia verò illa austera sanguini communicantur à potu Vinorum sive austerorum, sive etiam generosorum largo; ab haustu Spiritûs Vini, Ceras. nigror. aut Liqueoris similis spirituofo-sulphurei excessivo; ab esu multo Fructuum horæorum, Casei, Ciborumque nimis salitorum, vel etiam fumo induratorum. Jungitur subinde Febri-cula, dum aliqualis per totam Massam sanguineam turbatio simul contingit: vel certè Febreos alicujus continuæ symptoma, imò subinde Crisis esse solet.

Affectus faciliè cognoscitur ex tumore, rubore, imò & ardore partis afflictae; ubi tamen simul contingit difficultas deglutiendi, licet ob Uvulae tumorem frequenter ad deglutendum stimulentur. Præterea subinde Oculi lachrymas invitas emittunt; inspecta verò Columella instar baccæ uvæ rotundæ atque rubentis deprehendetur. Interdum simul Febris continua, vel præcessit, vel conjungitur, cum vel sine dolore Capitis,

siti aliquâ, dysorexiâ, & lassitudine membrorum. Nonnulli homines obesi propter angustiam tubulorum Uvulæ huic malo præ aliis sunt obnoxii, ut vel levi occasione eodem prehendantur.

Prognosis.

Quoad Prognosin, Inflammatio hæc periculo vacat, nisi alius in corpore Affectus periculosus simul existat. Potest tamen, si causa sit corrosiva, in Abscessum & Ulcus mutari tædiosum, nec ita citò curabile; imò si venerei quid subsit, non rarò planè consumi & auferri solet, cum subsequente postliminiò Vocis raucedine quadam, & locutione, uti vulgus ait, per nares.

Curatio.

In Curatione ante omnia, si alvus segnior fuerit, *Clyisma emolliens* & *detergens* injiciatur: hinc statim *Venæsectio* in alterutro brachio instituatur, postea quoque, si opus videbitur, raninæ sub Linguâ Venæ incidantur; ac demum *Gargarismate discutiente* malum abigatur. In quem finem aliqui gargarizant cum solo *Lacte*, *Aqu. Hordei mucilaginosâ*, aut *decocto Raparum* diluto. Alii verò sequens usurpant:

℞. *Herb. Brunell. Scord. ana Mj.*
Plantag. Scabiosf.
Flor. Malv. hortensf. ana Mß.
Cancror. fluvial. rec. contus.
no. iiij.

Incis. & mixta invicem coqu. in s. q.
Aqu. fontan. Colatur. ℥ij. adde
Roob dianuc. ℥iß.
Nitr. purif. 3j. vel
Roob Moror. 3j.

M. ad Vit. & calidè sæpius blandeq;
non fortiter nimis palatum gargarisetur.

Alii solam *Brunell. Aquam cum Succo Sempervi. Cancror. fluvial. Mucilag. Sem. Psyll. aut Cydon. & tantillo Aceti vel rosacei, vel Rubi idæi &c.* permiscent, & sic gargarisationem instituunt.

Quod si Uvula fuerit excoriata, tum *Nitrum & Acetum* in Gargarismate est omittendum, ejusque loco *Mellis rosacei 3j.* adjicienda.

Vel potest *Aqu. Fl. Ligustr. Brunell. Succis. Fumar. Ulmar. Levistici &c.* cum *Melle rosac. Roob dianuc. Mucilag. Semin. cydon. Aqu. Plantag. fact. Spirit. Vini Camphorat.* permisceri, & sic pro Gargarismate usurpari. Post singulas verò gargarisationes, & aliàs sæpius aliquid de seqq. *Eclegmate* lambatur:

℞. *Syrup. Violar. purpur. ℥iß.*

Granat. acid. 3j.

Mucilag. semin. Cydon. Aqu. Ros. fact. 3ij.

Aqu. Brunell. 3j.

℥n. diaph. 3j.

M. d. ad Ollam.

Mane ac vespere quoque *Mixtura* quædam *diaphoretica* exhibeatur, v. gr.

℞. *Aqu. Agrimon.*

Plantag.

Scabiosf. ana 3j.

Syrup. Gran. acid. 3ß.

Bezoard. min.

Ocul. ̄. ppt.

Terr. sigill. ana 3ß.

M. f. Potio, d. ad Vit. pro dosi quotidie bis repetendâ.

Vel

Vel R̄. *Aqu. Brunell.* ʒiʒ.

Succis.

Ulmar. ana ʒvj.

Syrup. Rub. id. ʒʒ.

Roob Sambuc. ʒj.

ʒ nii *diaph.* ʒj.

C. C. phil. ppt.

Ebor. ppt. ana ʒʒ.

M. f. Potio d ad Vit. pro dosi.

Vel saltem ipsi *Pulveres diaphoretici m. ac v.* cum haustu *Aquæ* aliqujus *diaphoreticæ* capiantur : v. gr.

R̄. *Dent. Apr. ppt.*

Corall. alb. ppt.

Ebor. f. ign. ppt.

Mag. ʒ n. diaph. ana ʒij.

Nitr. ʒ iat. ʒj.

M. f. Pulv. subt. div. in 6. dos. æqu.

Extus subinde collum antèrius *Oleo*

Chamomill. Amygd. amar. Violar. Verbasc. Hyperic. Melilot. hortensis, aut simili illinatur, desuperque vel *Emplastrum de Meliloto* aut *Baccis Lauri,* vel *Lana nigra succida* recens abscissa applicetur.

Quòd si verò *Inflammati*o ad *suppurationem* vergat, tum *Lacte tepido* tantillum *saccharato* frequenter gargarisandum est, vel *Lacti* etiam prius incoqui possunt *Malva, Althæa, Chamomilla, Ficus, Jujubæ, Crocus, Melissa, Parietaria, Rad. Lil. alb. &c.* Atque sic brevi vel sponte *suppuratus* rumperetur *Tumor,* vel inflicta cautè lanceolâ apertus purulentam frigidiss. materiam fundet. *Ulcus* autem sic factum *Gargarismate* ex *Melle rosaceo, Roob dianucum, Mucilagin. Gumm. Tragacanth. aut Cydonior. Aqu. Ros. fact.* cum permistione *Tutiae ppt. Cre-*

tæ rubræ, seu Rubricæ fabrilis, ʒ n. diaph. &c. persanabitur; additamen etiam in casu necessitatis potest *Essentia Lignorum,* vel *Myrrh. & Aloës.*

Aliquando autem talia *Ulcer*a *venerea, fæda ac sordida* existunt, quæ proin non nisi admotione *Aqu. viridis Plateri,* vel *Hartmanni,* ac postea *Gargarismate* cum *Essentiâ Lignorum & Myrrhæ* extergentur & consolidantur: intus non negligendo *Decoctum Lignorum* siccans, aliaque humorum acrimoniam scorbuticam & veneream absorbentia, & edulcorantia, prout in curatione *Luis venereæ & Scorbuti* recensentur.

In *Diætâ* vitanda sunt omnia acida, & aromatica, profunt verò *Juscula carnea, hordeacea, avenacea, &c.* Pro potu ordinario cedat loco *Vini decoctum Agrimon. Scabios. Brunell. radic. Gramin. Acetos. Hordei,* bibatur verò hoc per canalem fistulosum *Levistici.*

GARGAREONIS RELAXATIO est molesta quidem, sed indolens tamen *Uvulæ* intumescencia atque elongatio, cum deglutiendi difficultate, & loquelæ offensione, facta à *Lymphæ viscosæ & pituitosæ* cumulatione.

Gargareonis relaxatio,

Producitur nimirum à *Lymphâ* *causa.* justo viscosiore & tenaciore, è glandulis affectæ partis quidem secretâ, sed tamen propter viscositatem in spongiosâ ejusdem substantiâ obhærente, sicque magnitudinem elongante. Occasionem hinc præbent isti malo partim serum sanguinis vi-

scosius & pituitosius, à chylo similem qualitatem per diætæ errores varios adeptæ, redditum : partim etiam ipsum frigus aëris externi excretorios Uvulæ porulos constringens; imprimis si simul Verticem capitis affecerit, ac transpirationem ibidem insensibilem sufflaminarit, unde regurgitantes halitus serum statim sanguineum incrassant, sicque modò ad hanc modò ad illam Capitis partem defluxiones pariunt, serosorumque humorum stagnationes producunt.

*Diagnos-
is.*

Quoad *Diagnosin*, haud difficulter ab Inflammatione dignoscitur: dum in Relaxatione Uvula justo longius in palato pendula ferè translucens, albicansque apparet, pituitâ glutinosâ, interdum in basin Linguae destillante, undique circumcincta, citra tamen ullum ardorem vel notabilem dolorem, aut ruborem. Æger interea continuè propemodum ad muci exscreationem stimuletur, vel etiam ad deglutiendum sollicitatur, dum tumida Uvula, instar alicujus boli in faucibus hærens, aut Linguae basin lambens, fibrillas musculorum pharyngæorum jugiter, atque molestè titillat. Nulla dein Febris, imò paucissima vel nulla alia symptomata Ægrum simul afficiunt.

*Prognos-
is.*

Quoad *Prognosin* Affectus hic omni periculo vacat: solet tamen, si Uvula nimium irriteretur, non rarò simul Inflammationem cum suis symptomatibus post se trahere. Si Corpus cacochymicum est, non ita facile citòve curatur; quin interdum in Ulcus cacoetheum mutatur.

In Curatione primùm statim *Pilulas mercuriales*, ex *Extract. Cath. Mass. pilul. è Succ. Craton. &c.* cum *Mercur. dulc.* & aliquot granis *Cre-moris Fri*, exhibebis, si merè pituitosa sit Uvulæ intumescencia, citra Febris præsentiam: postmodum verò sequens *Gargarisma* adstringens usurpetur:

Rx. Rad. Ir. florent.

Aristol. rot. ver.

Vincetox. ana ʒiʒ.

Herb. Majoran. Mj.

Calaminth.

Ocym.

Salv. ana Mʒ.

Flor. Sambuc. Pij.

Bacc. Laur. ʒij.

Semin. Levist. ʒiʒ.

Nasturt. ʒʒ.

Incis. & contus. coqu. in f. q. Aqu.

Fl. Sambuc. Colaturæ adde

Spirit. Vin. camph. vel

Aqu. theriac. simpl. ʒʒ.

Spirit. Sal. arm. ʒij.

Roob Sambuc. vel

Oxymel. squill. ʒj.

Misc. d. ad Vitr.

Vel Rx. Radic. Pentaphyll. ʒʒ.

Flor. Rosar. rubr.

Balaust. ana Mʒ.

Semin. Acetos. ʒj.

Piperis ʒij.

Incis. & contus. coqu. in

Aqu. fontan. ʒʒj.

Ad quart. part. consumptionem, Colaturæ adde

Syrup. Plantag. ʒj.

M. f. Gargarisma, quo sæpius calidè conspergatur vel eluatur Uvula. Postea statim

statim tangatur spatulâ plenâ Piperis albi vel nigri pulverisati; vel talis Pulvis per tubulatum cochleare insuffletur. Verzascha sequentem hoc fine Pulverem concinnari jussit:

R̄. Cortic. Granator. ʒj.

Rad. Irid. florent. Tormentill. Bistort.

Flor. Rosar. rubr. Balaust. ana gr. v.

Alumin. ust. gr. iij.

M. f. Pulvis subtil. d. ad ch.

Vel R̄. Succ. Acaciæ inspissat.

Radic. Tormentill. ana ʒij.

Piper. long. ʒj.

M. f. pulvis.

G. Hier. Velschius Hecatost. 2.

Obs. 12. Prolapsum Columellæ in plurimis citissimè curari vidit linteolo Vertici imposito, cui fermentum Pistorum sive panis vulgare in vino solutum, ac pro lubitu Succini pulvere adhuc permistum, superinductum fuerat: & Gargarismate simplicissimo adhibito, ex Aqu. fontan. Nitro fixo acuatâ.

Quod si Verticis capilli paulò fortius in altum trahantur, idque a iquoties repetatur, non rarò etiam citissimè laxatio Uvulæ, & ad miraculum usque tollitur; inprimis si simul de superioribus pulveribus, aut Semine Rosarum pulverisato, tantilloque Aluminis usli acuatâ Uvula conspergatur. Job. Hartmannus Ovum recens ad duritiem coctum per medium dividit, atque calidissimè sic vertici imponit, inibi que per aliquot horas relinquit, donec laxitas Gargareonis remiserit.

Quod si subitò ab esu Panis recens è clibano extracti Uvula intumuerit valdè, tum lanceolâ aperiatur, vel inflicto notabili colapho rumpatur, ac postmodum Gargarismate è Melle rosaceo, pulvere Myrrhæ, Aloës, Rubricæ fabrilis, & Aqu. Plantaginis sanetur.

Si conjuncta simul est Inflammatio, ac Febricula, tum Venæ statim raninæ incidantur, vel etiam Brachii Vena secetur, & ea præterea usurpentur, quæ in Inflammatione jam commendata sunt. Extus in Uvulæ prolapsu conducunt, quæ itidem in ejus Inflammatione conveniunt, atque suo loco laudavimus.

In casu gravissimo, & Uvulâ tumidâ mukum copiosum stillante, nec ullis medicamentis cedente, Columella usque ad naturalem magnitudinem abscindatur; si verò inde Hæmorrhagia sequatur nimia, tum excavatâ spatulâ, vel cochleari tubulato sequens adhibeto:

R̄. Farin. Tritic. Lapid. Hæmat.

Lini combust. ana quantum placet.

Adde Spiritus Oli q. s. ad consistentiam Pultis crassioris. Detur ad Pyxid.

Postmodum non nisi Melle rosaceo curatio tota absolvatur.

GARGAREONIS VLCVS est solutio continui in Columellâ per humorem quendam acido-acrem erodentem excitata.

Pars affecta, ipseque morbus ex solâ inspectione patet, dum continuò sanior

Gargareonis Vlcus.

Pars affecta, & Diagnosi.

sam quandam materiam fundit, colore, consistentiâ, atque acrimoniâ pro causæ diversitate variantem, quâ Ager modò exspuit, modò in Ventrículum deglutit. In Lue venereâ ac Leprâ frequens est, sæpè & Inflammationi succedit in illis, qui scorbuticâ sanguinis cacochymiâ, aliave acri intemperie sunt inquinati. Deglutitio molesta evadit, ob angustatum paratam. Hinc & si Prognosin consideremus, mutari non rarò solet in Cancrum vicinas simul partes exedentem, Gangrænam, Sphacelum, ac mortem. Subinde per continuatam erosionem Uvula tota prorsus auferitur, raucamque vocem reddit.

Prognos.
ss.

Causa.

Producuntur autem talia Ulcera ab humore acido-acri corrorente salino, quem inquinata Massa sanguinea vel in Scorbuto, vel in Lue Gallicâ, vel in aliâ texturæ sanguinis dulcioris mutatione suppeditat: unde fibrillæ pororum Uvulæ erosæ liquorem ibi secretum plus minus crassum, pungentem, liquidum aut foetidum emittunt.

Curatio.

In Curatione ante omnia Infusum Foliorum Senæ & Rhab. cum Radicibus Scorzonæ. Cichor. Caryophyll. nec non Crem. Fr. Semin. Fœnic. &c. ad minuendam causam antecedentem est propinandum. Deinceps verò Intus acrimonia circulantium humorum edulcoranda & corrigenda per siccantia, absorbentia, diuretica, & diaphoretica; atque hunc in finem partim Decoctum Lignorum & Plantarum vulnerariarum est præscribendum; partim Essentia traumatica, vel Tinct.

† n. Corallor. vel Pilulæ quoque è Plantarum vulnerariarum, Trifolii imprimis fibrini, Betonic. atque Consolid. maj. Extractis factæ; vel etiam Pulveres è Diaphor. martial. ʒvial. Corall. ppt. Unicorn. fossil. Ocul. ʒ. ppt. C.C. phil. ppt. Ebor. ppt. Pulv. Consolid. maj. Lichen. petr. Bol. arm. &c. simul in usum vocantur.

Extus conveniunt frequentia Gargarismata, è Decocto Lignorum cum Melle rosaceo, Roob diamor. Roob Dianuc. Essentiâ Myrrh. Aloës, Succ. Apii, Ligustr. &c. parata, à quibus si Ulcus probè detersum reddi non queat, tum tangetur Aquâ virid. Plateri, dein eluatur vel Aqu. Calcis viv. cum Succ. Chelidon. & Apii: vel Lactebubul. cum decoct. Hordei, Rad. Consolid. Fol. Lichen. petr. adjecto Sacch. cand. Aliàs sequens Decoctum in hocce casu pro Gargarismate multum servit.

℞. Rad. Aristol. rot. ver.

Caryophyllat.

Tormentill. ana ʒiij.

Herb. Marrub. alb.

Veronic.

Scord.

Gratiol. ana Mj.

Lichen. petr. Mß.

Semin. Mespilor.

Hyperic. ana ʒiß.

Bol. armen. ʒß.

† n. diaph. ʒij.

Myrrh. elect.

Aloës soccotr.

Mastich. elect. ana ʒiß.

Incis. & contus. coqu. in s. q. Vini albi veter. In Colaturâ dein adhuc dissolve Mellis

Mellis rosac. ʒiʒ.

Roob Dianuc. ʒj.

Misc. detur ad Vitr.

In *Ulcere cancroso & exedente* interna plus quàm externa profunt medicamina : commendari solet *Pulvis è Cancris fluviatil. Ranis aquatil.* aut *Bufonibus ustis*, nec non è *C. C. usto, Radicib. Aristol. rot. ver.* paratus, hinc cum *Melle rosaceo* subactus, atque impositus, vel crudè tantùm inspersus.

In *Dietâ* ab omnibus alimentis chylum acido-acrem præbentibus est abstinendum. Potus *Thermarum Fabariensium, Embsensium*, aliarumve, vel etiam *Acidularum* quarumvis calefactarum, debito cum regimine victûs æstivo tempore convenit. Aliàs tamen pro potu ordinario intervit *Vinum album vetus, tenue, Lignorum decocto* dilutum. *Aër* frigidus humidus multum nocet ; qualiscunque verò is fuerit, vel *flammâ accensi Ligni Juniperi*, vel *fumo Mastichis, Thuris*, ac *florum Beton.* corrigi frequenter potest.

GARGAREONIS TVMOR est *Uvulæ* magnitudo præternaturaliter aucta, quæ si à *Lymphâ acri*, sanguineque stagnante provenit, *Inflammatio* nuncupatur, de quâ superius actum. Si verò à *pituitâ tantùm viscidâ spongiosam Uvulæ texturam infarciante* oboriatur, *Relaxationem* nominamus, quam itidem supra exposuimus.

GARGAREONIS ABSCESSVS vel *Apostema*, est tumor inflam-

matorius *Uvulæ* ad suppurationem paulatim tendens, hinc sub titulo *Inflammationis* paulo supra explicatus. *Abscessus* autem si tandem vel per se ruptus, vel lanceolâ apertus fuerit, *Ulcus* exhibet, de cuius naturâ & curatione superius quoque actum est.

GIBBOSITAS, GIBBUS, Gibberositas, Gibber, Græcis *Κύφωσις, Κυφός*, est morbus vitiatæ conformationis, in quo dorsi figura naturalis, propter rectilineum vertebrarum subluxatarum situm plus minus immutatum, ita vitiatur, ut in alterutro latere magis intumescat.

Autopsia hinc facile cognoscenda præbet hanc malam conformationem ; ubi simul *differentiæ Gibborum* patentiunt. Etenim pro plurimum vel pauciorum vertebrarum dorsi subluxatione, Gibbus nunc major, nunc minor evadit. Ut plurimum autem evenit, ut, dum v. g. dorsum in latere dextro magnopere excrescit, antèrius pectoris latus sinistrum vicissim tumidum reddatur, atque præternaturaliter elevetur, vel saltem elatius latere opposito compareat. Dum enim costæ in dextro latere dorsi retrorsum magis extenduntur vel attolluntur, sterni simul dextram partem retrorsum quasi trahunt, ut hinc minus antrorsum promineat, quàm sinistra ejus pars, hæcque propterea tumida magis credatur. Minor interim Gibbus parum Homini creat molestiæ ; major autem respirationem plus minus offendit, & aliquando periculum suffocationis excitat.

U u u

citatur. Cumque hæc ipsa pectoris vitiata structura Pulmonis sufficientem dilatationem impediat, aut Cordis quoque motum nonnihil offendat, Homines hinc tales obnoxii facile redduntur Catarrhis suffocativis, Asthmati, Phthisi, Cordis palpitationi, atque Thoracis Hydropi; quoniam sub hac Pectoris constitutione vitiata circulatio humorum in tali parte facile ac levi data ansa nonnihil impeditur, sicque ad stagnationem disponitur. Gibbositas si minor ac junior adhuc fuerit, curationem certe sæpius integram, aut correctionem saltem notabilem admittit. Si verò major extiterit, atque inveteraverit, pro inemendabili habebitur. Qui Pueri gibbam habent supra diaphragma Spinam dorsii, hi crura quidem ac brachia adipiscentur perfecta, pectus autem non latum & amplum, sed magis prominens, acutum, breve, macilentum, atque ex carne obtinebunt; imò respiratio talibus haud facilis continget, stridulâ propemodum voce pollebunt, ac propter angustatam thoracis cameram Cordis facile palpitatione vexabuntur, denique Catarrhis pectoralibus, ac Tussi reddentur obnoxii. Quin imò etiam Cervicem juxta atlantem repandam habere coguntur, non sine faucium angustia præternaturali. Pueri autem infra Diaphragma gibbosi rediti, subinde magis ad Renum & Vesicæ morbos proclives erunt, spinam longior. m., & coxas magis excarnes habebunt, quàm qui supra septum transversum gibbi existunt; denique

& minus, foecundi evadent, barbamque tardius atque imperfectius sibi crescentem experientur. Quanquam autem nonnulli Gibbosi, si carnosi facti sunt, istud conformationis vitium etiam ad senectutem usque sani satis portare soleant; mihi quæ nota sit adhuc vivens lautioris conditionis Matrona gibbosa, quatuordecim liberorum mater, optimè habens, regula tamen hæc non est generalis, cum pauci profecto, vel ipso jam Hippocrate observante, gibbos suos ultra sexagesimum ætatis annum portarent.

In Curatione probè examinanda venit Gibbi natura & conditio, utrum nimirum una vel altera vertebra introrsum vel extrorsum, dextrorsum vel sinistrorsum subluxata sit? Quævisunque tamen existat hæc mala conformatio, eo omnis cura est dirigenda, ut Vertebrae omnes naturalium situm adipiscantur, atque in eo etiam contineantur. Curatio sanè difficilis, imò in inveterato Gibbo impossibilis, in juniore autem apud Puerum, Puellamque subinde adhuc Gibbositas emendari valet, modò Patiens fuerit obediens.

Itaque heic ante omnia intus quidem corpus aliquoties expurgandum esse judicamus *Infuso Fol. Senn. cum Rhabarb. vel Radice Jalapp. cum Mercurio dulc. aut Cinnab. $\frac{1}{2}$ n. opt.* Deinceps *Pulvis absorbens* incidens, atque *nervos roborans* aliquamdiu usurpabitur, v. gr.

*R. Radic. Caryophyllat.
Ireos florent.
Pæon.*

Doronic.

Doronic. ana ʒiʒ.

Unicorn. fossil.

Bezoard. min.

C. C. phil. ppt. ana ʒij.

Diaph. martial. ʒj.

Semin. Anis.

Aquileg.

Fol. Majoran. ana ʒij.

Sacch. alb. ad pondus omn.

Misc. f. Pulv. subtil. d. ad Scatul.

Dosis ʒj. m. ac vesp.

Extus autem, ut Vertebrae in naturalem situm reponi, inibique contineri queant, primò inungi per plures dies debet Spina dorsi v. gr. *Oleo è flor. Slotani, Lumbric. terr. Chamomill. Rosar. Verbas. Meliloti, Violar. Amygdalar. dulc. vel amar. Unguento de Alth. Axungia Taxi, Sciuri, Vulpis, Cati, Muris alpin. ac similibus.* Deinceps verò commodis instrumentis, v. gr. mantilibus, quorum unum sub axillis, alterum supra coxas alligari debet, Spina dorsi extenditur validè, eaque extensâ simul manus Chirurgi præstantis plus minùs facilè, si quidem erit possibile, vertebrae subluxatas in situm suum naturalem premendo reponet & aptabit. Cùm verò hoc opus non simul & uno actu perfici queat, repetendum erit quotidie, donec scopum definitum attigerimus. Interea pectus totum, præprimis autem locus affectus, *Axungia Cati cum Oleo Laurino, anethino, & Ungu. de Alth. bis* quotidie inungendus est; atque hinc Pectus arctè noctu diuque ligatum tenendum, Thorace nimirum obvoluto, qui vel è laminis ferreis, vel è chartâ forti,

vel ex ossibus Ceri; vel ex corio picato, vel è ligneis lamellis, panno obductis concinnari poterit, ita quidem ut in loco gibbi vel lamina, vel quid simile affixum hæreat, cujus ope gibbus magis premi, atque in suum locum protrudi, inibique contineri queat.

In nonnullis suspensio trunci corporis artificialis quotidie non sine successu instituitur, vinculis subter axillas injectis, vel adhibito alio commodo instrumento pensili. Juben- tur quoque Pueri sese de manibus suspendere crebrò. Juxta hæctamen, interdum planè inutilia tentamina conducunt ferè magis Emplastra nervina, acidum destruentia, atque coagulum omne dissolventia; quemadmodum sunt *Empl. de Baccis Lauri, Diachalcitheos, diapalma, diaphoretic. Myns. vel sequens:*

R. Gumm. Tacamah. ʒʒ.

Radic. Scrophular.

Caryophyllat.

Mastich. el. ana ʒiʒ.

Thuris masc.

Succin. flav.

Myrrh.

Ol. Nucist. expr. ana ʒj.

Picis naval. ʒiʒ.

Ceræ q. s.

Misc. f. Emplastrum Oleo destillato

Lavendulae irrorandum.

Vel R. Gumm. Elem.

Bdell.

Oliban. ana ʒj.

Ros. Sambuc. ʒʒ.

Radic. Symphyt. ʒij.

Bol. Armen. ppt. ʒʒ.

U u u 2

Cinnab.

Cinnab. commun.

Lumbr. terr. ppt. ana ʒij.

Picis naval. ʒj.

Cerae ac Tereb. ana q. s.

M. f. leg. artis Emplastrum, Oleo Spicae vel Majoran. destill. irrorandum.

Usum Thermarum quarundam sulphureo - aluminosarum non improbamus, modò reliqua medicamina externa simul in usum vocentur, atq; inprimis Emplastrum cum Thorace gestetur.

GINGIVARVM CARO LVXURIANS, vide *Epulis*.

GINGIVARVM EXCRESCENTIA, vid. *Epulis*.

Gingivarum Fistula.

GINGIVARVM FISTVLA est Ulcus sinuosum, in Gingivis à lymphâ acido - corrosivâ enatum, & ad os maxillæ, vel dentis cariosi radicem terminans, continueque saniem plus minus liquidam fundens. Cum itaque hic Affectus genesin atque curationem eandem admittat cum *Fistulâ in Genere*, Lectorem quoque eo remittimus.

GINGIVARVM INFLAMMATIO, vid. *Parulis*.

Gingivarum corruptio.

GINGIVARVM CORRVPTIO est tunicæ carnosæ, extremitates Maxillarum circa dentes investientis, paulatina erosio; exulceratio atque consumptio, à lymphâ falso-acri, occultè corrosivâ, huc è sanguine delatâ, originem trahens.

Causa.

Solet hoc malum iis maximè

contingere, qui scorbuticâ, leprosa aut venerea cacochymiâ, salino-acri corrosivâ laborant; hancque sibi è malâ diætâ, aliquandiu continuatâ, vel è contagio adquisiverunt. Cibi falsi, acres, aromatici plurimum, saccharati, melliti quotidie comesti, potus Cerevisiæ, vel Vini acescentis diutinus, usus remediorum mercurialium frequens, salivatioque ab iis excitata, Gingivarum substantiam valdè corrumpere, putrefacere, erodere, atque consumere solet.

Non simplex proin incommodum est ista corruptio, quin dicta simul mala secum fert, *erosionem* videlicet, *exulcerationem*, *consumptionem* vel etiam *cruentationem*, ubi laxior Gingivarum substantia vel levi attactu fissa sanguinem fundit. Facile hinc talia vitia cognoscuntur, cum in conspectum prodeant, & commodè ab invicem discerni possint. Si laxa est, ab admissione copiosi humoris facta, substantia Gingivarum, ferè albicans, mollis, & facile cruentans, subinde & pruriente dolore molesta evadet. Si planè eroditur, atque consumitur substantia Gingivarum, tum tandem Dentes in suis alveolis continere amplius nequit, unde Mobilitas ac Vacillatio Dentium, de quâ suo loco actum est, oboritur, ac Dentes cum maxillæ extremitate prope modum denudantur.

Non contemnendum proin hæc Gingivarum corruptio malum est; certè enim Fœtorem oris, Dentium nigredinem, vacillationem, cariem, atque elapsionem maturam post se trahit,

trahit, non sine deformitate, ac distinctæ loquelæ mutatione.

In Curatione proin intus quidem mox dabuntur remedia, totam sanguinis massam depurantia, edulcorantia, absorbentia, diaphoretica & diuretica. Adultus nimirum Homo, sicubi saburram in Ventriculo vel Intestinis obhærentem circumgerere notabitur, *emeticum* sequens deglutire debet:

℞. Pulver. rad. Ipecacuanhæ vel Asari ʒʒ.

Crem. Fri gr. ij.

Misc. f. Pulv. subt. d. ad ch. pro dosi matutin.

Poterit hoc remedium adhuc semel aut bis, sed fractâ dosi, usurpari. Vel *Catharticum* ejus loco exhibebitur, per epicrasin blandè educens, & sanguinem depurans, verbi gratiâ;

℞. Radic. Polypod.

Apii.

Cichor.

Sarsaparill. ana ʒijj.

Fol. Betonic.

Sanic.

Anserin.

Card. bened. ana Mj.

Senæ opt. mund. ʒiʒ.

Bacc. Juniper.

Semin. Fenic. ana ʒij.

Agaric. trochisc.

Rhab. elect.

Rad. Helleb. nigr. ana ʒiʒ.

Cortic. Winter. ʒj.

Salis Ononid. ʒij.

Juniper. ʒj.

Incis. contus. & in nodulo ligatis affunde

Vini alb. veteris t̄biiʒ.

Aqu. font. t̄biʒ.

Stent per noctem in loco tepido, postea singulis mane hauriantur uncia tres vel quatuor cum regimine Dietæ.

Vel *Massa pilularum Emanuelis*, *Murocostinarum*, aut è *Succino Craton*. per tres pluresve dies mane ad gr. 25. vel 30. capiatur. Vel *Panacea solutiva alcalina* à ʒiʒ. ad ʒʒ. quotidie per 12. dies usurpetur, ceu indolens aliquod & optimū laxans, sanguinemq; simul edulcorans. Juxta hæc tamen sub vespere semper *Tinctura Corallorum*, vel ʒnii, cum *Essentiâ Lignorum*, *Trifolii fibrin.* aliave *antiscorbuticâ*; *Spiritus* quoque *Cochleariæ*, in Vehiculo *Infusi fol. Thée* ad 20. pluresve guttulas dabitur. Sequens tamen *Opiata* cum fructu ejusmodi spirituosus substituetur:

℞. Conserv. Fumar.

Borrag. ana ʒvj.

Nuc. Ind. cond. ʒj.

Conditur. rad. Symp. ʒij.

Terr. sigillat.

ʒ n. diaph.

Specif. stom. Poter. ana ʒij.

Syrup. Capill. ʒ r. q. s.

M. f. Elect. d. ad Ollam; ter quotidie magnitudo Castaneæ sumatur.

Extus Gingivæ primū *Aquâ Calcis viv.* cum *Spiritu Cochlear.* & *Essentiâ Aloës* ac *Myrrhæ*, quotidie bis vel ter abluantur, & tantillum quoque exprimantur; deinceps verò sequens *Mixtura* Gingivis subinde affricetur, iterumque expuatur:

℞. Mellis rosac. ʒiʒ.

rutac. ʒʒ.

Uuu 3

Tinct.

Tinct. Lacc. florent. 3ij.

Essent. Myrrh.

Aloës.

Catechu.

Absynth. ana 3j.

Rubricæ fabril. 3ij.

M. d. ad Pyxid.

Vel si *Cruentatio* crebra occurrat, sequens conducet :

Rx. Mellis rosac. 3ij.

anthos. 3vj.

Essent. Galang.

Myrrhæ ana 3j.

Spirit. Vitrioli 3ß. ad 3j.

Misc. d. ad Pyxid.

Quod si hoc remedio sufficienter deterfæ creduntur *Gingivæ*, ad novam harum carnem generandam sequens conducet :

Rx. Mell. rosac. 3ij.

Rubric. fabril. pulv. 3ij.

Myrrh. pulv.

Mastich. pulveris.

Succ. Catechu ana 3ij.

Tinct. Lacc. flor. 3ij.

M. d. ad Ollam, atq; Gingivæ ter vel pluries quotidie illinantur.

Cucurbitulæ cum scarificatione singulis sex hebdomadis dorso applicentur. *Venæsectio* in *Plethoricis* instituitur. *Purgans* remedium singulis hebdomadis semel repetatur. *Æstivo* tempore *Thermarum* harum illarumve, vel *mineralium Acidularum Aquæ* potentur. Aut *Serum Lactis caprilli*, vel integrum hoc *Lac* potabitur, cum incôctione *Herbar. Scabios. Fumar. Borrâg. Veronic. Beton.* Omni tempore etiam *Infusum fol. Thée, Trifolii fibrin. Nasturt. aquat. Plantag. aquatic.*

Betonic. Chamædr. frequenter potetur. *Fonticulus in Brachio*, si malum contumacius fuerit, excitetur.

GLAVCOMA, *Glaucoſis*, *Glauco*, est coloris naturalis Humoris oculorum crystallini in glaucum mutatio, cum Visûs imminutione ac depravatione.

Provenit hoc vitium à particulis quibusdam sive acido - austeris, sive sulphureo - ramosis ac viscidis, corpuscula Humoris crystallini è suo situ naturali nonnihil deturbantibus, vel magis condensantibus, siccantibus, & lapideam ferè duritiem conciliantibus. Ansam hinc aliquam præbent nocturnæ lucubrationes frequentes; temperamentum melancholicum, aut cacochymicum; victus crassus, chylum spissum, lentum reddens; contusio vel ictus acceptus.

Cognoscitur facilè, si circa pupillam insignis in profundo deprehendatur albedo, si perspicuus Humoris affecti color crystallinus obscurus, atque in glaucum mutatus observatur; si omnia tanquam per nebulam aut fumum conspiciantur; si denique indurato prorsus Humore crystallino Visus omnimodè pereat. Quale exemplum nobis Ann. 1694. Norimbergæ in Viro quodam Nobili videre contigit, qui anno ætatis quinquagesimo Glaucoma in utroque Oculo fuit adeptus, cum duritiè insigni Bulborum. Aliàs Affectus hic Senibus est magis quàm Junioribus familiaris; & illis quidem maximè, quorum fibrillæ oculorum valde sunt teneræ, molles,

molles, quique alienos humores pituitosos in sese haud difficulter admittunt, ac retinent.

Prognosis heic instituitur minus favorabilis: rarus est Affectus, atque ob partis vitiatae situm, & teneritudinem, difficillimamque virtutis remedium penetrationem, curatu vix possibilis; quin coecitas plerumque totalis subsequitur, eaque immedicabilis.

Curatio internis magis quam externis remediis perficitur; aperientibus nimirum, resolventibus, ac discutientibus. Ante omnia sequentes *Pilulae* semel vel aliquoties exhibendae sunt purgantes:

℞. *Mass. Pilul. hydrop. Bont. vel marocost.* ℥j.
Mercur. dulc. opt. ℥ss.
Resin. Scammon. gr. iij.
Ol. stillat. Fœnic. q. s.

M. f. Pilulae num. 12. Inraur. d. pro dosi.

Purgato sic corpore nullum melius remedium est, quam *Tragma* quoddam ophthalmicum, quale v. g. sequens est:

℞. *Radic. Pæon. Valerian. Chelidon. maj.*
Herb. Euphras. ana ℥ij.
Semin. Fœnic. ℥ss.
Cubeb. 3j.
Corall. rubr. ppt.
Ocul. 5. ppt.
Ebor. s. ign ppt. ana ℥ij.
Sacch. alb. 3iij.

M. f. Pulv. subt. d. ad Scatul. Dosis 3j. m. ac vesp.

In *Potu ordinario Vinum album* vetus probè defœcatum conceditur, *Aquâ* nonnihil dilutum. In *Vino* autem continuè immersa teneatur *Euphrasie herba* siccata cum radicib. *Chelidon. major.*

Extus singulis noctibus linteola *Spiritu Vini* aut *Ceras. nigr. camphorato*, & calefacto immersa & expressa oculis applicata tenebuntur. In *Spiritu Vini* autem infuse sint *Radices Valerian. Chelidon. maj. Pæon. Men, Herbae Euphras. Majoran. Hierac. Rorismar. Bacc. Juniper. Laur. Semina Fœnic. Aquileg.*

GONORRHOEA BENIGNA Gonorrhœa benigna

f. *VERA* aut *SIMPLEX* ex γονή, semen genitale, & ῥέω, fluo, compositâ voce, est frequens & involuntarium seminalis materiae per Urethram & Virgam apud Viros aut Juvenes profluvium, à læsione Vesicularum seminalium aut Prostatarum glandularum oriundum.

Contingit hic Affectus vel cum Differentia frequentiore & largiore, vel cum remissione materiae profluvio. Deinetiam est vel gravior & citra veneris imaginationem aut voluptatem Homini eveniens, vel levior, & cum tentigine, ac venereis cogitationibus accidens, qualis aliàs *Pollutio nocturna* vocari solet. Quæ autem apud Fœminas similiter contingit mucoso-pituitosæ, materiae per pudenda excretio, eadem etsi olim *Gonorrhœa* quoque nuncuparetur, melius tamen nomine *Fluoris* vel *Fluxus albi* de quo suo loco, effertur.

Dicitur

Dicitur hæc Gonorrhœa *benigna* & *vera* vel *simplex*, quia verum, nullâ malignâ atque corrosivâ qualitate inquinatum semen simpliciter effunditur ac profluit, ad distinctionem *Virulentæ* Gonorrhœæ, de quâ postea agetur.

Pars affecta.

Pars affecta sunt Vesiculæ partim seminales, partim & Glandularum prostaticarum ostiola in Urethræ ductum hiantia, quibus exulceratis aut excoriatis, vel laxioribus redditis humor continuè effluit.

Causa Pollutivæ nocturnæ.

Causa proxima nocturnæ Pollutionis est seminis naturalis intra Vesicularum seminalium capacitatem abundantis turgescencia, venereas primùm cogitationes per Spirituum animalium placidiorem in Genitalibus motum excitatum, producens, mox virgæ tentiginem, tandem seminis plus minus voluntariam, in somno contingentem, voluptuosam ejaculationem efficiens. Evenit hoc magis Juvenibus supinè decumbentibus, quàm aliis. *Antecedenter* autem ad hunc Affectum contribuunt Juventus; Temperies sanguineo-cholerica; victus plenus; vita sedentaria, curarum expers, multum otiosa, unde multa in sanguine gignitur seminalis materia; fibrarum in Vesiculis seminalibus sensibilitas tenera, titillationem faciliè persentiens; meditatio rerum venerearum & conversatio cum subjectis amabilibus frequens.

Causa Gonorrhœæ benignæ.

Causa proxima autem Gonorrhœæ *benignæ* est vel nimia laxitas, vel etiam erosio fibrillarum, ostiola tum Ve-

sicularum seminalium, tum Glandularum prostaticarum cingentium, unde necesse est secretam in Testibus materiam seminalem invitè effluere. *Antecedenter* autem concurrit huc simul partim Seminis nimia aquositas, partim quoque acrimonia illius blandè corrosiva; quæ quidem vitia Semen contrahit ex ipsâ massâ humorum circulante, atque originaliter è chylo crudiore, & aquosiore, qualem victus copiosus, principio sulphureo-salino-balsamico, & quasi lacteo maximè destitutus, suppeditat. Hinc Cachectici omnes, Obesi multi, atque pituitoso temperamento præditi huic præ aliis Affectui sunt obnoxii.

Quod si igitur per Virgam masculam flaccidam liquor talis plus minus aquosus albicans, spumofus aut mucosus, sine illius voluptuosâ erectione, frequenter aut etiam continuè & invito Homine, tam dormiente quàm vigilante, effluit: si materia illa seminalis minus est acris, internamque Urethræ superficiem neque erodit, aut excoriat, neque admodum pungit, irritat atque titillat: si quoque citra venereas cogitationes promanat, tum profluvium hoc vocatur *Gonorrhœa vera, simplex* aut *benigna*. Si autem tempore somni cum venereis cogitationibus, sub virgæ libidinosâ erectione semen ejaculetur plus minus frequenter, indeque membrum rursus flaccescat, *Pollutio magis nocturna* appellari consuevit.

Nocturna hæc *Pollutio* nil in se periculi habet, quin Spirituum atq; seminalis materiæ copiam, uberemque proven-

proventum hætenus designat. Si autem nimis frequenter Juvenibus obtingat, tum etiam lassitudinem, spirituum animalium vitaliumque penuriam, aliaque hinc subsequenda symptomata inducere valet. Si Gonorrhœa mitis est, & neque continua, neque frequens, in recessu quoque nihil habet. Succedit talis aliquando ipsi Gonorrhœæ virulentæ persanatae, ubi interdum per plures adhuc hebdomadas seminalis substantia citra ullum dolorem sponte profluit. Quod si verò continua sit, larga, atque diutius duret, tum absumptis spiritibus animalibus Homines sensim ad Tabem præcipitat dorsalem, vel Cachexiam, Febrim hæticam, aut Hydropem post se trahit. Nonnunquam, si Affectus negligatur, & ipse interea Homo cum Fœminâ Fluore albo, aut Menstruis laborante concumbat, semen postea effluere pergens, acquisitâ qualicunque acrimoniâ, in graviolem, tantumque non prorsus malignam Gonorrhœam degenerare potest.

In Curatione Pollutioni nocturnæ remedia vix adhibentur, nisi frequenter affligens Juvenem valdè incommodet, ac fatigare vel emaciare incipiat, tum enim demum medicamina semen imminuentia in usum vocanda sunt, v. g. præter Dietam nonnihil frigidam, victumque parcum, alimenta acidiuscula, aquosa, refrigerantia, minimè flatulenta, aut succum lacteo-aromaticum spumofumque præbentia; exercitia corporis fatigantia; lucubrationes Spirituum

quantitatem exhaurientes, Vigiliæ; Julepi aut Emulsiones seminum frigidorum crebrò haustæ; Nitrum sæpius cum tantillo Camphoræ & Sacchari Saturni exhibitum; Tinctura antiphthifica Garmanni, Aqua Castitatis; & quæ hujus farinæ suo loco de Satyriasi aut Tentigine sunt commendata. Sed in horum tamen usurpatione cautius procedas, ne Semen imminuere studendo, virilitatem simul omnem extinguas.

In Gonorrhœâ autem verâ primò sequentes dabis Pilulas purgantes:

Cura Gonorrhœæ veræ.

R̄. Mass. Pilul. è Succ. Craton.
gr. xviii.

Mercur. dulc. opt. gr. x.

Resin. Jalapp. gr. iij.

Crem. Fri gr. j.

Ol. stillat. Rut. q. s.

F. l. a. Pilulæ num xij. Inaur. dentur summo mane pro dosi, cum regimine Dietæ. Dein Vena secetur, si Homo sufficiente sanguinis quantitate instructus sit, appetitumque ciborum constantem habuerit. Postea sequentes Pilulæ longo usu sumantur; v. g.

R̄. Terebinth. venet. ʒij.

Offis Sepiæ ppt.

Corall. rubr. ppt. ana ʒj.

Diaph. martial. ʒij.

Sack. Saturn. ʒj.

Camph. ʒss.

Ol. stillat. Succ. q. s.

F. l. a. Pilulæ pisi minoris magnitudino, de quibus mane ac vesp. 8 vel 10. sumantur, cum haustu sequentis aut similis Emuls.

R̄. Nucl. Persic.

Amygd. dulc. rec. excort. aa. ʒiʒ.

X x x

Semin.

Semin. Melon. ʒij.
Cucum.
Cucurb.
Lactuc. ana ʒj.
Aqu. Nymph. ʒiij.
Portulac.
Cichor. ana ʒij.

F. l. a. Emulsio, cui adde
Sacch. ros. tabul. ʒʒ.

D. ad Vitr. Sumatur duabus vel tri-
bus dosibus.

Vel Pulvis ex Semine Rut. Agn.
cast. Lactuc. Nymph. Unicorn. foss. Off.
Sepiæ ppt. Nitr. ʒ iat. ʒ n. diaph. Croc.
Martis aperit. Oleo Mart. Terr. sigill.
vel Lemn. Camphor. Sacch. vel Magi-
ster. Saturn. Succin. ppt. &c. parabitur,
& frequenter exhibebitur. Prodest
in hunc quoque finem Tinctura an-
tiphthisica superius jam laudata; item
Essentia Castit. Myns. Tinctur. Corall.
cum Nitr. parat. Decoct. Granor. Coffee
tostor. Sed nec sequentes Morsuli sunt
contemnendi:

R. Semin. Hyperic.
Portulac. ana ʒiij.

Diaph. martial.
Succin. alb. ppt.
Off. Sepiæ ppt.
Terr. sigillat. ana ʒij.
Flor. Lamii alb.

Tunic. ana ʒj.
Succ. Catech. ʒiij.
Camphor. ʒj.
Sacch. Aqu. Ros. solut. ʒiiij.

M. f. l. a. Morselli, de quibus duo
pluresve quotidie sumantur.

Extus totum dorsum Oleo rosa-
ceo, vel Unguento refrigerante Ga-
leni, aut albo camphorato, cum Sacch.

Saturn. mixto quotidie bis inun-
gatur.

In Dietâ sufficiens quidem illud-
que bonum nutrimentum assumatur,
sed quod feminis quantitatem non
adaugeat. Potus sit Cerevisia probè
defœcata, tenuis, non ita fortis; vel
Vinum rubellum tenue. Decocto
Lignorum subinde dilutum. A Ve-
neris usu aliquamdiu abstineatur.

GONORRHOEA VIRULEN-
TA, s. maligna, est involuntarius &
 malignus seminis vel lymphæ puru-
 lentæ, sordidæ atque acris effluxus
 cum dolore & ardore urinæ, ab In-
 flammatione ac erosione Glandula-
 rum per concubitum venereum con-
 tractâ oriundus.

Morbus hic æquè Fœminas atque
 Viros affligit; in Fœminis enim
 glandulæ vaginæ, cervicisque Uteri
 læduntur: in Viris autem Prostatae, in-
 teriorq; Penis tunica spongiosa affici-
 tur. Gonorrhœa alia mitior, alia gra-
 vior, prout causa plus minus acris est,
 & corrosiva: nunc recens, nunc in-
 veterata; modò cum, modò sine Lue
 venerea.

Causa proxima malignæ Gonor-
 rhœæ est inflammatio atque erosio
 vel exulceratio Glandularum prosta-
 tarum, harumque extremitatum in
 Virgæ canalem hiantium, imò & in-
 ternæ spongiosæ Glandis Penis sub-
 stantiæ apud Viros: apud Fœminas
 autem tunica Vaginæ Cervicisque
 Uteri glandulosa, sæpius & ipse
 sphincter Vesicæ eroditur; unde ne-
 cessum est, semper mucoso-lymph-
 ticam,

ticam, vel etiam feminalem materiam profluere. Ad hanc verò genitalium exulcerationem, velut antecedentes causæ, contribuunt humores maligno corrosivo venereo characterè inquinati, qui nonnisi per concubitum cum Personâ vel simili malo prehensâ, vel prorsus Lue Gallicâ affectâ ad Partes afflictas accedunt: cum enim genitales partes sub coitu incalescunt, & dilatantur, facile seminalis materiæ venereum virus intra poros suos admittunt, istaque similiter labe post aliquot inde dies infestantur, ita tamen, ut pro variâ texturæ suæ dispositione diversos quoque in sese effectus experiantur; nunc enim in ipsis Ulcuscula excitantur & apparent; nunc Porri seu Verrucæ venereæ; nunc Bubones virulenti ibidem nascuntur; nunc demum ipsa planè Gonorrhœa maligna subsequitur. Quando enim in Pudendorum superficie tantum obhæret admissa in coitu impuro sanies mucoso-acris, tum non nisi Verrucæ aut Condylomata venerea enascuntur: si verò maligna atque volatilis corrosiva ejusdem saniei aura intimius penetrans ostia Glandularum prostaticarum insensibiliter arrodit & exulcerat, tum Gonorrhœa maligna oboritur: si eadem profundius adhuc penetrando vicinorum vasorum humores inficit, tum Bubones venerei succrescunt; denique ubi cum totâ massa humoralis lymphæ seminalis acrimonia communicata fuerit, tum Luem perfectè Gallicam efficiet. Itaque Glandularum prostaticarum Inflammatio &

Exulceratio fieri nequit, nisi particulæ maligni corrosivique seminis in coitu impuro per genitales partes eo penetraverint, atque non solum acrimoniâ suâ erosionem instituerint, sed & suis halitibus ulterius penetrando in ipsâ Glandularum substantiâ fermentationem corruptivam; vasculorumque sanguineorum obstructionem, atque tumorem, produxerint.

Affectus haud difficulter cognoscitur vel ab ipso Ægroto, qui conscius sibi impuri cujusdam coitus, post unum abhinc vel alterum etiam diem Urinas non sine ardente dolore mingere incipit, ac ita pergit, donec inde facta Urethræ excoriatio vel exulceratio perfectè rursus sanata fuerit. Itaque hoc malo laborantes sæpius à sanie per genitalia decurrente acri ad mingendum stimulantur, atque Urina excoriatas partes præterfluens non nisi magno cum ardore excernitur. Interim continuè atque involuntariè è glandulis exulceratis effluit sordida, mucosa, purulenta, modò cineritii, modò flavi aut etiam viridescantis coloris, materia, prout ipsæ virulentæ particulæ nunc acutiores, nunc obtusiores habent aculeos. Glans etiam Virgæ apud Viros non rarò inflammatur, aut intus à repositâ in suo circulo materiâ purulentâ excoriatur; apex autem illius albâ primum illuvie madet, quæ postea indies augetur, acrior redditur, & colorem album in flavum, viridemque mutat, atque sæpius importunam, dolorificamque Tentiginem, noctu potissimum inducit; tantâ sæpè cum duritie,

duritie, atque cruciatu, ut Penis ob ingentem ligamentorum aut muscutorum inflammatorum tensionem incurvetur, sicque talis *Gonorrhœa* excitetur, quam *chordatam* nonnulli appellant, quæ si diu duret, omnium pessima est, & post se indelebilia Ulcera non rarò relinquit.

Prognosis.

Quantum ad *Prognosin* spectat, licet Morbus hic per se non sit periculosus, per negligentiam tamen, aut imperitam tractationem talis reddi, inque Ulcera cacoëthea, exedentia, Fistulam, imò Luem ipsam veneream promptè mutari potest.

Curatio

Curatio instituenda per evacuantia, lenientia, adstringentia & consolidantia; ante omnia igitur sequens aliquod *purgans* exhiberi, postque elapsos 6. dies repeti debet; v. g.

℞. *Pulp. Cass. recent. extr.* ℥℞.

Confect. Hamech. ℥iij.

Mercur. dulc. opt. ℥j.

Crem. Fri ℥℞.

M. f. cum Saccharo Boli aliquot mane unâ vice devorandi.

Vel ℞. *Fol. Senæ opt. mund.* ℥iij.

Tamarind. ℥vj.

Crem. Fri ℥℞.

Semin. Fœnic. ℥ij.

M. Coque in s. q. Aqu. fontan. In Colaturæ ℥iij. dissolve

Pulp. Cass. rec. extr. ℥j.

Syrup. Ros. sol. s. ℥℞.

M. ad Vitr. pro dosi.

Vel ℞. *Mass. Pilul. s. quib. aut*

Extract. panchymag. Croll.

Mercur. dulc. opt. ana ℥j.

Magist. Jalapp.

Crem. Fri ana gr. ij.

Ol. stillat. Succin. q. s.

M. f. Pilul. num. xv. Inauratæ deglutiantur unâ dosi.

Post *purgans* statim *Venæsectio* in Brachio vel Pede instituat, extrahendo sanguinem ad ℥viiij. eaque post aliquot dies repetatur. Interea sequens *Emulsio* frequenti haustu bibatur ad demulcendam acrimoniam Seminis, ac Urinæ, Ulcusque prostaticarum detergendum:

℞. *Radic. Nymphææ.*

Fragariæ ana ℥j.

Cichor. ℥℞.

Folior. Portulac. Artemis.

Agrimon. Saponar.

Dent. Leon. ana M℞.

Incis. & contus. coqu. in s. q. Aqu. ad remanent. ℥i℞. Dein

℞. *Semin. Cucum. Melon. ana* ℥ij.

Cannabin.

Amygd. dulc. rec. exc. ana ℥ij.

Sem. Papav. alb. ℥i℞.

Decoct. superior. ℥i℞.

F. l. a. Emulsio d. ad Vitr. de quâ subinde tres uncia pro dosi hauriantur.

Laudatur & *Succus Citri recens* cum æquali pondere *Olei Amygdal. dulc. mixtus*, & ad ℥ij. pro dosi m. ac v. per aliquot dies sumtus.

Vel prodest sequens eundem in finem ordinatus *Julepus*:

℞. *Radic. Plantag.*

Nymph.

Caryophyllat.

Fragar. ana ℥vj.

Fol. Endiv.

Lactuc.

Dent. Leon.

Capillor. ♀. ana Mj.

Semin.

Semin. Cucum. ʒiij.

Agn. Cast.

Papav. alb. ana ʒiʒ.

Incis. & contus. coqu. in f. q. Aqu. fontan. Colaturæ tʒiʒ. adde

Syrup. Violar. purp.

de Alth. Fern. ana ʒj.

Lapid. prunell. ʒj.

Misc. ad Vit. Sumantur m. ac vesp. tres uncia pro dosi.

Sed insimul m. ac vesp. seqq. in usum vocentur Pilulae :

℞. Terebinth. venet. ʒiij.

Succin. alb. ppt.

Corall. rubr. ppt.

Extract. Consol. ana ʒj.

Diaph. martial. ʒij.

Ol. still. Succin. q. s.

M. f. Pilulae pisi minor. magnitud. conspers. pulv. Liquirit. d. ad Scatul. Dosis 8. 10. vel 12. cum vehiculo conveniente.

Sunt qui in recenti adhuc malo Terebinthinam venet. crudam nucistae magnitud. Saccharo involvunt, ac m. & v. deglutiunt, sicque citò sæpiùs curantur. Ditiores de Opobalsamo vel Balsamo de Copaibâ ʒj. vel ʒʒ. assument, unde sordities Ulceris felicissimè extergitur & sanatur.

Vel ℞. Spirit. Terebinth.

Tinct. Succin. ana ʒiʒ.

M. ad Vit. 10. ad 20. gutt. sumantur pro dosi cum Emulsione.

Vel ℞. Bals. ʒris terebinth. ʒij.

Essent. Succin. ʒj.

M. ad Vit. Dos. m. ac v. 20. gutt.

Vel ℞. Essent. Succin.

Ol. Terebinth.

Balsam. de Copaib. ana ʒj.

M. ad Vit. Dos. 15. gutt. m. ac v.

Pro potu ordinario loco Vini vel Cerevisiae bibatur Decoctum Lignorum, & ab omnium salitorum nimis aut acrium ciborum usu abstinetur. Post sex quosque dies Purgans mercuriale reiterari potest, vel superius dictâ, vel sequenti formâ :

℞. Terebinth. Chia Vitello ovi solut. ʒʒ.

Syrup. Violar. ʒvj.

Mercur. dulc. opt. gr. xv.

Aqu. Cinam. bugl. ʒij.

M. f. Potio d. ad Vit. pro dosi.

Vel ℞. Tereb. vitell. ovor. solut.

Elect. Hier. pic. Gal. ana ʒʒ.

Syrup. Ros. sol. f. ʒj.

Salis polychr. ʒj.

Aqu. Meliss. vel

Cham. q. s.

M. f. Potio d. ad Vit. pro dosi.

Vel excavetur Ovum, & cochleare plenum Syrupi Violarum infundatur, dein Terebinth. ʒʒ. & demum Syrupo Violarum repleatur, sicq; hauriatur, quod fit sine ingrato Terebinthinæ sapore. Mercurius autem dulcis per se postea cum Syrupo Ros. sol. simpl. superingeri potest. Vel sequentes Pilulae usuales concinnabuntur, ac in usum trahentur.

℞. Mercur. crud. ritè purgati, & cum pauc. Terebinth. probe subacti ʒiʒ.

Conserv. Rosar. Damascen.

Mell. rosac. ana ʒj.

Pulv. fol. Senæ.

Rhabarb. opt.

Radic. Jalapp. ana ʒij.

Scammon. ℞rat. 3℞.

Cinam. opt. ℞j.

M. f. cum Elix. propr. f. acid. Pilulæ
ex 3j. 10. vel 15. unâ vice deglutiendæ.

Quod si vel *Emulsio*, vel *Julepus*
superior non videantur ad palatum
esse, oportebit nihilominus sequens
Colostrum haurire;

℞. *Terebinth. clar. non lot. 3j.*
Solvatur Vitell. ovor. q. f. & adde

Syrup. de Alth. Fernel.

Elect. catholic. ana 3ij.

Aqu. Artemis. q. f.

M. f. Liquamen tenuius, de quo m.
ac v. duo vel tria cochlearia sumantur.

Sequentes *Pilulæ* quoque egregiè
abstergunt:

℞. *Terebinth. Chia.*

Resin. lign. Guajac. ana 3℞.

Essent. Artemis. 3ij.

Croc. Oli Mart.

Salis Corall. ana 3j.

Caphuræ, Ol. Succ. alb. ana ℞j.

M. f. Pilulæ num. CCXL. de quibus
m. ac vesper. 5. 6. vel 10. capiantur.

Si partes sufficienter deterfsæ
sunt, ipsa que *Stranguria* cessavit, de
seqq. *Pulvere* m. ac v. 3℞. detur:

℞. *Thur. mascul.*

Succin. alb. ppt. ana 3i℞.

Sanguin. Drac. ver.

C. C. phil. ppt.

Diaph. martial.

Salis Corallor.

Unicorn. fossil.

Gumm. Tragacanth. ana 3j.

Camphor. gr. viij.

Sacchar. 3℞.

M. f. Pulv. subtil. d. ad Scatul. cum

Conserv. Ros. rubr. aut Syrup. Viol.
sumendus.

Inveteratis Gonorrhœis opponi
potest *Aqua destillata Ulmarie*, super
novam herbam secundâ vice cohoba-
ta, vel *Aqu. destillata contra Gonor-*
rhœam Quercetani m. ac vesp. ad 3ij.
pota.

Si *Priapismus* vel *Tentigo* Ægrum
valdè molestat, tum vel *Lactis tepen-*
tis, vel *Decocti Malv. Alth. Violarie*,
Parietar. Salvie, *Rutæ*, *Semin. Lin.*
Psyll. aliorumque emollientium fotu
deprimenda.

His verò præstitis, ne malum al-
tius serpat, & Luem veneream accer-
sat, reliquiæ ejus sequenti præserva-
torio *Decocto*, quod simul consolida-
tionem deterforum *Ulcerum* præstat,
exhaustiendæ sunt:

℞. $\frac{1}{2}$ ni crudi crassiusculè triti &
in nodulo ligati 3vj.

Radic. Sarsaparill. 3iv.

Infunde per 24. horas supra cineres
calidos in 12. libris *Aqu. fontan.* dein
coque ad mediæ partis consumption. &
colentur. De colaturâ hâc capiat Æ-
ger singulis diebus cyathos tres; unum
mane tribus ante pastum, secundum
tribus horis post prandium, & tertium
duabus horis post cœnam, continuando
per 15. vel 20. dies. Dein

℞. *Remanentiam Decoct. prædict.*

Aqu. fontan. ℞xv.

Coqu. ad consumptionem 5. partis.
F. Bochetum, quo Æger utatur pro Po-
tu ordinario.

Inter usum hujus remedii nihilo-
minus aliquoties supra dicto modo
corpus purgandum est.

Semi-

Semicupia dein post *Venaſectiones* & *Purgationes* aliquas præmiſſas, jamque per plures dies durante uſu Remedium internorum non ſunt contemnenda, parata ex *Aquâ fluviatili*, cum incoctione *Herbarum emollientium*, addito quoque *Solano*, *Rofis*, *Hyperico* aliisque ſimilibus, quibus humorum ardor temperatur, & partium genitalium empyreuma à venereo viru inductum tollitur. Simul etiam *Injectiones* in Penem aut Vaginam fiant, & quidem ubi ſemen adhuc acre fluit, ex ſolo *Lacte* cum incoctione *Radic. Conſolid.* & *Herb. Lich. petræi*, addendo *Aquam Calc. viv.* cum tantillo *Sacch. candid. alb.* Ubi autem ſemini & puri omnis acrimonia ferè adempta eſt, ſequens vel ſimilis *Injeſtio* parari poterit :

℞. *Radic. Nymph. Irid. flor. aa.* ʒij.
Herb. Plantag. Scord.
Flor. Roſ. rubr. Salv. ana Pij.
Thuris maſcul. ʒij.
 ʒ n. crud. ʒß.

Incis. & contuſ. coqu. in Aqu. fontan. ʒiſſ. *ad tertiæ partis conſumptionem. Colatura clara injicienda eſt calidè.*
 Vel ℞. ʒiii crudi craſſius triti, in nodulo ligati, atq; in olla ſuſpenſi ʒiv.

Radic. Sarsaparill. ʒiſſ.
Ariſtol. rot. ʒiij.

Summit. Hyper.

Flor. Roſ. rubr.

Herb. Lichen. petr. ana Pij.

Coqu. in Aqu. fontan. ʒiſſ. *ad medietatem conſumpt.* *In colatura diſſolv.*

Mell. roſac. ʒij.

M. f. Injeſtio bis de die.

Si verò per ejusmodi *Injectiones* dolor exacerbatur, tum ab illis abſtinendum erit, & ſequens potius adhibenda :

℞. *Hordei integr.* Miſſ.

Flor. Roſ. rubr.

Summit. Hyperic. ana Pij.

Mixt. coque ad ʒbj. In colatur. diſſolv. Mell. roſac. ʒj. *vel ʒij. M. f. Injeſtio* ; cui ſi ſordidius fuerit *Ulcus* & deterſione majore adhuc opus habeat, *Aqua calcis vivæ prima ad ʒij. ulterius admiſceri poterit.*

Notandum tamen, non multum ſemper ſidendum eſſe *Injectionibus*, quocunque tempore uſurpentur ; licet enim *Urethram* vel *Vaginam* expurgent, & detergant, non attingunt tamen ſemper *Proſtatas*, in iisq; latitantem mali radicem. Interim tamen ſi extremitates vel oſtia *Proſtatarum* ſint cicatrice obducenda, ſicque benignior adhuc reſtitans *Gonorrhœa* ſiſtenda, tum *Injeſtio* nihilominus diligens fieri poterit cum *Decocto fortiori Lignorum & Lacte*, in quo *Semen Cydon. Pſyll. Hyperic. Herb. Sanic. Pyrol. Lich. petr.* cocta ſint, addendo vel *Sacchar. cand.* vel tantillum *Aluminis uſti*, vel utrumque ; & ſic ſenſim *Fluxus Seminis* ceſſabit.

Denique ut reſtitantes omnes latentis in genitalibus partibus *Ulceris* reliquæ expurgentur, *Aquarum mineralium*, de *Glo Martis* participantium, aliarumve *Potus* concedendus, prout ſunt *Sualbacenſes*, *ſtadanae*, *Egranae*, *Rhatenſes* &c. frigidae ; item *Piperinae Helveticæ*, *Plumbaria Lotharingica* &c. calidæ.

Durante

Durante Curatione omnes Potus frigidi, Aqua gelida, Vinum, inprimis recens, non defœcatum & acidum; Exercitia corporis nimia, principaliter Equitatio & Concubitus venereus vitentur. Aër hinc frigidus externus, pedum infrigidatio, Cibi falsi, acres, fumo indurati &c. hunc Affectum maximè augent, & Stranguriam intensiorem reddunt.

Gonagra. **GONAGRA**, è Græc. γόνυ, genu, & ἀγχα, captura, composito vocabulo, est dolor arthriticus sive articularis in Genuum articulis à succo crasso, viscido, acido-acri stagnante oriundus. Cùm igitur species sit *Arthritidis*, hinc Lectorem ad Titulum de hoc Morbo tractantem remittimus.

Grando. **GRANDO** est tuberculum rotundum, indolens, in Palpebrâ oculorum enascens. Vid. *Oculorum Palpebrarum Grandinem* suo loco.

Gravidam Curat. **GRAVIDARVM CVRA** est peculiaris Diæta, quæ gravidis sive prægnantibus Fœminis præscribi solet, eum in finem, ut & ipsæ à variis præservari vel liberari morbis, & Fœtus, quem utero gerunt, simul corroborari, atque ad justam maturitatem deduci queat.

Graviditas. *Gravidæ, Prægnantes* sive *Utero gerentes* Fœminæ dicuntur, quæ sub fœcundo coitu conceperunt, i. e. in quibus sub congressu venereo unum vel alterum Ovarii ovulum fœcundatum atque vivificatum, hincque per

tubam Fallopianam in Uteri cavitationem demissum est, ut inibi postea Fœtus in ovulo formatus ac vivus per continuatam semper nutritionem ad justam magnitudinem & molem asurgere, tandemque maturus ex Uteri claustro in hunc mundum protrudat.

Protrusio hæc vel exclusio Fœtus appellatur *Partus*, contingit autem hic, in statu naturali & ordinariè quidem, mense post conceptionem nono, videlicet circa hujus finem aut decimi initium, sive circa hebdomadam quadragesimam, ita ut Fœminæ secundum communem Naturæ cursum per quadraginta circiter septimanas gravidæ maneant, antequam parere cogantur, vel ad Fœtum excludendum stimulentur.

Quomodo autem cognosci possit, Utrum Fœmina prægnans sit nec ne, hoc opus, hic labor, præprimis in illis, quæ non maritatae in suspicionem imprægnationis ceciderunt, & se utero gerere mordicus negant. Multa autem vulgo circumferuntur imprægnationis signa, quorum aliqua etiam ex Urinâ peti posse Uromantes protervi asseverant, quando ex Avicennæ, Arabum Medicorum Principis, oraculo dicunt, Fœminam certò gravidam esse, in cujus Urinâ sedimentum compacto tenui gossypio simile sit, aut filamenta alba simul appareant. Alii juxta Veteres id ex retentione plus minus diuturnâ seminis masculini in congressu venereo hariolari voluerunt. Sunt qui chalybeam novam acum patinæ novæ lignæ

lignæ infigunt, atque urinam Fœminæ superfundunt, cumque dein nubecula quædam acui adhærebit, prægnantem esse audacter pronunciant. Idem significari volunt, quando similis acus in lebetæ aurichalceo per noctem Urinæ fœmininæ immersa, nullo vel rubigine vel nigredine tingitur, sed nonnihil rubella deprehenditur. Mulierculæ etiam aliquæ elixis piscibus adhuc ferventibus Acetum superfundunt; quod si dein odorem inde exhalantem Fœmina tolerare nequit, imprægnatam esse volunt. Nonnulli etiam Medici statuunt, Mulieres paulo post conceptionem sentire nunc horripilationes per dorsum ascendentes, nunc lassitudinem artuum, capitis obtusos dolores, oculos nonnihil cavos, frequentem pallorem faciei, Nauseam, Mensium emanationem sine Febri aut horrore. Deinceps alii ex Hippocrate etiam didicerunt, Fœminam, si cubitum itura cochleare plenum Mellis in Aquâ pluviali solutum deglutiat, ac postridie mane nauseâ, vomitu, torminibus atque tensione abdominis affligatur, certò gravidam esse. Sed hæc omnia signa incerta, fallacia, & communia esse solent tam Gravidis, quàm non Gravidis malè alias ob causas habentibus.

Certiōra autem indicia imprægnationis hætenus deprehensa sunt, v. gr. Mensium emanatio sine Febri, Pallor faciei, Dysoresia, Nausea, Vomitus matutinus aut vespertinus quasi regularis, per aliquot menses, Fastidium carnis, aut Vini, aliqualis

Emaciatio, Mammarum induratio & tantilla intumescencia cum aliquo interdum dolore, Abdomen quoque paulatim majus aut tumidum evadens; tandem sensatio quædam motus membrorum Infantis circa septimanam imprægnationis vigesimam. Prehendit etiam interdum Gravidas quædam imbecillitas Cordis, nec non Pica & Malacia; aut si assuetos desiderant cibos, illos magis frigidos, quàm calentes expetunt. Cervix Uteri in principio imprægnationis percipietur longa, & arctè clausa, in progressu nonnihil brevior evadit, in fine tandem, appropinquante Partu plana valdè, & quasi una cum Utero rotunditas globosa redditur.

Si *Hydrops* adest Uteri loco veræ conceptionis, paulatim quoque cum Utero intumescit Abdomen, & prægnantem Fœminæ statum mentitur, sed dignoscitur hoc à vera imprægnatione, dum in Hydrope non indurefcunt Mammæ, non averfantur hæc aut illa peculiariter edulia Fœminæ, non appetunt absurda, nec motum Infantis post vigesimam hebdomadam à Mensium emanatione percipiunt; subinde urinam non sufficienter excernunt, & pedes earum intumescunt, aut cedematosi redduntur.

*Signa
Hydrops
Uteri.*

Quandoque *Mola* in Utero loco Infantis nascitur, & eadem prope modum cum verâ imprægnatione symptomata parit, sed cognoscitur tamen ex pondere Uteri, si Mola increverit, cervicem gravante, ex defectu motus, quem Infans vivus per-

*Mola ino
dicia.*

cupere facit, & aliis signis suo loco exponendis.

Quòd si porrò Abdomen Fœminarum, quæ suspicantur se gravidas esse, modò intumescat plus minus, aut infletur promptè, modò iterum detumescat; quòd si Mammæ quoque talium Mulierum nunc indurescant, & tumeant, nunc molles iterum, minoresque reddantur. Si juxta hæc interdum animo propemodum linquant, atq; hystericis passionibus affligantur; tum istæ certæ esse possunt, se Prægnantes non esse, sed, cum mensium defectu laborent, suspicionem habere debent vel de Molæ alicujus præsentia, vel de sanguinis intra vasa uterina accumulatione, unde plerunque, ni præcaveatur, Uteri Hæmorrhagia sequitur.

Quid
Vt
gerat Fœ-
mina?

An autem Gravidam masculum vel femellam, unum vel duos Fœtus gestet, non facile divinabis, nisi quòd vulgo credatur, Mulieres Fœtum masculum gerentes ut plurimum esse alacriores, lætiores, ac meliore faciei colore gaudere. Somnium verò est, quando dicunt, masculos in dextro, femellas autem in sinistro magis latere Abdominis hære. Gemellorum verò præsentiam non nisi ultimis imprægnationis mensibus, ex Abdominis majore intumescentiâ, ejus lateribus ambobus valdè repletis aliquo modo cognoscere licet. Somnium iterum est, masculinos Fœtus è dextro, fœmininos autem è sinistro magis ovario prodire. Fortè plus habet fundamenti, quando dicimus, ex feminis masculini maximè copiosi &

volatilis actuosissimi robustissimâ ejaculatione vel masculos, vel etiam gemellos Fœtus concipi atque gigni solere, nisi præexistentia rudimentorum fœtus in ovo obstet.

Quod *Dietam* Gravidarum nunc attinet, generales ipsis regulæ diæticæ præscribi possunt, quarum observatione diligenti ab Abortu & pluribus aliis symptomatibus morbofis præservari, atque Fœtus insuper corroborari queat. Ubi statim regula *Hippocratis* minimè contemnenda venit, quando *Libr. II. Aphorism. 50. & 52.* dixit, consueta licet deteriora sint, insuetis, ut ut melioribus, salubriora esse, vel minus saltem nocere. Ac iterum, quòd sanis conveniat, non satiari Cibis, & impigrum esse ad laborem, saltem moderatum; quodque omne nimium vertatur in Vitium, si apud quoscunque alios Homines, certè apud imprægnatas quoque Fœminas, quæ non unius tantum, sed duarum vel trium simul vitarum rationem habere debent.

Quòd igitur in specie concernit *Res non naturales*, ante omnia *Aër* Gravidis convenit maximè temperatus, ab odoribus fortibus *Croci*, *Carbonum accensorum*, *Candelarum extinctarum*, aliisque sive fragrantibus, sive fœtidis & graveolentibus olfactui valdè adversis, Fœtuique nocivis, liber. Tales enim odores, cum olfactorios Gravidæ nervos maximè percellant, hincque spiritus & massam sanguineam valdè exagitant, facile hystericas passiones, spasmos uterinos, & Abortum excitare, vel Fœtum necare possent. In-

Inter *Cibos* assueti quidem concedantur, sed moderatâ tamen quantitate heic appetitui satisfiat. *Fructibus* proin *horâis* ne nimium indulgeant *Prægnantes*, à quibus facile præternaturalis in *Intestinis* fermentatio, *Diarrhœa*, *Dysenteria*, *Colica* funesta excitari possent. *Aromatum* usus quidem concessus est, sed & ille parvus, inprimis acriorum, spirituosiorumque, quoniam ab his massa quoque sanguinea nimium commoveri, hincque fluxus *Mensium*, *Abortus*, *Lochia* excessiva excitari haud difficulter solent. *Acida* dein *Utero* & *Fœtui* maximè nociva, toto gestationis tempore fugiantur, ab illis enim frequenter & copiosè comestis si non *Uteri* nervosæ tunicæ facillimè irritabiles ad *Spasmos* irritantur, saltem *Fœtui* talis imprimitur succus nutritius, qui ipsum postliminiò ad *Epilepsiam*, *Colicam*, *Atrophiam*, *Scabiem*, & alia plus minùs gravia *Corporis* *Vitia* disponit.

Quoad *Potum*, *Vini* quidem aut *Cerevisiæ* bonæ usum non denegamus *Prægnantibus*, sed tamen si in horum liquorum potatione frequentes committantur excessus, inprimis quando vel nimis generosi & spirituosi, vel facile fermentescibiles, flatulenti, aut acrescentes existunt, *Abortus* quoque acceleratur, vel *Fœtui* maligna diversorum *Morborum* semina imprimuntur; imò ipsi *Gravidæ* *Passiones* hysteriæ, *Tormina*, *Diarrhœa*, *Cholera*, *Vomit*us, *Angustia* pectoris, aliæ conciliantur.

Vigiliæ nimie *Prægnantes* ad Fe-

brim ephemeram, & *Abortum* disponunt. *Veneris* exercitium, præprimis ultimis mensibus ob compressionem ventris nimiam *Fœtui* situm alienum, eumque *Partui* dein nocentem conciliare valet. In principio autem imprægnationis coitus excessivus & æstuans valdè in *Fœcundioribus* subinde vel *Gemellorum* conceptionem, & *Superfœtationem*, vel *Molæ* generationem producit.

Motus omnis vehemens corporis *Motus.* porrò, cursu inprimis aut *Rhedâ* institutus secundinam *Fœtûs* ab *Utero* avellendo, vel æstum sanguini ac spiritibus nimium conciliando, elateremque fibrarum matricis augendo: manuum extensiones violentæ sursum versus, aut ponderum graviorum elevationes *Abdomen* contrahendo, *Diaphragma* per fortiores inspirationem valdè deprimendo, & sic *Uterum* comprimendo, *Abortum* accelerant. Saltus item gravis in pedes ex scamno deorsum factus, in specie primis imprægnationis mensibus, *Secundinam* avellit. *Pedum* divaricationes magnæ & crebræ haud difficulter membranas *Fœtûs* dilacerant. Ultimis tamen mensibus moderatum corporis exercitium *Fœtum* blandè ad *Cervicem* devolvit, sicque *Partum* facilitare potest.

Inter *Animi pathemata* *Ira* præ- *Animæ*
passiones. primis ac *Terror* vehemens nocent, massam sanguinis & spirituum latice valdè turbando, hinc elaterem fibrarum uterinarum nimis augendo, nunc vasa aperiunt sanguinea & *Hæmorrhagiam* excitant, *Abortûs* prodromum,

dromum, nunc Fœtum necant subito, vel ei etiam semina futurorum Insultuum epilepticorum ac spasmodicorum imprimunt. Moderatum hinc gaudium mentis, animusque curis vacuus Gravidis optimè conducit.

*Excreta
& retenta.*

Quoad *Excreta & Retenta* eo est adnitendum studiosè, ut Alvus quotidie aperta existat, ne scybala excrementorum in Intestinis retenta periculosa excitent tormina. Clysmata tamen & suppositoria præcipuè acria sunt vitanda, ne factâ in Intestino recto irritatione simul Vagina Uteri artè connexa irritetur, & Spasmodum matricis producendo Abortum acceleret. Ad fluidam Alvum servandam conducunt ante omnia Cibi emollientes Olerum hortensium quotidie comesti, Juscula varia, in quibus *Malva*, *Beta*, *Brassica*, *Blitum*, *Mercurialis*, *Cherifolium*, *Lactuca*, *Portulaca*, *Endivia* fuerunt decocta, *Phaseoli*, *Pisa*, *Fabæ*, *Pruna Damascena* ac similia. *Butyrum* etiam cum *Melle* quotidie mixtum, imò *Oleum Olivarum* sæpius assumptum idem præstat. *Syrupus macrobius* sive præservativus, singulis diebus mane ad cochleare plenum deglutitus, alvum quoque tenet apertam. Alii hoc efficere & conciliare beneficium nituntur, subinde *Cremorem Tartari* ad ʒß. cum vel sine *Salis Fri* ʒß. mixtum in Jusculo exhibendo. Aliquæ Fœminæ interdum pro laxitate Alvi conservandâ etiam *Oleum Amygdalar. dulc. rec. expr.* ad ʒj. vel ʒij. deglutiunt. Idem faciunt *Ova sorbilia* frequenter hausta, nec non *Pruna* vel

Passulæ minores cum Foliis Sen. Tamarindis, & *Cremore Fri laxativæ* redditæ: Commendare etiam licet usum *Panaceæ solutivæ alcalinæ*, citra Tormina alvum expedientis. Vel poterit *Pulvis laxans* in fractâ dosi subinde usurpari: v. gr.

℞. *Crem. Fri* ʒj.

Semin. Anis. ʒj.

Sacch. cand. alb. ʒiij.

Radic. Jalapp. ʒij.

M. f. Pulv. subtil. d. ad ch. ac inde sumatur necessitate urgente cuspis cultri major vel minor pro re natâ.

Quod si Prægnans malit formam *Electuarii*, huic sequens concedere poterimus:

℞. *Pulpæ Passular. minor.* ʒiß.

ʒn. diaphor. non edulcorat. ʒj.

Succi Tamarind. ʒß. vel

Crem. Fri ʒij.

Semin. Fœnicul. pulveris. ʒß.

Syrup. Fl. Acac. q. s.

M. f. Elect. d. ad Pyxid. Dosis subinde magnitudo duplicis Castaneæ.

Vel *Bolus* etiam laxans frequenter deglutiri potest ad aperiendam Alvum:

℞. *Pulpæ Tamarindor.* ʒiijß. ad ʒß.

Fri vitriol. gr. vj. vel viij.

Radic. Jalapp. gr. ij. vel iij.

Syrup. de Cich. cum Rhab. q. s.

M. f. Bolus unâ vel duabus eadem die vicibus deglutiendus.

Quod si quotidie mane vel vespere cochleare plenum *Syrup. de Cich. cum Rhabarb. vel Flor. Persic. aut Acac.* cum multiplici Infusione paratum, deglutiendum præbebis, effectus etiam quæsitus sequetur. Horstius in

Obser-

Observationibus suis commendat Ele-
ctuarium de Tamarindis pro laxandis
Gravidarum primis viis. Aloë &
Aloëtica omnia, Cassia, Manna, Sena
in pulvere Prægnantibus valdè no-
cent. Rhabbarbari autem radix ma-
gis amica deprehenditur; atque hinc
sequens Pulvis usualis suaderi posset:

℞. Rhab. elect. 3iβ.

Radic. Jalapp. ℥ij.

Crem. Fri 3j.

Semin. Anis. 3β.

† n. diaphor. ℥iiij.

Macis. ℥j.

Sacch. alb. 3vj.

M. f. Pulvis subt. d. ad chart. Dosis
subinde 3β. ad ℥ij. plus minus cum re-
gimine Diætæ.

Vel ℞. Rhab. elect. 3ij. ad 3β.

Herb. Card. bened.

Scabios. Malv. ana Mβ.

Semin. Fœnic. 3iβ.

Incisis, contusis & in nodulo ligatis
affunde

Vini albi veteris Mens. j.
sive ℥iiij.

Singulis dein partibus illius duæ vel
tres plus minus uncie exhauriantur;
subinde novum Vinum superfundendo,
quousq; virtus ingredientium aliqua
affuerit.

Deinceps Gravidæ plures solent
esse sollicitæ de Foetum, quos ge-
stant, robore & vivacitate, quam
quidem non solum Diætæ exactæ
observatione, sed & aliquibus medi-
camentis quærere ac obtinere solent.
In hunc proin finem Officinæ habent
Balsamum Embryonum, de quo fre-
quenter cochleare plenum assumunt.

Vel hujus loco concedi potest Aqua
Cinamomi cydoniata, borraginata, aut
buglossata, per cochlearia etiam in-
terdum danda. Syrupus, Succus &
Miva Cydoniorum, Cinamomo, Mace-
re, Nuce moschatâ aromatisata simi-
liter conveniunt. Vel de Vino aro-
matisato quodam subinde aliquid in
pastu bibant; v. gr. Cinamomum,
Nucem mosch. Cardamomum Cubebas,
Calami arom. Caryophyllat. Bistortæ,
Levistici, Scorzonera, Angelicæ ra-
dices in sacculo ligando, hinc Vi-
num desuper affundendo, atque Sac-
charum pro lubitu etiam addendo.
Vel Amygdalas dulces rec. excorticatas
cum Mellis tantillo quotidie vel sæpè
deglutiendas comedant. Laudant
aliæ Amygdalata, ex Amygdalis dulc.
cum Passulis min. Syrupo paucò Cydo-
niori, & Seminum Fœniculi subactis, pa-
rata, & crebrò exhibita. Interdum
post pastum cochleare tantum Vini
Malvat. vel Hungarici, vel Frontinia-
ci aut similis aliûs exhauriant. Ex-
terne profunt Epithemata varia Um-
bilico applicata; ita enim solent fru-
sta Panis Malvatico subinde Vino, aut
Spiritu Cerasorum nigrorum, Aquâ
vitæ Mulierum, Balsamo Embryonum,
Spiritu matricali, aut similibus irro-
rare, & calidè multoties applicare.
Vel Frustra panis communis tosta pul-
vere Cinamomi, Galangæ, Nucis mo-
schatæ. Calam. arom. Cyperi &c. con-
sparguntur, & aliquo Spirituum mo-
dò laudatorum irrorata calidè admo-
ventur. Potest & eundem in finem
Emplastrum diapalma cum Nuce mo-
schatâ, Mastiche, Radice Tormentillæ,

Yyy 3

Terrâ

Terrâ sigillatâ, Tereb. Pice & Cerâ permisceri, sicque in formâ Emplastri lumbis applicari. Vel sacculus interpassatus construatur, Herbis Majoranæ, Ocymi, Melissæ, Menth. Matricar. Anethi, Abrotoni, Seminib. Anis. Fœnicul. Carv. Coriandr. Aneth. Florib. Chamomill. Anth. Spic. Stæchad. Radicibus Zingiber. Cyperi, Zedoar. Cinnamonom, Macire, Nuce mosch. Garryophyllis arom. & similibus replendus, ac ita calefactus vel siccè, vel Spiritu quodam generoso conspersus umbilicali regioni applicetur.

Venæse-
ctio in
Gravida-
dis.

Quæstio heic incidit, annon Fœtui quoque conducatur, si Mater subinde venam sibi curet aperiri, & sanguinis sex plus minus uncias effluere? Respondemus autem, *Venæsectionem* nonnullis quidem Gravidis utilem imò necessariam esse, ad Fœtum retinendum, ac roborandum, Abortumque præcavendum; aliis verò inutilem, imò noxiam existere. Distinguendæ nimirum sunt Fœminarum complexionones, quæ enim Plethoricæ sunt, habitu athletico præditæ, & sanguinem etiam acriorem habent, ac eapropter ad abortiendum proclives existunt, illis *Venæsectio* non semel tantum, sed bis vel ter, aut etiam pluries toto gestationis tempore venit instituenda, tertio, quinto & octavo mense, in Brachio, non in Pede. Conducit etiam *Venæsectio* in Plethoricis paulo ante partum ad hunc facilitandum. Quæ autem Fœminæ succulentæ non admodum sunt, adeoque sanguinis quantitate non sunt præditæ, quibus venæ ar-

tuum non tument, in his *Phlebotomia* plus damni quàm utilitatis affert.

Inter *Symptomata* Gravidarum primò occurrit *Nausea*, horum illorumq; *Ciborum fastidium*, atq; *Vomitus*, adeo interdum miseras primis ut plurimum, sed & interdum aliis ingravidationis mensibus, & quidem nunc mane, nunc vesperi exercens, ut inde emacientur valdè, & in periculum Abortûs delabantur. Cum autem hæc mala ab acribus humoribus, propter suppressos menses in Ventriculi cavitatem labentibus, inibique fibras nerveas spasmodicè crispantibus oriuntur, necesse est, ejusmodi humorum acrimoniam salsam destruere, aut invertere, vel etiam per vias urinæ aut insensilis transpirationis blandè expellere. Equidem primis gestationis mensibus ipsi Naturæ permittitur hæc Affectio, quoniam per se tandem circa medium tempus cessare solet, & quidem eo citius, quo crebrius Gravidæ vomunt, hincque feliciter etiam Puerperium consequuntur. Quando autem diutius protrahitur *Vomitus*, tum *Venæsectio* administrata prodest, atque simul remedia absorbentia & præcipitantia in usum trahenda; præmisso tamen laxante aliquo remedio *Rhabbarino*, v. gr.

R. Rhabarb. elect. 3j.

Crem. Fri gr. iv.

Ol. still. Mac. gutt. j.

M. f Pulv. subtil. d. ad ch. pro dosi cum Jusculo farinaceo sumendâ.

Vel R. Extract. Rhabarb. gr. xij.

Massa pilul. Marocost. gr. vj.

Resin. Scammon. gr. ij.

Ol.

Ol. stillat. Carv. q. s.

M. f. Pilulæ num. 12. dentur pro dosi.

Vel R. Syrup. de Cichor. cum Rhab. ʒij.

Elect. è Succ. Ros. ʒii. ad ʒj.

Aqu. Meliss. 3vj.

Fenic. ʒß.

Cinam. cydoniat. ʒij.

M. f. Potio, detur pro dosi matut.

Conducit etiam Syrupus Fl. Persic. & Acac. aut Infusum fol. Senn. & Rhabarb.

Deinceps verò sequentes Pulveres egregiè Vomitus compescunt, v. gr.

R. Corall. rubr. ppt. ʒiiij.

Ocul. ʒ. ppt.

Diaph. ʒial. ana ʒij.

Nuc. mosch.

Semin. Fenic. ana ʒj.

Sacch. alb. ʒß.

M. f. Pulv. subt. d. ad Scat. Ter quotidie cuspis cultri plenus capiatur.

Vel R. Pulv. stom. Birckm.

Specif. stomach. Poter.

Ebor. s. ign. ppt. ana ʒiiij.

Mastich. elect.

Semin. Anis. ana ʒij.

Oli ʒtis ʒj.

Sacch. cand. alb. vel

Elæosacch. Citr. 3vj.

M. f. Pulv. subtil. d. ad Scat. Dosis ut supra.

Vel R. Bol. Arm. ppt.

Unic. fossil.

C. C. ust. ppt. ana ʒij.

Salis Absynth. vel

Cichor. aut Cent. min. ʒj.

Elæosacch. Cort. Aur. 3vj.

M. f. Pulv. subtil. d. ad Scat. Dosis ut supra.

In formâ liquidâ prodest Liqu. Terræ fol. ʒri ad ʒj. vel ʒß. aliquoties cum Syrup. flor. Aurant. & Aqu. Plantag. sumtus. Vel Spirit. Salis arm. anis. ad guttas 15. aut 20. pluries cum simili vehiculo propinatus. Vel

R. Aqu. Fenic.

Meliss.

Card. bened. ana ʒj.

Cinam. cydon. ʒß.

Bals. Embryon. ʒiiij.

Syrup. Card. bened. 3vj.

Liqu. Terr. fol. ʒri.

Tinct. Mart. aperit. ana ʒß.

M. d. ad Vitr. Ter vel pluries quotidie cochleare plenum hauriatur.

Vel Aqua Menth. Pulegii, Plantaginis, Borrage, Burs. Past. Naph. pro vehiculis sumuntur. Syrupi etiam de Absynth. Pulegio, Menthâ, Cinnamon. Cydonior, Ribium, de Agrest. flor. Tunic. addi possunt. Laudamus quoque usum Spiritus Vitrioli Martis Zwelf. Spirit. Mastichis, Tinctur. Corall. ʒnii, Salis volat. oleos. Sylv. Essent. carminat. Wedel. Zedoar. Absynth. Vidimus etiam sæpius ab haustu repetito Acidularum quàm felicissimè sedatos esse Vomitus, præcipuè in cholericis complexionibus. Vel

R. Conserv. Ros. rubr. ʒj.

Menth. ʒß.

Conf. Hyac. inc. ʒj.

Pulp. Cydon. cond. ʒij.

Unic. fossil.

Bol. Arm. ppt.

Specif. stom. Pot.

Cond. Nuc. Ind. ana ʒij.

Syrup. de Card. ben. q. s.

M. f.

M. f. Elect. d. ad Oll. Ter quotidie magnitudo nucistæ capiatur.

Externè regio stomachi inungi potest Balsamo Peruv. Oleo expr. Nucistæ, & destillato Macis, Cumini, Menthæ, Carvi, Mastich. &c. Imponitur quoque Emplastrum stomachale Cratonis cum Tacamahaca, Theriaca &c. Vel Crusta panis Vino malvatico, aut rubro bono alio immersa, atque pulvere Nucis mosch. Zingib. Cinam. Garryophyll. Cubeb. Piperis, Calami arom. Galangæ, Mastich. conspersa, admixto simul si velis Fermento Panis.

*Malacia
& Pica.*

Malacia & Pica Gravidarum à Liquoris gastrici specificâ quadam alteratione, per accedentes ex sanguine moleculas falso-acriusculas certâ configuratione præternaturali instructas, producantur, ita ut in *Malaciâ* quidem appetitus ac desiderium rerum esui aliâs consuetarum, sed crudarum ac minimè præparatarum, v. gr. carnis crudæ Animantium, ac similibus; in *Picâ* autem cupiditas edendarum rerum planè absurdarum, v. gr. carbonum, arenæ &c. excite-
tur. Uterque Affectus nihil periculosi alit in recessu, ita quidem, ut appetitu nimium urgente subinde usum vel deglutitionem rerum esui aliâs non ineptarum, tanquam morbi remedium concedere possimus, cum non rarò Prægnans tales Cibus, quorum desiderio tantopere flagrat stomachus, facile ferat ac digerat, quæ non Prægnans maximè respueret, aut tolerare nesciret. Commendant verò aliâs in his Symptomatibus Succos Cydonior. Citr. Limonum, Aurant. Sy-

rupos de Absynth. Card. bened. Matri-car. flor. Aurant. Cinam. Cortic. Citr. Aurant. Granator. Ribium, Berber. Aquam Pampinor. Vit. vel tenellorum foliorum Vitis destillat. Menthæ, Puleg. flor. Aurant. Card. bened. Centaur. minor. Corpus tamen etiam laxandum est Syrupis v. gr. de Cich. cum Rhab. ad ℥iij. dato; hinc verò absorbentia in usum vocentur, quemadmodum sub Titulo de Pica suo loco monuimus.

Termina Ventris aut Colica Prægnantium ab humoribus acido-acribus vel flatibus quandoque Intestino-
rum oriunda, absorbentibus, diaphoreticis & carminativis abiguntur, postquam primæ viæ potione Rhabarbarinâ, vel aliquot dosibus Panaceæ solut. alcalin. evacuatae fuerunt. Hæc igitur sequentia conveniunt: v. gr.

R. ½ n. diaphor.

Crysell. alb. ppt.

Pulver. Viper. ppt. ana ℥ij.

Cinnab. ½ n. rectif. 3℔.

Ol. still. Fœnic.

Carv. ana gutt. iv.

Sacch. alb. 3j.

M. f. Pulv. subt. div. in 6. dos. æqu. ad ch. m. & vesp. capiendas.

Vel R. Ocul. ̄ ppt.

Corall. rubr. ppt. ana 3ij.

Radic. Zedoar. 3℔.

Semin. Fœnic.

Anis. ana 3j.

Flaved. Cortic. Aurant. 3ij.

Laud. opiat. gr. vj.

Sacch. alb. 3℔.

M. f. Pulv. subt. d. ad Scat. Dosis ter quotidie cuspis Cultri cum Vino, aut alio vehiculo.

Vel

Vel ℞. *Aqu. carminat. Dorncr. ℥ij.*
Chamomill. ℥j.
Cinam. bugl. ℥ss.
Essent. carminat. Wedel. ℥ss.
Syrup. de Cort. Aurant.
Capill. ♀ r. ana ℥iij.
M. d. ad Vitr. Singulis sex horis ali-
quot cochlearia plena hauriantur.
 Vel ℞. *Aqu. physogon. ℥iijss.*
Card. bened. 3vj.
Syrup. Capill. ♀ r.
anodyn. ana ℥ss.
Spirit. Nitr. dulc. ℥ss.
Essent. Zedoar. ℥j.
Misc. d. ad Vitr. Sumatur coch-
leatim.
 Vel ℞. *Destillat. Hippenteror. 3vj.*
Aqu. Puleg.
Meliss. ana ℥j.
Ol. stillat. Cumin. gutt. xij.
Cort. Aurant. gutt. vj.
Sacch. alb. ℥iij.
M. d. ad Vitr. Sumatur tribus vel
quatuor dosibus.

Aqua etiam Vitæ Mulierum, Eli-
xir Vitæ Matthiol. Balsam. Embryon.
 conveniunt, si subinde cochleare
 plenum de illis sumatur. Potest ve-
 rò cum hisce commodè etiam quod-
 dam *Oleum destillatum carminativum*
 permisceri.

Extus totum Abdomen, ac inpri-
mis Regio umbilicalis quotidie bis
vel pluries calidè inungi potest Oleo
Rutæ, Aneth. Chamomill. Absynth.
Menth. Lauri, è floribus Slotan. ex-
presso Seminis Hyoscyam ac Papav. alb.
aut simili, quod acuari adhuc potest
Ol. destill. Chamomill. Carv. Anis. An-
gelic. Fœnic. Rutæ, Aneth. Vel Sac-

culus Herbis, Radicib. & Seminibus
carminativis repletus atque interpaf-
satus, calefactusque Abdomini im-
ponitur, desuper ulterius applicando
Pellem vel felinam vel leporinam, vel
cygneam.

Diarrhœa Gravidarum, ab humo- *Diarr-*
rhœa.
ribus seroso-salsis, aut biliosis excitata,
 in principio quidem aut progressu ge-
 stationis non diu ferenda, quia Te-
 nesmum & Abortum facilè post se
 trahit, si nimia fuerit. In fine au-
 tem, nisi vehemens admodum ac la-
 boriosa extiterit, naturæ permitti
 potest, tanquam res facilem postli-
 miniò, felicemque Partum procu-
 rans, quoniam cum euphoriâ sæpius
 Diarrhœas Gravidæ ferunt. Tale
 itaque symptoma, si laborem Ægro-
 tanti pariat & periculum Abortûs
 inferat, vires atterendo, spiritusque
 dissipando, tunc sedandum est illud,
 stomachusq; roborandus. Poterimus
 tamen statim *Rhabarbarum* in sub-
 stantiâ solum ad 3j. cum *Jusculo bor-*
deaceo, avenaceo, aut farinaceo exhi-
bere: deinceps verò blanda adstrin-
gentia, & aromatica confortantia
conveniunt, v. gr. Roob Cydoniorum,
Cydonia condita, Syrupus Cydoniorum,
cum Aquâ Cinnam. cydoniat. Terra si-
gillat. Bolus Armen. ppt. Unic. fossil.
Mater Perl. ppt. Corall. rubr. & alb.
ppt. Sanguis Drac. ver. Ebur. ust. ppt.
Radices Tormentill. Bistort. Quibus
etiam Theriacam, Electuar. Orvietan.
ac Diascordinum Fracast. non secus at-
que anodyna blanda jungimus. Se-
quentes formulæ hinc convenienter
præscribuntur:

Zzz

℞. Con-

Rx. *Conserv. Rosar. rubr. Qlat. ʒiʒ.*
Nuc. mosch. condit.
Conf. Hyac. inc. ana ʒj.
Conditur. Carn. Cydon. ʒij.
Unic. fossil.

Corall. rubr. ppt. ana ʒij.
Syrup. Myrt. vel Corallor. q. s.
M. f. Elect. d. ad Ollam, ac sæpius
inde magnitudo Nucistæ deglutatur.

Vel Rx. *Conf. Fl. Tun. ʒj.*
Plantag. ʒʒ.
Condit. rad. Symph. ʒj.
Bacc. Cynosb. cond. ʒij.
Theriac. Andr. vel
Elect. Orviet. ʒj.
Matr. Perl. ppt.
Bol. Arm. ppt. ana ʒʒ.
Syrup. Cydon. q. s.

F. Mixtura ad formam Opiatæ, de
quâ subinde magnitudo Castaneæ su-
matur.

Vel Rx. *Extr. Symphyt. ʒj.*
Cort. Tamar. ʒʒ.
Corall. rubr. ppt. ʒij.
Succ. Catechu. gr. vj.
Laud. opiat. gr. ij.
Ol. destill. Mac. q. s.

M. f. Pilulæ num. 40. Inaur. d. ad
scat. Dosis num. 8. man. ac vesp. cum
Decocto ordinario.

Vel Rx. *Extract. Tormentill. ʒj.*
Absynth. ʒʒ.
Sangu. Drac. ver. gr. xvj.
Mastich. elect. gr. xij.
Croc. Mart. adstring. gr. viij.
Ol. stillat. Mac. q. s.

M. f. l. a. Pilulæ num. 32. Inaur. d.
ad scat. Dosis 8. mane ac vesp. cum
Emulsione Amygd. dulc.

Vel Rx. *Conserv. Ros. antiqu. ʒj.*
Extract. Tormentill. gr. vj.
Elect. diase. Frac. ʒʒ.
Terr. sigillat. ʒʒ.

Cum Sacch. alb. f. Bolus d. ad char.
Sumatur pro dosi, & aliquoties repe-
tatur.

Externè Theriaca vel Mithrida-
tium cum Pulvere Mastichis, Tacama-
hacæ, Nucis moschat. Oleo myrtin. Cy-
donior. Cerâ & Pice in Emplastri for-
mam redigatur, & stomacho atqu
Umbilico applicetur. Vel Cataplas-
ma fiat è Cydoniis aut Pyris austeris in
Vino rubro coctis, cum Fermento panis
Mastiche, Myrrhâ, Macere, Nuce mo-
schatâ, Radic. Calam. aromat. Bistort
Tormentill. Garyophyll. arom. Menthâ.
Ocymo, & calidè linteo obductum
applicetur.

Odontalgia Gravidas etiam non ra-
rò valdè excruciat, originem non nisi
à Lymphâ falsâ, acri, subinde scor-
buticâ, in Tunicâ oris glandulosâ cu-
mulatâ, stagnante, & hinc fibras ner-
veas plus minus potenter irritante atq;
crispante ducens. Ad sedandum proin-
hunc cruciatum primæ viæ blando la-
xante, sicut in superioribus Sympto-
matibus invenitur, statim mundan-
dæ sunt: hinc Decoctum Radic. Alth.
Malv. Imperator. Zingiber. Cyperi,
Herbar. Absynth. Aneth. Abroton. Me-
liss. Salviæ, Oxylapath. Urtic. major.
Flor. Chamom. Melilot. Ficum, Semin.
Anis. Fœnic. in Aquâ & paucò Aceto,
vel si scorbutici quid subest, loco Aceti
in Lactē factum sæpius in ore calidè
detineatur. Vel Nicotianæ, aut So-
lani folia cum Florib. Chamom. in Aquâ
coquan-

coquantur, hocque decoctum postea sæpius ore teneatur, nihil prorsus deglutiendo, ne Vomitus excitetur. Vel grana aliquot Laudani opiatum in Essentiâ Lignorum solvantur, & Gofypio excepta dentibus dolentibus applicentur, addi potest Spiritus Vini, vel theriacalis camphorat. cum Oleo destill. Buxi, Gar. ophyll. arom. Piperis, Rorismar. Thym. Cephæ aliquoties volâ manuum teneantur, donec valdè incaluerint, sic dolor frequenter sedari observatur. Emplastra quoque è Tacamahacâ, Mastlicke, Styrac. calamit. Pice, Cantharidibus, & Terebinthinâ concinnantur, atque magnitudine thaleri temporibus applicantur, inibique relinquuntur, etiamsi forsan elevent vesiculas, & hinc ferum fundant plus minus copiosum.

Quando Uterus Gravidæ à contentis suis valdè distenditur, tum ligamenta simul ipsius in Lumborum & Coxendicum regione præternaturaliter expanduntur, & Uterus quoque magis subsidet ac ad anteriora protruditur; unde Dolores Pubis, Coxendicis & Lumborum enascuntur; pro quibus leniendis & dissipandis Venæsectio in Plethoricis valdè conducit, non secus atque alvum subduens blandè remedium, quemadmodum esse solet Panacea solutiva alcanâ, quæ tutissimè à Gravidis æquè c à Puerperis usurpari & assumi potest. Deinceps verò litus institui debent anodynæ & emollientes, quem in-

R̄. Olei e flor. Slotan. ℥j.
Chamom. ℥ss.

Lumbr. terr.

Sem. Papav. alb. express.
ana ʒij.

M. d. ad Vitr. Usurpetur bis vel ter quotidie.

Vel R̄. Olei Aneth. Verbasco.

Chamomill. ana ʒss.

destill. Juniper. ʒj.

Sem. Hyosc. expr. ℥iiij.

Misc. d. ad Vitr.

Vel laventur Partes dolentes subinde Spiritu Juniper. Anthos, Lil. conv. Anhaltino, Lumbric. terr. Essent. Opii liquid. ac Tincturâ Succini.

Fit quandoque, ut unum alterumve Ligamentum Uteri, ob nimiam expansionem rumpatur, quod etiam cum aliquo fragore contingere potest. In hoc casu perpetuum ferè dolorem atque cruciatum Ægræ patiuntur, ut nullo sibi meliore auxilio levamen afferre queant, quàm Fasciâ aut Subligaculo Abdomen involvendo ac suspensum tenendo, simulque Oleo quodam superiore quotidianum Litum instituendo.

Non est infrequens dein quibusdam Prægnantibus Cordis Lipothymia ac Palpitatio, quarum illa quidem originem ferè debet teneræ admodum fibrarum nervosarum texturæ, & hinc interdum debilitatæ sanguinis circulationi; hæc verò à sanguinis exundantiâ atque commotione vehementiore ut plurimum certè derivari potest. Ad Palpitationem itaque curandam ac radicitus extirpandam, si Fœmina succulenta existat, Venæsectio statim præscribenda venit; post illam verò conducunt

Lipothymia, Palpitatio Cordis.

diaphoretica alcalina, cum blandis volatilibus miscenda ; v. gr.

*R̃. Matr. Perlar. ppt.
Corallor. rubr. ppt.
Bezoard. miner. ana ʒiij.
Cinnab. nat. opt. ʒij.
Salis volat. C. C. ʒj.
Sacch. alb. ʒß.
Semin. Anis. ʒß.*

M. f. Pulv. subt. d. ad scat. Quotidie ter inde sumatur ʒj.

*Vel R̃. Spirit. Cochlear. ʒiij.
Tinct. Corallor. cum Spirit. Cordis Cerv. vel cum Nitr. parat. ʒij.*

M. d. ad Vitr. Sumantur m. ac v. 20. vel 25. gutt. cum Aqu. Card. bened. Borrage. Fl. Til.

*Vel R̃. Aqu. Meliss. Scabios.
Fl. Acac. ana ʒj.
Syrup. Capill. ♀ r. ʒß.
Spirit. C. C. volat. sine oleo ʒß.
Conf. Alk. compl. ʒij.*

M. d. ad Vitr. Sumatur cochleatim. Conducunt etiam Balsam. Embryon. Confectio Alkerm. cum Succo Citri, Solutio Corallorum vel Matris Perlar. cum eodem Succo facta, & Saccharo edulcorata ; Elixir Citri, Aqua cordialis temperata Herculis Saxon. Aqua Cordis Cervi composita, vel Cynamomi cydon.

Externe regioni scrobiculi Cordis applicari potest linteolum Spiritui Anthos, Melissæ, Anbaltino, Aquæ vitæ Mulierum immersum, cum Confect. Alkerm. incompl.

Syncope.

In Syncope ea aguntur, quæcunque sub titulo de Lipothymia sunt adnotata ; inprimis autem interne qui-

dem profunt Tinctura Succini, Aqua vitæ cum Castoreo, Spiritus Salis armon. urinos. volatil. Balsam. Embryon. Tinctur. Castorei cum Spiritu Salis armon. parat. Ambra gryseæ, aliis permiscenda, Spiritus theriacalis camphorat. & similia. Externe verò Naribus admovenda, quæ sub Titulo de Lipothymia, & Passione vel Affectione hystericâ fusius laudata sunt.

Tussis Gravidis quandoque consuevit esse molestissima, etiam ad Partum usque sæpius sine intermissione durans ; à Lymphâ tenui, vel crassâ acri, perpetim è Sanguine in vesiculas & glandulas pneumonicas destillante oriunda. Quandoque & à mucro acri, sive cruditate Ventriculi viscidâ mucilaginosâ originem ducit. In priore Tussi, quæ noctu præcipue Gravidas torquet, temperantia, ac demulcentia maximè conveniunt, præprimis si primæ viæ aliquot Panaceæ alcalinæ solutivæ dosibus sumtis purgatæ fuerint. Commendamus itaque heic frequentia Juscula hordeacea, avenacea, ex Orizâ facta, Lac item & Lactinia. Pro Potu ordinario conducit maximopere Decoctum Radic. Liquirit. Filic. Tussilag. Sarsaparill. Chin. Alth. Herb. Veronic. Beton. Ligni Guajac. Sassafr. Hordei integr. Rasur. C. C. Ficum, Passular. major. excort. Jujubar. Semin. Anis. Fœnicul. Deinceps Linctus vel Eclegmata magni fiant : v. gr.

R̃. Diacod. Mont.

Loob. de Pulm. Vulp.

Syrup. Bell. min. ana ʒj.

Ol. Amyd. dulc. rec. expr. ʒvj.

Specier.

Specier. diatrag. frig. 3j.

Misc. d. ad Ollam, & lambatur cum baculo Liquirit.

Vel R. Pulpæ Passular. min. 3vj.

Syrup. de Farfar. de Liquir.

Viol. purpur. ana 3j.

Aqu. Veronic.

Scab. ana 3ß.

Balsam. Embryon. 3vj.

M. d. ad Vitr. Sumatur frequenter cochleare plenum.

Vel R. Ol. Amygd. dulc. rec. expr. 3iß.

Axung. Can. rec. 3iij.

Spermat. Cet. rec. 3j.

Essent. Croc. 3ß.

Sacch. cand. alb. 3ß.

Syrup. de Jujub. 3vj.

M. d. ad Ollam, ac crebrò aliquid cum Baculo Liquiritiæ lambatur.

Vel R. Spec. diair. simpl.

diatrag. frigid. ana 3j.

Corall. rubr. ppt.

Bol. Arm. ppt. ana 3iß.

Radic. Alth. pulveris. 3vj.

Spermat. Cet. rec. 3j.

Conf. Alk. incompl. 3ij.

Sacch. cand. alb. 3iij.

Mucilag. Gum. Trag. Aqu. Veron. fact. q. s.

M. f. l. a. Trochisci d. ad Scatul. & frequenter lambantur.

Euporiston est, neque contemnendum tamen, si vel Ficus, vel Passulæ, Saccharum cand. rubr. aut Cremor. Hordei Saccharatus, super quæ Spiritus Cerasor. nigr. aut Vini rectificatus deflagravit, lambantur. Infusum folior. Thée, Betonic. Veron. atque Chamædr. cum Hordei Cremore saccharat. sæpius bibatur. Nocte cubi-

tum itaræ de sequentibus Pilulis Catarrhalibus quoque capiant:

R. Mass. Pilular. è Styrac. 3ß.

Gumm. Guajac. 3j.

Flor. Benzoin.

Extract. Beton. ana 3ß.

Ol. stillat. Anis. q. s.

M. f. Pilulæ num. 70. Consperf. Pulver. Liquir. d. ad Scatul. Sumantur 7. 8. aut 9. pro dosi.

Si Tussis fuerit humida, stomachica, magis diurna, tum stomachica potius conducunt ea; alterantia, incidentia, v. gr. Species diair. simpl. aut compos. Species Imper. Radices Helenii, Aronis, Angelic. Cyper. Aristol. rot. ver. Succus Cepar. Raphan. hort. Raparum, Semina carminativa, Aquæ antasthmaticæ qualescunq; Syrupi de Hyssopo, Hed. terr. Marrub. Helen. Polio, Essent. Helen. Beton. Galang. Zedoar. Bals. Sulphuris anisat. Spirit. Ceras. nigr. Ros Solis, Liqueur Spirit. Angelic. Aurantior. Aqu. Vit. Balsam. Embr. unde sequentes formulæ conveniunt:

R. Aqu. Veronic. Scabios. ana 3iß.

Hyssop. 3ß.

Spirit. Meliss.

Angelic.

Essent. Helen. ana 3j.

Sacch. cand. alb. 3iij.

M. d. ad Vitr. Sumatur cochleatim.

Vel R. Aqu. Fœnic. Levistic.

Fl. Acac.

Syrup. Sceletyrbic.

pectoral. balsamic. aa. 3j.

M. d. ad Vitr. Dosis subinde cochleare plenum.

Zzz 3

Vel

Vel R₂. *Spec. diair. simpl.*

aromat. ros. ana ℥ij.

Radic. Aron.

Helen.

Angelic. ana 3℔.

Ocul. ☉. ppt. 3ij.

Diaph. 2vial. 3j.

Semin. Anis.

Fenic. ana ℥iib.

Sacch. cand. alb. 3iij.

M. f. Pulv. subt. d. ad scat. Bis vel ter quotidie capiatur 3j. plus minus.

Vel R₂. *Radic. Helen. Aristol. rot. ver.*

Scillæ ana 3iij.

Herb. Veronic. Mj.

Hyssop.

Flor. Bell. min. ana M℔.

Semin. Anis. 3ij.

Passular. maj. exac. 3ib.

Incis. & contus. coqu. in mediâ parte Vini albi, & Aqu. font. De Colaturâ ter quotidie 3ij. vel 3iij. Syrup. Jujubino edulcoratæ hauriantur.

Vel R₂. *Looch. san. & expert.*

Syrup. de Hyssop.

Sceletyrb. ana 3j.

Elix. Vit. Matth. 3vj.

Aqu. Scab. 3ib.

M. d. ad Vitr. Hauriatur cochleatim.

Vel R₂. *Elix. Angelic. 3vj.*

Essent. Helen.

Trisol. fibr. ana ℥ij.

M. d. ad Vitr. Mane ac vesp. duo cochlearia hauriantur.

Prodest & Vinum Malvaticum, Hispan. Hungar. aliudve simile generosum, quotidie ad aliquot uncias sumtum.

Accidit etiam aliquando Plethoricis Fluxus Sanguinis è pudendis, qui

si periodicè, primis aliquot mensibus, tempore menstrui Fluxûs ordinarii, sine cruciatu aut dolore, pedetentim & modicè è Vaginâ Uteri contingit, matricis cervice interea probè clausâ, tum non sistendus est, sed naturæ permittendus tanquam res non inutilis, & Abortum præcavens. Si autem confertim & continuè vel interruptè per plures dies ex ipso Utero profluat Sanguis, isque modò floridus, modò aquosus & liquidus, modò grumofus, tum hoc non sine doloribus Lumborum aut Hypogastrii lancinantibus, parturientium similibus contingit, & sive primis, sive mediis gestationis mensibus Abortûs periculum inducit, si quidem verè prægnans Mulier fuerit. Aliquando enim non nisi collectio facta fuit in Uterinis vasis, quæ dein per ruptum unum alterumve tubum copiosè sanguinem profundit: subinde etiam *Mola* tantùm aliqua leco Infantis genita fuit, quæ occasionem isti Hæmorrhagiæ præbet. In hisce verò casibus non statim sistendus est ille Sanguinis fluxus, sed eo usque permittendus, donec evacuata planè, & ab heterogeneis corporibus liberata Matrix sit, ac interea non nisi confortantia Juscula & Medicamina danda, v. gr.

R₂. *Conserv. Fl. Bugloss. Beton.*

Tunic. ana 3℔.

Nuc. Ind. cond.

Conf. Hyac. inc. ana 3j.

Corall. rubr. ppt.

Terr. sigillat. ana ℥iib.

Syrup. Capill. 2r. q. s.

M. f.

M. f. Elect. d. ad Oll. Dosis subinde magnitudo Nucistæ.

Vel R. Aqu. Cardiac. offic.

Plantag. ana ʒiʒ.

Naph. ʒʒ.

Syrup. Rub. id. ʒvj.

Conf. Hyac. inc. ʒij.

Matr. Perl. ppt. ʒʒ.

M. d. ad Vitr. Sumatur cochleatim.

Expurgato autem Utero, si nihilominus continuaret Hæmorrhagia, tum remediis mox enarrandis sustineretur.

Nimirum si verè concepit Uterus, Fœtusque vivus in eo hæreat, Hæmorrhagia quocunq; etiam mense gestationis accedens, & nunc ab internâ sanguinis abundantia aut effervescentia, nunc à casu aliquo ex alto, percussione, Irâ, Terrore, Vino, Cibis aromaticis & acribus, vehementi corporis motu, nunc denique à medicamentis producta, per irritationem fibrarum Matricis ulteriorem spasmos, hincque secundinæ avulsionem, Fœtum sive vivum sive mortuum Abortu facto expellit. Quin ipsa illa Hæmorrhagia incipiens avulsionis dictæ principium esse solet; ut adeo si continueretur, atque constricta planè Uteri substantiâ ulterum perficiatur, Fœtus mori, & unâ cum Secundinâ extrudinecesse habet. Hæc extrusio si maturè contingat, Fœtus adhuc vivus erit, si autem post secundinæ avulsionem adhuc aliquandiu Fœtus in Utero maneat, denegato vitali matris succo, demtaque Sanguinis circulatione, moritur. Extruditur etiam vivus, si prodeat, an-

tequam Secundina penitus ab Utero avulsa erit. In hoc itaque statu cum Fœmina prægnans versatur, ac se lassam esse percipiat, ad conservandam in Vitâ prolem statim Vena quædam Brachii secanda est, dein verò blanda adstringentia, vel incrassantia, absorbentia, demulcentia, in usum trahenda, quem in finem sequens Electuarius confert:

R. Conserv. Ros. rubr. ʒlat. ʒj.

Fl. Tunic. ʒʒ.

Condit. Cydon.

rad. Symphyt. ana ʒij.

Lapid. Hamat. ppt. ʒiiij.

Sanguin. Drac. ver.

Bol. Arm. ppt. ana ʒij.

Succi Japon. ʒj.

Syrup. Myrtin. q. s.

F. Mixtura ad formam Opiatæ d. ad Oll. Dosis singulis trihoris magnitudo Nucistæ.

Vel R. Aqu. Polygon.

Urtic. ana ʒj.

Burs. Pastor. ʒvj.

Conf. Hyac. inc. ʒij.

Matr. Perl. ppt.

Unic. fossil.

Terr. sigill. ana gr. xv.

M. d. ad Vitr. Sumatur cochleatim per vices.

Vel Tinctura antiphthisic. Martis adstringens, Catechu, aliave styptica, m. ac vesp. ad gutt. 12. 15. 20. cum vehiculo conveniente sumatur; in quem finem prodest præ aliis Aqua Burs. past. & Urtic. vel Infusum fol. Sanicul. Pyrol. Alebymill. Millef. Trifol. fibr. Lamii purpur. &c. Radicumq; Tormentill. & Bistortæ, insiar Thée accommoda-

modatum. In Cibis conveniunt Cremor Hordei, Juscula farinacea, blanda acidula, cydoniata &c. Pro Potu ordinario conducit Decoct. rad. Tormentill. Herb. Anserin. Agrimon. Millefol. Hordei integr. Passul. min. Rarsur. Ebor. C. C. Inde fieri potest quoque Emulsio Amygd. dulc. Vide præterea, quæ de Hæmorrhagia Narium & Uteri laudavimus. Si verò Infans in Utero mortuus est, ac Hæmorrhagia sisti nequit, tum Partus non amplius impediri, sed naturæ, quam confortare studebimus, relinqui debet, aut hæc etiam juvanda est in extrusione Fœtus non quidem per interna pellentia, sed potius per dilatationem Cervicis Uteri digitis subinde tentandam ac promovendam.

Suppres-
sio urina.

Suppressio Urinæ Prægnantibus contingit interdum ultimis gestationis mensibus ob Uteri molem Vesicæ nimis incumbentem; solent enim Fœminæ quædam suos Fœtus inferiora versus gestare, hincque ob compressum Vesicæ collum urinam stantes vix possunt reddere nisi cum magno nixu, jacentes autem aut abdomen in altum tollentes melius reddunt. In hoc itaque casu diuretica nihil valent, quoniam Urinæ copiam exhibent, quæ dein reddi nequit commodè. Potius externè compressio Vesicæ est mitiganda, hinc tales Fœminæ Balnea Aquæ dulcis ex decoctione emollientium Plantarum subinde ingredi, Regionem pubis Oleis Verbasci, Scorpionum, Rosar. Melilot. Chamomill. frequenter illinire, Cataplasmata è Malvâ, Parietariâ, Vio-

lariâ, Betâ, Petroselino, Cherefol. Cepis, Baccis Juniperi, recentibus, incisis & contusis cum Axungia Anatum vel anserinâ & Oleo Chamomill. permistis componere, & calidè regioni Pubis applicare possunt.

Stranguria Gravidarum ab acrimonia Urinæ acescentis, Sphincterem Vesicæ, nimis ab Uteri mole etiam compressæ, continuè stimulantis originem trahit, & Abortui non rarò portas aperit, si diu nimis Fœminas torqueat, quoniam Uteri fibræ tandem in consensum trahi, ac sese spasmodicè contrahendo Secundinam avellere, sicque Fœtum necare, vel cum vi quadam extrudere possent. Ad mitigandam proin ejusmodi ardentis, atque guttatim ferè prædeuntis Urinæ molestiam, vel eam prorsus tollendam conveniunt post Venæsectionem in abundantia Sanguinis acris instituendam, Emulsionem crebræ Semin. quatuor frigid. maj. Decocta itidem Radic. & Herbarum emollientium ac mucilaginosarum, cum Pulveribus absorbentibus, acidum destruentibus, quibus subinde vel Balsamum Gris terebinthinatum, vel Essentiam Balsami de Copaibâ intermiscere possumus: v. gr.

R. Amygd. dulc. rec. excort.

Semin. 4. frig. major. ana 3j.

Lactuc. ʒij.

Aqu. Portulac. ʒiiij.

Malv. ʒiiij.

F. l. a. Emuls. cui adde

Syrup. de Portulac. vel

Nymph. 3vj.

Ocul. ʒ. ppt. 3j.

M. d.

M. d. ad Vitr. Sumatur duabus vel tribus dosibus, & quotidie reiteretur, usq; dum mitigata fuerit Stranguria.

℞. Corall. alb. ppt.

Lapid. Percar. ppt.

Radic. Liquir. ana ℥iij.

Filic.

Semin. Papav. alb. ana ℥ij.

Anis. ℥j.

Sacch. alb. ℥℞.

M. f. Pulvis subt. d. ad scat. Dosis mane, vesperi & noctu ℥℞. ad ℥ij.

Vel ℞. Tinctur. Bals. de Copaib.

Olei Terebinth. ana ℥i℞.

Essent. Opii liquid. ℥℞.

M. detur ad Vitr. Dosis 15. vel 20. guttæ cum Decocto ordinar. quale sequens esse poterit:

℞. Radic. Gramin. Filic. Alth.

Liquirit. ana ℥℞.

Rasur. Lign. Guaj.

Sassafr. ana ℥i℞.

Semin. Anis. ℥ij.

Incis. & contus. d. ad ch. Cochleare plenum harum specierum in 5. libris Aquæ ad Ovi duritiem coquitur, hinc Aqua colata frigide pro ordinario potu usurpatur.

Spasmus Gravidarum flatulentus, crura ac suras præcipuè torquens, atque à vaporosâ acriusculâ lymphâ, in Cruribus quandoque ob compressionem, à mole expansi Uteri factam, subsistente proveniens, requirit ante omnia Venæsectionem in Plethoricis administrandam, postea verò sequens Pulvis intus sumatur aliquoties:

℞. ꝑn. diaph.

Dent. aprin. vel Hippopot. ppt.

Unic. mar. ppt. ana 3j.

Ungul. Alc. ppt.

Cinnab. nativ. opt.

Semin. Pæon.

Fœnic. ana 3℞.

Sacch. alb. 3vj.

M. f. Pulv. subt. d. ad Scat. Quotidie hinc semel capiat 3℞. ad ℥ij. vel 3j. cum Aqu. Card. bened. Scab. flor. Til. Pæon. expectando lenem sudorem.

Extus Crura subinde in Spasmi paroxysmo, præprimis supra genua, fortiter ligentur, iterumque relaxentur. Dein & Lotio eorundem calida & frequens instituat, cum Spiritu matricali, Lil. convall. Anthos, Lumbric. terr. Aquâ Hirund. cum Castor. Spiritu theriacali camphor. Formicar. Baccar. Juniper. Ettmüllerus magni facit Aquam articulare sic dictam ad extra cum Spiritu Lumbr. terr. & Formicar. Vel Crura Oleo Rutæ, Lumbr. terr. Scorpion. simpl. aut Matthiol. Aneth. è Florib. Slotan. Amygdal. dulc. Chamomill. Melilot. calidè sæpius ilinantur.

Obesis Fœminis, vel quæ primùm Utero gerunt, non rarò ultimis in gravidationis mensibus, ex distensione Abdominis validâ non solum dolor Inguinum tensivus contingit, sed & interdum simul à fricatione nimia sudantium earum partium tenera cuticula excoriatur, ac fissuras agit, æstivo inprimis tempore valdè molestas atque dolentes, pro quibus sanandis conveniunt præcipuè Inunctiones diligenter instituendæ v.g. cum Axungia hædinâ, cervinâ, gallinaceâ, Unguento pomatum, albo camphor. Oleo Rosar.

A a a a

Lil.

Dolor Abdominis = tensivus, cum intertrigine cutis.

Lil. alb. Amygd. dulc. rec. expr. Violar. Verbasco. Mucilag. Semin. Lin. Fœni græci, Psyll. cum Aqu. Plantag. extra-ctâ, Radicis Alth. Symphyt. maj. Medullâ Crur. vitulin. Vide Titulum de Fissuris.

Tumor
Crurum
oedema-
tosus.

Si quæ Mulieres fuerint cache-cticæ, aut Temperie seroso-phlegmaticâ sint præditæ, præterea simul albo Fluore laboraverint, illæ etiam subinde duobus postremis gestationis mensibus Crurum oedematofum adipiscuntur Tumorem, molestum certè illum, & gressui libero faciliq̃ue adversantem, ut tales Fœminæ plus in lecto decumbere, quàm extra illum versari cogantur. Equidem periculo caret omni talis Tumor, & plerunque usque ad Partum futurum durat, atque, si non nimius sit, intactus relinquitur, ubi demum in Puerperio cum Lochiis effluentes copiosæ aquæ citò eundem disparere faciunt, ad quod tamen non parum decubitus in lecto diuturnus, adeoque & positus Crurum horizontalis contribuit. Si verò Tumor ejusmodi nimium evadat grandis, ut metus sit, ne Lympha tamdiu in vasis Crurum subsistens in Gelatinam tandem vix amplius dissolubilem vertatur, tum intus quidam Tinctura $\overline{\text{Fri}}$, vel $\frac{1}{2}$ n. vel Jtis aperit. cum Aquâ Nasturt. Flor. Sambuc. &c. ad guttas 20. 25. aut 30. capiatur; & aliquoties Alvus blandè cum Sympo Fl. Persic. aut de Cich. cum Rhab. laxetur; Pulvis etiam sequens capiatur:

$\overline{\text{R}}$. Ocul. $\overline{\text{O}}$. ppt. 3ij.
 $\frac{1}{2}$ n. diaphor.

Semin. Danc.

Nasturt. hort.

Pulv. rad. Ononid.

Virg. aur.

Salis Juniper. ana 3j.

Sacch. alb. 3j.

M. f. Pulv. subt. d. ad Scat. Dosis man. ac vesperi 3j. cum Potu ordinario, vel cum Decoct. Gran. Coffee.

Extus autem non melius reperitur medicamen, quàm Fomentatio cum Decocto conveniente instituta, quemadmodum sequens optimè conducit:

$\overline{\text{R}}$. Radic. Pimpinell. Ononid.

Vincetox. Eryng. ana 3ß.

Herbar. Ebul. Majoran.

Alliar. Rorismar.

Flor. Genist. Hyperic.

Summit. Lavendul. Absynth.

Centaur. min aa. Miß.

Baccar. Laur. Juniper.

Alkekeng. ana 3vj.

Rasur. Lign. Juniper.

Cort. median. Ebul.

Sambuc. aa. Mj.

Salis $\overline{\text{Fri}}$ 3j.

Incis. & contus. coque benè in

Aqu. Calc. viv. &

Lixiv. Sarmentor. Vit. aa. q. s.

In decocto hoc immerguntur Lintea vel Spongia, quæ dein expressæ statim calentes applicantur, bis vel ter quotidie repetendo.

Vel Salvia tantum, Anethum, Absynthium Geranium robert. aut quodvis aliud, Flores Samb. Cham. Fimus anserinus, atque columbin. in Lixivio qualicunque coquantur, hocque Decoctum postea pro Epithemate

usur-

usurpatur. Nonnunquam solus *Fumus* sequentis *Pulveris fumalis*, lin-
teis exceptus, & calidè frequenter
applicatus Tumorem omnem di-
scutit.

R. *Radic. Angelic. Vincetox.*

Folior. Solan. Menth. Thym.

Meliss. Euleg.

Flor. Cheir.

Sambuc. ana ʒij.

Storac. calam.

Mastich. elect.

Ladani ana ʒj.

Semin. Carv. Cumin. Levist.
ana ʒiib.

M. f. Pulvis d. ad Scatul.

Vidimus etiam semel Pudenda
alicujus Mulieris gravidæ usque adeo
intumuisse, ut molem ferè Capitis
infantis æquârint. Ettmüllerus vo-
cat *Hydropem Pudendi muliebris*, qui
si non dissipatur ante Partum, eum
non simpliciter tantum difficilem red-
dere, sed & Matrem cum Infante in
discrimen vitæ maximum conjicere
potest. Dissipavimus illum Tumo-
rem, qui clarus atque Hydroceles in-
star transparens albus erat, solo Fo-
mento ex *Aquâ Calc. viv. cum Lixivio*
Sarmentor. Vit. in quibus Scordium,
Solanum, Absynth. Centaur. min. Sal-
viam, Flores Sambuc. Melilot. Genist.
Baccas Juniper. atque Stercus anseri-
um decoximus. Aliàs certum est
convenire quoque heic Cataplasmata
ex *Stercore caballino, columbino, Her-*
bis Absynth. Calaminth. Scabios. Anse-
rin. Geranii &c. Flor. Samb. cum Sal.
Pri in Aquâ simpl. decoctis compo-
ita, & calidè sæpius applicata. Sunt

qui solum *Stercus vaccinum Cataplas-*
matis loco calidè quotidie imponunt
cum fructu. Si talibus in usum vo-
catis nihil in melius proficitur, tum
vel *Hirudines* applicandi, qui forsan
Lympham è Tumore omnem exu-
gent; vel acu Tumor iste, sicut in
Paracenthesi, perfoditur pluries, do-
nec omnis disparuerit, aut Lanceolâ
hinc inde inflectâ aperitur; & ubi
omnes dein effluxerunt Aquæ, sta-
tim *Spongia* applicabitur calida, atque
immersa *Decocto Betonic. Scord. Alliar.*
Salv. Meliss. Absynth. Flor. Balaustr.
&c. in *Vino* facto.

Varices in Cruribus quarundam *Varices.*
Gravidarum, Sanguine crasso ac fœ-
culento pollentium, apparent, quæ
si minores sint, nullumque incommo-
dum afferant, relinquuntur intactæ,
utpote in futuro dein puerperio ite-
rum disparituræ. Si autem adeo incre-
scant, ut jam dolorem, molestiamque
incedendi pariant, ac præterea me-
tum incutiant, ne fortè rumpantur
atque Ulcera varicosa inferant; tum
verò inungendæ sunt bis quotidie
Oleo Aneth. Laur. Chamom. Lumbric.
terr. Unguento de Alth. de Ranis, ab
infra sursum versus unguendo. Dein-
ceps Fasciâ latâ *Vino, Acetove* calenti,
cui adstringentia prius incoques, in-
tinctâ constringendi sunt Pedes us-
que ad Puerperium.

Hæmorrhoidum Vaginæ uteri- *Hæmor-*
nae, aut Ani tumor, nunc dolorosus, *rroidum*
nunc indolens, aliquando etiam Gra- *tumor.*
vidas affligit circa ultimum gestatio-
nis tempus, qui Tumor partum la-
boriosum reddere posset, ni discute-

retur ; perfici autem hoc potest remediis variis , tam *Unguentis & Oleis*, quàm etiam *Epithematibus*. Commendantur hinc *Oleum Momordicæ per infusionem paratum*, *Oleum Ros. rubr. Lumbr. terr. Ovor. Mastich. Lil. alb. Unguent. album camphor. de Linar. Aqu. Rosar. alb. Spermat. Ranar. Solani, Scabios. cum Pulpâ Pomor. coct. Mucilag. Semin. Psyll. vel Cydon. Aqu. Plant. fact. Tutia ppt. $\frac{1}{2}$ n. diaph. Lapid. calamin. ppt. Camphor. Spirit. Vin. camphor. Succo Cancror. fluviatil. vel Cochlear. contus. Cremor. Hordei. Vide etiam caput de *Hæmorrhoid. cæcis*.*

Dolor
Mam-
marum.

Subinde Fœminæ quædam Gravidæ *Dolore* quoque *Mammarum* affliguntur , quem non nisi expansio earundem à dilatatis Glandularum vasculis producta excitat , dum scilicet post intermissum Mensium Fluxum sensim Lymphâ quadam lacteâ implentur , ita ut hæc non rarò ex nimia abundantia per tubulos Papillarum laxatos & emollitos effluat , præprimis , quando Prægnans jam ad medium gestationis tempus pervenit. In principio ferè hoc malum naturæ permittitur , nec usurpatur quidquam , cavebit sibi tamen Gravidæ à nimia Mammarum compressione , vel ab ictu aut percussione qualicunque , unde Inflammatio , Abscessus , Scirrhus , aliaque subsequi possent. *Venæsectio* in hoc casu quoque necessaria. Mammæ autem vel *Butyro cocto* , vel *Oleo Chamomill. Rosar. Hyperic. Verbasc. Melilot. quotidie bis vel ter illinantur*, simulque *Sparadrapum* ex *Cerâ & Oleo rosac. Mammis imponatur*.

Quòd si autem *Papillæ* mammarum in Gravidis findantur ab allabente lymphâ salso-acri , id quod eo tempore contingit , quo ferosum Lac jam fluere incipit , tum intus quidem loco *Vini Decoctum radic. Graminis, Liquirit. Rasur. C. C. Lign. Sassafr. cum Passulis & Hordeo bibatur aliquandiu ordinariè* , subinde haustum *Vini albi* intercalando ; imò & interdum cyathus *Aquæ destill. Endiv. Cichor. Lactuc. Portulac. Gramini Agrimon. Scabios. bibatur. Acidulæ* quoque non ita largâ dosi gustentur. Extus autem *Papillæ* variis *Unguentis* aut *Linimentis* inungantur , quemadmodum complexio certa cujuscunque Personæ hoc vel illud magis tolerabit ; sequentia verò à nobis cum fructu etiam in Puerperarum fissis Papillis usurpata fuere :

Rx. *Olei rosac. 3ß.*

Ceræ flav. 3ij.

Solutis invicem super ignem admisce

Vitellum ovi unius.

Tutia ppt. 3iß.

Misc. f. Unguentum , bis vel ter quotidie inungendum : prius tamen semper Papillas abluere oportet Vino , in quo Folia Plantagin. angustifol. Millefol. Hyperic. Flor. Ros. rub. cocta fuerint ; atque tum demum , quando iterum siccatae sunt, Unguentum adhibeto.

Vel Rx. *Folior. rec. Nicotian.*

Geran. robert.

Virg. aur.

Rubi sylvestr. aa. Mj.

Incisa

Incisa & mixta invicem coque lento gradu super ignem lenem in Butyro majali, exprime dein per linteum, & quando in Unguenti formam refrigit, inunge.

Vel R̄. Cerae alb. ʒj. Solve & misce Axung. caprinae non solut. mediam partem.

Mixtis affunde

Aqu. Rosar. & Lavend. ana part. æqu.

Coque per quadrantem horæ, stet dein donec refrigerit, atq; hinc Papillis inunge.

Cremor Lactis & Aqu. Rosarum invicem mixta & parum cocta cum succellu similiter applicantur. Vel

R̄. Olei Hyperic.

Rosac. ana ʒʒ.

Mastich. ʒij.

Bol. Arm. ppt.

Magist. ʒ n. diaph. ana ʒij.

Sacch. Saturn. ʒʒ.

Cerae flav. ʒij.

Terebinth. clar. ʒj.

M. f. Unguent. d. ad Oll. Inungatur frequenter.

Tandem etiam aliquando Gravidis valdè molesta contingit *Vaginae uterinae*, Uterive ipsius procidentia, non sine Lumborum cruciatu, & dolore gravante regionis Pubis atque *Vaginae*, in quâ velut rotundus aliquis globus percipitur, Viro quidē in concubitu, ipsi autem Gravidæ in incessu incommodus atque dolorificus. Oritur hæc Procidentia tempore quidem imprægnationis, vel ab ingenti mole Fœtus, Cervicem Uteri deprimentis, vel à laxatione & emol-

litione nimia *Tunicæ Vaginae*, aut ligamentorum Uteri, per affluxum copiosæ lymphæ ac muci productâ. Cum itaque Prolapsus talis futuro proximè partui impedimento esse, ac fortè genitalia valdè oblædere posset, hinc necessaria est illius longè ante partum emendatio, utut non adeo facilis. Quòd si enim à mole Infantis Utero conclusi proveniat, quis hanc diminuere posset, nisi fortè Matrix simul cum Fœtu quantitatem Aquarum contineat, & velut hydro-pica existat, in hoc enim casu blanda diuretica atque diaphoretica apprimè convenirent, quemadmodum in *Hydrope Uteri* suo loco descripta & commendata extant, si modò excipias acriora purgantia, quæ tempore in-gravitationis mitiganda sunt.

A laxitate autem nimia tunicarum orta Procidentia requirit siccantia, extergentia, & tonum fibrarum roborantia. Hinc v. gr. vel Clysmate emolliente & blandè extergente, non acri, vel blando laxante Sympo de Cich. cum Rhabarb. Flor. Pers. aut Passulis laxativis primas vias expurgare convenit. Dein etiam Gravidæ Balneo Aquæ dulcis, in quâ Herbae Agrimon. Anserin. Numular. Lapathi acut. Scabios. Plantag. Saponar. Chamomill. Majoranae, Parietar. Sphondyl. Violar. Mercurial. &c. decoctæ fuerint, aliquoties ad eluendum è Vaginâ copiosum mucum immittantur. Postmodum elapsa plus minus Vagina Mucilagine Seminis Cydonior. vel Gumm. Tragac. Aquâ Plant. aut Burs. Pastor. factâ illinatur, moxque simul

Aaaa 3

Pulver.

Pulver. styptico, qualis ex *Florib. Ros. rubr. Balauft. Radic. Tormentill. Cortic. Granatar. Gallis, Succo Japon. Musco corallino*, ac similibus componi potest, conspersa cum linteolo molli in suum locum naturalem, Gravidâ in lecto decumbente, retrudatur; ubi tamen linteolum prius *Oleo Hyperic. Cydon. vel mastichino* immersum esse debet. Quo facto lintea sicca, adstringente fumo *Mastichis, Thuris, Storacis, Myrrhæ, Nucum Cupress. Gallar. Virgæ aureæ, Fol. Solani, Menth. Senecion.* imbuta calidè applicentur. Imò simul *Spongia Liquore* quodam *styptico* ebria imponatur, quem in finem adstringentia modò recensita, pluraque in *Vino rubro*, vel *Aquâ fer-ratâ* coquantur. Tandem & *Annali* vel *Globuli*, quorum in Curâ Proci-dentiæ suo loco mentio est facta, in-tra Vaginam aliquamdiu portentur. Gravidâ autem interea parum obam-bulet, ita ut Vagina semel intrusa deinceps immota manere, neque am-plius elabi queat.

Gustus læsus.
GVSTVS LÆSVS est sympto-ma sensûs Gustationis vitiatî, quo sapores rerum sapidarum vel planè non sentimus, vel imminutè perci-pimus, vel depravatè apprehendimus. *abolitus,* Primum symptoma *Gustus* dicitur *abolitus* vel *ablatus*, in quo subinde simul sensus Tactûs in Linguâ amitti-tur, aliàs verò remanente Tactu so-lus labefactatur *Gustus*. *imminu-* *ens,* Secundum appellatur *Gustus imminutus*, in quo leviter tantum gustabilium rerum sa-pores deprehendimus. *deprava-* *tus,* Tertium de-nique *Gustus* audit *depravatus*, quan-

do nimirum sapores rerum aliter per-cipimus, quàm quidem in statu na-tu naturali solemus; veluti cum ama-ra, dulcia, falsa, acida, insipida esse nobis imaginamur, quæ alio prorsus sapore prædita sunt.

Imminuitur vel *aboletur* *Gustus*, quando papillulæ Linguae nerveæ nunc flaccidæ nimis redduntur, velut in paralyâ aut humectatione earum excessivâ; nunc mucos nimio obli-niuntur, ut sapidarum particularum ἐπεγχειαν & vellicationem admittere nequeant; nunc ob defectum saliva-lis humoris exiccantur valdè atque in-durantur, sicq; ineptæ ad recipiendum motû evadunt, quem quidem sapidæ rerum particulæ imprimere conantur. Siccitas ejusmodi scabritiem & aspe-ritatem gignit, ac frequenter ab aëre in inspiratione transeunte produci-tur, quando videlicet ore aperto mu-nia nostra obimus, aut quando hiantè oris rictu dormimus; aër enim, præ-primis calidus, absorbet magnopere humiditatem Linguae ac Faucium. Os apertum tenemus sive vigilantes sive dormientes ex consuetudine ma-lâ, vel propter nares mucos viscido & crasso obstructas, ita ut aër in inspi-ratione per nares attrahi aut penetrare nequeat. Non rarò & in æstu cor-poris nimio, sive Febris quædam ar-dens, sive corporis exercitatio nimia, sive calefacientium valdè, aut spiri-tuoso-sulphurearum rerum, Viniq; generosioris, inprimis rubicundi, usus illum excitaverint, dicta Linguae siccitas & scabrities oboritur. Saliva deficit, quando serum humoralis Massæ

massæ nimis crassum lentum ac viscidum evasit, unde per poros Glandularum salivalium Lympha nulla transmittitur vel segregatur; aut si quid Salivæ secernitur, illud mucosum, crassum ac viscidum existit, vel tale mox ab aëre forsan externo calido & sicco, aut aëre fervido in expiratione transeunte evadit; vel etiam ita ab exhalantibus è ventriculo per gulam vaporibus redditur, formamque pituitæ nunc subflavæ, nunc nigrae, nunc albæ viscidæ induit, partibusque oris instar glutinis adhærescit.

Depravatur autem Gustus, quando Lingua imbuitur salivâ, aut quacunque alio humore viscido, saporem alienum in se habente vel producente, ita ut quicquid dein assumitur, eodem sapore præditum esse crederetur. Subinde & Cibi quidam assumpti saporem suum adeo fortiter enaciterque imprimunt Papillis Linguae, ut diu postea subsistat, ac ita iterum aliarum degustationem impediât. Si quis enim v. gr. post comestum caseum putrem, post acetum in cetariis assumptum, vel post alimentum maximè adversum ori ingestum, ut alia specificè contraria Vinum aliaque alimenta degustet, revera hæc non observabuntur nativum suum obtinere saporem. Quod si mucus palatinus, aut saliva præternaturaliter sit constituta, ut pituita quædam vaporosa è malè digestis in Ventriculo cibis in rictum alati ascendat, & eructetur, quale quid in Febribus sæpè contingit, tum modò dulcis, modò viscosus, modò

acidus, amarus, salus, vitriolicus, aut nescio quis alius sapor præternaturalis in assumptis cibis deprehenditur, imò & in Linguâ percipitur, etiam si nihil ori ingeratur. Hinc enim Ægrotantes de oris amarore, falsedine, aciditate, &c. conqueruntur.

Symptoma hoc per se nihil habet in se, vel portendit periculi, quin si causa ejus fuerit correctæ, per se promptè disparebit. *Curatio* proin juxta causarum diversitatem instituitur; quod si hinc à *Nervorum debilitate* aut *resolutione* proveniat, *intus* quidem, sicut in Paralyti, corpus unâ vel alterâ vice purgabitur per superiora aut inferiora, prout id naturæ inclinatio postulabit. Deinceps *Sal quoddam volatile oleosum m.* ac *vespericum Infuso sol. Thée, Beton. Majoranae & Chamædryos* ad gutt. 15. vel 20. exhibebitur; etiam basis Linguae bis vel ter quotidie *Ol. stillat. Rosimar. Lavend. Thymi, Amarac.* illinetur. *Extus* autem *Vesicatorium Nuchæ* applicabitur.

Si à *cruditatibus* Ventriculi aut primarum viarum producat, *Vomitatorium* ex *Ipecacuanhæ* vel *Asari radicis* 3ß. cum *granis duobus Cinamomi* dabitur, imò etiam, si opus videbitur, post aliquot dies, fractâ nonnihil dosi, repetetur; ac deinceps *Elixir propriet. Clauderi* cum *Essentiâ Zedoar. Absynthii & Calami aromat.* bis quotidie ad 25 pluresve guttas cum vehiculo congruo stomachico dabitur.

Si à *Salivâ* aut *Muco viscido* trahatur originem in Febribus, tum alvo *quotidie*

Curatio Affe-ctus.

à Nervorum debilitate.

à Cruditatibus.

à Salivâ viscidâ.

quotidie apertâ diaphoretica plus minus volatilia exhibeantur, ex $\frac{1}{2}$ nio diaphor. Ocul. $\overline{\text{O}}$. ppt. Bezoard. min. Viperarum Spinis ppt. Ebores vel C. C. philosoph. ppt. Sale volatil. C. C. Viperar. Ebor. Cinnab. nativ. &c. cum Aquâ destill. Nasturtii, Card. bened. Flor. Sambuc. Scab. Succis. Taraxac. Et in usu talium remediorum per plures dies continuandum est, donec salivæ tenuioris proventus, & leviuscule madoris cutanei successus apparuerit, tū enim Gustatio paulatim naturalis redibit.

à Lingua
ariditate.

Quando ariditas Linguae in culpâ est, v. gr. ex ore frequenter aperto per consuetudinem pravam, tum corrigenda hæc est, & ab illo more desuescendum; quod quidem fiet tanto facilius, si nares forsan à mucicopiâ obstructæ referentur ante somnum, idque per usum remediorum errhinorum; v. gr. Pulveris è Foliis Thymi, Betonic. Majoran, Lavendul. Floribus Aurant. Lil. convall. Radic. Angel. Caryophyll. Ireos flor. Cyperi, &c. compositi, ac naribus sæpè attracti. Aut Liqueoris errhini, v. gr. Decocti fol. Beton. Meliss. Majoran. Lil. convall. cum Succo Betæ, Atriplic. &c. permiscendi, & naribus immittendi. Ariditas verò & asperitas Linguae à Salivæ defectu oriunda in Febribus aut aliâs, præter antifebrilia, massæ sanguineæ visciditatem corrigentia & resolventia, emendari potest molli- bus, pinguibus & mucilaginosi- bus Linguae affricandis, vel ad lambendum, colluendum, mastigandumque tradi- tis. Plebeji hunc in finem frusto Lar- di subinde linguam & os fricant non

sine fructu; vel Passulæ minores, Pru- na damascena, Tamarindi, Poma re- centia, Folia Sempervivi majoris, La- ctuca, Acetosæ, Portulacæ, Quercuum teneriora succulenta, sæpius mastigata, similiter profunt. Alii Melonum, Cucumerum, vel Cucurbitarum car- nem mastigandam, sed iterum ex- spuendam præbent. Vel Mucilagi- nem Seminis Cydonior. Psyllii, Malvæ, Pomor. aut Radic. Alth. Aquâ Rosar. extractam cum Syrup. Viol. de Nymph. Gran. acid. aut Melle rosac. permisce- re, ac lambendam dare possumus. Vel mixtiones has spissiores reddere, nodulo includere, huncque Aquâ Rosarum subinde conspersum Linguae impo- nere & aliquandiu ore retinere licet. Lactis butyroso frigido oris partes sæpè etiam colluuntur. Albumen ovi cum decocto Hordei mistum & gargarisa- tum est præstans. Alii cum tantillo Mellis Butyrum miscent & hinc lam- bunt. Si cum ariditate ardor simul jungatur, tum ea, quæ in Faucium Ardore commendavimus, heic ma- ximè conveniunt.

Quod si à mucoviscido Gustus de- pravatus fuerit, frequenter extergen- dus ille erit, hincque os colluendum, v. gr. Sero Lactis, Melle, Aceto rosa- ceo, aut scillitico; vel Hordeum, Ci- ceres, Radices Cichor. Ireos Fl. Liquirit. Acetos. Passulæ minores, Folia Salviæ, Hyssop. Lactuc. Portulac. Agrimon. Malv. Meliss. Scab. & similia in Aquâ decoquantur cum tantillo Aceti rosac. hocque decocto calente Os frequen- ter colluatur. Interna dein diapho- ret, in usum vocari non negligantur.

GVLÆ

GVLÆ ANGVSTIA vel **OBSTRVCTIO**, est Canalis à palato in Ventriculum descendens per quamcunque causam facta angustia, subinde cum difficultate respirandi conjuncta.

Causa mali est vel res aliqua dura, v. g. ossiculum, spina piscium, acus, aliaque per incuriam in palatum deglutita, inibi que acutis suis eminentiis in canalis introitu aut progressu, non sine magnâ molestiâ, puncturâ, atque deglutiendi difficultate, obhærens. Vel aliquando est Ulcus, aut induratio Tunicarum, aut Tumor aliquis sive scirrhus, sive alius, intra Gulam, à collectâ inspissataque nunc dulciore, nunc acriori Lymphâ enatus, & Oesophagum vel planè constipans, vel ita angustum reddens, ut, si quid deglutitur, ad locum Tumoris quidem facile demittatur, sed ubi ulterius in Ventriculum est protrudendum, id non nisi cum magno labore atque dolore fieri queat, quin sæpius per violentum rejiciatur vomitum. Atque Tumores quidem inflammatorios, Abscessus & Ulcera Oesophagi Cadaverum exenteratio non infrequens subinde detexit: ita enim ante aliquot annos heic Basileæ Rusticæ cujusdam mulieris cadaver, postquam ex deglutiendi difficultate in lethalem Hecticam incidit, & mortua fuit, iustrabamus, & ejus quidem interanea omnia sana deprehendimus, solo excepto Oesophago & Gulâ, in cujus medio ferè tractu scirrhusam tunicæ interioris glandulosæ intumescitionem, atque duri-

tiem conspiciebamus, eamque statim unicam mali, quo laborabat ægra Mulier, causam pronunciabamus. Similem casum non ita pridem observavit *Clariss. Dn. D. Claudius Passavant*, *Præcticus* apud nos *feliciss.* in apertione Cadaveris Viri alicujus Lucisvallis, cujus Oesophagus ob Tunicæ mucoso-glandulosæ scirrhusam indurationem adeo angustatus fuit, ut stylum transmittere non nisi cum labore potuerit. Scirrhus verò talis à concrezione Lymphæ acidioris & austerioris originem ducit, cui ansam præbet inprimis gelidus semper Aquarum aliorumve Liqueorum potus, & acidorum comestio frequens, inprimis frigidorum. Sic *Consulis* apud nos *Amplissimi* Ann. 1690. deglutionem maximè difficilem, cum dolore & vomitu frequenti rerum nondum planè in Ventriculi cavum demissarum, indeque necessariò secutam Atrophiam funestam (famelico licet semper existente stomacho) Medici scitè adscripserunt scirrhusæ tunicarum Oesophagi constitutioni, sensim à potibus glaciatis, cui Vir ditissimus per plures annos æstivo, hybernoque tempore maximè indulgit; productæ, unde si quid in Ventriculi cavum deglutire voluit, magnâ cum vi, nec sine dolore regionis Oesophagi ingenti illud præstare coactus fuerit, argumento certo, maximè angustatum, simulque scirrhusum & induratum fuisse Stomachi introitum.

Si quid igitur Gulæ illapsum est, & simul Epiglottidem in suo libero

Diagnos.
sis.

etorius in illis partibus dolor, sed & loquelæ simul ac deglutiendi difficultas producitur; imò si res illapsa fortius pungat, nec citò eximi queat, etiam Inflammationem, Tumoremque excitat, Hominem brevi suffocantem, nisi causam maturè abstuleris. Aliàs verò angustia Gulæ ex eo quoque cognoscitur, quando Homo facilè quidem alimenta in rictum Palati, aut in ipsum fortè Gulæ introitum demittit, sed quando postea ulterius in Ventriculum ipsum planè detrudere vel nequit, vel non nisi cum dolore ac difficultate potest. Interdum etiam Cibi aliquamdiu in Gulâ angustatâ obhærent, ac demum vel delabuntur in Stomachi cavum, vel cum Vomitu iterum ejiciuntur.

Prognosis.

Quicquid proin in Gulam delabitur, ac in conspectum venit, chirurgicis facilè instrumentis eximi potest. Si verò profundius intra ipsum gulæ canale demissum obhæreat, difficilius aufertur. Scirrhus Gulæ aut Oesophagi inveteratus, vel etiam Ulcus confirmatum immedicabile est, Hominesque per maciem paulatinam consumit. Inflammatio quoque Gulæ periculosa est, & in Abscessum facilè transit.

Curatio.

Curatio pro varietate causarum instituitur. Ossicula, Spinæ piscium, vel alia Gulæ illapsa instrumentis chirurgicis, Acantabulo nimirum curvo, vel Volfellâ, vel Fistulâ aut Cannulâ curvâ perforatâ & oleo oblitâ extrahuntur, si conspici queant. Si autem Inflammatio, vel leve aliquod *Vulnus* fuerit in affectâ parte factum,

promptè malum hoc curabitur *Melle rosaceo*, si cum *Mucilag. Semin. Cydon. Aqu. Levist. factâ* mistum sæpiùs lambatur. Si res illapsæ in conspectum non veniant, tum Cervix Ægri pugno percutitur; vomitus etiam *Oleo Amygdal. dulc.* aut *Jure pingui* movetur. Vel *Boli majores panis* deglutiuntur. Vel *Candelâ etiam cereâ*, aut *Stylo plumbeo incurvato*, *Melle* aut *Oleo oblitò*, detruditur in stomachum. Tussis denique assumtis acidis excitatur.

Scirrhus autem incipiens in mediâ vel extremâ Gulâ discutitur, si *potus Thée, Betonic. Malv. Parietar. Salv. Veronic. Ocymi*, vel *Coffee* quotidie bis vel ter hauriatur; si *ordinarius potus* magis *calidus*, quàm *frigidus* existat; si singulis quoque noctibus per plures hebdomadas dosis *Pulveris contra Botium* vel *Strumam* cum *Melle* aut *Aqu. Fœniculi* sumatur; si æstivo tempore *Thermarum* quarundam *potus* debito cum regiminæ diætæ usurpetur, atque corpus simul iisdem balnei loco immittatur, aut potius si quotidie semel *Laconicum* ingrediatur; si tandem in *Victu* nihil admittatur, quod serum sanguinis viscosum reddere queat. Inprimis autem liquores glaciatos, vel è saxi defluentes *Aquas fontanas* in potu ordinario, non secus atque acida, salsaque omnia in cibis damnamus.

Si obstructio gulæ est ab *Inflammatione*, tum curatio est instituenda prout in *Febribus*. In *Abscessu* autem vel *Ulcere* jam formato probamus usum *Decoctorum vulnerariorum*, cum

Essen-

Essentiis traumaticis diligenter hauriendorum, quemadmodum suo loco prolixius in *Vulneribus & Ulceribus* traditur. Si *Thermæ Rhætorum Fabarienses* haberi possunt, nec eorum potum dissuaderemus.

Quando verò Angustia Gulæ & Oesophagi provenit à mucò quodam acido-austero, fibras nervosas adducente, & velut spasmodicè constringente, tum nil melius est, quàm *pulvis absorbens* aliquis v. gr. seqq.

℞. *Spec. diacret. Myns.* ʒiʒ.

‡ *n. diaph.* ʒʒ.

Cinnab. ‡ *n. opt.*

Nuc. mosch. ana ʒj.

Sacch. alb. ʒij.

M. f. Pulv. subt. d. ad ch. indeq. ter vel pluries quotidie *cuspis cultri* plenus siccè sumatur, vel cum *Aqu. Fœniculi* hauriatur.

In omnibus ejusmodi Affectibus externè prodest impositum *Emplastrum de Baccis Lauri*, vel *Norimbergense camphoratum* cum *Nuc. moschatâ*, vel *diaphoreticum Myns.* aliudve simile.

GVSTA SERENA, *Amaurosis* est omnimoda Visionis abolitio, nullo in oculis apparente perceptibili vitio, orta à denegato spirituum animalium per nervum opticum influxu, tonoque fibrarum Retinæ tunicæ maximè debilitato.

Est autem vel *incipiens*, ubi sentiunt *Ægri* gravitatem circa oculos, & quasi muscas ante eos volitantes; vel *consummata*: vel subito orta, vel

tractu temporis contracta: vel ab *externâ* vel ab *internâ* causâ producta.

Causa hujus Affectûs proxima varia est, nimirum vel *Nervi optici* retinæque *Tunicæ* induratio; vel ejusdem nimia flacciditas, mollities, aut obstructio ab humore viscido oriunda; vel compressio à tumoribus in cerebro existentibus, & nervo optico incumben-^{causa}tibus; vel humor extravasatus à *Vulneribus* aut *Contusionibus* capitis; vel alius denique *Morbus Cerebri*, unde debitus spirituum animalium influxus per *Nervos opticos* intercipitur, aut denegatur. *Antecedenter* contribuunt ad Affectum *Aër nocturnus*, frigidus, pluviosus, *Crapula* frequens, *Victus crudior*, *Vigiliæ* protractæ, *Somnus intempestivus*, inprimis sub jove frigido, *Exercitia insolita corporis*; *subitanei & graviores Animi affectus*, *Excretiones subito suppressæ*; *Ictus & Casus ab alto*, *Vulnus* atque *Contusio capitis*.

Ex eo inprimis cognoscitur, quòd ^{Diagnos.} utut Homines nihil planè videant, imò ne quidem luminis externi qualemunque effectum percipiant, nullo tamen in *Oculis* vitium pateat, neque in *Pupillâ*, nisi quod hæc aliquando amplior solito, ac magis nigricans observetur, & minimè mutetur, licet opponatur lumini. In utroque simul oculo plerunque contingit, etsi non semper in principio; ac ut plurimum subito, rarius verò paulatim oritur, atque producit. Sine dolore tandem affligit, Hominesque sibi imaginantur se in cymmeriis tene-

bris latere, cum nullum plenè lumen percipiant.

Amaurosis recens, vel modò incipiens, & subitò orta, nisi à graviori causâ provenerit, curatu adhuc possibilis, licèt difficilis; inveterata autem, quæque Morbos sequitur graviores, planè incurabilis, vel certè periculosa existit.

Curatio.

Curatio pro diversitate causarum varianda est, si enim Amaurosis subitò orta & Homo plethoric⁹ sit; ut & si ab ictu & casu ab alto, vel ab accepta contusione aut vulnete provenerit, ita ut metus sit factæ cujusdam extravasationis, tum Venæsectio statim celebretur in Brachio, Capitiq̃ue Sacculus Herbarum cephalicarum, in primis *Verbenæ*, *Absynth.* *Abroton.* *Beton.* *Veronic.* *Majoran.* *Thym.* *Origan.* &c. *Vino* incoctus, & expressus frequenter calidè applicetur. *Vesicatoria* statim simul pro re natâ nuchæ apponantur.

Si subitò à Defluxione quadam, aliisque causis magis internis, orta fuerit, tum in plethorico quidem Homine similiter Venæsectio non formidetur; deinceps verò *Pilulæ purgantes cephalicæ* è *Mass.* *Pilul. de Succin.* *Craton. de Sagapen.* *Marocost.* *Extr. cathol. panchymag.* aliisq̃; cum *Mercur. dulc.* vel *Cinnab.* ḡ n. opt. & *Ol. stillat. Rorismar.* *Lavend.* *Thym.* *Fenic.* bis in septimanâ exhibeantur. *Vesicatoria* statim in Vertice Capitis, imò & retro utramque Aures applicentur. *Gucurbitulæ* quoque cum scarificatione dorso admoveantur. Postmodum *cephalicum Decoctum* propinetur

in *Aquâ communi* post macerationem prægressam factum ex *Radic. Valerian.* *Chelidon. maj.* *Chin.* *Sars.* *parill.* *Lign.* *Sassaphr.* *Cortic. Lign.* *Gnajak.* *Herbis Beton.* *Rorismarin.* *Ocym.* *Origan.* *Euphras.* *Calaminth.* *Chamædr.* *Semin.* *Fenicul.* *Coriandr.* De hoc *Decocto* ter quotidie sumat ʒiij. vel iv. cū aliquot guttis *Spirit. Sal. arm. feniculat.* *Tinctur. Castor. cum Spirit. Sal. arm. parat.* *Spiritus Formicar.* *Spirit. magnamin.* *Salis volat. oleos.* vel *Liqu. C. C. succinat.* Præterea *Errhina* naribus admoveantur sub formâ vel *Pulveris Tabaci*, vel *Liquoris* è *Succo Betæ*, *Brassicæ*, *Nasturtii* cum *Aqu.* vel *Spirit. Meliss.* *Anth.* &c. Ita quoque *Apophlegmatismi* boni sunt, in primis sub formâ *Trochiscorum sublingual.* è *Mastich.* *Cinamom.* *Rad. Pyrethr.* *Garyophyll.* *Radic. Angelic. Valerian.* &c. cum *Oleo dest. Fæn. Sacch.* & *Mucilag. Gum. Trag. Aqu. Ros. fact. paratorum*, qui continuè mastificentur. *Vesperi* etiam cum superiore *decocto* possunt sumi *Millepedes præparati ad ʒj.* Capitis vertici raso autem inungatur *Oleum dest. Succini*, atque *Lavend. Amarac.* imponatur simul *Emplastrum cephalicum nostrum*, cum *Semine Sinapi pulverisato* acutum. Toti verò capiti *Cucupha* quoque applicetur è *Plantis cephalicis* & *Aromatibus* concinnata. Ac denique *Setaceum* in Nuchâ, vel *Fonticulus* in utroque Brachio excitetur.

Quibus nihil juvantibus, ad *Salivationem* excitandam protinus est deveniendum; quæ post exhibitionem *Pilularum mercurialium purgantium*

tium, uti supra monitum, optimè instituitur sequenti modo:

R. *Cinnab. nativ. vel ½ n. opt.*

Myrrh. rubr.

Succin. alb. ana q. v.

M. f. Pulvis subt. cujus, quantum cuspidè cultri capi potest prunis injiciatur, & fumus inde exhalans ope infundibili ore exceptus, aliquandiu in eo detineatur, ac postea effletur, iterumque novus excipiat. Hoc opus ter ad minimum de die repetatur, donec salivatio probè sequatur; sed nulla hoc tempore oculorum Inflammatio adesse debet. Ager in calido maneat loco, quamdiu salivatio durat; si verò eadem cunctetur, poterit *Mercurius dulcis ter sublimatus*, cum *Conservâ Rosar. vel Beton.* sub formâ *Boli*, semel aut bis deglutiri, ut tanto melius sequatur Salivatio; hanc verò instare, patet ex tumore Faucium, Linguae, Gingivarum, & Dentium incipiente stupore aut vacillatione.

Dieta in hoc Morbo instituenda est contraria causis. *Cibus* sit parvus, imprimis vesperi, multum plantis cephalicis & ophthalmicis conditus. Pro *Potu* ordinario concedatur *Decoctum Herb. Euphras. Betonic.* aliarumque cephalicar. Vel *Vinum* aut *Cerevisia* probè defœcata iisdem affusa propinetur. *Aër* serenus, siccus, calidus; *Alvus* respondens: *Mens* hilaris existat.

GVTTA ROSACEA, est rufor Faciei pustulosus, fructûs Cynosmati colorem referens, à diuturno Vi-

ni abusu, aut intempestivâ venere, aut contagio etiam hæreditario obortus.

Affectus vel incipiens est, vel confirmatus: recens, vel inveteratus; cum vel sine Pustulis & tuberculis ulcerosis rubentibus: gravior, vel levior: vel totam Faciem, vel Nasum duntaxat infestans: alia adventitia s. acquisita, alia congenita & hæreditaria: alia indolens, alia dolens, pruriginosa, inflammatoria, crustosa, squamosa.

Causa proxima est humoris sanguineo-fœculenti, plus minusve falsi & crassi intra varios tubulos & glandulas cutaneas Faciei obhærens & stagnans. Antecedentes verò & procatactica causæ sunt Massæ sanguineæ intemperies & eo-salina fixior, quæ tartareas suas, atque fixiores, viscidas, fœculentas partes in Faciei magis cute, quam in aliis corporis partibus deponit, quoniam transpiratio ibi non tam feliciter procedit, quam alibi, cum Facies aëri cuicunque sit semper exposita, sicque halitus per poros nunc exprimantur largiter, nunc subito etiam retropellantur. Dum itaque latex humorosus vel post largum Vini potum, vel in Irâ, aut subitaneo Motu ac Terrore, in motum ebullientem fuscitatur, caput mox incalescit, ipseque sanguis in capillaribus Faciei tubulis sistitur, & sic facile glandulas ibidem minimas suis spiculis salinis distorquere, fœculentumque humorem in illis deponere potest, qui dein stagnando sensimque augescendo cutim in Tubercula suaverubentia elevat, ita ut

hæc quandoque exulcerata pus concoctum ex sese fundant. In *Facie* magis exoritur hic *Affectus* apud Bibulos, quando ab intempestivo potu frequenter etiam sanguinis æstus & rarefactio augetur, unde vasa pneumonica aliave distenduntur, valdeque distenta & expansa compressione suâ impediunt, quò minus Sanguis in *Faciei* venis debitâ promptitudine ad *Cor* descendere queat; hic proin tardius sic profluens facilè incrassatur, spissioresque suas particulas hinc inde in poris cutaneis relinquit; ut adeo in *Hominibus* *Vino* obrutis majorem *Faciei*, intensioremque ruborem observare liceat. Contribuit tamen etiam ad hocce vitium ipsarum *Faciei* glandularum peculiaris structura, ob quam tubuli angustiores existunt, & sic facilius in sese fœculentias intemperati sanguinis admittunt, atque coërcent. Quod si Rubedo simplex est sine pustulis aut tuberculis, quemadmodum in principio hujus Morbi evenire solet, tum sanguis fœculentus intra vascula adhuc coërcetur, tardeque per ea sine effusione decurrit, vel leves Varices in iisdem excitat. Si autem jam *Pustulæ* effloruerunt, ut plurimum extravasatus est sanguis, qui suppuratus dein *Ulceram* manantia exhibet. Ubi autem concrevit & induratur, tum *nodosam* vel *tuberosam* efficit *Guttam rosaceam*, in quâ sæpè *Nasum* duplo majorem videre licet.

Diagnos.
sis.

Affectus uti externus est, ita unicuique in conspectum promptè venit: principium ejus ferè est exiguum, na-

tum vel in ipsâ *Nasi* extremitate, vel in summitate *Genarum* prope *Nares*. Primò quidem rubedo adest, eaque instar maculæ purpurascens, quæ nunc floridioris evadit, inprimis à potu *Vino*, coloris, nunc iterum pallidioris. Paulatim verò illa rubedo constantior fit, majoremque portionem *Genarum* occupat, tandem causâ etiam auctâ & cutim inflante, in *Pustulas* & *Tubercula* rubicunda mutatur. Hæc *Tubercula* vel *Pustulæ* quandoque exulcerantur, atque saniem fundunt. Contingit verò simul in hoc *Affectu*, ut etiam *Nasus* variis *Tuberibus* rubicundis curiosè donetur, & sic duplo interdum major, atque nodosus evadat.

Quoad *Prognosin*, incipiens *Affectus* in *Juvenibus* adhuc curabilis est, confirmatus autem vix medicabilis existit, præprimis si jam majores *Pustulæ* aut *Nodi* fuerint geniti. Sic & hæreditarium existens malum curationem vix ullam admittit. Nonnullis tamen cum *Ætate* disparet Rubor, si exactam nimirum in *Vini* aliarumque rerum usu diætam semper observârint. Aliis verò *Vino* abutentibus cum ætate increfcit, atque in sordidum tandem spectaculum mutatur.

In *Curatione* primùm serosi infarctus & obstructions tam per evacuationia, serum acrius & viscidius per quascunque vias educentia, quàm etiam per topica, diaphoresin partis affectæ promoventia, sunt aperiendæ ac referendæ. Dein etiâ causæ antecedentes sunt emendandæ totaque adeo sanguinis massa à particularum falso-austero-

austero-sulphurearum quantitate liberanda ; tandem & procatarcticæ causæ per observatam probè diætam evitandæ sunt.

Ante omnia itaq; *Vinum medicatum*, è *plantis nitroso sale abundantibus* rectè paratum aliquandiu concedantur bibendum, v. g.

R̄. *Radic. Cichor.*

Endiv.

Nymph.

Polypod. ana ʒiiss.

Herb. Agrimon.

Hepat. nobil.

Scolopendr.

Pimpinell.

Ulmar. ana Mʒ.

Flor. Bellid. min. Pij.

Fol. Senæ Opt. mund. ʒj.

Agaric. trochisc.

Rad. Helleb. nigr. ana ʒiiss.

Spic. indic.

Semin. Lactuc.

Salis Prunell. ana ʒj.

Incis. & contusa insuantur nodulo ex Sindon. alb. cui affunde Vin. albi veteris & Aqu. fontan. ana tʒij. ac singulis inde diebus mane ʒiv. vel sex hauriantur. Durante usu hujus remedii, subinde reiterati, etiam Venæsectio in Brachio vel Pede semel aut bis instituat. Prodest dein, loco Vini medicati repetiti, aliquoties dosim Pulveris polychresti exhibere cum insigni haustu Ptisanæ ordinariæ. Post hæc diuturnus usus Diaphor. ʒial. Ocul. ʒj. ppt. & Lapid. prunell. vel Nitri ʒj. niat. Pulv. hepat. rubr. Spec. latif. Galen. ac diatr. santal. cum Conserv. Ros. Acetofell. aut Radicis Cichorei

commendandus venit. Huic tamen remedio, ne appetitum dejiciat, intercalare poteris usum *Tincturæ ʒnii*, vel *ʒtis aper. & Corall. vel Spirit. aper. Penot. Quin & Spirit. vitriol. Mart. ad guttas iv. vj. vel viij. singulis vespertinis per unam vel alteram septimanam haustus, nostrâ experientia brevi feliciterque Guttam sustulit rosaceam. Adde his Acidulas æstate præprimis potas, vel Caprilli Lactis serum mense Majo haustum, nitrosisq; ulterius Plantis incoctis alteratum. Vel etiam Juscula plantis aperitivis alterata, v. g. *Radic. Cichor. Scorzonæ. Apii Selin. Hepat. nobil. Fragar. Ulmar. Eupator. Nymph. Endiv. Lactuc. Acetosæ, Borrag. Bugloss. Nasturt. Cherefol. Fumar. Scabios. &c.* Ita quoque *Conservæ Acetofellæ, Fumariæ, Portulacæ, Melissæ, Rosar. Condituræ radic. Cichorei &c.* cum absorbentibus pulveribus frequenter sumtæ non parum boni operantur. Novimus aliquos, qui singulis matutinis horis per mensem integrum *Aquæ fontanæ optimæ, vel Aquæ Portulac. Endiv. Nymph. Lactuc. Cichor.* haustum biberunt, & simul pugillum *Passularum minorum* probè lotarum, iterumque in Aëre siccatarum manducârunt, hacque ratione à Guttâ rosacæ feliciter liberati fuerunt & postea manserunt.*

Quod autem externa concernit, topicave remedia, si Pustulæ jam majores fuerint, & pus concoctum habuerint, eo, quo *Furunculi*, modo curabuntur. Aliàs autem seqq. in his illisve proficua fuerunt remedia:

R̄. *Flor.*

℞. Flor. Fris.

Alum. crystallin. ana 3vj.

Pulverisatis affunde

Aqu. Rosac. ℥j.

Maneant sic mixta, & cubitum iturus Faciem hac Aquâ tepidè lavet, postmodum mane autem eandem Aqu. Fragar. aut Rosar. tepidâ abluet.

℞. Aceti Vini albi Mj.

Camphor. probè trit. 3j.

Flor. Fris. 3ij.

Axung. Porci mascul. ℥j.

Mixta inde omnia Ollæ terreæ novæ, coque super prunas per horam integram, cavendo ne empyreuma adquirat; effunde postea in patinam, in quâ, cum refrigit, residuum Aceti separetur, hinc de novo solvatur, ut omne Acetum abscedat. Hoc Unguento cubitum iturus Rubedinem Faciei inunge, & seqq. mane vel linteis mollibus leniter absterge, vel Oleo rosaceo, aut Aqu. Fragar. Flor. Fabar. Spermat. Ranar. calefactâ abluet.

Aliis magis convenit seqq. Lac Virginis:

℞. Asæ dul. Myrrh. elect.

Styrac. calamit. ana 3ij.

Salis $\text{Fris. sicciss. 3℔.}$

Camph. 3ij.

Spirit. Vini rectificatiss. 3xvj.

Species singulæ in subtilem pulverem redigantur, hinc Spiritu affuso stent in vase clauso & loco tepido, usq; dum Tinctura rubicundissima fuerit extracta, omnisq; Resina soluta, quæ dein per chartam emporeticam filtrata in usum externum servetur. Sunt qui ad fragrantem magis reddendam hanc Tincturam, simul aliquid Cina-

moni, Caryophyll. Moschi & Ambra cum Spir. Rosar. solut. addunt. Postea

℞. Aqu. Fl. Fabar.

Lil. alb.

Fragor.

Spermat. Ranar. ana 3j.

Misceantur & Liquor lacteus mox evadet; hoc verò Lacte postmodum Facies, Mentum aut Frons lavari poterunt. Sequens etiam Mixtura non est contemnenda, quâ difformis sæpè lavetur Facies.

℞. Aqu. Sperm. Ran.

Flor. Fabar. cum. Vin. dest.

Fragor.

Flor. omnium ana 3ij.

Ol. $\text{Fris. per deliquium 3j.}$

Salis Saturni 3℔.

Camphor. paucill. Spirit. Vin. solut. 3j.

Misc. d. ad Vitr.

Sic etiam Sulphur Thermarum Badensium Helveticarum cum Spirit. Vin. camphorat. Aquis cosmeticis diluto, in Pulticulam tenuiorem redactum & Faciei sæpius affricatum vel inunctum conducit. Pariter & Linimentum anterysipelatodes Helmontii è Cremore Lactis dulci, cum Aceto Saturnino confectum, ac sæpius illitum prodest. Sunt &, qui Acetum destillatum Saturno parum imprægnatum Aquis cosmeticis diluunt, & eodem Faciem lavant. Plures Urinâ propriâ Faciem detergere solent singulis noctibus.

In Diætâ nimium salita & aromatica fugiantur: Vinum aquâ sit dilutum, & hoc quoque parcius bibatur; vacuo inprimis ventriculo à Vini potu est

est abstinendum. Thermæ, Balnea, ac Stufæ sudatoriæ multis nocent. Motus corporis sit moderatus, Confortia vinolenta spernantur.

HÆMODIA, Ἀιμαδία, ex αἷμα, Sanguis & ὀδὺς, Dens, composito vocabulo, significat *Dentium dolorem vel stuporem*, de quibus suo loco fusè actum est.

HÆMOPTOE, HÆMOPTY-SIS, SANGVINIS SPVTVM, ex αἷμα sanguis, & πύω σπυο, compositâ voce, est Sanguinis sinceri, majori ex parte spumosi, per Tussim excreatio, ut plurimum cum Dyspnœâ, ac respiratione stertorosâ conjuncta.

Pars affecta sunt Vasa sanguifera capillaria, vel etiam majora, venosa magis quàm arteriosa, in asperâ Arteriâ, Pulmonibus & Thorace sita. Quod enim sanguinis sputum è Fau-cibus, Palato, Gulâ, Columellâ, Ductu nasali, Gingivis, aut Ventriculo ipso per Vomitum excernitur, Hæmoptoë appellari non solet.

Causa proxima est Vasorum sanguivehorum dictis in partibus affectis vel ruptio, vel erosio, unde Sanguis in Pulmonis vesiculas effluens, intra ramulos & canaliculos tracheales suscipitur, & inde paulatim cum Tussi rejicitur sive excreatur; Respiratione interea propter Vesicularum pulmonalium impletionem non nihil difficili, ac simul ob aërem per extravasatum sanguinem cum sibilo vel al-

lisione penetrantem, stertorosâ redditâ.

Causa antecedens est vel humor acris erodens, aut pus quoque acre in Phthisi Vasa majora minorave aperiens: vel Tussis violenta quacun- que demum à causâ proveniens, atque vas quoddam rumpens: vel tandem nimia tenerorum Vasorum in Pulmonibus Plethoricorum distensio atque ruptura, à sanguine multum rarefacto producta, quemadmodum hoc in Viris subinde, in Fœminis autem frequentius contingit, præprimis tempore menstrui fluxûs, qui si per ordinarias vias obstructas fieri nequit, sæpè per ruptos Pulmonum canaliculos, sub formâ Hæmo-ptoës excitatur.

Externæ causæ sunt Corporis incalescentia; nimius Vinorum gen-erorum potus, præprimis si Asthma, Tussis, atque Plethora simul adfuerint; inspiratio aëris gelidi, vel potus gelidus affatim ingurgitatus post ingentem corporis æstum; Ictus, Lapsus, Contusio, Vulnus, nimia Vociferatio, & similia violenta exercitia, quæ vasa rumpere, sanguinisque sputum producere valent.

Facile Hæmoptysis ex sputo cc- Diagnosi
gnoscitur, dum per Tussim modò si.
sanguis spumosus, rutilus, floridus
ac sincerus è ruptis vasis cum sterto-
rosâ quadam respiratione plus mi-
nus copiosè ejicitur; modò sanguineæ
striæ plures vel pauciores, purulentæ
aut viscosæ materiæ permixtæ, in Vo-
micâ aut Ulcere pulmonum &c. ex-
screantur; quanquam hæc striarum
Cccc tantum

tantum sanguinearum cum aliâ materiâ rejectio propriè non mereatur *Hæmoptoe* vocari. Quod si verò sine Tussi sanguis sive è glandulis palatinis, sive è Faucibus, (ad quas in Hæmorrhagiâ narium subinde per ductum nasalem corpore supino jacente delabatur) sive tandem è Gingivis proveniens excreatur, magis Sputum cruentum quàm Hæmoptoe appellatur; quemadmodum, qui è Ventriculo per gulam excernitur Sanguis, *Vomit* sanguineus nuncupatur. Notus fuit nobis ante complures años Vienne Austriacæ Vir Nobiliss. Dn. Goldschleger, Professor olim Marpurgensis, S. Cæs. Pal. Com. qui quotannisverno atque autumnali tempore Hæmoptoen patiebatur, eaque non sine discrimine Vitæ ultra quatuor libras sanguinis spumosi, floridique rejiciebat. Quo quidem malo per decem pluresve annos conflictabatur, donec tandem ex usu *Fumi Tabaci* quotidiano ab eo prorsus liberatus fuerit.

Prognosis.

Quantum ad *Prognosin* attinet, non omnis Hæmoptoe æquè periculosa est, sed ea tantum, quæ ab Ulcere Vomicaque Pulmonis provenit; quæ vires admodum debilitat, quæque Tussim, Pulmonis exulcerationem, & lethalem Phthisin post se trahit. Reliqua verò omnis Hæmoptoe faciliorem admittit sanationem.

Curatio.

In *Curatione* si Phthisis & Ulcus Pulmonis adest, tunc suo modo curatur, remedia semper admiscendo, quæ sanguinis simul fluxum sistere

possunt. Ubi autem in Plethoricis, aliisque tenerioris texturæ Hominibus Hæmoptoe per Vasorum rupturam contingit, ibi omissis purgantibus, *Venæsectio* statim est instituenda: deinceps verò *Conditum* è *Conserv. Bell. min. Radice Alth. Fl. Ros. rubr. Roob Passular. Corall. rubr. ppt. ½ n. diaph. Lapid. Hæmat. ppt. Semine Urtic. Sanguine Drac. ver. C. C. usto, Unicorn. fossil. & Syrup. Capill. ½ is vel myrtin. concinnatum*, sæpius exhibendum est, v. gr.

R. Conf. Ros. rubr. ʒlat. ʒj.

Fl. Tunic. ʒss.

Condit. rad. Symp. ʒij.

Conf. Hyac. inc.

Lapid. Hæmat. ppt.

Terr. sigillat. ana ʒj.

Semin. Hyoscyam. ʒj.

Syrup. de Ros. sicc. q. s.

M. f. Electuar. d. ad Pyxid. Dosis singulis triboriis magnitudo Nucistæ.

Vel *Tinctura antiphthisic. ad gutt. xvj. pro dosi exhibeatur m. ac vesp.* Sic etiam *Rotulæ* è *Corall. rubr. ppt. Sanguin. Dracon. ver. Lapid. Hæmat. ppt. Gum. Samb. Semin. Hyoscyam. Papav. alb. Violis recentibus*, si haberi adhuc possunt, vel siccis etiam, & *Saccharo*, tantillo *Succi Berberum & Aquâ Rosar. soluto*, confectæ præstantes sunt. Sed juxta hæc aliquandiu *Becchicis* detergentibus depletiones quoque Pulmonum sunt instituendæ, ne relicto cruore in eorum recessibus tandem ulcerosi Sinus cum purulentâ materiâ progignantur. Ad quos præcavendos, *Decoctum pectorale traumaticum* aliquandiu est bibendum, ex *Radicibus Gly-*

Glycirrhiz. Tussilag. Lappæ min. Nymphææ, Scorzonæ. Fragar. Herbis Veronic. Chamædr. Chamæpith. Pilosell. Numular. Plantag. Sanicul. Vinc. pervinc. Geran. robertian. Flor. Bellid. min. Semin. Acetof. Passulis minoribus, Tamarind. & Saccharo cand. rubr. in Aquâ fontis invicem coctis, v. gr.

℞. Radic. Caryophyllat.

Ulmæ. ana ʒß.

Herb. Artemis.

Sanic.

Pyrol.

Summit. Virg. aur.

Flor. Bell. min. ana Mß.

Semin. Hyper.

Anis. ana ʒij.

Incis. & contus. coque in Vini albi veter. Aqu. font. ana ℥ij. ad Ovi duritiem, de Colaturâ postmodum ter quotidie hauriantur tres pluresve unciae cum ʒj. Conservæ Rosar. rubr.

Vel Decocti hujus loco Mixtura propinari potest ex Aqu. Veronic. Polygon. Urtic. Alchymill. Plantag. Burs. pastor. Scabios. Essentiis Flor. Bellid. min. Tussilag. Hyperic. Numular. Gramin. Parnass. & Sacch. cand. alb.

℞. Aqu. Polygon. ʒiß.

Urtic.

Burs. Pastor. ana ʒj.

Syrup. flor. Tunic.

de Ros. sicc. ana ʒß.

Essent. traumat. ℥iiij.

Corall. rubr. ppt.

Bol. Arm. ppt. ana ʒß.

M. d. ad Vitr. Singulis sex horis duo cochlearia plena capiantur.

Possunt quoque parari Succo recentes è Bellid. Numularia, Plantagi-

ne, Urticâ urente, Gramine Parnassii, Hyperico, Veronica, Buglossò, Beccabungâ, Geranio robertiano, ac similibus Plantis vulnerariis, atq; de horum uno alterove seorsim, vel aliquibus simul junctis m. ac v. tria aut quatuor cochlearia cum Jure carniû assumi.

Deterso autem & evacuato cruore, qui extravasatus fuit, consolidantia & glutinantia aliquandiu usurpari debent, concinnata è Conservis Acetof. Ros. rubr. Lichenis petr. Flor. Tunicæ, Bellid. Syrupis capillor. ♀. de Symphyt. Fernel. de Polyg. de Ros. sicc. Bol. armen. Unic. fossil. Spec. diatr. frig. Terr. sigill. C. C. ust. Sanguin. Hirc. ppt. Sale Corallor. Syrupo & Pulvere Lichen. petr. Gramin. Parnass. Extract. fol. Querc. Essentiis vulnerariis supra nominatis, è quibus variæ in rem præsentem formulæ adornari possunt. Subacida imprimis omnia in hoc Affectu cum fructu capiuntur; quibus admisceri tamen debent absorbentia & opiata. Salia volatilia autem; & acria qualiacunque nocent, utpote à quibus sanguinis consistentia nimis fluida redditur.

In Dietâ porro à nimio corporis æstu, à Vinorum generosorum ingurgitatione largâ, à Vociferatione insigni, ab esu acrium salinorum & aromaticorum excessivo &c. est abstinendum. Venæsectiones bis vel ter in anno sunt instituendæ. Potus Coffeæ rarò parceque bibendus, ab usu Aloëticorum sibi cavendum. Acidulis suo tempore, sed cum cautelâ utendum; in plerisque usus Lactis caprilli vel asinini est præferendus. Tandem & Fumus Tabaci frequens

præſervationis loco non eſt contem-
nendus.

*Hæmo-
rhagia
narium.*

**HÆMORRHAGIA NA-
RIVM**, ex αἷμα, ſanguis & ρηγνύω,
rumpo, compositâ voce, eſt fluxus
ſanguinis qualiscunque per utraſque
vel alterutras tantum nares, à va-
ſculorum ſanguineorum apertione
oriundus.

Cauſa.

Cauſa ergo proxima eſt venulæ
alicujus in naribus prominentis aper-
tio, ſive hæc à rupturâ & dilacera-
tione, ſive ab eroſione contingat.
Antecedentes cauſæ autem ſunt Ple-
thora, Menſium vel Hæmorrhoidum
obſtructio, unde natura excretionem
per vaſcula narium molitur; Venula-
rum in naribus prominentia, & tene-
ritudo, ob quam facile aperiuntur,
vel eroduntur: earundem expansio
nimia, unde haud difficulter rum-
puntur ac diſſiliunt; ad quod con-
tribuere poſſunt vel Sternutatio,
vel violenta nimis muci narium ex-
cuſſio, aut ſi durius obhæreſcat, &
pruritus excitet, ejusdem extractio,
vaſculum ſanguineum, cui adgluti-
natus eſt, ſimul dilacerans; æſtus
ſanguinis ebullientis, atque hinc tar-
dius per vaſa, inprimis frontis & na-
rium, circulantis, unde ſimul Cepha-
lalgia, in Febribus aliâs Hæmorrhæ-
giam narium criticam præcedens,
oboritur; acrimonia tandem ſan-
guinis juſto magis falſi & ſeroſioris
exiſtentis, vel etiam in ſuâ compage
diſſoluti, & vaſcula erodentis, unde
narium Hæmorrhagiæ non raro in-
curabiles [producuntur, quæ licet

quandoque ſiſtantur, brevi tamen
iterum recurrunt. *Cauſæ procatar-
cticæ & externæ* ſunt Æſtivi aëris ca-
lor, ac nimia corporis exæſtuatio per
exercitationes vehementes: Viſtus
plenior & copioſior; temperamen-
tum plethoricum; uſus ciborum ni-
mis ſalitorum aut acidorum: Potus
rubri Vini largus & frequens, unde
paulatim ſcorbutica, vel ſeroſo-falſo-
acris Cacochymia Plethoræ jungitur:
Iracundia, & corporis incaleſcentia
non ſolum à Sole, & vehementi cor-
poris motu, ſed & à *Balneis*, inpri-
mis *Æreis* excitta, unde ſanguis turge-
ſcens vaſcula Narium valdè expandit,
talemque moleſtiam excitat, quâ Ho-
mines Narium membranam vel levi-
ter fricando, vel digiti intruſione ex-
pandendo, vaſcula rumpunt; quan-
quam & ſternutatio ex pruritu acce-
dens ſimul vaſculum diſſilire faciat.
Lapſus in nares aut caput, inſlicti
colaphi, ſternutatoriorum attractio-
nes crebræ tandem haud abſimilem
effectum producunt.

Quoad *Diagnosin*, facile Affectus
hic ad oculos patet; notandum ta-
men, utrum effluens ſanguis in flo-
ridè rubentes concreſcat grumos,
quod ſignum eſt Plethoræ, atque
ſanguinis non adeo malè habentis.
Vel an ſanguis effluens ſtatim in
partes ſuas, ſeroſam nimirum ſal-
ſamque copiâ exundantem, & gru-
moſam diſcedat, quod ſignum eſt
ſanguinis admodum ſeroſi, atque ad
ſui diſſolutionem deleteriam maxi-
mè proclivis. Distinguitur autem
Hæmorrhagia in *criticam* & *ſympto-
maticam*,

maticam, quarum illa in Febribus tempestivè nec immodicè eveniens salutem promittit; intempestivè autem & immodicè accidens, vel etiam sæpè per vices rediens, lethalem morbi eventum portendit. Hæc verò s. *symptomatica* etiam citra Febrim ab aliquâ causarum supradictarum contingit.

In *Prognosi* notandum est, quod *Hæmorrhagia modica symptomatica* in Plethoricis sæpè Cephalalgiam adimat, & à Febribus, Apoplexiâ, aliisve morbis Hominem præservet. *Hæmorrhagia* etiam *critica*, intra terminos mediocritatis subsistens, ac ubi simul sanguis floridus, nec dissolutus aut valde serofus & acris est, sanitatem Aëgris conciliat. Si verò *Hæmorrhagia nimia* sit, sive in Febribus, sive extra illas, si frequentius occurrat, si diu durans vires exolvat; si pallorem vultui & labiis inducat; si Sanguis effluens valdè serofus sit, acris & confestim in suas partes secedat; si acrimonia suâ nares exasperet, & exulceret; si denique redeat subinde, tunc metus est, ne Hominem tandem interimat, ob continuum ac sisti impossibilem Sanguinis fluxum; néve etiam sedatam Hæmorrhagiam Cachexia vel Hydrops lethalis subsequatur. In Febribus malignis Hæmorrhagia narium statim à principio accedens, ac subinde licèt modicè rediens, magnam sanguinis acrimoniam, dubiumque morbi eventum indicat.

Curatio pro diversitate circumstantiarum instituitur. Quod si enim

Criticè in Febribus obtingat, non statim sistenda venit, sed naturæ permittenda, ita tamen ut *roborante* interno remedio, *Mixturæ cardiacæ* succuramus. Si autem in iisdem Febribus magis *symptomaticè* à Sanguinis abundantia citra malignitatem eveniat, viresque fortes, plethoræque adsint, ad *sanguinis missionem* tuto accedimus; atque mox simul diaphoretica præscribimus, ea miscendo, quæ æstum sanguinis minuere ac restinguere possunt; sed externa simul non negligentur paulo post enarranda. Ubi verò in Febribus Hæmorrhagia sanguinis acrimoniæ adscribenda venit, tunc *absorbentia* & *edulcorantia internè* quidem, juxta *Emulsiones*, præscribentur; *externè* verò ea applicabuntur, quæ postea in omni narium Hæmorrhagia commendantur.

In *Hæmorrhagiâ nimia* primo omnium *Venæsectio*, præcipuè in Plethoricis convenit, quæ uti sanguinis abundantiam & æstum, ita simul ejusdem per nares fluxum imminuens ac sistens. Postmodum internè conveniunt *Julepi refrigerantes ex Aquis Portulac. Urtic. Lactuc. Endiv. Burs. pastor. Syrupus de Acetosell. Rub. id. Cydonior. Flor. Papav. rhead. Vel Emulsio refrigerans* exhibeatur.

R. Aqu. Plantag. ℥iij.

Endiv. ℥ij.

Syrup. Cydon.

Acetosell. ana ℥j.

Spir. Oli q. s. ad grat. acid.

M. f. Julepus, d. ad Vitr. pro duabus dosibus.

Cccc 3

Vel

Hæmorrhagiâ nimia.

Vel R̄. *Amygd. dulc. rec. exc.* ʒj.

Aqu. Urtic.

Burs. past. ana ʒiiij.

F. l. a. Emuls. cui adde

Syrup. de Nymph.

Diacod. Mont. ana ʒvj.

Unic. fossil. ʒiiij.

M. d. ad Vit. Potetur tribus do-
sibus.

Si sæpius in Plethoricis obtingat, metusque sit, ne accedente quadam præternaturali acrimoniâ, tandem quocunque modo lethalis evadat, tunc præservationis loco vel *Lac caprillum integrum* per plures hebdomadas est propinandum una cum ʒiʒ. vel ʒij. *Conservæ Ros. rubr. s. Ol.* Vel *Acidularum* potus æstate concedendus; vel *Electuarium* aliquod sicuti in *Hæmoptoë* est præscribendum, inque ejus usu aliquandiu continuandum. Neque tamen in casu necessitatis externa negligantur. Si verò in Plethoricis talis Hæmorrhagia subinde recurrat, nec diu duret, aut vires exolvat, tunc non est sistenda, quia plus juvat, quàm nocet.

Quando autem Hæmorrhagia non tantum sæpius recurrit, sed & diu durat, vires exolvit, pallorem vultus post se relinquit, & è sero copioso acri, falso, sanguineam massam prorsus dissolvere conanti, provenit, tunc neglectâ etiam *Venæsectione*, quies corporis & animi est imperanda, atque Potio statim sequens adulto homini est propinanda:

R̄. *Aqu. Fl. Acac.*

Plantag.

Burs. past.

Syrup. Corallor. ana ʒj.

Lapid. Hæmatit. ppt.

Sanguin. Drac. ver. ana ʒj.

Land. opiat. gr. j.

M. f. Potio d. ad Vit. pro dosi quotidie repetendâ.

Vel hujus loco exhibeatur *Emulsio* ex *Aquis Borrag. Bugloss. Plantag. Burs. pastor. Polygon. Ulmar. Sanicul. Chamomill. Nymphææ, Portulac. cum Seminib. frigid. major. ut & Papav. alb. additis tandem Pulveribus C. C. ust. Unicorn. foss. Corall. alb. ppt. Magist. ʒ n. &c.* Sic & *Lanugo Baccarum Cynosbat. vel Semen Urtic. aut Hyperic. ad ʒj. in Pulvere exhibitum talem Hæmorrhagiam quoque sistit. Imò & Pulveres è Terr. sigillat. Bol. armenat. Croc. ʒ t. adstring. Diaph. martial. ʒ n. diaph. Ocul. ʒ. C. C. ust. Ebor. ust. Unicorn. foss. Corall. rubr. vel alb. ppt. Semin. Urtic. Hyoscyam. vel Papav. alb. Matr. perl. ppt. ac similibus concinnati, vel per se sub dosi ʒʒ. cum Emulsionibus aut Aquis destillatis; vel cum Conservis Urticæ, Plant. Flor. Tunic. Ros. rubr. Fol. Polygoni permisti, exhiberi sedulò possunt. Sunt qui & *Succum Catechu, Flores Balaustiorum pulveris. aliave fortiter adstringentia internè præscribunt, à quibus tamen vix semper laudabilis sperandus est effectus. Commendamus magis Tincturam antiphthificam Garmann. vel Tincturam è Radic. Tormentill. Bistort. Herb. Polygon. Urtic. Geran. robertian. Flor. Balaust. Ros. rubr. & simil. cum Spiritu sanguinis hircin. extractam. Aliquando etiam Ichtyocolla ad ʒj. vel ultra in Jusculo soluta**

soluta propinari solet. Si *Julepi* desiderentur, concedi etiam poterunt, sed non nimis *acidi*, in quem finem præter *Aquas destillatas superiores*, simul commendamus *Syrup. de Succ. Urtic.* ut & *Papav. rhead. Flor. Tunic. Cydonior. Acetosell. de Ros. sicc. de Symp. Fenel.* cui & *Tinctura Fl. Papav. rhead.* admisceatur. Porro *Juscula Succo Plantarum recent. Urtic. Borrag. Polygon. Apii selin. Nasturt. Plantag. Millefolii, Ros. rubr. &c.* alterata non sunt contemnenda. Ita & seqq. *Pulvis* cum fructu usurpari potest in desperato quoque casu:

℞. *Semin. Portulac. 3j.*

Plantag.

Urtic.

Hyoscyam. ana 3ß.

Radic. Consolid. major. ʒij.

Sacch. cand. alb. 3ß.

M. f. Pulv. subt. cujus dosi est 3j. singulis sex horis cum *Emulsione* propinanda. Si placet eidem addere *Lapid. Hæmat. Unicornu fossil. Sanguin. Dracon. verum. &c.* non è re erit. Poterunt etiam ex eodem pulvere & *Saccharo Aqu. Ros. soluto Rotulæ* fieri, atque sæpius lambendæ exhiberi. Nec displicent mihi sequentia quorundam hoc in casu secreta:

℞. *Hippenteror. num. iij.*

Aqu. flor. Acac. ʒiv.

Stent infusa per bihorium; colatura postmodum filtrata & sacchari tantill. vel *Syrup. de Papavar. rhead. edulcorata* exhibeatur pro dosi, & aliquoties repetatur. Vel

℞. *Fimi porcin. rec. 3j.*

Aqu. Fl. Acac. ʒiiijß.

Ros. 3ß.

Stent in infus. per horam; colatura dein filtrata & Rotulis Berberum ac Man. Chr. simpl. nonnihil edulcorata detur pro dosi sæpius repetendâ. Addi his potest quoque 3ß. *Confectionis Alk. vel Hyac. compl.*

℞. *Sanguin. Hirc. ppt. ʒiiijß.*

Pulv. viperin. ʒj.

Semin. Hyoscyam. alb. ʒß.

M. f. Pulvis subtil. in 2. dos. æqu. ad ch. m. ac vesperi exhibend. cum Jusculo avenac. vel farinaceo.

Ita ex *Semine Hyperic. Cortic. Tamaric. Granat. Radic. Tormentill. Consolid. Bistort. Florib. Balauft. Ros. rubr. Herb. Polyg. &c.* cum *Aqu. Fabrorum* extrahitur vis adstringens, & ad *Mellis* ferè consistentiam coquitur; de quo *Extracto 3j.* vel plus cum *Aquâ Plantaginis* subinde exhiberi potest. Denique præservationis loco inservit etiam *Potus Acidularum* vel *Lactis caprilli integri*, vel *Aquarum è nasturcinis Plantis destillatarum*, vel denique *Jusculorum Herbis nasturcinis, Urticâ, Millefolio, &c. alteratorum.*

Externè plura ad sistendum hunc sanguinis Fluxum adhibentur, qualia sunt v. gr. *Emplastrum è Rubricâ fabrili adstringens* factum, & *radicinarium* inter duos oculos impositum; *Acetum frigidum* vel per se vel cum *adstringente* sive *stegnotico pulvere* in pulvem redactum, atque collo, fronti, scroto, quatuorque artubus frigide applicatum; *Pulvis adstringens* naribus attractus, qualis è *Laccæ Florentin. Alumin. rup. Cretæ coloniens. ana* partibus

*Externa
remedia.*

partibus æqualibus concinnari potest; *Liquor* etiam *stypticus* naribus subinde immissus, quemadmodum est sequens:

℞. *Aqu. flor. Acac. Plantag. aa. ʒiβ.*
Alumin. rupei.

℞. *℞. tis aa. ʒβ.*

Lacc. florentin. ʒj.

M. ad Vit. Vel coletur post aliqualem digestionem.

Manibus teneri potest *Lapis Hæmatites*, vel alius *Lapis frigidus*, donec incalescat. *Ferrum* etiam candens naribus propinquè admovetur, ut sanguis in illis coaguletur. Juvat non raro *Turunda* è *carbasso* facta, *albumine Ovi* imbuta, *pulvere* ℞. *℞. li*, ac *Terræ sigillatæ*, vel alio *stegnotico* conspersa, naribusque intrusa. *Nasus* supremus, ipsaque *frons*, continuè *Aquâ gelidâ*, vel *Aceto frigido* fomentatur. *Cucurbitulæ* magnæ, cum magnâ *flammâ Hypochondriis* sine scarificatione applicantur. *Frigidæ aquæ* subitanea in *Cervicem Ægri* profusio inscii, ut ita terrorem incutiat, laudatur, à quo sæpè confestim *Fluxus narium* sistitur. Vel *Cervix* quoque *Aceto frigido*, uti supra, continuè foveatur. Aliquando & *Fons saliens* in nares sanguine stillantes aliquandiu intro-mitti solet tamdiu, donec *Hæmorrhagia* sistatur. *Stercus suillum*, vel *Musculus tectorum* recens naribus etiam admovetur, quorum certè habitus quandoque fluxum sedant. Sunt & qui in casu desperato *lin-teola Spiritui ℞. li immersa* naribus intrudunt. *Aqua gelida*, vel *Acetum* tale carpis manuum affunditur, si *Febris* absit,

Sic & *Aqua gelida* frequenter in ore teneri potest. *Crepitus Lupi* naribus quoque intrudi solet, vel per se, vel *Pulvere Lapid. Hæmat.* aut *Cretæ alb.* aut *Cinerum Chartarum*, vel *Pappi*, aut ipsius etiam *℞. li* conspersus. *Spongia Aceto immersa*, vel *Bufo exiccatus* & *Aceto* conspersus *Axillis* submittitur frigidè. *Radix Pæon. Bursæ pastoris, Polygon.* vel *Nigellæ* sub linguâ tenetur, aut etiam masticatur. Commendant alii *Lapidem Carpinum* ore detentum. Tandem & *Ligaturæ* brachiis, pedibus, vel eorum digitis injectæ, ac per vices reiteratæ, etiam ad fluxûs sanguinei sedationem contribuunt.

HÆMORRHAGIA VTERI, ^{Hæmorrhagia Uteri} est *Fluxus sanguinis* plus minus copiosus per *Vasa Uteri sanguiveha*, quacunque à causâ rupta, lacerata aut erosa contingens.

Distinguitur non nisi gradu à *ni-Di-mio Mensium fluxu*, in quo non tam per *Uteri*, quàm per *Vaginæ uterinæ* vascula majora aperta sanguis profluit. Quod si enim ex ipsis *Uteri* vasis provenit, *Hæmorrhagiam* magis *uterinam* vocabis. Deinde *Mensium fluxus* immodicus ordinario quatuor hebdomadarum tempore obtingit, *Hæmorrhagia* autem quocunq; tempore *Fœminis* accidere potest.

Pars affecta proin sunt *Venæ* per *Uteri* substantiam numerosè disseminatæ, eæque majores apertæ: è minoribus enim ramulis fluxus ejusmodi enormis provenire nequit.

Causa proxima autem est apertio ^{Causa proxima} *Venæ*

Venæ unius vel plurium majorum in Uteri fundo præprimis existentium; unde sanguis non tantum, ut plerunque contingit, floridus, sed subinde etiam coagulatus intra capacitatem ejus, sub formâ grumorum nigricantium non sine insigni tenesmo, & egerendi conatu excernitur. *Antecedentes* causæ sunt *vel* humor acris corrosivus, (velut à nobis in Uteri cancro observatus est ann. 1695. & 96. in Fœminâ quadragenariâ) qui vasa etiam majora erodit: *vel* ruptio, à nimîâ distensione vasorum, & simul superaccedente improvisâ rarefactione sanguinis, aut etiam à saltu, aliove insigni motu corporis, brachiorum vel crurum expansione, ponderisve gravioris elevatione proveniens: *vel* est dilaceratio, à simili corporis agitatione, aut violentâ Secundinarum ab Uteri fundo avulsione, unde non possunt non plura etiam majora vasa discerpi, producta. Occasionem remotius præbent diathesis sanguinis salino-sulphureo-acrior, Plethoræ conjuncta, Vasorum uterinorū teneritudo & elater debilis, Cibi multi aromatici & salino-acres, Balnea calidiora, vel etiam Stuphæ sive Laconica corpus incalefacientia.

Quoad *Diagnosin* & *Prognosin*, Affectus hic signis peculiaribus multisque opus non habet, quando Symptoma est, de quo Ægri conqueruntur, quodque Medico curandum, sistendumque offertur. Malum certè non contemnendum, quia vires magnopere exhaurit, Ægras flore balsamico sanguinis, spirituumque

vitalium necessariâ quantitate privat; animi Deliquia, Gangrænam, Convulsiones, Febres, Cachexiam, Hydropem, mortemque lentam post se trahit. Si Uterus cancroso tumore est affectus, Hæmorrhagia frequenter ipsi jungitur, propter crebram vasorum erosionem.

In *Curatione* ea quidem *intus* ex- *Curatio.* hiberi possunt, quæ in Hæmorrhagia v. gr. *Narium* commendavimus; modò non nimium adstringendo Ulceri uterino ansam præbeant. *Externæ* verò profunt heic *Ligaturæ artuum*, *Venæsectio*, *Emplastrî Comitissæ*, aliisque *adstringentis* applicatio ad Lumbos & Inguina, *Chalybis frigidi* detentio in manibus, *Corporis* maxima, diuturnaqué *quies*; *Linteorum Aceto* immerforum appositiones ad Lumbos & Abdomen. Si quæ præterea externè contra Hæmorrhagiam *Narium* suo loco commendata sunt, & heic pro re natâ usurpari possunt.

HÆMORRHAGIA VVLNERVM, est sanguinis copiosi effluxus *Hæmorrhagia*
Vuln-
rum. è partibus carnosis quocunque modo vulneratis, ex apertione unius vel plurium vasorum sanguivehorum majorum oriundus.

Equidem in quovis Vulnere sanguinis profluxus observatur, quando semper vascula quædam rumpuntur: verum si minores tantum canaliculi aperti sunt, & exigua solum minusque notabilis quantitas liquoris circulantis profunditur, nomen *Hæmorrhagiæ* nec meretur, nec invenit: sed tum demum ita vocatur, quando

D d d d

insignis

insignis quantitas sanguinis è ruptis vasis majoribus profunditur, ut, nisi sistatur, magna virium jactura, ipsaque adeo mors inde metuenda sit.

Causa.

Causa proxima talis Hæmorrhagiæ est, quicquid sive pungendo, sive secando, sive contundendo vasa partium mollium venosa arteriosa rumpere, dilacerare, vel alio quocunque modo aperire potest.

Diagnosis & Prognosis.

Hæmorrhagiam Vulnerum cognoscit quilibet, neque contemnenda illa est; quod si enim arteriæ, majores in primis, fuerint apertæ, præcipuè secundum longitudinem, non ita facile Hæmorrhagia sistitur; si quoque è Venis majoribus v.g. Colli, Inguinum, Femorum sanguis profluens intra horæ spatium non sistitur, mortem plerunque infert, aut Ægrum ita viribus atque spiritibus exhaurit, ut postliminiò in Cachexiam aut Hydropem lethalem facile incidat, vel lentam ad minimum Febrim incurrat, à quâ non nisi post longum temporis intervallum ad pristinam sanitatem redire valet.

Curatio.

Quoad *Curationem*, ad Hæmorrhagiam Vulnerum sistendam *Pulveres stegnotici* stupæ albumini Ovi immerse insperguntur, & Vulneri statim applicantur. *Pulveres* illi usitatè componuntur è *Terr. sigill. Terr. Olii dulci, Pulvere Equiseti, Gallar. Bol. Armen. Lapid. Hæmat. ppt. Sanguin. Dracon. Pilis leporinis pulveris. Vitriolo cypr. Amylo alb. Colophon. Myrrhâ, Lacc. Florentin. Telis Araneæ. Usneâ, aliisve Muscis siccatis & pulverisat. Thure, Calce viv. Farin. volatili, Gyp-*

so, Succo Catechu; quibus etiam *Crepitus Lupi* substituitur, præprimis albumine Ovi conspersus. Vel statim *Plumaceolus*, aut *Linteam quadrupl.* aut *Stupa*, aut *Crepitus Lupi* liquori cuidam *styptico*, si statim ad manus est, immergatur & applicetur. Tales autem *styptici Liquores* variè à variis concinnantur, & in usum adhibentur, quorum descriptiones videantur apud *Dolæum Encyclopæd. Chirurg. Ration. pag. m. 413. in Curatione Hæmorrhagiæ narium.* Quibus adde *Liquorem magneticum Waldschmidii*, aut etiam solum *Vini Spiritum optime dephlegmatum*, aut cum hocce extractam *Tincturam Catechu*, vel *Prunorum sylvestrium* nondum perfectè maturorum. *Wedelius* commendat *Pannum Xylum ustum albumine Ovi exceptum*, sicque applicatum, superimposito adhuc *Crepitu Lupi*.

Quod si tamen his nihil efficias, atque etiam continuato eorum usu nullum tibi effectum promittere queas, tum vasis majoris aperti orificium vel compressione digitorum est occludendum, donec thrombus concreascit; vel si arripi Vena aut Arteria possit, ligetur; imò Arteria, si tantum aperta sit, prorsus disseccetur, hincque vel ligetur, vel *actuali cauterio*, quod sæpè præsentissimum atque tutissimum est remedium, aduratur, atque nihilominus adhuc desuper applicetur *Stupa*, aut *Crepitus Lupi* cum albumine Ovi. *Cauteria* verò *actualia* juvant partes adustas crispando, corrugando, & crustam inducendo. Quando Hæmorrhagia

sedata,

sedata, Vulnusque deligatum est; ligatura ante aliquot dies perfectè solvi non debet, ne recens Hæmorrhagia subsequatur. Sicubi etiam è re videbitur esse, *sanguinis Missio* in Brachio instituatur, atque internè exhibebuntur, quæ supra contra *Hæmorrhagiam Narium* commendavimus.

HÆMORRHOIDES COECÆ

sunt tubercula venarum nodosa, majora minorave, rubicundo-cœrulea, vel intra anum latitantia, vel extus conspicua, plus minus dura aut mollia, atque dolore nunc gravante, nunc urente etiam valdè molesta, à subsistente in vasis sanguine crasso oriunda.

Differunt hinc maximè inter se; etenim 1. ratione *magnitudinis* Hæmorrhoides cœcæ nunc valdè nunc minùs tumidæ existunt. 2. Ratione *numeri*, aliæ unico solùm nodo, aliæ pluribus nodis vel tuberculis varicosis eminent. 3. Ratione *situs & partis affectæ*, aliæ hærent intra anum, vel etiam apud Fœminas intra vaginam uteri, & internæ vocantur; aliæ extra anum vel vulvam eminent & conspiciuntur, externæ proin nuncupatæ. 4. Ratione *originis*, aliæ sunt hæreditariæ, aliæ adventitiæ. 5. Ratione *temporis*, aliæ sunt recentes, aliæ inveteratæ, quædam etiam periodicè, atque certis temporibus, vel post commissos in diætâ errores recurrunt. 6. Ratione *durationis*, aliæ facile citòq; dispereunt, aliæ diutius affligunt. 7. Ratione *figuræ*, aliæ sunt longæ, verrucis similes, hinc verrucæ dictæ;

aliæ rotundæ nonnihil & latæ, baccae Uvarum magnitudine, hinc *uvales* vocatæ; aliæ *mori* fructûs formam æmulantes, *morales* proin vel *mariscæ* appellatæ; aliæ denique *vesiculis* similes sunt, *vesicales* eapropter nuncupatæ. 8. Ratione *modi*, aliæ mites sunt, aliæ malignæ, vel etiam cancrôsæ. 9. Ratione *Symptomatum*, aliæ sunt cum *maiore vel minore dolore*, eoque nunc *gravativo*, nunc *inflammatorio & urente*; aliæ etiam cum *Tenesmo ani* frequenti; aliæ cum *Abscessu, & Exulceratione*, vel *Febri*. Aut etiam Ani vaginæque uterinæ Proci-dentiâ, aliisque symptomatibus conjunctæ.

Subjectum, seu *Pars affecta* sunt Venæ hæmorrhoidales, ceu Vasorum iliacorum propaggines, in quarum valvulis, si crassior, viscidiorque humor circulans subsistat, Nodos illos, vel Varices hæmorrhoidales progignit. Quidam Neoterici credunt, & extremos Arteriolarum tubulos quandoque inrumescere, ultra quos nimirum sanguis ille lentus in venulas transmitti nequit; atque tum non solùm gravativum, sed & pulsanter simulq; urentem cum Inflammatione dolorem produci; atque hoc quidem respectu sententiam hanc admittimus, quanquam plausibile sit, ordinarias cœcas Hæmorrhoides non nisi *Venularum ani Varices* existere.

Causa proxima Hæmorrhoidum cœcarum, est suppressio earundem fluxûs à sanguinis visciditate oriunda, ob quam in extremis tubulis stagnat & coacervatur. Stagnationem hanc

magis promovent tum Venularum minimarum præcedens obstructio; tum earundem compressio facta à duris fœcibus harumque difficili excretionem, aut à Tumore quodam vel Inflammatione in musculis podicis natâ. Hæc verò coacervatio sanguinis in tumentem unum alterumve nodum contingit, quatenus ille ob lentorem retro valvulas Venularum urgetur & cogitur, ut ita in ipso valvularum loco dicti nodi vel tubercula appareant magis patentia, quamvis & reliquis Venarum tractus simul tumeat. Dolor inde gravativus vel subinde etiam lancinans sentitur, propter membranarum circumjacentium valdè sensibilibus nimiam expansionem, vel fibrillarum nervearum à salis acris asperitate factâ irritationem. Post scybalorum alvinorum duriorum difficilem excretionem, indeque factam sanguinis in Venis propinquis retro-pulsionem dolor etiam augetur. Quod si verò Tumor diu durans ardente pulsanteque dolore molestus evadat, tum non amplius sub *Hæmorrhoidum cæcarum*, sed sub *Inflammationis veræ* nomine venit, quæ ubi humorum circulatio non maturè restituitur, propter ruptos canaliculos minimos, effusumq; sanguinem putrescentem in *Abscessum*, *Ulcusq;* haud rarò mutatur.

antece-
dens.

Causa *antecedens* hujus mali partim in sanguine est quærenda, partim in ipsis tubulis sanguinis justam suam configurationem, & debitam amplitudinem vel conformationem amittentibus, quale quid non rarò à remediis aloëticis, aliisque specifico

quodam sale acri prædicta vascula crispantibus, vel etiam planè discindantibus producit. Inprimis autem heic accusamus sanguinis copiam nimiam, ejusdemque ab intercurrente aliquo acido fixo enatam crassitiem ac visciditatem; quâ quidem vitiosâ qualitate imbutus, in aliis certè omnibus vasis sanguiferis utcunque benè circulatur, in hæmorrhoidalibus autem vel eapropter etiam facilius obhæret & stagnat, quòd Homo forsan multum sedeat, aut equo rhedisve diu vehatur, sicque vasa illa plus quàm quævis alia comprimant. Ipsi hinc Melancholici atque Scorbutici ob sanguinem minùs mobilem, fixis quippe salibus valdè imprægnatum, huic malo multum sunt obnoxii; sicut Cholerici ob Sal volatile oleosum & acre sanguinis Hæmorrhoidibus magis fluentibus infestantur. Malum præterea audit *hereditarium*, si liberi eandem cum Parentibus crasin atque texturam humorum sortiuntur. Qui nimium Veneri indulgent, ac suum ita sanguinem spirituosius valdè partibus depauperant, humorum quoque crassitiem adipiscuntur, in quâ particulæ, ob suam ponderositatem majorem, sibi invicem fortius graviusque incumbentes lentum motum adquirunt, & ita in hæmorrhoidalibus tubulis faciliè obhærent. Proin Itali, Hispani, atque Galli, Veneri maximè inhiantes ad hoc malum præ aliis proclives existunt, si reliqua simul consenserint.

In Causis *procataceticis* ea omnia
ad

procataceticis

ad hunc Affectum contribuunt, quæcunque vel sanguini lentorem acidofixum imprimere, vel hæmorrhoidalia Vasa crispare atq; comprimere valent.

Cognoscuntur Hæmorrhoides cœcæ ex dolore ani magis vel minus gravante; crurum longuore; tuberculo uno alterove rubicundo-livido juxta anum exurgente, nonnunquam cum ardore ac pruritu conjuncto. Nodi illi variæ quandoque sunt figuræ; Dolor est nunc mitior, nunc, post alvi excretionem præprimis, gravior. Si internæ sunt Hæmorrhoides cœcæ, ad oculum haud patent, sed solo plerunque dolore gravativo, & aliquali tenesmo, circa os sacrum sese produnt. Color faciei, si malum pertinax est, etiam mutatur in citreum aut luridum.

Non omni semper periculo cœcæ vacant Hæmorrhoides, quia neglectæ haud difficulter Inflammationem, Gangrænam, Sphacelum; vel saltem Abscessum, Ulcus, Fistulamque Ani difficulter medicabilem post se trahunt. Præ dolore nimio vidimus quoque Homines in animi Deliquia incurrisse.

In Curatione Hæmorrhoidum cœcarum præ *Venæ sectione* etiam largiore, aliquoties, si opus videbitur, institutâ, præsentius vix datur remedium. Cùm autem sæpè sanguis in nodis hæmorrhoidalibus propter scybala excrementorum alvina, extus prementia, circulari vix possit, tum in *Jure carniarum de Electuar. catholico* uncia dimidia vel integra dissolvatur, & unâ dosi hauriatur; hoc enim facto

scybala intestinorum duriora emollientur, atque blandè evacuabuntur. Vel hujus loco de *Passulis laxativis cochleare unum* aut *alterum* comedatur. Postea non sine fructu ter vel pluries potandus offertur *expressus filtratusq; Fimi recentis & adhuc calentis Vacca nigræ succus ad duas vel tres uncias cum Aqu. Fl. Acac. & Saccharo.* Vel quotidie propinabitur semel aut bis cyathus *Aqu. Plant. Nasturt. atq; Fumar. repletus, cum vel sine pulvere quodam diaphoretico, v. g. ex Antimon. diaph. Ebor. ppt. Ocul. ☉. ppt. Dent. Hippopotam. vel Apri ppt.*

Extus verò frequenter inungi potest *Linimentum Norimberg. de Hyoscyam. vel de Linariâ; nec non Oleum rosac. vel Ovor. Amygdal. dulc. Nucl. persic. Semin. Papav. alb. express. Populeum, Lil. albor. Violar. Verbasc. Camph. cum Tutiâ, Lapid. calaminar. Mercur. dulc. aut præcipitat. alb.* Vel *Succus Ceparum* aut *Cepæ ipsæ, Allii radices, Tuliparum bulbi; Folia Hederæ arboreæ, Alliariae, Chelidon. maj. Scrophular. rec. Quercus &c.* cum *Oleo rosaceo*, aut *Butyro recenti non salito* parum coquantur, indeque per linteum expressus *Balsamus* in hunc finem usurpetur. Sed caveto ne frigide remedia applies, quia nil magis nocet, quàm actu frigida, unde non rarò Gangræna superinducta fuit. Nonnulli *radicem Telephii* contusam in hoc Affectu ossi sacro applicant. A *sectione* vel *puncturâ* Hæmorrhoidum cœcarum per *Hirudines* prudenter abstinebis, quando Fluxus inde nimius sanguinis, vel

etiam Ulcus hæmorrhoidale fistulosum metuendum est. Si verò tutioribus & blandioribus remediis earum apertionem & lenem fluxum procurare possumus, neutiquam id intermittamus; hunc autem in finem commendamus tumentium Vasorum frictionem asperiusculo cum linteo factam; vel cum foliis *Mercurialis*, *Parietariæ*, *Centaurii minoris*, *Borragin. Betæ*, *Cyclamin. Cepar. Alliar.* institutam. Qualia tamen folia sæpius per solam applicationem nodos hæmorrhoidales aperiunt, atque fluere faciunt. Vel *Pellicula* subinde quædam *Ceparum albar.* aut *assatæ* cum *Oleo Lilior. alb. Cephæ Emplastri* formâ apponuntur. Quidam *Radicem & folia Alth.* cum *Radic. Petroselini*, *Vincetoxic. Aristol. rot. ver.* & *Foliis Malv.* in *Vino* coquunt, & de hoc *Vino* colato m. ac vesp. haustum trium pluriumve unciarum propinant ad Hæmorrhoides aperiendas. *Officula* quoque *Malorum Persicor.* pulverisata prunis insperguntur, fumusque ad Anum tamdiu admittitur, donec Hæmorrhoides aperiantur, quo facto *Oleum ovorum* illinitur. *Liquor* è floribus *Verbasci* insolatis in vitro factus, mirè quoque dolorem lenit; poteris eidem pro lubitu permiscere *Spiritum Vini camphoratum*, vel *Spirit. Oli philosophicum*. Laudant alii *Oleum florum Sambuc.* atque *Hyperici* vel solum, vel cum *Calcis vivæ pulvere* mistum. *Unguentum* dein prodest album *camphoratum*, *Suffitus* ✠ ris vivi, vel *Vapor Aquæ calidæ* per sellam perforatam admissus. Quidam *Suberis lignei* ci-

nerem cum *Oleo rosaceo & Vitello Ovor.* subactum applicuit, & sic enormem dolorem miraculosè citoque dissipavit. *Amatus Lusitanus*, cum cœtera gratis usurparentur, *Pomum aurantium excavatum* *Oleo rosaceo*, & *Semine Lavendulæ* impletum, ad cineres calidos admovit, sicque calidè applicuit, sæpiusque renovavit. Vidimus etiam, per *suppositoria* tria quatuor vel quinque è *bulbis Ceparum* adornata, *Oleo Ovorum* vel *Rosar.* intincta, & successivè ano intrusa, hæmorrhoidales Venulas apertas, vel aliàs dolorem commodè discussum fuisse. Sequens etiam *Balneum* aperit & sanat Hæmorrhoides:

℞. *Herbar. Abroton.*

Levistic.

Malv.

Mercurial.

Violar.

Valerian.

Chelidon. maj.

Rorismarin.

Lavendul.

Rut.

Artemis.

Puleg.

Menth.

Flor. Chamom.

Linar.

Calendul. ana Mj.

Incis. insue *Sacculo*, qui coquatur in *Aquâ fluviatili*, cui dein aliquoties *Æger* insidebit.

Profunt etiam sequentia: *Flores Chamomill. Lamii alb. Gallii Lutei, Linariæ, Verbasc. Rosar. alb. Melilot. Sambuc. nodulo* illigati in *Lactē* coquantur,

quantur, expressus hinc Nodulus calidè sæpius applicatur. *Linteum Aquæ calenti Plantag. Fl. Sambuc. Sperm. Ranar. Chelidon. maj. Scabios. Solan. cum Mucilagine Semin. Cydon.* mistæ immergitur, & sæpius admoveatur cum fructu. *Lupulus* etiam, quo Zytopœi utuntur, in Aquâ probè decoquitur, indeque emergens vapor calidè admodum ano excipitur. Sunt porrò, qui *Vitriolum viride* seu *Hungaricum* in Aquâ *Plantagin.* atque *Flor. Sambuc.* dissolvunt, Spongiamque huic calenti liquori immersam frequenter apponunt. *Folia Semper-vivi major.* contusa, ollulæque terreæ indita super ignem lenem tepescunt, & linteo imposita sæpius applicantur. Cum successu etiam *Mucilago Seminum Hordei & Avena* in Aqu. *Spermat. Ranar. ac Solani* probè decoctorum Linteolo illinita frequenter imponitur. *Fimus* tandem *vaccinus* applicatus aliquoties mirè compescit dolores.

HÆMORRHOIDVM DOLOR nihil aliud est, quàm accidens Hæmorrhoidum cœcarum, à distensione vasculorum, & membranarum sensibilibus, vel etiam ab eorundem molesta rosione procedens; cujus medela in præcedenti Affectu indigitata est.

HÆMORRHOIDVM FLVXVS NIMIVS, est sanguinis puri ac sinceri per extremitates protuberantes venularum vel arteriolarum Intestini recti immodica atque intempestiva,

cum virium imminutione, aliisque symptomatibus contingens excretio.

Distinguimus hunc Affectum à *Fluxu Hæmorrhoidum ordinario* atque naturali, eoque modico & parciore, certis periodis, & quidem sæpè menstruis, velut menses apud Fœminas, nonnullos Homines afficiente, quod egregium est habendum naturæ beneficium, præprimis in Hypochondriacis, Plethoricis, Cholericis &c. Discernitur etiam à *Fluxu hepatico*, quoniam in hoc sanguis ante fœces, imò quandoque sine his excernitur; in *Hæmorrhoidibus* autem nimum, aut etiam ordinariò fluentibus fœces alvinæ plerunque præcedunt: cui adde, quod sanguis in *Fluxu hepatico* longè aquosior, ac citra dolorem aut Tenesimum profluat, sanguis verò hæmorrhoidalis magis floridus existat, atque ob acrimoniam suam Tenesimum in sphinctere ani producat.

Affectam partem nos extremitates Arteriolarum, vel etiam Venulas statuimus, à ramis mesentericis aut iliacis oriundas; & intra canalem Intestini recti magis patulas; unde fit, ut faciliùs rumpantur, suumque sanguinem profundant.

Causa Hæmorrhoidum nimis fluentium proxima est Vasculorum modò dictorum, inprimis majusculorum apertio. Ad quam antecedenter contribuunt partim obstructio, vel stagnatio ipsius sanguinis, hincque vasorum patentium à durioribus fœcibus transeuntibus disruptio sive dilaceratio: partim Sanguinis ipsius nimum fortè æstuantis acrimonia vel rare:

rarefactio erodens, aut valdè distendens. Quando igitur vascula hæmorrhoidalia admodum in alvo patent, tum non secus atque tubuli in Plethoricorum naribus sanguinei, propter effervescentiam falsedinemq; acriorem Massæ humoralis, levemque aliam datam occasionem rumpuntur, & suum sanguinem effundunt eousque, donec plethora aut ebullitio sanguinis sit imminuta, omnesque particulæ ad pristinum æquilibrium cum aëre externo fuerint deductæ; hoc enim facto orificia ruptorum tubulorum ab eodem liquido elastico circumfluo quasi comprimuntur, & clauduntur, idque eo magis, quando interea minuto intestino humorum motu, naturalis succus nutritius balsamicus statim vasculis cicatricem obducit.

Diagnosis.

Affectus tum ex Ægrorum relatione, tum ex sanguinis floridioris post fœces excretionem nimiam, tum ex præsentem simul tenesmo haud difficulter cognoscitur. Sed cum excretio hæc nimia evadit, tum succedunt pallor totius corporis, virium dejectio, appetitus immunitio, crurum languor, lumborum & coxendicum dolor cum tensione abdominis, chylicatio debilior, è quâ non nisi sanguis crudior, & aquosior provenit, alvi procidentia haud infrequens, aliave symptomata. Quoties verò alvus deponit Fœces, toties ferè copia sanguinis Hæmorrhoidalis subsequitur. Interim primò sanguis fluit niger, fœculentus, & crassus, qui antea stagnabat in nodis cœ-

carum fortè Hæmorrhoidum, isque chartaceo emunctorio sæpius deprehenditur; postea floridus magis, & copiosus, tandem etiam pallidior, sed vix unquam sine dolore excernitur.

In *Prognosi* tenendum, quòd Fluxus hic diutius durans, & frequentius largâ copiâ recurrens omnem sanguinis florem balsamicum adimat, spirituum laticem maximè enervet, & hinc, stomachi fermentum debilitando, chylicationem tantum non planè destruat, sicque Cachexiæ, Hydropi, Marasmo, Tabi, Febri hecticæ aliisque Affectibus portam aperiat. Ordinarius autem, periodicus, isque moderatus fluxus salutaris est, Melancholicis inprimis; ac sæpè à magnis morbis Homines vel liberat, vel immunes præstat. Unde Hippocrates *Aphorism. Sect. 6. Aph. 21.* Insanis Hæmorrhoides supervenientes rejectionem quamcunque malam, infernam verò, etiam nigram, bonam esse statuit. Præservant hinc à Pleuritide, Peripneumoniâ, Furunculis, Terminthis, Leprâ, Arthritide, Nephritide. Tandem nimius Fluxus propter humorum acrimoniam non rarò occasionem præbet Fistulæ ani.

In *Curatione*, qui Fluxus est naturalis, modicus, periodicus, is minimè sistendus: diuturnus autem, largus, & vires atterens, ante omnia *Venæsectionem* Brachii requirit, quâ præmissâ remedia dentur humorum acrimoniam demulcentia, falsedinem absorbentia, & traumatica: quem in finem intus quidem profunt *Electuaria* è *Conserv. Ros. rubr. Plantag. Flor.*

Flor. Tunic. Beton. Borrag. Nymph. Urtic. urent. Polygon. Condituris Cydonior. Rad. Symphyti, Bacc. Cynosbatos, Myrobolan. Nuc. moschat. Quibus addere licet Pulveres, aliàs simpliciter in hoc quoque affectu usurpabiles; v. g. Corallor. Unicorn. fossil. Terr. sigillat. Boli armenat. Magist. ꝑ n. Lapid. Hæmat. ppt. Sanguin. Drac. ver. Croc. ꝑ t. adstring. Imò profunt quoque Emulsiones amygdalar. dulc. Seminum frigid. major. ac Semin. Papav. alb. In pertinaci dein malo ad opiata simul confugiendum est; v. grat.

*R̄. Conserv. fol. Myrt. 3vj.
flor. Ros. rubr. ℥l.
Plantag. ana 3ß.*

*Condit. rad. Symph. 3ij.
Bacc. Cynosb. cond. 3iß.
Conf. Hyac. inc. 3j.
Lapid. Hæmat. ppt. ℥iiij.
Corall. rubr. ppt.
Terr. sigill. ana ℥ij.
Semin. Hyoscyam. ℥j.
Syrup. Fl. Tunic. q. s.*

M. f. Electuar. d. ad Oll. Singulis sex horis capiatur magnitudo Castaneæ.

*R̄. Amygd. dulc. rec. exc. 3j.
Aqu. Burs. Past.
Plantag. ana 3iiij.*

*F. l. a. Emulsio, cui adde
Syrup myrtin. 3ß.
Unic. fossil. 3iß.
Essent. Opii liquid. 3ß.*

M. d. ad Vit. Sumatur quatuor dosibus spacio sedecim horarum.

Si purgatione ad eliminanda salia acria opus videbitur, præferenda sunt in hunc finem Rhabarbarum, in

substantiâ ad 3j. vel Myrobolanorum decoctum, Serum Lactis tamarindinum, & pro lubitu Rhabarbaro affusum; decoctum quoque Passularum cum Santalo paratum. Ab aloëticis autem, aliisque resinoso-acribus in Hæmorrhoidum morbis est abstinentum. Subinde Pilulæ conferunt, ex supra jam dictis pulveribus cum Extract. fol. Quercus, aut Plantag. Betonic. Tormentill. Corticum Tamaric. radic. Symphyti concinnatæ. Commendantur præterea heic Tinctura antiphthis. Garmann. Tinct. flor. Bellid. Tinctur. Lapid. Hæmat. aut Oli Martis, Succus Urtic. urentis, ut & Plantaginis recent. expressus ac filtratus, ad 3ij. sæpè pro dosi exhibitus.

Externe Lumbis atque Pubi applicabis Unguentū Comitissæ, vel Empl. de Baccis Lauri, ac Boli armenate. Alvo autem inungatur Unguentum de Liniariâ, Linimentum contra Hæmorrhoides Norimbergensium, Succo Acaciæ nonnihil imprægnatum, Oleum Hyoscyami aut Semin. Papav. alb. express. quibus ceu euporiston Dolæus addit. seqq.

*R̄. Alcool Lapid. Scissil. q. v.
Misc. cum Butyro rec. non salit. in formam Unguenti & illinatur.*

Sunt etiam, qui Crepitum Lupi, Fuliginem, Terram Vitrioli dulcem pulverisat. cum Albumine Ovi atque Telis Araneæ, applicant. Laudant alii Unguentum rosaceum, vel album camphoratum, cum Oleo Saturni, Cera, Rosar. Populeon. Verbasc. Croco, Opio. Poterit & Spongia Liquori cuicunque styptico non corroderenti immergi, & sic tepidè applicari, ad subito sistendum

dum Fluxum. Melius autem à nonnullis deprehensum est, si *lateritius Lapis ardens* sellæ perforatæ immittatur, ejusque calor, non fervor, ad anum Ægri exhalare permittatur. Ad Tennesmi dolorē mitigandum non solum modò dicta *Unguenta* varia, sed & *Unguentum Millepedum* vel *Oleum* eorundem cum *Pulpâ Pomorum dulcium* profunt. Valdè etiam Fluxum mitigant *Fotus* è *Foliis floribusq; Verbasci, Heder. arbor. Hyperic. Linar. Chamomill. Flor. calendul. Melilot. Alth. Malv. Radicibus Allii, Cepar. Alth. Lil. albor. Lappath. Seminib. Psyllii, Nymph. Lini, Fœn. græc. Fimo porcin.* similibusque in *Lacte coctis*, facti & applicati.

Hæmor-
rhoidum
suppres-
sio.

HÆMORRHOIDVM SVPPRESSIO, *Obstructio, Retentio, Constipatio*, est Fluxus Hæmorrhoidalium vasorum periodici & consueti in Homine cessatio, cum Sanitatis majore vel minore detrimento. Notandum enim, non paucos Mortalium reperiri, inprimis autem Scorbuticos, sanguineo-pituitosâ ac falsacidâ intemperie laborantes, quibus hæmorrhoidalia vasa, non secus ac uterina apud Fœminas, per certas periodos trium, quatuor, pluriumve septimanarum, magno cum incolumitatis stabilimento fluant; quando enim hoc tempore alvum exonerant, tum vel ante, vel plerunque post excrementa sanguis plus minusve copiosus simul exprimitur, sine tamen ullo virium lapsu.

Diagno-
sis.

Quoties igitur hic ipse salutaris cessat Fluxus, quemadmodum id

quilibet in sese haud difficulter observare & cognoscere, Medicoque indicare potest, tum periculum statim imminet gravioris alicujus morbi. Hoc enim tempore non solum Anxietates pectoris, Tristitia, Inquietudines, sed etiam gravans Alvi Lumborumque dolor, Phlogoses crebræ totum corpus pervagantes, Cephalalgia, Hæmorrhoides cœcæ, tandem & Febres ipsæ continuæ Hominemprehendere & per vices torquere solent.

Causa proxima Mali est Vasculorum hæmorrhoidalium impedita apertio; cui ansam præbent ex *antedentium* causarum numero modò strictus nimis fibrarum in Vasis tonus, ab austeritate liquoris transeuntis proveniens, modò eorundem vasorum constrictio à muco quodam externo viscido austero producta; modò ipsa turgescencia sanguinis periodica ablata idq; propter crassitiem & visciditatem liquorum circulantium, à chylo crudo, pituitoso, nonnihil austero & viscido contractam. Chylum verò talem subministrant Victus similib⁹ crudis particulis constans, Aër frigidus humidus, vita sedentaria, lucubrationibus crebris sociata. Quibus adde Morbos qualescunque prægressos, Sanguinem torpidum crassumque post se relinquentes.

Quoad *Prognosin*, in principio quidem hic Affectus notabilibus symptomatibus minimè stipatus est, nihilq; adeo in semet deprehendit Homo, de quo conqueri possit; sed ubi diu consuetus hicce Fluxus cessavit, tum verò graves Morbos excitare valet,

let, Febres nimirum continuas plus minus ardentes, aut etiam malignas: Melancholiam intensam, ipsamque Maniam; Cephalalgias horrendas; Anxietates præcordiorum, Cordisque Palpitationes acerbæ, Cachexiam, Asthma, Hydropem, Ficus ani can- crofos, tandem & Fistulas difficillimè curabiles, sæpius lethalem Hecticam post se trahentes.

In Curatione, si unum alterumve talium symptomatum jam compare- re incipiat, Hæmorrhoidum apertio matura indicatur, quæ quidem haud difficulter fieri & conciliari poterit per Remedia Sanguinis crassitiem & austeritatem tollentia, atque corri- gentia. Ante omnia proin Alvo sive naturâ sive arte laxâ existente, san- guis è Venâ quacunque Brachii vel Pedis sectâ extrahatur ad octo vel plures pro re natâ uncias. Hinc in- terne usurpabuntur *Salo volatil. oleos. Sylv. Elix. propr. Parac. Essent. Aloës cum Aqu. Cinamom. Spirit. C. C. ali- usque volatil. Spirit. Sal. armon. anis. vel fœnicul. Tinct. Mart. aperit. vel helleborata Wedelii, Fæculæ Aronis, Bryon. Diaph. martial. Croc. mart. aperitiv. Vina medicata purgantia ex Radicib. Aristoloch. Vincetox. Asar. Carlin. Calam. aromat. Zedoar. Her- bis Chamædr. Sabin. Meliss. Absynth. Agrimon. Betonic. Artemis. Florib. Ca- lendul. Cinamom. Croc. Seminib. Anis. Dauc. Fœnic. Nasturt. Fol. Sennæ, rad. Hellebor. nigr. Rhab. elect. Sale Rutæ, Artemis. parata. Hisce tamen reme- diis præmittere licet aliquod, vel il- lud etiam si placet, post aliquot dies*

repetitum remedium purgans, ex *Massa Pilular. angelicar. vel hydrop. Bont. Extract. catholic. similive cum Mercurio dulci permistâ paratum, at- que sub Pilularum formâ exhibitum. V. gr. præscribi poterit sequens pri- mò remedium:*

*R. Mass. Pilul. marocost.
Extr. Pilul. cochiar. ana ʒss.
Resin. Jalapp. vel Scammon.
gr. iij.
Mercur. dulc. opt. vel
Cinnab. ʒ n. rectif. ʒss.
Ol. stillat. Garyoph. q. s.
M. f. l. a. Pilulæ num. 15. Dentur
pro dosi. Vel
R. Radic. Rhab. Monach.
Rub. Tinct.
Gentian.
Bryon. ana ʒiij.
Herb. Artemis.
Beton. ana Mj.
Summit. Cent. min. Mss.
Fol. Sabin. ʒiij.
Baccar. Laur.
Semin. Anis. ana ʒij.
Cassie Lign. ver. ʒj.
Croc. orient. ver. ʒss.
Rad. Helleb. nigr. ʒiij.
Jalapp. ʒiʒ.
Fol. Sen. opt. mund. ʒx.
Borac. venet. ʒj.
Scoriar. Ferr. ʒss.
Incis. & contus. insuantur nodulo ex
Sindon. rubr. Affunde Vini alb. veter.
ʒbiiʒ. Aqu. fontan. calent. ʒbij.
Dein quotidie mane hauriantur ʒiij.
vel quatuor.
Præmissis his guttatim sumenda
ordinabuntur sequ.*

R. Salis volat. oleos.

Elix. aperit. *Claud. ana* ʒij.

Essent. Galang. *Artemis.* aa. ʒj.

M. d. ad Vitr. Dof. m. ac vesp gutt.

25. ad 30. cum Decocto Gran. Coffee to-
stor. vel alio vehiculo.

Externè conveniunt Hæmorrhoidum externarum apertiones per *Hirudinum* applicationem, aut per *Balneorum sulphureorum* usum. Quibus adde *Cucurbitulas* sæpius cum scarificatione applicandas. Tandem *Dia'a* concurret simul sanguinis massam resolvens, attenuans, & edulcorans. *Vini* v. gr. usus rubelli, aut rubri generosioris minus austeri; *Ciborum arom.* sale blando aromatico, & balsamico multum pollentum. *Corporis exercitia* crebra & modica. *Somnus* non largus. *Animus* curis & tristitiâ vacuus. Quæ denique in Mensium suppressione commendata sunt remedia, ea & heic conveniunt.

Hæmorrhoides
uteri.

HÆMORRHOIDES VTERI sunt dolorificæ expansiones vasculorum in Cervice ac Vaginâ uterinâ, cum vel sine apertione, sanguinisque effusione, oriundæ à crasso, fœculento aut acri sanguine in iisdem stagnante.

Pars
affecta.

Pars affecta sunt Vascula sanguinea plerunque capillaria in Cervicem atque Vaginam uterinam disseminata, ac satis in tunicæ extimâ superficie prominentia.

Causa
proxima.

Causa proxima & immediata est sanguis crassus, fœculentus, quandoque simul acris & salsus, in vasculis capillaribus stagnans, eaque disten-

dens, atque hinc inde prope venularum valvulas nodos excitans, sicque dolorem nunc gravantem, nunc ardentem, nunc etiam plus minus acutum & pungentem producens. Si vasculum unum aut alterum (plura enim simul heic affici credendum) nimiooperè distendatur, tum facile rumpetur & effundet, quicquid in sese continuit sanguinis fœculentti, & si hic fuerit iusto acrior, aut etiam si novus fluidior subsequutus fuerit, tunc fluxus sanguinis nonnihil durabit, & quidem cum dolore partis affectæ gravativo ac lancinante; atque hoc ipso signo facile discernetur à menstruo Fluxu ordinario. Si nihil amplius humoris effluat, vascula sponte statim obducentur cicatriculâ, quæ nisi firmior evaserit, postliminiò novâ oboriente stagnatione faciliè rumpetur, novamque denuo Hæmorrhagiam dolorificam suscitabit. Quando autem Canaliculorum fibræ nimis robustæ & firmæ existunt, tunc ruptio illarum nulla contingit, & Hæmorrhoides tales cæcæ, dolentesq; admodum manebunt, donec stagnans in illis sanguinea portio adeptâ fluiditate dissipata fuerit, ipsaque sic vascula pristino statui restituta.

Causæ antecedentes sunt illæ omnes, quarum mentio jam supra in Hæmorrhoidibus aliis est facta. In primis heic accusamus retentos Menses, vel etiam Semen Mâris Luem veneream perpeffi admodum acre, & malignâ qualitate adhuc præditum, unde non rarò Vasculorum capillarum fibræ crispatae sanguinem circulantem

lantem diutius intra sese retinent, & ita *Varicibus hæmorrhoidalibus* admodum *dolentibus* ansam exhibent. His adde Uteri tumorem à Fœtu Molave inclusis oriundum, & suo pondere Vasa inguinalia venosa valdè prementem, unde sæpius quidem Varices pedum, sed & non rarò ipsa quoque vasa uterina compressa intumescunt.

Equidem Hæmorrhoides istæ ex dolore *nunc* gravativo, quando sanguis stagnans nec copiosus adhuc nec valdè acris extiterit, *nunc* magis lancinante, pungente, ardente, quando ille ipse magis acris & copiosior vasa plus distenderit, cognosci possunt; præprimis si cum ejusmodi cruciatibus simul sanguis è ruptis fortè vasculis profluat, fœculentus ille, nigricans, minusque floridus, quemadmodum plerunque in Menstruo fluxu cerni solet, qui sine cruciatu Vaginæ Uteri contingit, nisi simul albo Fluori sociatus fuerit, à pituitâ acri, vel etiam Gonorrhœa oriundo. Maximè tamen cognoscuntur tales Hæmorrhoides uterinæ per ocularem inspectionem, quam sibi Medicus conciliare potest, si specillo uterino Vaginam paululum distenderit; tum enim ad oculos mox intus patebunt Vasa sanguine distenta, sæpè etiam nodis cœruleis interstincta, nunc in Cervice magis, nunc in ipsâ Vaginæ tunica comparentia, coloris lividi aut cœruleo-nigricantis. Affectus Gravidis plus quàm non Prægnantibus familiaris; illis etiam, quæ Lue venereâ laborant, aut Sanguine scor-

butico-melancholico, acido-austero ac pituitoso salino instructæ sunt.

Malum proin hoc minimè est *Prognosis.* contemnendum, non enim solum dolore acerbo molestum, sed & Parturientibus quandoque funestum evadit, quando in ipsis parturiendi conatibus magis distenta vasa longè adhuc acerbior cruciatu miseras torquent, sicque vel ipsum Partum præpediunt, vel certè Gangrænam aut Sphacelum quandoque lethalem post se trahunt. Non rarò etiam hic Morbus in Fœminis Lue venereâ laborantibus transmutatur in Cancrum interinum, nefandis cruciatibus sensim misellas emaciantem, atque è medio tollentem, quemadmodum hujusce rei exempla nobis in Praxi jam aliqua occurrerunt.

In *Curatione* ante omnia Alvus *Curatio.* Clysmatibus emollientibus aliquoties est eluenda; hinc Sanguis per Venæ brachialis sectionem sufficienti quantitate extrahendus. Postea intus quidem *dissolventia*, *rarefacientia* atque *discutientia* in usum vocentur: hunc in finem conducunt *Aquæ destillatæ Paludapii, Ononidis, Chelidonii, Beccabungæ, Cichorii, Nasturtii aquatici, Card. benedicti, Plantaginis, Ulmarie, Pimpinellæ &c.* de quibus m. ac vesp. per aliquot hebdomadas propinabitur haustus 4. 5. aut 6. unciarum. Vel etiam *Essentia Martis aperitiva, Tinctura* $\frac{1}{2}$ *nii, vel Coralorum simul ad guttas 12. vel 15. dabitur.* Imò *Pulveres* quoque acidum austerum *absorbentes* heic non sunt contemnendi ex *Radic. Chelidon. maj.*

Aron. $\frac{1}{2}$ n. *diaph.* *Diaph.* $\frac{1}{2}$ *vial.* vel $\frac{1}{2}$ *ial.* *Ocul.* $\frac{1}{2}$ *Milleped.* ppt. *Viperis* ppt. *Crystall. alb.* ppt. *Cinnab. nat.* vel $\frac{1}{2}$ n. *Sibus lixivios.* *Artemis Absynth.* ipsaque tandem *Camphora* ad aliquot grana pro dosi reliquis sociatâ. Si *Prægnans* haud fuerit *Ægra*, concedere licebit simul potum *Acidularum*, vel *Thermarum Fabariens.* aliarumque *Aquarum mineralium* debito cum regimine *Diætæ*, quocunque etiam anni tempore haustum, si modò ad manus possint haberi.

Externe autem conducunt *Fomenta* ex *Decocto Malvæ*, *Althææ*, *Solani*, *Plantaginis*, *Violarie*, *Salviæ*, *Ulmariæ*, *Scordii*, *Meliss.* *Perficariæ*, *Consol. mediæ*, *Flor. Chamom.* *Calendul.* *Melilot.* *Hyperic.* *Cheiri*, *Ligustri* &c. in *Vino albo* vel *Lactē* facta. *Quin* & *Balnea* sive *mineralia aluminoso-sulphurea*, sive *artificialia* ex *Decocto* superiùs jam nominatorum ingredientium cum fructu usurpantur, si *Inflammatio interna* nulla adfuerit, nec metuenda sit. Aliàs *Unguenta* & *Linimenta* in usum vocari possunt blandè discutientia & refrigerantia; cui scopo inserviunt *Unguent. de Alth.* *Unguent. album camphor.* vel *rosat.* *Olea Violar.* *Rosar.* *Lil. alb.* *Amygd. dulc.* frigide express. *Verbasci*, *Chamomillæ*, *Meliloti*, *Hyperici*, *Lumbricor. terrestr.* *Scorpion.* *Ovorum*, *Linim. de Linariâ*, ex *Succi Linariæ* & *Butyr. ana* mixtis compositum. Vel *Linimentum* fiat ex *Album. Ovor.* cum *Alumine* conquassato, *Tutiâ*, *Lapid. calaminar.* *Croco*, *Magist.* $\frac{1}{2}$ n. *diaph.* *Aqu. Solan.* & *Chelidon.* vel *Levistic.* mixtis par.

Quod si non fluant, & apertionem urgeant, tum *Unguentis succus Ceparum* permisceri poterit, & si nec sic aperiantur, tum *Hirudinum* in aquâ depuratorum applicatione sanguis extrahetur.

HEMICRANIA, *ἡμικρανία*, ex *ἡμῖ* & *κρανίον* *calvaria*, est dolor plus minus acerbis mediam tantum capitis partem, eamque vel sinistram, vel dextram occupans, à spasmodicâ tensione vellicationeve membranæ sensibilis, aliisq; causis oriundus; & nonnunquam per certas periodos Hominem diutius aut brevius affligens, statasque horas invasionis atque cessationis observans.

In hoc affectu primariò quidem affligitur caput quoad varias suas membranas admodum sensibiles; & quidem vel sinistrâ tantum, vel dextrâ illius parte; imò interdum frontem solum dolor occupat, & versus oculi orbitam quasi infixus hæret clavus. Quandoque etiam occiput tantum tenet, & membranas, quæ sive extra calvariam, sive sub illâ hærent, dolorificè tensas occupat. *Secundariò* autem sæpè heic simul vel primò affliguntur *Ventriculus*, *Intestina*, *Uterus*, aut alia infimi Ventris viscera, in quibus si causa hæret, *sympathicam* sic dictam *Hemicraniam* excitat; quemadmodum *Idiopathica* nominatur aliàs, cujus causa in ipso Capite versatur.

Dantur Homines plures, quibus hoc malum adeo familiare est, ut levi quacunque occasione apud eos resuscitetur,

scitetur, pristinumque semper locum occupet; ac per sex, octo, duodecim, imò 24. horas continuè duret, demumque post intervallum aliquot hebdomadarum aut dierum recurat. Novimus Fœminam, quæ singulis tribus hebdomadis eodem per 24. horas afficiebatur pluribus insequentibus annis, nec nisi subsequuto vomitu à Paroxysmo liberabatur, unde *Sympathicam* Hemicraniam pronuntiabamus. Novimus aliam, quæ singulis octiduis simili ratione per 12. horas sine intermissione excruciat fuit, tandemque sensim levamen sensit, etiam sine vomitu, & hæc fuit Hemicrania *idiopathica*. Novimus adhuc aliam, cui malum singulis annis aut bienniis recurrebat, & per duas, tres, vel quatuor hebdomadas quotidianis paroxysmis ita miseram vexabat, ut dolor v. g. horâ undecima antemeridianâ accederet, atque bihorii, vel trihorii spatio immaniter augeretur, ferè ad Convulsionum suscitationem; postea verò paulatim remitteret, ac quintâ sextave horâ præcisè in totum cessaret, sine ullâ vel nausæâ, vel vomitu.

De *Aitiologiâ*, atque *Curatione* hujus morbi vide sis *Cephalalgiam*. Quibus tamen heic addimus, *Potum Infusi fol. Théæ* m. ac vesp. per plures hebdomadas continuatum, sæpe hoc malum radicitus extirpasse. Sed & *Thermarum Fabariensium* in *Rhætiâ*, vel *Plumbariarum* in *Lotharingiâ* aliarumve in Subjectis pituitosis; vel *Acidularum* quarumcunque in *Choricis*, *Scorbuticis*, & *Melancholi-*

cis æstare aliquot annorum, vel etiam bis in aîno reiteratus potus non leviter conducit, tanto magis, si simul pili capitis deradantur, & abradi serventur portando semper capillamentum.

HEPATITIS, ab ἥπαρ, *Hepar*, ^{Hepatis} ^{113.} *Inflammatio Hepatis*, est Tumor ejusdem cum dolore intenso pulsante, & ardente, plerunque etiam Febri acutâ conjunctus, à Sanguinis viscido-acris in variis Hepatis tubulis capillaribus stagnatione originem ducens.

Afficitur autem heic non totum ^{Pars} præcisè *Hepar*, ^{affecteda,} Viscus illud glandulosum, sed ejus solum portio, eaque nunc major nunc minor, pro diversâ humoris obstruentis quantitate.

Causa proxima eadem est, quæ ^{Causa.} *Inflammationum* in genere; imò & *antecedentes* inter se conveniunt, ut adeo eadem ex titulo de *Inflammationibus* peti, hucque trahi possint. Notabimus tamen heic, non rarò hunc *Affectum* ab externâ quadam concussione, ictu, aut vulnere similiter excitari posse. Quin & *Febres malignæ* interdum suam morbificam causam, suumque virus, humores nimirum acres, & heterogeneos ad Glandulas hepaticas, plures paucioresve deponere, sicque occasionem tali *Inflammationi*, & fortè simul subsequenti *Abscessui*, *Ulcerique* præbere consueverunt.

Cognoscitur hic *Affectus* ex dolore ^{Diagno-} ardente pulsanteque, in regione ^{sis.} *Hepatis* præcisè affligente, cum Febri continuâ, siti, anorexiâ, agrypniâ, lassitudine, anxietatibus frequentibus.

Dolor

Dolor autem ille pungitivus fixusque in loco Hepatis affecto hæret, non vagabundus, qualis indicium aliûs Morbi esset; non cum nausæa aut vomendi conatu junctus, vel aliquo singultu comitatus, qui foret potius Ventriculi affecti. Neque etiam Convulsionibus aut spasmodico Asthmate, quale esset τεκμήριον Diaphragmatis inflammati, stipatus. Tamdiu Febris heic durat continua, quamdiu ipsa persistit Inflammatio; alternis tamen diebus hæc ipsa Febris exacerbationem patitur. Si in Abscessum Inflammatio abit, tunc dolor tantillum minuitur, iterumque per periodos gravior evadit. Pus autem in Abscessu contentum aliquando ruptâ Hepatis pertusaque substantiâ in cavum Abdominis exoneratur: aliquando etiam intra hiantia venularum dilaceratarum oscula sensim absorbetur, postmodumque factâ unâ alterave circulatione per Urinam aut secessum è corpore secernitur, quemadmodum hujus rei indicia ex diligenti Fœcum aut Urinæ inspectione haberi possunt.

Prognosis.

In *Prognosi* grave hoc malum, periculique plenum est enunciandum, in primis si maligna simul adsit Febris, in quâ Ægri plerunque excitato Sphacelo moriuntur, nisi in Abscessum Inflammatio abierit. Sed nec tum omni periculo vacat, quando talis metamorphosis plerunque hecticam eamque funestam post se trahit Febrim. Si Convulsiones supervenerint, aut Sopor extraordinarius, imminens indicium est Mortis.

Curatio.

Qui morbum hunc feliciter cura-

re cupit, in principio statim omnem lapidem movere debet, ad Inflammationem promptè discutiendam; quoniam neglecto hoc morbi tempore frustra laborabis. Itaque primo statim mali insultu Alvum Clysmate emolliente, eoque etiam domestico atque euporisto, ex Decocto Malvæ, Parietar. Violar. Portulac. Chamomill. Scord. Mercurial. Betæ, Bacc. Juniper. Semin. Cumin. in Jusculo carniū salito, cum Oleo Olivar. atque Melle rosac. vel simpl. concinnato, eluere oportet. Hinc statim Vena brachii dextri maximè tumida secabitur, atque sanguis ad uncias octo pluresve extrahetur; propinato antea Jusculo carnis. Postmodum internè diaphoretica tam fixa quàm volatilia dosibus certis m. acv. cum vehiculo conveniente exhibeantur, sicut in Febris docuimus ardentibus; quibus jungi semper potest *Mixtura cardiaco-sudorifera*. In primis autem heic extollimus usum *Pulveris Viperar. ppt.* aut etiam *Sal earundem volatile* cum $\frac{1}{2}$ n. diaph. Bezoard. miner. Cinnabar. $\frac{1}{2}$ nii, vel nativ. opt. Nitr. $\frac{1}{2}$ iat. Camphorâ, repetitis dosibus exhibendum. Quin & Sanguis Hirci ppt. cum Bezoard. mineral. Pulv. Pannon. rubr. heic quoque non contemnendus, additâ, si placet, Myrrhâ pulverisat. vel tantillo Croci. De cætero omnis curatio sicut in Febri continuâ malignâ absolvitur. Externè Hepatis regio inungatur frequenter Oleo Rosar. Lil. alb. Chamom. Violar. Hyperic. atque simul desuper imponatur Emplastrum de Cicutâ, santalinum, vel de Meliloto invicem

invicem subacta & permixta. *Diæta* quoque ea est observanda, quæ in malignis requiritur Febribus. Pro potu ordinario inserviet *Decoctum Radic. Cichor. Acetos. Gramin. Scorzoner. Herb. Agrimon. Succis. Scabios. Hordei integr. Passul. min. C.C. raspat. &c.* Si in Abscessum & Ulcus abierit Inflammatio, conveniunt *Decocta vulneraria*, & *Pulvis Radic. Ulmar. Symphyt.* aut *Sigilli Salomonis* per Urinam valdè pellens, quotidie bis vel ter ad 3ß. exhibitus; *Diæta*que Ulceribus conveniens observetur.

HEPATIS OBSTRVCTIO est Morbus meatuum & Glandularum Hepatis, quo tubuli & canaliculi ejus secretorii ab humoribus viscidis & crassis ita infarciuntur atque occluduntur, ut hinc Actiones corporis variæ lædantur, symptomataque hæc aut illa excitentur.

Et reverâ occasionem hæc Obstructio præbet nunc Cachexiæ, nunc Hydropi, nunc Ictero flavo, nigro, nunc Atrophiciæ, Febrique lentæ aut hecticiæ, tandem & ipsi Scirrho. Adeo ut qui Diagnosin, Prognosin atque Curationem illius desiderat, petere eam possit ex subsequentium Symptomatum modò dictorum capitibus. Quòd si autem genesin talium Obstructionum requirimus, dicendum erit, non nisi humores acido-austeros, viscidos, ferofo-salinos cum sanguine ramorum Venæ portæ ad Hepar delatos, atque intestino suarum particularum motu nonnihil hebetatos in pluribus vasculis capilla-

ribus, maximè tamen in Glandulis hepaticis, earumque canaliculis excretoriis obhærere, & sensim novarum molecularum accessione cumulos infarctum, obstructionem, tumoremque etiam non rarò pituitosum producere. Humores autem illi acido-austri viscidi è primis viis, sub formâ non absimilis Chyli, ad sanguineum laticem deveniunt. Chylo isti originem præbent non solum plurimum ciborum dictis particulis salino-austriis præditorum frequens devoratio, sed & alii errores *Diætæ*, imò ipsamet debilitata Ventriculi chylicatio, propter liquorem gastricum, minùs volatilem salum, sed austriusculis, undecunque acquisitis, moleculis pollentem. De quibus autem hinc inde plura in Praxi hæc occurrunt.

HEPATIS SCIRRHVS est tumor Hepatis durus, indolens, cum obtuso gravante dolore conjunctus, ab infarctu Glandularum oriundus, & lentam Febrim, Atrophiamque post se trahens. *Hepatis Scirrhus.*

Afficitur heic sæpè totum Hepar, subinde verò solum major ejus, minorve portio, quoad Glandulas & Vascula, interstitiaque membranularum fibrosa. *Partes affectæ.*

Causa proxima est materia pituitosa, viscida, minùs salina acris, primum quidem fluida satis, hinc verò sensim aquosis flexibilibus particulis exhalantibus, incrassata atq; indurata, idq; propter quamplurimas moleculas fixas, plus minùs terrestres, atque tar-

tareas conjunctas. Ista autem materia primò quidem in paucis canaliculis stagnare, colligi, infarctumq; producere solet, deinceps verò quotidie accedentibus novis aliis valdè augetur, majorem Obstructionem efficit, molem partis auget, arreptaque tandem duritie in Scirrhum sensim mutatur. Quod si hæc ipsa materia terrestiores, atque alcalino-salinas fixas, vel etiam lapideas in se moleculas habuerit, simul intra ipsum Hepar hinc inde calculosæ concretiones generabuntur.

Antecedens prior causa non est nisi serum circulantis Massæ sanguineæ, pluribus particulis heterogeneis viscidis, lentis, crudis, ac plus minus terrestribus fixis, salino-austeris inquinatum; hoc enim Serum sicubi ob specificam suam figuram magis in Hepatis quàm aliarum partium tubulis obhærere aptum fuerit, causam Affectus nostri proximam facilius, quàm aliam læsionem inducet. Ad tale serum in sanguine producendum contribuunt Chylus ipse simili characterè præditus ac è primis viis ad Cor translatus. Chylum verò talem reddunt, partim hepaticæ Bilis inertia, partim Succii pancreatici, Lymphæque sive salivalis, sive gastricæ aut intestinalis visciditas; partim denique *causæ procatacticæ*, nimirum Aër frigidus-humidus, Potus aquarum glacialium vel saxatiliū, aut etiam liquorum acidorū frequens; Cibi dyspepti, pluribus tartareis, & fæculentis acidis particulis præditi; Vita sedentaria, ociosa; somnus largior, torpor ad actiones; tristitia protracta,

Hic Affectus, obstructioque Hepatis obscura sui indicia in principio exhibet; non curat enim, neque sentit Æger mali tantū initium. Procedente autem & increfcente jam morbo, illius præsentiam nonnihil conjecturare possumus ex Alvi excrementis minùs flavis, & Artuum inchoante lassitudine, à chylo propter bilis defectum crassiore inductâ; maxime verò ex dolore obtuso plus minùs gravante, tumoreque duro admodum, ac sensibili, dum Scirrhus formatus est, in regione Hepatis sive ad Oculum comparente, sive digitis peritis palpabili. Subsequuntur hinc paulatina consumptio corporis cum vel sine tantillâ Febri lentâ, Pallor faciei, Lassitudo artuum increfcescens; Respiratio propter compressum diaphragma aliquatenus offensa ac difficilis.

Quod *Prognosis* attinet, Scirrhus confirmatus vix curabilis, cum nec interna, nec externa remedia suas vires in Partem affectam immediate exercere queant. Quin ille post se trahit ut plurimum Atrophiam sive Maciem, vel Cachexiam, Ascitem, aut alia etiam æquè funesta mala. Si autem tumor nondum adeo induratus fuerit, tum adhuc aliqualem spem sanationis facere poterimus, modò Æger diuturnum remediorum usum non reformidet.

Quoad *Curationem*, in principio Morbi, quo Obstructio nondum adeo firma, induratave erit, præsentè cruditate ventriculi, aut liquoris gastrici, lene Vomitorium proderit è *Radicis*

dice Ipecacuanhæ, vel Afari, vel Gemmis Sambuci siccatis & pulverisatis ad 3ß. cum Cremore Fri exhibitis : vel fracta dosi Syrupi aut Friemetici dari potest. Ubi autem Vomitus locus non est, tunc non secus ac in confirmatâ Scirrhi duritie, Catharticum mercuriale exhiberi debet ; v. g. ex Rhabarb. elect. Radic. Jalapp. Mechoacann. Extract. panchym. Croll. cathol. Mass. pilul. Hydrop. Bontii, vel Coch. Scammom. Frat. &c. cum Mercurio dulci vel Cinnabar. Antim. corr.

R. Mass. Pilul. coch. maroc. aa. 3ß.
Mercur. dulc. gr. 12.

Resin. Scamm. gr. iij.

Ol. stillat. Mac. q. s.

M. f. Pilulæ num. 13. pro dosi mat.

Vel R. Radic. Jalap. 3j.

Mercur. dulc. gr. 15.

Crem. Fri gr. vj.

Scamm. Frat. gr. iij.

Ol. stillat. Cinam. gutt. j.

M. f. Pulv. subtil. pro dosi matut.

Post purgans internè præscribentur usurpanda per vices, nunc Aqua antipeccatica composita, nunc Succus Plantarum antiscorbuticarum, nunc eorundem Essentiæ, sicut & Tincturæ ʒnii, Mart. aperit. Corallor. Myrrhæ, Croci, Aloës, Aristoloch. Sabinæ, Rhabarbar. Gratiolæ. Salia volatilia oleosa quæcunque. Nunc etiam pulveres ex Diaphor. ʒvial. ʒial. Specif. stomach. Poter. Radicibus Sigilli Salomon. Aron. Aristoloch. rotund. ver. Galang. Calam. arom. Bryon. Ireos flor. Zedoar. Cyperi, Scrophular. Spongiis ppt. Lapid. Spongiar. calcinat. Osse Sepiæ ppt. Spinis Serpentum aut Viperarum

ppt. Cochleis calcinatis ac pulveris. Seminib. Nasturt. Aquileg. Anis. Dauci, Fœniculi &c.

R. Radic. Scrophular. 3iß.

Ireos Flor. 3j.

Diaph. ʒvial. 3ij.

Specif. stom. Pot. 3j.

Ebor. phil. calcin. 3ij.

Semin. Thlasp.

Fœnic.

Spic. Indic. ana 3ij.

Sacch. alb. 3j.

M. f. Pulv. subt. d. ad scat. Dos. 3ij. ad 3j. m. ac vesp. cum vehiculo conven.

Externè tandem præter Inunctionem Olei Lacertarum, Scorpionum Matth. Capparum, Persicariæ, Sabinæ, conducunt Cataplasmata ex Herbis recentibus Persicariæ, Verbenæ, Sabinæ, Aristoloch. Rutæ, Sigilli Salomon. &c. cum Farinâ Fabarum atque Albumine Ovorum concinnata, & quotidie semel imposita. Balnea mineralia profunt quandoque, inprimis sulphureo-aluminoſa blanda; aliquando plus nocent. In Diætâ nimis refrigerantia, acida, austera, salina nimia, lentum crudumque chylum præbentia sunt fugienda.

HERNIA INTESTINALIS, Hernia intestinalis. ENTEROCELE, ab ἔντερον, intestinum, & κελύ, ramea, est Morbus magnitudinis auctæ sive Tumor in Inguine vel etiam Scroto unius alteriusve, quandoque etiam utriusque lateris comparens, & à prolapsu Intestinorum vel Omenti per duplicaturam Peritonæi proveniens. Quod si Intestina in Scrotum delabantur

Ffff 2

osche-

Oscheo - enterocele, si verò Omentum procidat, *Oscheo - epiplocele* nuncupatur.

Pars affecta.

Pars itaque heic *affecta* est Inguinis alterutrum vel utrumque latus, ipsumque etiam apud Viros sæpissimè Scrotum. Sed maximè duplicatura Peritonæi in Inguine sita, & per Scrotum dispersa in Viris, ut testiculos simul includat, quam duplicaturam Anatomici etiam Processum Peritonæi, alii verò elytroidem sive erythroidem Tunicam appellant. His enim partibus læsis, Intestinarum vel Omenti procidentia contingere debet.

Causa.

Causa proxima hujus Herniæ est vel Omenti vel Intestini vel utriusque decidentia, quæ si solum leviter contingat in Inguen, tunc inibi Tumorem factâ quadam expansione producit, eumque non adeo magnum, quoniam major portio Intestini prolabentis ibi non containeretur, sed in Scrotum usque decumberet, hujusque Tumorem simul efficeret. *Antecedens causa*, ob quam illæ res delabuntur, est vel ruptura, vel emollitio & laxitas duplicaturæ Peritonæi, eaque nunc major & amplior, nunc minor & strictior. Si major est & amplior, procul dubio major portio Intestinarum elabi, & Scroti ipsius capacitatem replere valet. Si minor est, tum Intestinum sæpè ultra Inguen non prolabitur; hoc verò malum si negligatur, facile augeri, & occasione nactâ etiam subito ingentem rupturam post se trahere valet. Sunt nonnulli Recen-

tiorum Medico-Chirurgorum, qui nullam rupturam, sed solam laxationem Peritonæi heic admittunt; ast observationes haud paucae nos contrarium docuerunt, quando Homi-nibus ex gravi aliquo lapsu Peritonæum cum fragore ruptum fuit deprehensum. Apud Fœminas tamen & Pueros credimus plerunque Hernias per laxationem; apud Viros autem nunc per laxationem, nunc etiam per veram rupturam Peritonæi contingere. *Remotiores antecedentes* causæ hinc sunt vel laxior textura corporis atque membranarum, quemadmodum apud Infantes, & plures Adultos, atque Fœminas; vel Clamor & Vociferatio, Saltatioque nimia, Insufflatio excessiva Tubarum, Cibi admodum flatulenti, Colica flatulenta, Frequens per alvum egerendi conatus, Nixus parturientium crebriores, Tussis violenta, Vomitus, Saltus ex alto &c. Vel violentæ quoque aliæ causæ, Peritonæum aliàs satis tensum rumpentes, quemadmodum sunt Equitatio fortis, Lapsus ex alto, Contusiones, Vulnera, &c.

Differunt Herniæ vel *inter se* <sup>*Differ-
tia.*</sup> ipsæmet, vel *ab aliis* vicinis Tumori-bus. Inter se differunt ipsæmet, dum v. g. ratione *magnitudinis* alia est *major*, sæpè Scrotum ad capitis puerilis magnitudinem extendens; alia *minor*, pomi minoris majorisve magnitudinem in Inguine vel Scroto vix attingens, imò sæpè in Inguine ipso subsistens, sicuti in Fœminis, in quibus tamen ob Scroti defectum non

raro

rardò molem tantam acquirit, quanta in Viris sine descensu in Scrotum ipsum contingere haud posset. Ratione *Ætatis* Hernia vel est *Infantum & Puerorum*, vel *Adultorum & Senum*. Ratione *Sexus*, alia *Virorum* est, *Fæminarum* alia. Ratione *durationis*, hæc quidem Hernia *recens* est, illa autem *inveterata*. Ratione *Symptomatum*, alia est *simplex*, alia *conjuncta* cum *Sarcocele*, *Hydrocele*, *Cirsocele*, vel cum *Dolore*, frequenti *Colica*, &c. ubi Intestina nonnunquam Scroti tunicis ita adnexa sunt, ut in cavum Abdominis retrudi amplius nequeant. Ratione *partis affectæ*, alia in *sinistro*, alia in *dextro*, alia in *utroq; latere*. Differt dein Hernia ab aliis *Tumoribus* Scroti, *Enterocelen* mentientibus, v. gr. 1. à Tumore Inguinis *Bubonocèle* dicto, in quo Glandula inguinalis intumuit, hæc enim vel duritie suâ, vel Inflammatione quadam, aut dolore sese dignoscendam præbet; neque heic ullum vestigium laxationis aut rupturæ peritonæi occurrit. 2. Differt à *Pneumatocèle*, s. *Hernia ventosâ*, aut *flatuosâ*, in quâ Inguen subinde simul cum Scroto intumescit, sed sine ullo Peritonæi laxati, aut Omenti vel Intestinorum prolapsûs vestigio, quin tensiva expansio, interdum & dolorifica, magis flatuum quàm prolapsorum Intestinorum præsentiam arguit. 3. A *Sarcocele* s. *Herniâ carnosâ*, in quâ secus ac in Herniâ intestinali Testiculus alteruter, si non uterque, intumescit, ipsumque Scrotum valdè durum ac solidum reddit. 4. Ab

Hydrocele s. *Herniâ aquosâ* quisque per se discernere valet, quando Scrotum sine Inguinis conjuncto tumore, aquis distentum videre potest. 5. A *Cirsocele*, s. *Herniâ varicosâ*, quâ spermatica solùm Vasa, cum adjacentibus tunicis in tumorem attolluntur durum, maximè dolentem, & tractum Inguinis usque ad Testiculum occupantem, ob varicosas Venas inæqualem; quæ signa in Enterocèle non habentur.

Quòd attinet *Diagnosin*, si Peritonæum fuerit ruptum, quemadmodum id magis in Adultis, quàm in Pueris evenit, tunc Hernia hæc subito oritur, & quidem tantâ magnitudine, quantam ruptionis foramen concedit; hoc enim si majus est, Hernia quoque grandior, si minus, eadem minor evadet. Quando autem Peritonæum duntaxat laxatur, tunc Tumor primùm in Inguine parvus comparet, sed qui sensim postmodum auctâ laxitate augetur, & tandem Inguen atque Scrotum simul occupat, inque magnitudinem prægrandem, nisi præcaveamus, excrescere potest. Præterea Intestina, quæ prolabantur, in principio & progressu facilè, licèt non sine aliquali dolore ac murmure, in Abdomen retrudi possunt; quin suâ etiam sponte, inprimis apud Homines in lecto decumbentes, intra abdomen simili cum murmurve retrahuntur. Sed hoc ipsum si neque naturâ neque arte, vel Ægri curâ diligenti fiat, tunc tandem Intestina tunicis Scroti adnascuntur,

scuntur, ac ab iisdem inseparabilia evadunt.

Prognosis.

Hic Affectus in principio facile curabilis est. Si verò inveteratus, si intestina jam Scroto adglutinata fuerint, tunc immedicabilis evadit. Quando vel flatus, vel crassa materia copiosè in portione Intestinorum prolapsâ colligitur, eademque portio sic à tensione præternaturali, non secus atque ab humorum acrimoniâ valdè irritatur, tunc spasmodicè simul constringi atq; crispari, & ita *Chordapsum* sive *Iliacam passionem* inducere solet, ex quâ intra 12. dies Ægri plerunque sphacelati moriuntur, nisi intra hoc tempus Intestinorum canalis fuerit pervius redditus. Quandoque tamen observatum est à nobis aliisve, obstructum sic in Herniâ canalem Intestini inprimis Coli, magno cum dolore in Inguinis Inflammationem, Abscessum, atque Ulcus transiisse, per quod apertum ipsa excrementa exierint; Ulcere tandem nunc perfectè, nunc imperfectè (i. e. cum permanente foramine Intestini peritonæo interea circumcirca adnati) curato. Qui Herniosi sunt, frigus pedum hybernum difficulter ferunt, quin ab eodem penetrante Colica, Intestinorum prolapsorum constrictio, constipatio, Inflammatio, sæpè & Sideratio, atque Iliaca passio oboriuntur.

Curatio Herniæ minoris.

Quoad *Curationem*, in Adultis æquè ac Pueris si Hernia ovi gallinaei, vel anserini magnitudinem non excesserit, superest curatio ejusdem citra sectionem. In hoc itaque casu

ante omnia conveniens Fascia struatur, sive Subligaculum, *Bracherium* dictum, Ægri corpori ita accommodatum, ut appensus ei nodus satis durus & justæ magnitudinis atque figuræ locum peritonæi laxatum probè tangere, & ita Intestinum, dum applicatur, intra Abdomen validè continere queat. Ejusmodi ergo Subligaculum è gossypino panno, *von Barchet*, imò si commodè Æger portare queat, etiam è Cupro aut Chalybe, panno linteo, vel holoserico superinducto, fabricari, & postea diu admodum portari solet. Dum itaque Subligaculum unum, & alterum, (duo enim ferè, imò apud Infantes plura requiruntur propter frequentem humectationem ac permictionem) ad manus est, tunc Intestinum elapsum in Abdomen, non vi magnâ, eaque forsan inflammatoriâ, sed placidâ digitorum applicatione retruditur, Ægro supinè nonnihil decumbente. Quo factò scitè statim induitur *Bracherium*, illudque strictè ita ligatur, ut adsutus ei nodus holosericeus, aut è Panno gossypino sive xylyno factus, Intestina in loco rupturæ intra Abdomen retinere queat. Quòd si fortè laxetur Subligaculum, tum stringendum denuò magis est. Interea notandum, ut constringatur probè atque ad naturalem firmitudinem reducatur Peritonæi duplicatura, Ægrum per plures hebdomadas, quatuor nimirum, quinque vel sex pluresve lecto affixum manere debere. Atque hæc ligatura, si probè sciteque facta, & per plures menses gestata fuerit, tum etiam

etiam sine decubitu Hernia talis perfecte curari poterit, modò in Diætâ à saltibus, ab equitationibus, aliisq; corporis validis exercitationibus, ab Irâ etiam, à Cibis acidis, flatulentis, concoctu difficilibus Herniosus sibi studiosè caverit. Præter ligaturam tamen etiam nonnulli, quanquam ferè gratis & præter necessitatem, externè adhuc *Emplastrum* validè *excicans* corio inductum hernioso loco applicant, sicque tanto citiorem curationem sperant: ast non omnium cutis æquè benè fert talia Emplastra. Hinc alii, quod & ego pluris facerem, *Aceto Lithargyrii* quotidie mane ac vesperti affectam partem calidè lavant. In eundem finem nonnulli quoque *Essentiam* componunt, vel *Tincturam* ex *Aloë*, *Myrrhâ*, *Mastiche*, *Galbano*, *Gumm. ammoniaco*, *Tacamahacâ*, *Sandarachâ*, *Hyperico*, *Tormentillâ*, *Virgâ aureâ*, *Gratiolâ*, *Rhapontico*, *Catechu*, *Aristolochiâ*, *Calamo aromat.* *Pimpinellâ*, *Clemate daphnoide*, *Foliis Myrti*, *Quercuum*, *Camphorâ*, *Betonicâ*, *Flor. Balaust.* *Gallis*, & similibus, cum *Spiritu Vini* *Friscato* extractam, eaque quotidie ac vesperti solùm frigidè illinunt, atque *Subligaculum* denuò adhibent. Intus verò pulverem *Herniariæ*, *Lunariæ botryitis*, *Seminis Persoliatæ*, *Folior. Millefol.* *Vincæ pervinc.* *Pyrol. Radic. Ulmar.* *Caryophyll.* *Consolidæ* cum *Bolo armenate* & *Saccharo*, ana partibus æqualibus mixtum, ter quotidie cum *Lactē* ad \mathfrak{Dij} . vel $\mathfrak{3\beta}$. vel cum *Roob Sambuc.* aut *Ebuli* dant. *Specificum* verò in hoc etiam casu *remedium* so-

let esse *Pulvis Naudi* sive *loculorum interstitialium*, (*deß Sattels der Nüsssen*) quibus *Nucleus* in juglandis *Nucis* putamine insidere solet, qui *Loculi* ante pulverisationem in loco moderatè calido, quemadmodum in clibano post extractos panes, torrefaciendi sunt. De hoc autem *Pulvere* ter quotidie \mathfrak{Dj} . vel etiam plus sumi debet ab *Ægro* 6. 7. 8. vel plurius pauciorumve annorum ætatem agente.

Si verò Hernia nimis magna sit, quàm ut ita commodè per *Cingula* curari possit, tum ne magis *Intestina* delabantur, vel intrusa in *Abdomen* *Subligaculo* commodo retinentur, vel si ruptura amplior sit, quàm ut illa intra *Abdomen* semper contineri queant, etiam *Scrotum* convenienti *Subligaculo* ita suspendi debet, ne pendulum ex *Abdomine* dolorem inferat, *Inflammationem*que suscitet. Atque hæc *palliativa curatio* tum in illis, quibus *Intestina* vel *Epiploon*, vel utraque simul unâ cum processu *Peritonæi*, *Scroti membranæ vaginali* successu temporis, quo *Subligaculum* nullum fuit usurpatum, sunt adnata, adeoque *Sectionem* difficulter admittunt; tum in reliquis, qui *Sectionem* quanquam possibilem prorsus reformidant, est adhibenda.

Sectio autem sive *Herniotomia* in tali casu, ubi *Bracherio* restitui pristina *conformatio* nequit, omninò necessaria est, atque institui solet non tantùm in *Oscheo-enterocele*, quæ *Hernia completa* sive *perfecta* à *Gallis* vocatur, sed etiam aliquando in *Bubonocele*.

Curatio
Herniæ
majoris.

Hernio-
tomia.

cele sive *Herniâ inguinali*, quam incompletam sive imperfectam nuncupant, in quâ videlicet nihil ex Inguine in Scrotum delabitur. Operationi dein subjiciuntur Pueri non minus quàm Adulti, sed variis omnino illa perfici solet modis, videlicet cum vel sine *Testiculi excisione*. Si Testiculus excinditur simul, Operatio non solum *Herniotomia*, sed insuper *Castratio* nuncupari consuevit. Fœminæ magis Subligaculis, quàm Sectione curantur. *Castratio* communiter ita peragitur: ante omnia Æger per laxans internum conveniens purgatur, aut saltem ejus Intestina per unum alterumve *Clysmâ emolliens* & *detergens* eluuntur. Hinc matutino aliquo tempore, aëre non æstuante, Æger convulsionibus non obnoxius, & Tussi Febrique carens, super asserem locatur, genua ipsius asseri, nec non Brachia colligantur; atque sic Æger supinè jacere debet, quo Caput pulvinari incumbens nonnihil profundius pedibus existat: retro caput ipsius Minister vel Famulus assidet, qui suo gremio caput Ægrotantis fovebit, ac insimul brachia ipsius fortiter tenebit, sicubi ligata forsan nolit. Dein Chirurgus Intestina è Scroto vel Inguine in Abdominis cavum retrudit, atque illa dein, quamdiu operatio durabit, à præsentē alio Ministro intra abdomen coërcentur. Hinc Operator unâ cum Ministri alterâ manu elevat Scroti cutim cum subjectis membranis, & quidem prope Inguen, eamque benè prehensam accutissimâ novaculâ adeo profundè

lateque incidit, prout res & magnitudo eximendi Testiculi requirunt. Foramine sic factō Operator statim suis digitis Vasa spermatica prehendit, cumque iis Testiculum, cautè à membranis, quibus involutus hæret, quantocyus separatum ac liberatum, extrahit, quo exempto, Vasa spermatica, quæ ex Abdomine ob metum futuræ convulsionis multum extrahi non dehent, retinaculo prope Inguen includit, sicque impedit, quò minus Intestina in Scrotum denudò prolabi queant. Interea acum filo forti cannabino aut sericeo prope retinaculum inter Vasa spermatica transmittit, sæpius circumducit, injectoq; duplici nodo, ne decidat, valde non tamen ob metum spasmi funesti nimis, stringit, ac tandem forfice acuto Testiculum cis nodum transversè digiti spatio abscindit; quo factō ad omnem Inflammationem impediendam, Hæmorrhagiamque præcavendam statim Stupa Albumine Ovor. Bolo armenate, & Lardo, invicem Vino albo incoctis, imbuta calidè imponitur; ac postmodum debita ligatura injicitur, sicque Æger suis vinculis liberatus in Lectum deportatur, in quo convenienter decumbat usque ad Vulneris consolidationem, quod intra trium septimanarum spatium fieri sano in corpore ut plurimum solet. Durante operatione & post eam Mixtura cardiaco-antispasmodica sæpè per cochlearia datur ex Aquis destill. Flor. Acac. Til. Beton. Borrâg. Syrup. Pæon. Rub. id. Confect. Alk. inc. Matr. perl. ppt. Corall. rubr. ppt. Ciunab. nativ.

vel

vel $\frac{1}{2}$ n. Sacch. rosat. tabul. vel perlat. Ante operationem post sumtum Jusculum, etiam adulto Ægro haustus Vini boni conceditur. Quando Intestina, cum vel sine Epiplooo membranis Scroti vel etiam Testiculi ita adhærent, ut in Abdomen retrudi nequeant, meo arbitrato tutius Operatio intermittitur, utpote quæ non nisi longa, laboriosa, ac plerunque funesta evadere solet.

Hodiernâ die *Sectio Herniæ* fieri solet à pluribus Gallis, aliisque citra Testiculi excisionem, dum inciso Inguine solum Peritonæi processum quærunt, eundem pro posse & nōsse non sine prudenti circumspectione à membranis Scroti, hinc & ab ipso quoque Testiculo, qui liber intra processum existere debet, undique secerunt, ac ita magnam hujus dilatati processûs partem, reclinatis ad latera vasis spermaticis, prope factam incisionemprehendunt, eam acu filo instructâ perforant, aliquoties hinc filum circa prehensam processûs partem circumducunt, hacq; ratione vel relinquunt, vel ejus portionem cis ligaturam rescindunt, tandemque Vulnus sic factû consueto more ligant & sanant. Vocari solet hæc operatio *Punctum aureum* , vel *Punctura aurea* , cujus varios modos Chirurghi tradunt, ita quidem ut, si à peritis atque exercitatis Chirurgis debitâ cum circumspectione & cautelâ instituat, neq; crudelis adeo, neque funesta semper evadat. Quod si autem multis illa difficultatibus obnoxia existat, Ægerque periculum Convulsionis futuræ prope-

modum certum incurrat, tum melius est, Herniam talem vel prorsus non secare, & quantum possibile, solo cingulo Ægros persanare, vel si aliter fieri nequeat, Ægerque magnis incommodis molestetur, sectionem cum Testiculi cautâ exemptione perficere.

HERNIA vel RAMEX IN- *Hernia inguinalis, s. Bubonocèle.*
GVINALIS s. BVBONOCELE est Tumor in Inguine alterutro, vel utroque comparens, & nunc à flatu nunc ab humoribus Glandulam inguinalem stipantibus, nunc ab Intestinis aut Omento in Inguen prolabantibus, nunc denique à Vasorum spermaticorum expansione nimia proveniens, atque dolorem plus minus intensum suscitans.

Quoniam autem varii Auctores nomine *Bubonocèles* nihil aliud indigitatum velint, quàm eam Enterocèles speciem, in quâ Intestini portio in Inguen, non autem in ipsum Scrotum delabatur, quæque adeo Bubonem inflammatorium mentiatur; haud minore tamen jure omnem ferè Inguinis Tumorem, à causâ quadam constante oriundum, *Herniæ inguinalis* nomine comprehendimus, eundemque postea *Tumorem* ratione causarum differentium distinguimus.

Etenim quoad *Partem affectam* , *Bubonocèle* aliam in genere non agnoscit, quàm Abdominis inferioris sive Hypogastrii partes laterales, quas Anatomici *Inguina* vocant. In specie autem in ipsis Inguinibus nunc duplicatura Peritonæi, nunc Mem-

branæ Musculorum, nunc Glandula inguinalis, nunc Cutis cum Membranâ adiposâ, nunc denique funiculi spermaticorum Vasorum affliguntur.

*Causa &
Diagno-
sis.*

Si *Causas* spectemus, atque *Diagnosin* simul, dicimus varias illas esse, tum *proximas* tum *remotas*, & hinc etiam variis ex signis dignoscendas. De ipsius enim Tumoris præsentia visus atque tactus explorantis Medici aut Chirurgi sufficienter testari potest. Itaque Tumorem ejusmodi producant *nunc Laxatio*, vel levis etiam ruptio Peritonæi, cui originem dant antecedentes variæ causæ præcedenti in Affectu satis descriptæ; laxato enim sic vel rupto Peritonæi processu quædam Omenti vel Intestini, vel simul utriusque portio elabi & Tumorem producere potest: *nunc humor* aliquis viscido-lentus pituitosus, vel etiam salinus, poros & tubulos Glandulæ inguinalis infarciens, obstruens, sicque simul expandens, & in Tumorem indolentem, non-nihil durum, imò sæpè sub cute instar Scrophularum mobilem, attollens; ad cujus humoris collectionem eæ contribuunt causæ *antecedentes*, quæ aliàs etiam Scrophulas vel Scirrhus producere valent, uti suo loco explicabitur: *nunc flatus* inter membranas cutaneas, aut musculosas, vel etiam in ipso Processu Peritonæi collectus, & pro majore aut minore sui quantitate Tumorem magis vel minus tumentem ac dolentem producens; quemadmodum id fieri solet à nimio fortè motu aut divaricatione crurum, vociferatione, ac forti per alvum

urinamve egerendi conatu: *nunc* tandem à *funiculi* spermaticorum Vasorum expansione varicosâ, per nimiam venerem, aut in Pueris per vociferationes, aliosque Diætæ errores inductâ, maximè dolente, ac sæpè etiam Inflammationem subeunte.

Quoad *Prognosin*, Bubonocèle intestinalis nihil in se habet periculi, nisi deterior evadat per varios errores, curaturque eo modo, quem præcedenti in Affectu exposuimus. Reliquæ species hujus Affectûs pro causarum varietate nunc diuturniores, nunc breviores ac minùs periculosæ existunt. Si quâ ad Inflammationem Tumor neglectus deveniat, etiam in Abscessum, imò quandoque in Gangrænam & Sphacelum immedicabilem mutatur.

Quòd *Curationem* attinet, Bubonocèle cum Intestini aut Omenti pro-cidentia curatur eâ prorsus methodo, quam in proximè præcedenti Affectu indigitavimus.

Hernia inguinalis autem à *Flatu* oriunda *Sacculos* vel *Cataplasmata carminativa* requirit extus applicanda, quæ quidem concinnari possunt ex *Decocto Radicum Angelic. Imperat. Valerian. Galang. Cyper. Herbar. Aneth. Absynth. Chamomill. Menth. Organ. Meliss. Puleg. Ocym. Centaur. min. Semin. Cumin. Carv. Dauci, Anis. Fenicul. Nasturt. Napi*; addito *Sale armoniac.* ad meliorem penetrationem. Hæc verò singula minutim incisa, & mixta vel *Sacculo* indi, vel in *Cataplasma* cum *Vino* scil. paulum cocta redigi, & calidè frequenter adhiberi

Prognosis.

Cura.

Bubonocèles tuosa.

hiberi possunt. Quod si loco talium placeat *Epithema* sive *Fomentum* ex *Spirit. Anis. Fœnic. Meliss. Menth. Angel. Matricar. Aneth.* admixtis *Spiritibus Lumbric. terrestr. Sal. armon. C. C. volat. Spir. Vin. camphorat. &c.* perinde nobis erit. Ita quoque superius nominata simplicia unâ cum *Camphor. Cubebis*, aliisve *aromatibus*, nec non *Myrrhâ*, *Thure &c.* paululum in *Vino* intra clausum quoddam vas coqui, hincque lintea eidem liquori calenti immersa jugiter applicari possunt. Interea intus quidem Pueris dabuntur laxantes *Trochisci bermetici*, Adultis verò purgans aliud cum *Mercurio dulci* exhibetur; post purgans autem pro lubitu vel *Potus Thée*, vel *Decoctum* aliarum *Plantarum* v. g. *carminativarum* propinare licet. Juxta hæc à Motu corporis vehementi, à Crurum divaricatione nimia; à Vociferationibus, à validâ nimis *Fœcum* alvinarum extrusione, ab esu flatulentorum Ciborum abstinetur; ac interdum simul *Clysmata carminativo-emollientia & detergentia* in usum trahentur, quò sic alvus semper facilis & lubrica sit.

Post *Fœtum* cum labore magno enixum si casus iste appareat, similes quoque *fotus*, atque *sacculi* conveniunt, prout supra descripti sunt. Reperiuntur etiam, qui *Oleis Chamomill. Rut. Aneth. Absynth. Fœnic. Carv. Anis. Angelic. Succin. Petræ, Castor. Melilot. &c.* partem affectam diligenter inungunt, simulque *fomentum* conveniens superimponunt.

Bubonocèle ab obstructione pituitosâ *Glandulæ* inguinalis oriunda, intus quidem desiderat assumptionem purgantis *mercurialis*, etiam reiterati; extus verò applicationem *Cataplasmatidis* è *Plantis* recentibus sale volatili alcalino præditis concinnati: quem in finem simpliciter *Rutam hortens. Cochleariam, Persicariam, Aristolochiam rotund. Verbenam, Sabinam, Cepas vel Allium, Sigillum Salomon. cum radic. invicem minutim concis. & contus.* non ita frigide sub *Cataplasmatidis* formâ quotidie admoveamus. Alii tamen heic contenti sunt impositione *Emplastrorum de Ranis Vigon. cum triplo Mercur. De Cicut. Bacc. Laur. Meliloto, Ammoniac. aut similium discutientium. Reliqua vide sub Titulo de Scrophulis vel Scirrho.*

Bubonocèles humorosa.

Bubonocèle cum inflatione *Vasorum spermaticorum* dolorosâ curatur per *Sacculos* vel *Cataplasmata discutientia* ex *Radicib. Aristoloch. Pimpinell. Filic. Rusc. Fœnicul. Apii, Herbis Meliss. Scord. Salviæ, Majoran. Geran. robert. Persicar. Sigill. Salomon. Aneth. Solan. Absynth. Gratiol. Summit. Chamom. Centaur. min. Thym. Lavendul. Seminib. Nasturt. Card. bened. Aquileg. Aloë, Myrrh. Croc. Camphor. Fimo caballin. &c. Vino* incoctis, parata, & calidè frequenter applicata; prius tamen Partem affectam *Oleis Rosar. Lil. alb. Rutæ, è florib. Slotan. Chamomill. Scorpion. Violar. Persicar. Aneth. &c.* inungendo. Intus prorsus sunt *diaphoretici pulveres*, sicut in *Febribus*,

Bubonocèles vasorica.

bribus, exhibiti. *Clysmata* quoque *emollientia* ac *detergentia* haud negligenda sunt. Si quid inflammatorii subfit, diligenter admodum *diaphoretica* usque ad sudoris profectionem exhibebuntur. *Vini* usui interdicetur; & extus post *Clysmatis* unius vel alterius *detergentis* infusionem, affecta pars foveatur calidè sæpius *Rore Oli*, cum vel sine *Spirit. Vini camphor. Essent. Myrrh. Aloës, Hyperic. Plantag. Numular. Violar. Rosar.* superimponendo *Ceratum* ex *Oleis Rosar. Lil. albor. Violar. Camph. & Cerâ.*

Bubono-
celes in-
flamma-
toria,

Si *Glandula inguinalis* fuerit inflammata, metuaturque *Abscessus*, tunc Affectus curandus instar aliorum *Apostematum* sive *Bubonum*, prout suo loco fusiùs adnotatum est.

Hernia
aquosa.

HERNIA AQVOSA, I. HYDROCELE, OSCHEO-HYDROCELE, est Tumor in alterutrâ vel utraque parte *Scroti*, minus dolens, splendens, sæpè etiam transparentis ac mollis, à sero extravasato & inter *membranas Scroti* collecto originem ducens.

Pars
affecta.

Patet itaque, in hoc morbo non nisi *Scrotum* affici, atque eapropter Morbum *Viris* esse peculiarem; quam & ipsæ *Fœminæ* interdum etiam oedematoso *Pudendotum* tumore affligantur. *Scrotum* verò pars est illa corporis in *Virili* sexu è pube dependens, pilis, cuticulâ, cute, membranâ adiposâ, & peculiari aliâ, *Dartos* appellatâ, duplicaturâ *Peritonæi* s. *erythroide* & septo intermedio,

Testiculos binos à se invicem dividente, constans.

Causa

Causa proxima Tumoris est seroso - falsi & aquosi humoris extravasatio & collectio inter *membranas* has illasve *Scroti* plus minus copiosa, unde pars necessariò magis dilatatur, inque præternaturalem magnitudinem attollitur. Serum verò illud colligitur nunc inter productionem *peritonæi* & *membranam Scroti* carnosam; nunc sub membranâ *Testiculorum* propriâ; nunc in peculiari cystide; nunc sub aliis *Scroti* *Tunicis*. *Antecedens causa* frequens est vel ruptura, vel compressio *Vasorum lymphaticorum* quorundam; rumpuntur vascula, si nimium expanduntur à tardiore admodum transitu *Lymphæ* crassioris, & magis falsæ. Etenim *Sanguinis* serum, sicubi à diætâ inconvenienti falsam, lentam, viscidam, mucosam ac pituitosam intemperiem contraxit, facile in his illisve *Tubulis lymphaticis*, quales quidem hinc inde in suo cursu deprehendit angustiores, tardius decurrit, hinc magis incrassescit, stagnare, atque *canaliculos* extendere incipit, sicque eorundem rupturæ paulatim ansam præbet. Et quemadmodum ab ejusmodi *circulantium Humorum* dyscrasiâ *Cachexiæ* atque *Hydropis* generatio dependet, ita sæpè ab eadem particularis ille *Scroti* *Hydrops* producit. Comprimuntur *Vascula lymphica* dein non rarò in *Hydrope Ascite* à mole *Abdominis* sero repleti, unde propter impeditum *lymphæ* refluxum

fluxum pars sensim intumescit, ipsiusque etiam Virgæ aquosa intumescencia atque incurvatio contingit, à quâ Æger plus fortè, quàm à toto reliquo morbo excruciat. Aquæ tandem nunc in unâ, nunc in utraque simul Scroti parte colliguntur; prout id quidem autopsia demonstrat, & non ita pridem in Viro sexagenario à nobis visum est, cujus sinistra tantum Scroti camera oedematoso tumore affecta comparuit.

Quoad *Diagnosin*, Hydrocele vel ex solo adspectu facile & cognoscitur, & ab aliis Scroti Tumoribus discernitur. Hydrocele enim tumor est mollis, albicans sæpè, transparent, in quo feri aquosi fluctuatio haud difficulter deprehenditur; ac, etiamsi prematur, nihil tamen in cavum Abdominis retrudi potest. Pelluciditas autem simul signum est, aquas intra Scrotum haud profundius latere, inque hoc casu simul Testiculus subter aquas naturali suâ magnitudine digitis deprehenditur. Si verò Aquæ inter membranam Testis erythroidem colliguntur, tunc Tumor magis dolens ac ovalis est, non transparent; neque etiam ad tantam magnitudinem assurgens, in cuius contactu Testiculus haud deprehenditur. A *Sarcocoele* dignoscitur facile, cum hæc durus soleat esse Testiculi magis quàm ipsius Scroti tumor. In *Enterocoele* autem neque tumoris pelluciditas deprehenditur, neque tumor in solo Scroto visitur, sed in Inguine simul, per quod etiam elapsa Intestina utplurimum in cavum Abdominis

ita retrudi possunt, ut Tumor omnis Scroti dispareat, quod in *Hydrocele* minimè contingit. In *Pneumatocele* tumor est magis tensus ac, si major extiterit, dolorosus, non itidem splendidus aut transparent; digitorum tactui facile cedit, sed instar tympani tensi, si digitum removeris, pristina statim figuræ restituitur. Coniungitur Hydrocele vel supervenit utplurimum Hydropi Asciti, in quo quidem vasa Scroti lymphatica admodum pressa, transituram Lympham retardant. Aliquando serum tanta quantitate subter cutim Scroti & partium genitalium colligitur, ut etiam Virgam ipsam corripiat, eamque nimis intumefaciendo, incurvam & valdè expansam reddat, unde propter angustatum meatum liquor Urinæ vix excerni potest.

Quod *Prognosis* concernit, Hydrocele per se affligens sine Hydrope, aut alio morbo gravi, periculo omni caret. Si verò Hydropem comitatur, tunc mortis discrimen auget, & plerunque lethalis evadit. Rarissimum enim est illud contingens, quo quidem heic *Basileæ* Scrotum oedematofum Viri hydropici quadragenarii, post applicatum sæpius *Cataplasma ex Fimo equino*, *Perficariâ recent.* aliisque concinnatum, intra paucos dies corruptum, sphacelatumque totum decidit, hincque Testiculis cum Virgâ restantibus sanis, & Urinæ copiam per viam ordinariam jugiter fluente, Ulcus vulnerariis detergentibus ac consolidantibus persanatum, ipseque simul Æger Hydro-

Prognosis.

dropis morbo perfectè liberatus fuit.

Curatio.

Curatio, si Hydrops ascites simul adfuerit, per interna remedia debitâ methodo institui debet, non omis- sis tamen, quæ extus simul Scroto con- venienter admoventur. Si verò Hydrocele sola Hominem prehende- rit sine Ascite, aut cum Sarcocoele sit conjuncta, tunc ante omnia *Pilulæ hydropicæ Bontii*, vel *Massa Pilul. Emanuelis*, vel *Extract. diacarth.* aut *Radic. Hermodactyl.* cum *Mercurio dulci*, semel vel aliquoties exhibe- buntur. Hinc internè præter *Potum Théè* vel *Coffée*, aut *Decoctum nephro- catharticum Foresti*, aliudve diureti- cum etiam ex *Cineribus Stipitum Fa- barum* factum, dari possunt vel *Pilulæ* vel *Pulveres* ex *Oculis* ☉. ppt. *Croc.* ♂ *t. aperit.* *Cochleis* ppt. *Diaphor.* ♂ *ial.* *Milleped.* ppt. *Radic. Sigill. Salom.* *Ono- nid. Virg.* ☉ *reæ*, *Chelid. maj.* *Sem. Na- pi*, *Raphani hortens.* *Nasturt.* *Thlaspios*, *Lithosperm.* *Saxifragiæ*, *Salib. volatil.* *Succin. C. Cerv.* *Verb. grat.*

℞. *Radic. Virg. aur.*

Scrophular.

Rhab. Monach.

Rubiæ ana ʒß.

Summit. Virg. aur. Mj.

Cent. min.

Flor. Genist. ana Mß.

Bacc. Junip. ʒiß.

Semin. Anis.

Thlasp. ana ʒij.

Ciner. Fabar. Mj.

Incisa & contus. coque in Vini albi veter. vel Cerevisiæ opt. & Aquæ font.

ana ℥iij. *de Colaturâ m. ac vesp. poten- tur uncia tres.*

℞. *Extract. Virg. aur.*

Ononid.

Rhabarb. ana ʒij.

Specif. stom. Poter. ʒij.

Milleped. ppt. ʒi.

Essent. Onon. q. s.

M. f. l. a. Pilulæ magnitud. pisi mi- nor. conspersæ pulv. Liquir. d. ad scatul. Dosis m. ac vesp. 10. ad 15.

℞. *Radic. Scrophular.*

Cichor.

Bryon.

Saxifrag.

Summ. Virg. aur. ana ʒj.

Semin. Anis.

Thlasp. ana ʒiß.

Ocul. ☉. ppt. ʒiij.

Diaph. ♂ ial. ʒiß.

Salis volatil. Fulig. ʒj.

Sach. alb. ʒiß.

Misc. f. Pulv. subt. d. ad scat. Dos. m. ac vesp. ʒij. ad ʒj. cum vehiculo con- veniente.

Sæpè etiam *Tinctura Salis* ☿ *ri*, *Mart. aperit. Aperitiv. Moeb. vel Penot. Essentiæ Ononid. Virgæ aureæ, Aronis, Sigill. Salomon. Card. bened. Radic. Asar. Cyclamin. Rhabarb. &c. ad plu- res quotidie guttas diu exhibitæ pro- sunt. Plura vide in Curatione Hy- dropis. Exterius omnium optima deprehendimus Cataplasmata ex Her- bis recentibus *Sabinæ, Rutæ, Sigilli Salomonis cum Radice, Persicariæ, A- ristolochiæ, Verbenæ, Radic. Allii, Ce- par. invicem minutè incisis & contu- sis, cum Fimo quoque caballino, si placet, mixtis, composita, & quo- tidie**

tidie diligenter tepidè applicata. Sunt, qui iisdem non sine fructu subinde admiscunt *Nicotianæ* atque *Solani* herbas, ut & pulverem *Cochlearum cum testis exustarum*. Alii *Calcis vivæ Aquam* vel per se calidè cum Spongiâ vel Linteis applicant; vel in eadem prius supra dictas herbas, non secus atque *Card. bened. Absynth. Centaur. minus, Althæam, Mercurialem, Violariam* &c. nec non *Aloën, Myrrham, Cineres Fabarum, Sal Tartari*, decoquunt. Si hisce nihil proficimus, Scrotum acu vel lanceolâ perforandum est, sicque exitus sero procurandus, sed Vulnus sic factum *Cataplasmate* ex *Herb. Scord. Card. bened. Hyperic. Salv. Polygon. Equiset. Meliss. Melilot. Absynth. Lavendul. Artemis. Pilosell. Sanicul. Gratiol. Aloë, Myrrh. Mastich. Fimo equino* &c. *Vino incoctis*, composito est percurandum, sicque omnis Gangræna & Sphacelus præcavendus. Etiam in hoc casu Vulnusculum *Essentiâ Aristoloch. Aloës, Myrrh.* singulis deligationibus est eluendum. Si ad perforationem *Acu* velis uti, usurpabis talem, quæ aliâs ad Paracenthesin Abdominis in Hydrope sumi solet. Verùm hanc operationem cautè institues, si Ascites simul immedicabilis adsit, aut si aquæ non sub cute Scroti immediatè, sed subter tunicam vaginalem ſ. erythroidem, Testiculum propius cingentem, collectæ fuerint, quoniam ita sideratio promptè subsequi solet.

Quando aquæ immediatè sub cute & adiposâ membranâ Scroti hærent, quod ex perspicuitate Tumoris

patet, tum *Setaceum* aliquando transfigi, inibi que relinqui potest, donec nullæ amplius ibidem Aquæ colligantur. Sed incommoda tamen hæc est, sæpiusque dolorosa operatio, iteratæ hinc Scroti paracenthesi postponenda.

Si Aquæ cystidi peculiari inclusæ sint, tunc ferè solemus corrosivum applicare, ubi incidere Tumorem volumus, escharam hinc factam post aliquot dies, nisi sponte deciderit, lanceolâ pertundimus, aquas emittimus, ac deinceps folliculum cauterio potentiali consumere studemus; quod si obtinebimus, aquæ de novo haud colligentur in Scroto. Apud Infantes Scrotum lanceolâ incidi solet, in Adultis autem melius *Acu* pertunditur, semper studiosè cavendo, ne Vasa spermatica, aut Testiculi lædantur.

HERNIA CARNOSA, ſ. **OSHEO-SARCOCELE** est Tumor alterutrius Testiculi durus, parum vel nihil dolens, paulatim à feminalis vel nutritii humoris retentione, collectione, atque inspissatione ortus, & paulatim citra Inguinis tumorem visibilem, in majorem molem auctus.

Affligitur proin hoc in Morbo Testiculus alteruter ut plurimum dexter, rarius sinister, rarissimè uterque.

Causa proxima est retentio, stagnatio, atque collectio vel liquoris feminalis, vel lymphatici dulcis aut nutritii humoris intra poros atque tubulos vel membranas Testiculi paulatim

Hernia carnosâ.

Pars affecta.

Causa.

tim facta. Retinetur autem Semen, quando vel in ipso coitu non ejaculatur, vel aliàs in Tubulis quomodo-
cunque angustatis retardatur. Sæpè hinc Lymphæ aut Seminis crassities, à vitiosâ digestionem primarum viarum orta, ejusdem stagnationi ansam præbet, tantoque id magis, quando simul animales spiritus sufficienti quantitate ad Testes non adfluunt, ipsamque ita seminis profluxionem aut secretionem non satis promovent. Dein etiam Cacochymia venerea ex impuro coitu contracta, nec non Venus ipsa nimia, libidoque excessiva; Testiculorum contrectatio fortis, aut etiam equitatio valdè molesta & laboriosa, vel eorundem testium percussio aut contusio inopinata tubulos valdè angustando, comprimendo aut dilacerando, hincque succos in motu suo retardando, ad Tumoris ejusmodi productionem multum confert.

Diagno-
sis.

Quòd si proin alteruter Testiculus, vel uterque præternaturaliter intumuit; si Tumor parum vel nihil doleat; aut si doleat tantum, cum major evasit, aut duriter contrectetur; si nulla sub Scroti membranis vestigia aquosi humoris, flatusve appareant; si nullus simul in Inguine tumor adsit, tum Adfectum hunc audacter *Sarcocelem* sive *Oscleo-Sarcocelen*, voce ex ὄσχεον *scrotum*, σάρξ *caro*, & κήλη *ramex* de compositâ, pronuncia-
bis, in quâ velut Testiculi substantia sive caro præternaturaliter aucta videtur. Quod si autem Tumor Scro-

scit, atque lancinante, pungenteque dolore molestus evadat, cum durtie inæquali, & colore livido Cutis, tum *Hernia* talis *cancrofa* existit.

In *Prognosi* hoc statim dicendum, quod cum *Sarcocele* utrumque Testiculum occupavit, sterilis inde reddatur Homo, si non prorsus impotens. Aliàs Tumor hic facillè toleratur, si nec magnus nimis fuerit, nec dolens; quo utroque modo valdè molestus evadit Homini, eundemque ad *Herniotomiam* sensim allicit, sine quâ vix ulla superest sanatio. Aliquando etiam in *Cancrum* mutatur, eumque immedicabilem, qualem ante aliquot annos funestum vidimus.

Etenim in *Curatione*, si recens adhuc, nec ita durus fuerit Tumor, tentanda est aliqua discussio, quam promovere valet *purgans* aliquod cum *Mercurio dulci* ante omnia exhibitum, imò illud etiam repetitum:

℞. *Radic. Jalapp.* ℥j.

Mercur. dulc. opt. gr. 15.

Crem. Fri gr. vj.

Scammon. Frat. gr. iij.

M. f. Pulv. subt. d. ad ch. pro dosi matut. Vel

℞. *Extr. Pilul. coch.* ℥j.

Cinnab. ½ n. opt. gr. viij.

Resin. Jalapp. gr. iij.

Ol. stillat. Succin. q. s.

M. f. Pilulæ num. 13. Sumantur pro dosi matut.

Dein intus quidem *Tinctura Antimon.* *Succin.* *Essentia Martis helleborata Wedel.* *Essent. Rutæ, Chamædryos, Virgæ Oreæ, Castitatis Myns.* cum *Aquis destill. Endiv. Portulac. Taraxac. Lactuc.*

Lactuc. Cichor. &c. propinari possunt. Vel etiam *Pulveres* ex $\frac{1}{2}$ n. *diaph. Bezoard. mineral. Ocul. 50. ppt. Cinnab. $\frac{1}{2}$ n. Semin. Rutæ, Agni casti &c.* exhiberi. Huc dein facit *Decoctum Radic. Aristoloch. Vincetox. Pimpinell. Filic. Ulmar. Fœnic. Apii, Rusci, Rubiæ, Chin. Sarsaparill. Lign. Guajac. Sassafr. Herb. Solani, Hepatic. nobil. Cuscut. Capill. ♀ ris, Eupator. Semin. Rut. Agni casti &c.* in *Aquâ fontanâ factum*, & quotidie m. ac vesp. potum, dosi $\frac{3}{4}$ v. vel vj. Huic decocto substitui potest vel usus *Thermarum Fabariensium, Leuccensium, Plumbariarum*, aliarum, in potu & balneo; vel etiam *Potus Acidularum* valdè penetrantium. Externe conveniunt *foimenta* vel ex *Spirit. Vin. camphorat.* in quo etiam *Gumm. ammoniac.* dissolvi potest; vel ex *Elixiri* quodam balsamico volatili parata: quemadmodum *Myrrha, Mastiche, Aloës, Camphora, Crocus, radices Hellebor. nigr. Angelic. Valerianæ, Imperatoriæ, Fœniculi, Chelidon. Aronis, Herbæ Sabinae, Card. bened. Solan. Nicotian. Artemis. Sigill. Salomon. Semin. Rut. Nasturt. Aquileg. Cochlear. &c.* in *Spiritu Vini dephlegmato* in hunc finem macerari solent. Aliàs quoque *Cataplasma* ex *Radicibus Herbisq; recentibus Aristoloch. Persicar. Rutæ, Verbenæ, Sabinae, Sigill. Salomonis, Geranii Robertian. Gratiolæ, Ceparum, Allii bulbos. Alliarie &c.* invicem contusis & mixtis confectum m. ac v. calidè applicari maximo cum fructu potest, modò per aliquod hebdomadas continuetur. Quòd si verò his aliisve

frustra aliquamdiu usi fuerimus, nulla superest cura certior, quàm *Testiculi excisio*, sive *Castratio*, perito hâc in re Operatori commendanda, postquam Æger benè præparatus, & ab omni *Cacochymiâ*, quantum possibile, liberatus fuit.

HERNIA VARICOSA, OSCHEO-CIRSOCELE, est Vasorum seminalium ad Testes abeuntium dilatatio & intumescencia varicosa, nunc dolens, nunc indolens, ita ut tertium quandoque Testiculum mentiatur.

Hernia varicosa.

Pars affecta sunt Vasa lymphatica, magis tamen Venæ spermaticæ per duplicaturam Peritonæi ad Testiculos demissæ.

Pars affecta.

Proximè verò hunc Tumorem producit dictorum Vasorum dilatatio varicosa, sive nodosa; quando enim valvulæ quædam in Venulis ejusmodi nimium tensæ ab humore crasso rumpuntur, aut ab acri eroduntur, tum sanguinè in circulatione refluxum non possunt adigere atque commodè ulterius propellere; hinc est, quod tardius procedens vasa distendat, & quidem in loco valvularum magis quàm alibi, quoniam ibidem aliqua-
lis est fibrarum strictura, ob quam canaliculus eo loci angustior evadit, cis autem fibras ipsum ob pressum valdè sanguinem magis dilatari necesse habet. Contribuunt verò *antecedenter* ad hunc Affectum omnes ferè illæ causæ, quarum mentio sub Titulo de *Varice* prolixior fit. Vidimus tamen etiam in Pueris subinde funiculum

Causæ.

Hhhh

sper-

spermaticorum Vasorum per tractum Inguinis usque ad Testiculum, à saltu, compressione, contusioneque, non sine insigni dolore, atque inflammatione intumuisse. Inprimis è causis *procatarteticis* heic nominanda venit nimis frequenter exercitata Venus, dum sub actu venereo spermaticæ Venæ diu admodum distentæ tenentur à sanguine, per talia vasa vel nihil vel parum circulante; unde hic diuturniore morâ nonnihil crassior evadit, atque postliminiò etiam tardius transcurrit; ut adeo talia vasa paulatim sic nimix dilatationi adfuerit ad pristinam naturæque convenientem angustiam haud amplius deducantur; non secus atque aliàs Ureteres, pluries à Calculis transeuntibus ampliatos, tales postea manere ex Anatomicis sæpè observationibus didicimus.

Diagnos.
is.

Affectus hic facile cognoscitur ex visu & tactu, & quidem in loco decurrentium vasorum spermaticorum; ibi enim tumorem cuti concolorem, sed inæqualem, visu & magis adhuc tactu deprehendere licet, qui, si membranas sensibiles earum, aut vicinarum partium valdè distendat atque comprimat, dolorosus evadit, & interdum magnam Inflammationem, præprimis si à Venere non abstinetur, aut impuri etiam coitus exercentur, vel contusio quædam accedat, incurrit. Affectus Hominibus Veneris, Lue Gallicæ laborantibus, virgam frequenter erectam atque tensam habentibus, magis quam aliis quibuscunque familiaris,

In *Prognosi* hinc tenendum est, hunc morbum plerumque citra Testiculi exstirpationem s. Herniotomiam existere curabilem, nec unquam esse lethalem, nisi occasione infelicitè datâ Testiculus cum Vasis seminalibus maximè inflammetur, sphacelletur, atque convulsiones post se trahat. Mutatur sæpè *Cirsocele* in *Sarcocoelem*, aut saltem hanc comitem adipiscitur, tumque hæc non rarò convertitur in *Cancrum*, si scilicet Ægrotantis massa sanguinea ad producendum talem Affectum disposita est. Vidimus etiam, quibus paulatim vasa iliaca venæque lymphaticæ Inguinum pressæ à tumentibus vasis spermaticis fuerunt, unde crura tantillum oedematosa, imò simul varicosa fuerunt reddita.

In *Curatione* Morbus hic, si quidem remediis curari potest, desiderat primùm *Vina medicata* ex *aperientibus* & *laxantibus* parata; dein internè *Remedia martialia*, in *Liquore* aut *Pulveribus* sæpè data, *Vinum* quoque *martiale aperiens*, ac insimul *sale blando volatili nasturcino* imprægnatum. Quin & *cinnabarina*, *camphorata*, *rutacea* reliquis cum fructu permisceri queunt. Formulæ sequentes aut similes inservire possunt:

℞. *Radic. Scrophular.*

Pimpinell.

Rusci ana ʒß.

Taraxac. ʒiij.

Herb. Agrimon.

Anserin. ana Mj.

Beton.

Card. bened. ana Mß.

Baccar.

Baccar. Laur. Juniper. ana ʒj.
 Semin. Anis. Thlasp. ana ʒij.
 Fol. Senn. opt. mund. ʒx.
 Radic. Hellebor. nigr.
 Rhab. elect. ana ʒiiij.

Cortic. Winter.

Salis Juniper. ana ʒj.

Incis. contus. & in sacculo ligatis af-
 funde Vini alb. veter. ℥iiij. p. c.

Aqu. fontan. vel Gramin. ℥ij.

Stent per noctem in cineribus calen-
 tibus, hinc quotidie mane hauriantur
 uncia quatuor.

℞. Tinctur. Martis aperit. ʒiij.

℞i.

℥n. ana ʒiij.

M. d. ad Vitr. Dosis quotidie m. ac
 vesper. ʒo. gutt. cum Infuso fol. Thé,
 Betonic. Trifol. fibr. aut simil. Vel

℞. Spirit. theriac. camphor.

Essent. Trifol. fibr. ana ʒij.

M. d. ad Vitr. Usurpetur ut prior.

Vel ℞. Spir. Sal. arm. anis. aut fœnicul.

Cochlear. ana ʒiij.

M. d. ad Vitr. Dosis m. ac vesp. gutt.
 25. ad ʒo. vel plures cum Aquâ Na-
 sturt. Gramin. Fumar. Scabiosf.

℞. Radic. Pœon. mar.

Vincetoxic.

Caryophyllat. vel

Carlin. ana ʒiij.

Ocul. ʒo. ppt.

℥n. diaphor.

Spod. ex Ebor. ppt. ana ʒij.

Vitriol. Mart.

Semin. Anis.

Sal. volat. Fulig. ana ʒj.

Sacch. alb. ʒij.

M. f. Pulv. subt. d. ad scatul. Dosis
 ʒj. m. ac vesp. cum Infuso fol. Thé &c.

Vel ℞. Radic. Borrag.

Dictamn. alb.

Pimpinell. ana ʒj.

Unicorn. mar. ppt.

Diaphoret. martial.

Dent. apr. ppt. ana ʒiij.

Semin. Urtic. Dauc.

Aquileg.

Fœnic. ana ʒij.

Sacch. alb. ʒiij.

M. f. Pulv. subt. d. ad scat. Dosis
 ut supra.

Vel ℞. Specif. stomach. Poter. ʒij.

Diaph. ʒvial. vel Dar. ʒj.

Corall. rubr. ppt. ʒiiij.

Radic. Ireos flor.

Sigill. Salom.

Liquirit. ana ʒij.

Semin. Seseleos. Mass.

Anis. stellat. ana ʒj.

Sacch. penidior. ʒj.

M. f. Pulv. subtil. d. ad scat. Dosis
 ut supra.

Vel ℞. Ebor. f. ign. ppt.

Bezoard. min.

Corall. alb. ppt. ana ʒj.

Cinnab. nativ. opt. vel ℥n. corr.

Diaph. ʒial.

Arcan. dupl. Myns. ana ʒij.

Camphor. ʒj.

Sacch. rosat. tab. ʒiiij.

M. f. Pulv. subt. div. in 10. dos. æqu.
 ad chart. Mane ac vesp. capiatur dosis
 cum Aquâ Borrag. Scabiosf. &c.

℞. Radic. Apii, Asparag.

Ulmar. Rusc. ana ʒij.

Herb. Succisf.

Hepat. nobil.

Chamædr.

Bugul. ana Mj.

Hhhh 2

Flor.

Flor. Calend. Genist. ana Mß.

Baccar. Alkekeng. 3j.

Cortic. Tamar.

Cappar. ana 3iß.

Semin. Fœnic. 3ij.

Limat. Chalyb. 3ß.

Terr. foliat. Fri 3ij.

Cinnam. opt. 3iiij.

Incis. contus. & sacculo inditis asfunde Vin. alb. vet. & Aqu. Succis. ana ʒiijß. Stent primâ nocte in Arenâ vel Cineribus calentibus, postea mane ac vesperi uncia tres hauriantur.

Externe commendamus Emplastrum de Mucilaginibus, vel Ammoniac. de Cicutâ, de Ranis Vigon. cum Mercur. de Bacc. Lauri, stict. Croll. Vel Fetus ex decocto aromaticarum Plantarum, adstringentiumq; paratos in Vino rubro chalybeato. Thermæ etiam, quibus Vitriolum martis naturaliter inest, non sunt contemnendæ. Dein Testes in Sacculo suspendendi, atque gestandi veniunt, ita tamen ut simul hâc ratione Emplastrum de Cicutâ, Solano quadrifolio, Nucibus Cupressi, Folis Quercuum &c. cum Bolo Tacamahacâ, Mastiche, Myrrha, Cera atque Terebinth. paratum applicetur. Si verò his nihil operantibus, Æger valdè ab hoc morbo incommodetur, tum Castrationis operatione medendum est. Hernia cancrosa per hanc ipsam sectionem quoque curari potest, modò Cancer nondum ad Vasa feminalia in Inguine serpsit; in hoc enim casu tutior est Cura palliativa Cancris.

HERNIA VENTOSA, OSCHEO-PNEVMATOCELE, Her
ven
est Tumor Inguinis vel etiam Scroti plus minus tensus ac dolens, à flatu inter membranas earum partium intercepto oriundus; atque sub specie *Herniæ intestinalis* subinde imponens.

Flatum aëreo-spirituosum ibi subsistere aut colligi facit Vociferatio nimia, Onerum gravissimorum portatio aut sublevatio frequens, excrementorum Alvi cohibitio diuturna; coitus creber ac fortis, buccarum valida inflatio continuata; equitatio in equo subsultante diuturna; Ciborum flatulentorum comestio, indeque flatuum retentio, & similia. Curari hinc debet citò, antequam aliam Herniam, Colicam, aliave symptomatica vehementiora post se trahat. Cau

Curatur autem facilè per discussionem Clysteribus carminativo-detergentibus, Cataplasmatibus similibus, Spiritu Anisi, vel Anthos, Baccar. Juniper. Meliss. & simil. cum Butyro frequenter applicatis. Balneum quoque ex decocto Herb. carminativarum in usum pluries vocabitur. Imò & impositio Emplastri de Baccis Lauri sæpè conduxit. Cura

HERNIA OMENTALIS, OSCHEO-EPIPLOCELE Hern
omen
lis
est Tumor Inguinis aut etiam Scroti, à delapsu Omenti in Processum Peritonæi laxatum oriundus. Cum autem hic Affectus quoad partem læsam, fiendi modum & ipsam Curationem cum *Herniâ intestinali* conveniat, Lectorem eo remittimus.

HERNIA

HERNIA VMBILICALIS
f. OMPHALOCELE est Tumor Umbilici, ab ejusdem tunicarum ac funiculi laxatione tantâ proveniens, ut intra illas tunicas nunc Omentum, nunc Intestinorum portio elabi, nunc etiam Serum ibidem colligi, vel Carnosa quædam excrescentia progigni queat.

Pars itaque affecta est Umbilicus, ex variis tunicis atque canalibus in Homine recens nato adhuc perviis, post paucas verò hebdomadas vitæ jam oblitteratis, sive coalitis & imperviis redditis, compositus.

Producitur hoc malum proxime à laxitate magis quàm à rupturâ membranarum Umbilici; hisce enim mollioribus atque laxioribus redditis simul facilitas jungitur expandendi sese, & intra suam capacitatem vel Omenti, vel Intestini cujusdam tenuis portionem, vel etiam Serum undecunque è glandulis vicinis exudans admittendi, ipsumque adeo Umbilicum in majorem minoremve Tumorem attellendi; prout vel laxitas membranarum major minorve, vel humor extravasatus parcius aut copiosior fuerit. Sæpè tamen etiam humor ejusmodi serofus, vel quandoque simul cruentus intra vasa Umbilici, denuò præternaturaliter ampliata, atque pervia reddita, aut eorundem interstitia membranis conclusa colligitur, qui, cum in extremitate Umbilici ostia neutiquam aperta, sed firmâ cicatrice clausa offendit, hætenus ibidem subsistit, atque ejus extremitates expandit, valdeque

tumidas reddit. Tandem Succus Tuborum vel Membranarum Umbilicalium nutritius, si copiosè admodum per laxatos qualitercunque poros affluit, atque in substantiam solidiorem convertitur, *Omphalocelen carnosam* producit. Ad laxandos autem tubulos, membranarumque poros multum contribuunt *Cacochymia* Hominis pituitosa, *Vociferatio* crebra & magna, dispositio affectæ partis à naturâ tantillum laxior; nifus fortes in Alvo solvendâ, *Urinâ* mittendâ, aut *Fœtu* excludendo adhibiti.

Tumor hic facilè ex solo intuitu *Diagnos.* cognoscitur; neque is dolens est, nisi aliud quoddam interveniat accidens, quod membranas sensibiles vel nimium distendat, vel acriter pungat aut vellicet. Si autem Tumor oriatur ab Omenti portione elapsâ, tunc ille quidem ad basin est latus, in vertice autem angustus. Si proveniat ab Intestinis procidentibus, Tumor nec admodum mollis erit, nec durus, suppresso hinc spiritu increscit; ac ubi Æger supinus decumbit, Intestina, nisi adnata fuerint, plerunque cum strepitu & rugitu sensim in suum locum regrediuntur. Si ab aquis vel fero fuerit orta talis Hernia, tunc laxa illa est cum fluctuatione, ac pressa nec minuitur nec augetur; quemadmodum aliàs Intestina intra corpus immissa Tumorem statim minuere observantur. Præterea ad candelam nonnihil lucidus, & extus sæpius splendens apparebit ejusmodi Herniæ Tumor, præprimis si major evaserit. *Omphalocelen tandem carnosam*

ex solâ duritie cognoscitur, dum ad digiti attactum neutiquam cedit, neque etiam Ægro supinè jacente, quicquam minuitur; indolens præterea est, si causa mitior fuerit; si autem materia ab affluente paulatim acriore humore cortosiva evaserit, dolorosus redditur, atque *Scirrhum cancrosum latentem* minuitur. Etiam *Omphalocèle intestinalis* dolorosa per se non est; sed quando materia humorosa aut flatulenta in portionem Intestini elapsam copiosius translata fuit, ac eam nimium distendendo loca ejus propè peritonæum angustiora reddit, tunc verò dolor jam acerbus producit, tamdiu excrucians Hominem, donec materia distendens per Intestini canalem magis laxatum ac pervium redditum retrocesserit.

Prognosis.

Quoad *Prognosin*, *Omphalocèle intestinalis* æquè ac *omentalis* per se periculo vacant, modò probè curentur, ac debitis subligaculis muniantur. Ast ubi vel à Cibus flatulentis, vel ab equitatione aut Clamore vehementi, vel à Potu Cibusve acidis viscosis nunc flatus copiosior, nunc humor viscoso-acrior nimium fuerit transmissus, aut etiam major Intestini portio in Tumorem neglectum demissa, sicque Canalis intestinorum prorsus impervius evasit; tunc non solum immanis ibidem dolor, nascitur, sed & non rarò simul Convulsiones, Inflammationes, Gangræna, Sphacelus, Passioque Iliaca cum Agri promptâ nece accedunt. *Omphalocèle aquosa* in Pueris minus periculosa, in Adultis autem si cum Hy-

drope Ascite affligerit, periculi magnitudinem portendit, neque adeo curationem salutarem promittit. *Omphalocèle carnosæ*, quæ indolens est, omni discrimine vacat; quæ autem dolorem habet comitem, eumque profundum, lancinantem, aut quæ incipit colore alieno, rubicundo-ceruleo parum tingi, ea verò est, quæ *Fungi cancrofi*, illiusque, nisi forsan excisione quid præstare velis, immedicabilis præsentiam denunciat.

In Infantibus & Pueris *Herniæ* Curatio hujus curatio faciliior quàm in Adultis; nimirum *Clysmatibus emollientibus* ac *detergentibus* primæ viæ probè eluuntur: dein repositis Intestinis *Emplastrum oxycroceum* corio rubro superinductum applicatur, ac tres adhuc rotulæ ex eodem corio confectæ desuper ponuntur, fasciâ commodâ firmiter ligantur; & ita per quatrimum, si possibile est, relinquuntur; finito illo tempore ligatura solvitur, rotulæ tolluntur, novæque iterum applicantur, Umbilico tamen prius *Oleo Rosarum* vel *Ovorum* inuncto. Alii *Perfoliatam* cum *Semine contusam*, item *Herniariam*, *Pulverem radices Symphyti* ac *Tormentill. Bolum armenat. Terram sigillat. Succum Japonicum*, *Cortic. granat. Gal- las*, *Flor. Balaust. ac Rosar. Lignum santalinum*, *Semin. Hyperic. Plantag. & simil. cum Cerâ ac Gummatib. liquatis* in *Emplastri formam* redigunt, atque hinc fortiter affectæ Parti alligant. Vel etiam, quod *Engelbergeri, Lindaviensis Medici* arcanum fuit, *Pulvis Mastichis cum Album. Ovi*

Ovi in *Unguentum* redigitur, in quo liquato intincta lintea Herniæ, post retrusa Intestina, applicantur, fasciisque fortiter ligantur. Ante applicationem tamen Pueros *lavari* præcipit Auctor ille in *Balneo*, quod ex *Decotto Herbar. Malv. Nasturt. aquat. Alfin. Radic. Alth. & Symphyti* in *Aquâ ferratâ* fieri debet. In Adultis hæc ipsa *remedia* quoque in usum vocari possunt, sed impari cum successu. Apud utrosque *Sectio* fugienda, nisi Operator certissimus de felici eventu existat. Necesse igitur est, ut Adultiores solo *Subligaculo*, *Emplastroq;* *siccante* extus quidem utantur, sive ad curandum malum adhuc recens, sive ad præservandum deterius. Intus verò si curationis spem habeat, ea usurpet, quæ contra Herniam intestinalem suo loco commendavimus; subinde enim eâdem methodo & *Omphalocèle intestinalis* vel *omentalis*, & *Enterocèle* citra sectionem curari potest.

Omphalocèle aquosa eandem prorsus curam postulat atque *Hernia aquosa*, sic & *Omphalocèle ventosa* iisdem quibus *Hernia ventosa*, remediis discutipoteſt. Aſt *Omphalocèle carnoſa* ſive *ſcirrhoſa* cautè admodum eſt tractanda, imò, ſi quædam Cancrî latentis indicia ſubſint, quemadmodum id aliquando obſervatur, tunc malum hoc tutius intactum relinquitur, quàm verò minus ſecurè tractandum ſuſcipitur. Quod ſi autem nihil cancroſi heic adſit, tum remedia in uſum trahentur, quæ aliàs contra Herniam cancroſam feliciter uſurpantur,

quibus ſi malum non diſcutitur, tum hoc in ſtatu quo relinquitur, & non niſi ſaſciâ munitur ad incommoda præcavenda. Quando autem magnas illud procreat moleſtias, videlicet ſi ſubinde doleat, ac majus quotidie incrementum capiendò pejora præſagiat, tunc à perito Operatore Tumor omnis exſcindendus, ac poſtea debitè perſanandus, Ægro ante operationem ſcitè præparato. Ad *præcavendam* talem Herniam in Infantibus atque Parturientibus umbilicum commodis ſaſciis firmiter ligare ſolemus.

HERNIA VTERI dicitur à *Hernia uteri.* nonnullis Tumor Inguinis, ab Utero in Inguen laxatum illabente enatus. Aſt hoc impoſſibile videtur, neque hætenus res vel unico exemplo demonſtrari potuit, ſi excipias unam alteramve obſervationem dubiam apud *Sennertum & oringium* occurrentem. Alii per Herniam uterinam nihil aliud intellectum volunt, quàm Uteri procidentiam, de quâ ſuo loco agetur,

HERNIA GUTTURALIS, vid. *Bronchocele.*

HERPES MILIARIS ſ. PV-STVLARIS, Græc. κέγχρως, Celſo *Ignis ſacer*, Avicennæ *Formica corroſiva* dictus, eſt exulceratio extremæ cutis pruriginofa, cum pluribus veſiculis parvis hinc inde per corpus numeroſè invicem effloſcentibus, ſero acri, pungente & lancinante repletis, affligens, ac plerunque cerneritio,

neritio, sæpè etiam flavescente colore apparens.

Diagno-
sis.

Facile ex jam dictis Affectus cognoscitur. *Scabiei* ferè species est; in extremâ nimirum cute tales vesiculæ, sive minutæ pustulæ, plerunque intra paucas horas, confertim uno in loco, ac si Milii semen adpersum fuerit, efflorescunt. Quandoque manum duntaxat unam alteramve, vel utramque occupat, nunc etiam pedes simul, aut Cutim reliqui corporis invadit. Molestus est Affectus pruriente, vel sæpius etiam ardente dolore. Non serpit tamen, nisi ichor falsus ex apertis per frictionem Pustulis vicinam Epidermidem quoque arroserit. Si verò serpat in vicina paulatim, tunc *Herpes exedens* nominatur. Pro varietate feri, quod in Pustulis continetur, varios colores suscipit; atque etiam, si negligatur, Scabiem post se trahere valet.

Causa.

Gignitur hic Affectus non nisi ex particulis seroso-salfo-acribus, è massâ sanguineâ per has illasve Glandulas cutis miliares, præcipitatis, atque sub Epidermide ob aliqualem sui crassitiem poris penetrandis ineptam subsistentibus, eamque in leves Pustulas elevantibus. Colliguntur autem tales particulæ salinæ in Massâ sanguineâ sensim ex Potu atque Cibis tali materiâ nimium turgidis. Quandoque etiam Aër externus frigidiusculus subito corpori æstuanti occurrens; vel attactus sordidarum fortè Aquarum, aut Liqueorum austeritate quadam pollentium ac frigidorum, corpore calente, Epidermi-

dis poros, ipsiusque Cutis extremos canaliculos angustando huic Affectui gignendo ansam præbere potest.

Quòd *Curationem* attinet si in unâ parte Malum effloruerit, simpliciter externè *Vino calido* vel *Spiritu* etiam *Vini* sæpius lavari, hinc verò *Emplastrum diapalma* aliudve *exiccans* imponi usque ad consolidationem poterit; intus tamen, si lubeat, aliquoties *diaphoreticum Pulverem* $\frac{1}{2}$ *ialem* cum *Aquâ Fumariæ* hauriendo, & operationem magis per diaphoresin, quàm per sudorem expectando. Si plura malum loca cutanea preenderit, tunc corpus benè expurgandum est *cathartico convenienti*: hinc etiam vel *secunda Vena*, vel *Cucurbitulæ cum scarificatione* applicandæ. Postea intus per octiduum & ultra *Pulvis meus antipsorus*, aut *Tinctura* $\frac{1}{2}$ *mii*, cum *Aqu. Scabios. Endiv. Plantag. Fumar. Card. bened. &c.* m. ac v. exhibeatur. Vel si tota sanguinis massa salibus heterogeneis nimium turgida deprehendatur, *Acidularum potus* cum regimine Diætæ commendabitur. Extus autem ea usurpabuntur, quæ in *Scabie* commendamus.

HERPES EXEDENS f. SER-
PIGINOSVS, est exulceratio hinc inde pluribus conglomeratis pustulis per cutim efflorescens, atque in vicinas partes suâ acrimoniâ corroden- te serpens, non sine dolore plus minus ardente.

Producitur autem hic Morbus, quandocunque plurima salia acido-
aguta

Cura.

Herpes
exedens

Causa.

acuta in Massâ humorali undecunque collecta, & viscoso cuidam humori irretita, per glandulas cutis miliares, forsitan à frigido externo austero aëre, aliisve causis angustiores poros adeptas, commodè transire, atque probè secerni nequeunt, sed ibidem subsistentes, & paulatim amplius congregatæ extimam Cuticulam non solum in Pustulas attollunt, sed insuper acrimoniâ suâ eandem simul atq; Cutis subjectæ fibras, sæpè & Panniculū carnosum, arrodunt, exedunt, ac ita Ulcuscula fœda serpentina producunt, quæ continuò sic magis serpunt, nisi debitis id remediis præcaveamus.

Cognoscitur Affectus facilè ex ipsa inspectione, ubi non solum fluens exulceratio cutanea, post prægressas Pustulas conspicitur, sed & ejusdem serpigiosa propagatio animadverti potest. Dolor interdum adest insigniter pruriginosus, imò ardens, atque inflammatorius. Affecta loca rubore plerunque, & asperitate præternaturali sunt contaminata. In principio serum nonnihil flavescens & acerrimum, postmodum autem, quando jam Cutis exulcerata est, etiam purulenta cum sero materia effluit.

Malum proin hoc si negligentius tractetur, etiam in *Fistulas* degenerare potest, parum vel difficulter curabiles, præprimis si Æger admodum cacochymicus fuerit. In principio autem curatio Morbi longè faciliior evadit, quàm in progressu demum & augmento ejus.

In *Curatione*, si Febris aliqua adsit inflammatoria, intus præscribentur

remedia antifebrilia sub titulo de *Febri malignâ* commendata. Si absit Febris, statim *Vinum medicatum purgans* est ordinandum, cujus ingredientia poterunt esse præter *Rhabarbarum*, *Helleborum* atque *Folia Sennæ*, etiam *alterantia*; v. g. *Radices Filicis*, *Pimpinell.* *Aristoloch.* *Cichor.* *Enulæ campan.* *Scorzoner.* *Bistort.* *Petasit.* *Herb. Agrimon.* *Hepatic.* *nobil.* *Sanicul.* *Pyrol.* *Scabios.* *Card. bened.* *Veronic.* *Cent. min.* *Chamædr.* *Semin.* *Plantag.* *Hyperici.* *Perfoliat.* *Anis.* *Spica Indica.* *Sal Tamaric.* vel *Absynth.* Quod si Æger magis appetat *Pilulas*, præscribi poterunt ex *Massâ pilul.* *Hydrop.* *Bont.* *Extract.* *panchymag. cathol.* &c. cum *Mercurio dulci.* Deinceps verò sola *alterantia* per plures hebdomadas usurpanda præscribentur, præmissâ tamen, si Ægri constitutio permittat, *Venæsectione* aut iteratâ *Scarificatione* cum *Cucurbitulis.* *Alterantia* talia erunt vel *Pulveres* ex $\frac{1}{2}$ n. *diaphoret.* *Bezoard. mineral.* *Pulver. pannon. rubr.* *Terr. sigill.* *Bolo armenate,* *C.C. ust.* *Spodio,* *Lapid. ☉.* *ppt.* *Diaph. Dial.* aut *Uvial.* &c. compositi. Vel *Liquores*, v. g. *Tinctura* quædam *traumatica,* *Tinct. $\frac{1}{2}$ nii,* *Mart. aperit.* ut & *Corallor.* *Essent.* *Succin.* *Betonic.* *Gramin.* *Parnass.* *Æstivo tempore,* vel *Juscula alterata* *Herbis nasturcinis,* vel *Acidulæ,* aut *Thermæ Fabarienses* potari possunt, quarum succedaneum huc usque fecimus *Aquas nasturcinarum Plantarum destillatas,* quæ singulis anni temporibus vel solitariè, vel cum aliis etiam absorbentibus atque edulcorantibus dari possunt. *Extus*

Ulcuscula frequenter *Essentiâ Myrrhæ, Aloës, Thuris, Hellebor. Rhabarb. Gratiolæ, Meliss. Absynth. &c.* vel *Aquâ Calcis vivæ* per solutionem *Mercurii sublimati phagedænicâ* redditâ; vel solo etiam *Lixivio sarmen-torum Vitis cum Spiritu Vini campho-rato*, aut *theriacali* elui poteunt. Hinc verò siccantia atque absorben-tia, acidum corrosivum destruentia applicanda, quem in finem *Unguen-tum pomatum cum Tutia, Antimon. diaph. Unicorn. fossil. Florib. &ris, Mer-curio præcipitato &c.* permixtum commendare haud veremur. *Empla-stra* desuper ponenda sunt v. gr. *Empl. diapalma, de Cicut. Diachalcit. de Bô-lo &c. Aquapendens* sæpè usus est seqq. *R. Succ. Tabac. ℥iij. Cereæ citrin. ℥ij. Resin. Pin. ℥iij. Terebinth. ℥j. Olei Myrrh. q. s. M. F. Ceratum.* *Forestus* autem ac *Paræus* Unguentum enula-tum cum Mercurio feliciter usurpâ-runt; desuper simul positis *Foliis re-cent. Tussilag. Quercus, Aristolochiæ rotund. Calthæ palustris*, aut *Lappæ* cujuscunque. Quod si his non ob-stantibus *Serpigo* pergat, tunc margi-nes vel *Aquâ forti*, vel *Oleo Vitrioli* sunt tangendæ, & hætenus dicta remedia postmodum continuanda.

Hordeo-lum.

HORDEOLVM, HORDEVN, CRITHE, est Tuberculum in sum-ma palpebrâ propè cilia ortum, quod primò rubescit, & pruriginoso arden-te dolore molestum est, deinceps ve-rò suppurascens, simile grano hordei atque album evadit, propriaque cysti s. pelliculâ includitur.

Gignitur à falsâ quadam sangui-nis atque lymphæ crassioris guttâ in tubulo porove aliquo propè Cilia fortè subsistente, ulterius meare haud potente, à variis novis succedentibus particulis paulatim auctâ, & hinc per stagnationem continuatam non so-lum parvum Tuberculum efficiente, sed etiam suppurationem subeunte, tandemque sui rupturâ, purisque candidi effluxu, Ulcusculum paucis horis durans reddente.

Quippe Tuberculum hoc illis est admodum familiare, apud quos vi-scosa quædam acrisque lymphæ in Ciliorum poros vel tubulos, fibrilla-rum tono infirmiore præditos, facile deponitur; inprimis quando tales Homines falso multum victu gau-dent, fructibus horæis apprimè dele-ctantur, aut lucubrationibus noctur-nis frequenter indulgent, sub quibus fumus candelarum acriusculus Pal-pebras atque Cilia frequenter lambit. Adde his Ciliorum pilos forsan du-riores, porulorum vicinorum cavi-tatem pressione quadam angustantes, unde haud difficilis ansa præbetur quibusdam particulis ibidem moram necendi, tandemque prorsus sta-gnandi.

Quoad *Diagnosin*, Tuberculum hoc propè Cilia conspicitur, magni-tudine ac, si suppuratum est, colore Hordei grano haud absimile: in prin-cipio tamen rubet magis & ardet, in-star parvularum Inflammationum. Differt à *Grandine*, quæ tuberculum est non propè Cilia, nec inflammato-rum, sed in medio Palpebrarum sub-

ter

ter cutim utramque mobile, durum, cuti concolor, rotundum, subinde etiam pellucidum, uti suo loco fufius defcriptum eft.

In *Prognofi* nihil eft valdè heic metuendum, nifi quòd, fi malum frequentius occurrat, tandem *Lippitudo* exspectanda fit; ab iis præfertim, quibus massa fanguinea falſior, & Oculorum membranulæ molliores tenerioresque obtigerunt.

In *Curatione* *Purgans ex Extracto Pilular. cochiar. vel cathol. cum Mercurio dulc. & Oleo Anet. Rutæ vel Fœniculi* aliquoties poterit exhiberi; ac deinceps aliquot doſes *Bezoardici mineralis*, *Ebor. ppt.* aliorumve *diaphoreticorum* concedi. *Externè Saliva jejuna cum papyro impoſita admodum prodeſt. Vel Hordeum, Caſeusve Salivâ jejunâ inter maſticandum imbutus adhibeatur. Commendant alii Ceram albam, Adipem Gallinarum Aquâ Roſar. lotam, vel Corpus Muſcæ abjecto capite affricatum; Sanguinem item Columbar. Turturum, Perdicum; Succum Semperviv. Geran. Robertian. &c. Melli ac Farinæ permiflum & calidè impoſitum. Etiam Lac cum incoctione Chamomillæ, Meliloti, Hordei, Malvæ, Althææ &c. conducit, ſi linteola ei calido intincta frequenter applicentur. Quod ſi ſponte non rumpatur *Hordeolum jam ſuppuratum*, ſcalpello pertundendum, hinc *Melle roſaceo* extergendum atque ſanandum eſt. Si verò non ſuppuretur, ſed materia potius in Tuberculo lapideſcat, quemadmodum ſic peculiari nomine *Chalazion* nuncupatur, tunc*

incisâ epidermide cuteque materia exprimenda, hincque *Melle rutaceo vel roſaceo cum Eſſentiâ Myrrhæ & Balsamo peruan. vel tolutan. cicatrix* inducenda venit.

HORROR, HORRIPILATIO, eſt frigus cutaneum, quòd ſubitò plerunque Hominem cum convulſivo quaſi tremore panniculi carnoſi, per dorſum maximè corripit, & ab auſteris falſis acriusculis particulis fibras nerveas laceſſentibus atque criſpantibus oritur. Horror

Hic *Affectus* levis quidem eſt, ac ſæpè homines affligit maximè ſanos, Aimle-
gia. quandocunque ſudante ac æſtuate corpore fortè ſubitò frigidus aër, gelidusve liquor ad Cutim aliquâ parte accedere, ſicque ſudorem repercutere poteſt; imò ſi ſudorem in Induſio non exuto refrigerari permittitur, tum ab hoc ipſo frigido induſio cutim tangente ſimiliter ſudor atque inſenſilis tranſpiratio repellitur, hinc à ſudoris particulis falſis atque pungentibus fibrillæ Cutis & Panniculi ſubjacentis criſpari, hacq; ratione Horripilationes excitari ſolent. Aliàs autem Horror iſte vel Febris jungitur, præprimis Quartanarum paroxyſmis incipientibus, aut Febris ephemeris inchoantibus. Quin & ſæpè in febrili ſanguinis diatheſi, imò ipſis Febris continuis omnibus Horrores haud infrequentes ſunt. Uſque adeo ut, ſicubi ſanus aliàs Homo talibus Horripilationibus ſubinde citra cauſam manifeſtam corripitur, ſuæ conſtitutioni haud fidere, ſed potius ad

præcavendam Febrim aliquoties remedia sudorifera in usum trahere, indeque sudorem cum debito regimine prolicere debeat; quoniam ejusmodi Horripilationes signum esse solent, crudos humores sive austera atque viscosa salia, ceu antecedentes Februm causas, in massâ Humorū circulante esse collecta. Quod si proin vel insensibilis transpiratio, sudorve ab usu aëris nocturni frigidioris, inque peregrinationibus intempesto aëre & corpore malè munito factis, maximè supprimatur; vel Cibi falsi, dyspepti, immodicè aut intempestivè assumti, viscosum falsum chylum exhibuerint; vel Potus liquorum acescantium nimis ingurgitatus sit; vel terror subitaneus incussus fuerit, cruditates prædictæ faciliè colligi & in massâ humoralī cumulari solent.

Curatio.

Quod igitur *Curationem* attinet, Horror in Febris ipsi peculiaris non desiderat remedia; extra Febres autem aliosve morbos, ea sunt usurpanda, quæ vel Sanguinem diminuerè, vel saltem simpliciter per Cutis poros superfluum serum falsum commodè in auras propellere, sicque Morbos præcavere possunt. Itaque in Plethoricis convenit *Venæsectio*, præmissio, si opus videbitur *Clysmate emolliente & detergente*. In aliis quoque lene purgans sub formâ *Infusi Folior. Senæ ac Rhabarb.* cum *Crem. Tri.* ac *Semin. Anis.* vel sub Formâ *Pilular.* aut *Potionis* exhibendum est. Ac deinceps *Dieta* proba servanda, quâ quidem non tantum chylus sincerus, & dulcis balsamicus procurari, sed

insensibilis transpiratio in suo vigor teneri potest.

HVMERI LVXATIO est Morbus compositionis, quo caput Ossis Humeri suo ex articulo violenter extruditur, sicque motum brachii naturalem vel insigniter lædit, vel prorsus impossibilem reddit. Humeri luxatio

Pars affecta heic est Os Humeri, cuius caput Scapulæ per diarthrosin s. dearticulationem, coracoide ejusdem processu cum acromio securitatem articulo præbentibus, jungitur. Pars affecta

Causa autem proxima luxati humeri Ossis ferè non est nisi externa, eaque violenta, v. g. ictus, atque contusio, lapsus ex alto, nimia excussio brachii in Sphæristerii ludo, vel ponderum magnorum elevatione. Rarum est, si humor intra articulum collectus, vel sub axillâ in tumorem congregatus Humerum suo loco dimoveat. Fit autem hæc Luxatio vel cum Tendinum, quibus Os Humeri articulo ligatum tenetur, ruptione; vel sine eorum læsione, vel cum vel sine fracturâ Ossis sive Humeri sive Scapulæ. Aliquando etiam conjungitur Vulneri à globis sclopetariis aliisve causis simul & contudentibus & vulnerantibus. Tandem laxati ab humiditate nimia Tendines occasionem Luxationi præbent, si non perfecta, quâ os planè excidit è suo articulo, saltem imperfectæ sive *Subluxationi*, quâ tantillum Os prolabitur. Causa

Cognoscitur Humeri luxatio non ita difficulter ex figuræ Axillæ mutatione, Diagnos.

tionem, flexuræ ejusdem impotentiâ, tumore quodam articuli præternaturali, eâ parte quâ ossis caput depulsum fuit, cavitate verò plus minus sensibili circa sinum in quo os jacebat. In Luxatione *imperfectâ* non omnis prorsus flexio est ablata, sed ea adhuc tantillum possibilis, licet dolorifica, atque hæc Luxationis Humeri species dolorem post se tum maximè trahit, quando violento aliquo ictu facta est. Cum autem non nisi à laxitate tendinum nimis humefactorum est oborta, tum brachium aliquantillo longius evadit, ac flexura illiusdem sufficiens adest, sed robore nihilominus tanto non gaudet, quanto oppositum brachium erit instructum. Si Luxatio *perfecta* est, indeque tendines vel torqueantur, vel expandantur nimium, tunc dolor non levis adest, præprimis cum flectere Humerum volumus, ita ut, si citò membrum non restituatur in pristinum locum, inflammatorius quoque Tumor, articuli repositionem magnopere retardans, accedat. Si tendines rupti penitus fuerint, tunc Humerus quantumvis centies repositus, iterum levissimâ brachii agitatione excidit. Præterea in *Luxatione perfecta* brachium longius evadit quàm in *Subluxatione*, sive *imperfectâ Luxatione*, nisi Os Humeri in altum fuerit retractum, quod tamen contingere nequit sine processûs Scapulæ Fracturâ.

Quoad *Prognosin*, Luxatio simplex sine aliis accidentibus orta, facile sanabilis existit, ac citò per Chi-

rurgi manum peritam curatur. Si verò Luxatio cum Fracturâ, Vulnere, aut Contritione ossis Scapulæ contigerit, vel etiam si Os Humeri prope juncturam, aut in ipso capite suo simul fractum fuerit, tunc malum & tardius & difficilior curatur, ac etiam si sanetur, vix tamen simul restituetur Humeri flexura, quoniam fractæ partes ab interveniente callo ita coalescunt, ut potentia flectendi omnis tollatur. Quod si præterea Humor seroso-acido-corrosivus subierit articulum, ejusque ossa non solum sede suâ dimoverit, sed & tendines paulatim varios eroderit, tum Fistulam immedicabilem simul producet. Quando autem Tendines à nimia humiditate valdè laxantur, tum Subluxatio inde orta per remedia siccantia sensim corrigitur. Rupti autem planè aut erosi tendines suæ nunquam integritati restitui possunt, unde Luxatum Os Humeri, si centies in suum locum reposueris, centies iterum excidet.

In *Curatione* si Luxatio simplex *Curatio.* sine alio comite Affectu existat, tunc statim repositio Ossis in suum articulum tentanda atque perficienda est, hæc quidem ratione, ut prius ipsum brachium retro cubitum vel Chirurgi manibus, vel fasciis arreptum, quocunque commodiore modo extendatur, cumque sufficienter extensum erit, tum caput Ossis Humeri, submisso Axillæ instrumento convenienti nonnihil duro ac rotundo, intra Articulum repellatur. Vel si aliter luxatum os fuerit, per eam

retrudendum est viam, quâ quidem elapsum est. Repositione peractâ locus vel *Spiritu Vini camphorato*, aliòve *spirituoso Liquore* calente per aliquot dies diligenter fovendus, ac interea quietus relinquendus est, donec robur omne redierit, nullusque amplius Inflammationis metus adsit. Sunt etiam Chirurghi, qui non malè applicant *Decoctum Herbarum aromaticarum in Vino*, sub formâ vel *Cataplasmatidis*, vel *Fomenti* maximè *discutientis*. Alii verò solum suum *Emplastrum contra rupturam Axillæ* prius *Oleo rosaceo*, vel *violaceo* inunctæ admovent, inibi que relinquunt aliquandiu, donec Articulus firmus denuò evaserit. Quod si autem sive *Vulnus*, sive *Fractura* simul adfuerit, tunc quocunque possibili modo pars affecta ad pristinam figuram deducenda ac *Fasciis* debitè immixtis coercenda est; ubi certè *Fasciæ* omnes non nisi *Spiritu Vini* intinctæ applicentur; relinquetur interea foramen inter illas, ut sine harum solutione ipsum *Vulnus* quotidie bis curari ac deligari queat. Sed in hoc casu, difficili admodum, præter *Venæsectionem* etiam interna partim *diaphoretica* sub *Pulverum*, partim *traumatica* sub *Decoctorum* formâ sunt exhibenda, non aliter ac in gravibus *Vulneribus*. Abstinentium interea ab omni potu *Vini*, ut & ab *Irâ*, omnibusque *Cibis acidis*, *salsis*, atque *dyspeptis*. *Alvum*, si naturâ non fuerit libera, *Clysmatum* aut *Suppositoriorum* ope laxabis. Si verò *Symptomata* quædam *Ægro* obtingant, iis occurrendum erit per

Remedia talibus accidentibus congrua, suisque hinc inde locis indigitata. *Imperfecta Luxatio*, à laxatis admodum tendinibus oriunda, *Balnei* & *Embrocationis sulphureo-aluminosæ* calentis ope, nec non imposito *Emplastro catagmatico*, *adstringente* restituitur. Si *Caries* ac *fistulosum Articuli Ulcus* simul præsens sit, *Pædarthrocace* nominabitur hic Affectus, & methodo, suo loco expositâ, curabitur, sed sine flexuræ Ossis restitutione, quæ in tali casu difficillimo impossibilis planè est.

HVMORVM OCVLORVM
VITIA, vid. *Oculorum Humorum Vitia*.

HVNGARICVS MORBVS,
vid. *Febris Maligna*.

HYDATIS PALPEBRÆ est Hya
Tumor mollis *Palpebræ Oculi*, plerunque superioris, sæpè splendens, rubicundus ac transparens, à seroso aquoso humore, copiosè inter membranas *Palpebræ* collecto & extravasato, sine notabili dolore, cum *Oculi clausurâ* oriundus.

Gignitur inprimis, quando *Lympha* Can
lacrymalis, ob irritatas glandularum fibrillas, nimium secreta ac profusa per angustatos hinc, vel planè occlusos tubulorum *lacrymalium* porulos effluere nequit; quod sæpè *Infantibus* obtingit, *Inflammationem* aliqualem *Palpebræ* antea perpessis; nec non aliis, in quibus à pituitâ viscosâ ac tenaci poruli illi infarcti & occlusi fuerunt. Contribuit huc proin

proin falsa & austera diathesis sanguinis, undecunque contracta; non secus atque aëris externi rigiditas Palpebrarum tubulos constringens; ploratus item nimius Oculis existentibus inflammatis.

Affectus, Infantibus & Pueris familiarior quàm Adultis, ex signis in definitione exhibitis cognosci sufficienter potest. Neque adeo notabilis existit, si citò admodum remedia in usum trahantur. Neglectus autem facile potest Inflammationem, Abscessum, ac tandem Ulcus Fistulosum post se trahere; vel saltem Palpebræ cicatricem molestant & fœdam inferre.

In Curatione intus quidem, absente Febre, Pueris Trochisci hermetici, vel lene aliud purgans exhibeatur; postmodum diuretica vel diaphoretica in usum vocentur; v. g. Ocul. $\overline{\text{O}}$. ppt. $\frac{1}{2}$ n. diaph. Succin. alb. ppt. Cinnab. nat. vel $\frac{1}{2}$ n. &c. cum Aquis Fœnic. Succisæ, Scabios. Ononid. Fragor. Card. bened. ac Syrupo Violar. Capill. $\frac{1}{2}$ r. permixtis. Si adsit Febris, alvus solum Clysmate uno alterove eluatur, & hinc dicta reliqua remedia m. ac v. diligenter usurpentur. Extus verò ad discutiendum præscribi debet Collyrium vel siccum, è Pulveribus Lactis Lunæ, Lapid. Calaminar. ppt. Ossis Sepiæ, Radicis Filicis &c. paratum, cum sacculis applicandum; vel humidum, ex Aquis destillat. Levistic. Chelidon. maj. Nasturt. aquat. Beccabung. Fœnic. Euphras. cum Ocul. $\overline{\text{O}}$. ppt. Tut. ppt. Off. Sepiæ ppt. Lapid. calamin. ppt. Bol. armen. compositum.

Addere licet vel Aqu. Calc. vivæ, vel ipsum quoque Crocum pulverisatum. Hinc alii leve Cataplasma ex Aqu. Calcis viv. Albumin. Ovi cum Alumin. conquass. Croco, ac Spirit. Vin. camphor. vel theriacal. concinnant, & continuè applicant. Si verò quis desideret Cataplasma ex Herbis discutientibus Scordii, Calaminth. Artemis. Solan. Scabios. Salv. Ryt. Fœnicul. Agrimon. Seminib. Dauc. Fœnic. Psyll. Lin. &c. inter se tenuiter admodum incisis, contusis, ac in Vino albo vel potius Lacte coctis paratum, calideque applicatum, per nos licebit. Quod si verò Affectus cum Inflammatione conjunctus sit, tum Collyrium siccum maximè prodest, ex Pulvere Tutie ppt. Oculor. $\overline{\text{O}}$. ppt. Cretæ albæ, Bol. Armen. Terræ sigill. Radicis Liquirit. Lactis Lunæ, Florum Sambuc. &c. paratum & cum sacculo interpassato applicandum, donec intumescencia discussa sit, quod plerunque per effluxum humoris contingit. Ubi autem inflammata Hydatis ad suppurationem tendit, tunc Cataplasma ex Malva, Althæa, Ficibus, Chamomill. Croco, Micâ panis &c. cum Lacte coctis est applicandum, continuandumque, donec ruptus Abscessus suum pus reddiderit. Hinc verò Ulcus Melle rosaceo atque Essentiâ Myrrhæ, cum Tutia, Lapid. Calaminari &c. est sanandum. Intus in omni hoc Affectu pro potu ordinar. convenit Decoctum Lignorum cum Semin. Fœnic. Rasur. C. C. Radicib. Graminis & Liquirit.

HYDROÆ, vid. Papulæ.

HYDRO-

HYDROCELE, vid. *Hernia aquosa*.

Hydrophobia.

HYDROPHOBIA, ab ὕδωρ *aqua* & φόβος *metus*, compositâ voce, est Morbus convulsivus cum vel sine Rabie, liquidorum ac splendorum fugâ, anxietate pectoris, deglutiendi, respirandi quæ difficultate, Febrî acutissimâ, aliisque symptomatibus gravioribus Hominem affligens, à morfu Canis rabidi oriundus, plerunque intra bidui, tridui aut quatriidui spatium Ægrotantem è medio tollens.

Parâ affecta.

Afficitur in hoc morbo nunc latex magis spirituosus, nunc Massa potissimum humoralis, nunc utrumque simul fluidum corporis. Si animales tantum spiritus affliguntur, Rabies producitur, cum liquidorum metu non admodum notabili, sed convulsivis tamen motibus insignibus conjuncta. Si Massa tantum humoralis affecta est, tunc *Hydrophobia sine rabie vel delirio* contingit. Tandem si utrumque fluidum inquinatur; & Rabies, & Hydrophobia simul graviter Hominem invadunt. Ut adeo non malè distinguatur ipsa Rabies canina ab *Hydrophobiâ*, cum hæc sine illâ quandoque evenire soleat; quemadmodum hanc rem prolixius in Observatione quadam *Ephemeridibus German. Curios.* insertâ exposuimus.

Causa.

Hydrophobia sine Rabie producitur immediatè non nisi a sanguine intra Vasa pulmonum sensim stagnante, imò etiam extra eadem profluente, vesiculas de horâ in horam magis im-

plente, bronchia hinc angustante, & acrimoniâ quoque suâ fibras nerveas atque membranaceas crispante; unde convulsivi corporis motus, cum respirandi, deglutiendi quæ difficultate oboriuntur. Horrent proin liquida, horrent auram tales Ægri liberam, quoniam ab hisce omnibus irritantur Faucium qualescunque nervuli, & hinc crispati sive convulsi Anxietatem maximam atque periculum suffocationis vel strangulationis præsentaneæ suscitant. Ob sanguinem illum stagnantem, inde quæ impeditam humorum circulationem debitam, sanguis in corpore toto turbatur, effervesceat, ac ita Febrim continuam malignam vel acutissimam excitat. Inflammanantur enim in hoc casu Lobi Pulmonis, inde Febris accendi necessariò debet.

Sanguinem stagnare atque grumescere facit admissum quoddam Venenum animale, quod quidem à rabidis Animantibus præcipuè Caninibus, Lupis aut Felibus, in vulneratas partes cum Salivâ projicitur. Saliva autem propter iram ac furorem Animalis particulis instructa est valdè mobilibus, salino-acribus & volatilibus acidis, quæ si in Vulneribus ac Moribus Sanguini venoso communicantur, ejus paulatim, hincque totius Massæ sanguineæ dissolutionem moliantur, unde illa in partes suas, grumofam ac serosam secedens, intra pneumonica Vasa vel ideo primum stagnare & accumulari incipit, quoniam Vasa talia ab ingrediunte sub actu respirationis aëre multum

multum comprimuntur. Accumulatur de horâ in horam magis ille sanguis, quoniam lege motûs circulatorii continuè novus affluit, qui cum transfluere nequeat, similiter stagnat & grumescit. Convulsivi motus frequentes circa pectus inprimis contingunt, quoniam ibi nervosæ fibræ qualescunque magis pervices irritantur & crispantur. Anxietas adest maxima propter impletas Pulmonum Vesiculas, sicque libertatem sufficienter eas expandendi ademptam.

Hydrophobia cum Rabie producitur, quando saliva Animalis venenata in morfu seu Vulnere cum latice Spirituum simul & Sanguinis, ob nervos æquè ac vasa sanguiveha dilacerata, communicatur; unde excitato talium Spirituum simul & nervorum motu irregulari delirium cum furore producitur, quemadmodum id quidem sub titulo de *Canis rabidi morfu* fusius explicatum invenitur.

Sapissimè tamen accidit, ut immissum Vulneri Venenum neque cum sanguine, neque cum spiritibus statim permisceatur, sed aliquandiu adhuc, etiam post curatum & cicatrice firmâ obductum Vulnus, in parte jaceat, ac demum post elapsum aliquod tempus in apicum prodeat, sanguini vel spiritibus communicate, suamque ita tragediam exerceat. Ita enim observatum à nobis, aliisque est, latitans ejusmodi Venenum post elapsos non solum aliquot menses, sed forsitan annos demum in sanguinem aut nervos pe-

netrâsse, & Hydrophobiam lethalem excitâsse.

Quod *Diagnosin* & *Prognosin* Diagnos. & Prognos. concernit, Homines, in quibus dirus hic Morbus latitat, vel in apicum prodire incipit, primò conqueruntur de plus min⁹ gravi lassitudine spontaneâ omnium membrorum; sequitur hinc dolor, in locis antea vulneratis aliquantulum torquere incipiens; progredi autem hunc dolorē sentiunt deinceps juxta ductum vasorum & nervosi generis versus Cor & Cerebrum, cumque hinc spatio paucarum horarum eousque pervenit, tunc statim Anxietas pectoris, atque præcordiorum angustia Hominem miserè torquere incipit, cum Inquietudine perpetuâ, Vigiliis, Respirandi difficultate, singulis horarum momentis augescente, indeque proveniente crebrâ membrorum calcitatione. Horrent Ægri omnia liquida oblata, nec non liberum aërem, & luminis diurni splendorem nimium; quando enim liquor qualiscunque offertur bibendus, vel quando fenestra quæpam aperitur, tunc illicò quasi motibus convulsivis agitati, majoreque respirandi difficultate prehensi pedibus manibusque calcitrant, resque oblatas vitare atque à sese amoliri conantur, quasi singulis momentis suffocandi. Solida verò oblata melius deglutire nonnihil, sed nec dum & illa facillè sine metu suffocationis possunt. Si Rabies simul adest, tum Ægri tales obvios quosque suis impetunt moribus, & si forsitan vulneraverint tales, similem in illis morbum excitare valent. In-

terea propter insignem Dyspnœam Hydrophobi non nisi verba dimidia-
ta pronunciant, & ea etiam instar
canum latrantium efferunt, voce
quasi ululante. Siti interim tantaleâ
quoq; torquentur, appetentes conti-
nuè potum, quem tamen vel eminus
adhuc monstratum aut oblatum hor-
rent, utpote deglutire nescientes ci-
tra metum suffocationis. Febris acu-
tissima simul adest cum agrypniâ;
respiratio de momento in momen-
tum difficilior redditur; sudor pri-
mum quidem calidus & largus toto è
corpore profluit, postea sensim frigi-
dus redditur. Atque talibus Sym-
ptomatibus horrendis affligitur Ager,
donec post elapsum unum alterum-
ve, rarius tertium aut quartum diem
planè suffocatus intereat. Haftenus
enim neminem notavimus, qui ex
hoc Morbo, si perfectè prehensus
fuerit, reconvaluerit, & pristinam
sanitatem recuperaverit. Vidimus
tamen, & tractavimus plures, qui,
cùm morfi fuissent à Canibus rabidis,
ab Hydrophobiæ metu per usum re-
mediorum immunes per Dei gratiam
manserunt.

Curatio.

Etenim quod *Curationem* attinet,
ad præcavendam Hydrophobiam
ipse Morfus Canis rabidi probè est
curandus, quemadmodum id sub ti-
tulo de Canis rabidi morfu indigita-
vimus. Præsens autem hic Morbus
in primo statim insultu requirit *Venæ-*
sectionem, semel aut bis in pede aut
brachio iteram: dein autem mox
potentia alexipharmaca in usum tra-
henda; quem in finem commenda-

mus *Spirit. volatilem* aut *Sal volatile*
C. C. Viperarum, *Eboris*, nec non
Spiritum theriacalem camphoratum,
Mixturam simplicem Danj. Lud. ad
20. 30. pluresve guttas singulis qua-
tuor horis concedenda. Vel *Theria-*
ca Andr. Mithrid. Damocr. Diascord.
Fracast. cum Conserv. Bell. min. Fumar.
Beton. Amarac. Borrage. Violar. permi-
sceri ac sæpius exhiberi potest; v. gr.

Rx. Conserv. Meliss.

Fumar.

Bugloss.

Violar. ana ʒss.

Confect. Alk. compl. ʒj.

Elect. Diascord. ʒiiij.

Salis volat. Viperar. ʒj.

Bezoard. min.

Matr. perl. ppt. ana ʒss.

Syrup. Fl. Tunic. q. s.

M. Mixtur. ad formam Opiatæ, d.
ad Fictil. Dosis singulis bihoris magni-
tudo Nucis mosch.

Vel *Rx. Conserv. Amarac.*

Fl. Tunic. ana ʒvj.

Succi Citr. rec. ʒss.

Conf. Alk. compl. ʒiss.

$\frac{1}{2}$ n. diaph.

Ebor. phil. ppt. ana ʒij.

Syrup. Capill. ʒr. q. s.

M. f. Electuar. d. ad Oll. Usurpetur,
ut supra.

Vel *Rx. ʒ n. diaph. ʒiss.*

Nitr. ʒ iat.

Salis volat. Ebor. vel Viperar.

Cinnab. ʒ n. corr. ana ʒss.

Camphor. gr. vj.

Sacch. alb. ʒss.

M. f.

M.f. Pulv. subt. in tres dos. æqu. div. ad chart. Sumatur singulis trihoris dosis cum Roob Sambuci, vel alio vehiculo.

Alimenta sint Cremor Hordei, Juscula avenacea, carniū, farinacea. Si *Infusum fol. Thé* non planè respuat, illud quoque concedendum largiter. Si his nil minuantur Accidentia, brevi morietur Æger; si verò mitigentur, spes aliqua adest convalescentiæ, quam usus diaphoretico-alexipharmaeorum & cardiacorum diligens promovere potest.

HYDROPS ASCITES est Tumor Abdominis atque Crurum, nonnunquam simul Scroti vel Pudendorum, ab Humore seroso intra Abdominis cavum copiosius extravasato, hinc & lymphaticis tubulis Crurum ubique stagnante cutisque ac membranæ adiposæ poros replente oriundus, cum Febri hecticâ simul conjunctus. ὡδρωψ græcè ab ὕδωρ, *aqua* & ὤψ, *facies* componitur, & latine aliàs sonat *Aqua intercus*. Ascites autem à Græco ἀσцитες, *uter, utris*, originem trahit; ut Hydrops ascites sit velut *Uter aquâ repletus, Aqualiculus*.

Afficiuntur in hoc morbo quàm maximè ipsius Abdominis, hinc & reliquarum partium tumentium Glandulæ, lymphatici que ex his prodeuntes Canaliculi.

Tumor itaque producitur, quandoque Lympha sive serosus humor, à Sanguine jam secretus & gela-

tinoso-mucosus redditus, intra Glandulas Abdominis varias, præprimis autem Mesenterii, Pancreatis, Hepatis, aliasve stagnare incipit neque per suos tubulos progredi potest; unde Hydrops in Abdomine sæpissimè initium sumit. Dum autem serum ita stagnans jugi accessione novarum particularum paulatim magis cumulatur, expandit tandem nimium Glandulas ac tubulos, eosque, cum cum resistere amplius nequeunt, rumpit; è ruptis verò hinc inde tubulis pluribus paucioribusve serum effluit in Abdominis cavum, illudque sensim replendo expandit, tumidumque reddit. Quâ expansione primùm quidem insensibili, postliminiò autem magis notabili factâ, compriuntur & angustantur simul Canaliculi lymphatici, membranofam Cutis & panniculi adiposo-carnosi texturam perreptantes, ut adeo in his omnibus tardius procedens Lympha subsistat, atque oedematofam Abdominis integumentorum intumescen-tiam producat. Hoc autem facto Seri in Abdominis cavo stagnantis quantitas & pondus non solum Renum substantiam premendo secretionem Urinæ maximè impedit; sed etiam per compressionem Trunci lymphatici, à Ductu thoracico usque ad Inguina continuati, inibi que in ramos crurales divaricati, Lymphæ necessarium è cruribus ac partibus pudendis reditum difficiliorem reddit, unde liquor ille solito tardius ad Chyli receptaculum assurgit, sicque Vasa Pedum lymphatica nimis expan-dendo,

dendo, ad Femorum Crurumve intumescentiam oedematofam simul contribuit. Quod si in morbi hujus progressu serum Abdominis nimis falsum & acre redditum fuerit, tum Viscera ibidem arrodendo corrumpit, ac paulatim fiderat, unde tandem serum illud ipsum, quod primum Lymphæ instar clarum limpidumve fuerat, flavescent, crassum, fœcibusque etiam Vini prorsus simile quoad colorem & consistentiam redditur. Sub quâ tragœdiâ Glandulæ Mesenterii intumescunt, indurantur, ac velut gelatinoso humore quodam oblinuntur, qui humor tamen nil videtur aliud esse, quàm pinguedo ab interveniente sero falso in Gelatinam versa. Cum autem rebus sic stantibus, tota Massa sanguinea magis ac magis corrumpatur, omniq; dulcedine balsamicâ privetur, necessariò hinc Febris hæctica, corporis naturalem habitum lentè consumens, oboriri debet, quemadmodum ista consumptio in partibus superioribus corporis, Pectore nimirum, Capite atque Brachiis manifestè apparet, licèt in artubus inferioribus, ob Aquam intercutem tumentibus, non adeo clarè deprehendatur.

Quæ verò Symptomata huic Morbo successivè junguntur, ea omnia hinc facile ex tali sanguineæ Massæ constitutione vitiatâ, Lymphæ crassitie, partibusque tumentibus explicari possunt. *Antecedenter* autem ipsa humoralis Massa heic accusanda venit, intemperie nimirum serosopituitosâ, sive Cachexiâ laborans,

quam quidem producant Febres diuturnæ, imprimis quartanæ, ut & nimix Venæsectiones, largiores Hæmorrhagiæ qualescunque, florem sanguinis depauperantes, ac eapropter liquorem stomachicum ita debilem reddentes, ut hinc è Cibis assumptis non nisi serosus admodum Chylus progigni soleat. Etenim ipsa Chylificatio taliter à prædictis Affectibus vitiata, Chylum similem per aliquod temporis spatium continuè producens, sanguinem non nisi serosum efficit. Quanquam etiam Mensium vel Hæmorrhoidum naturalium obstructio non secus atque Hæctica Febres, Phthisis, Empyema, & alii Morbi Tumorem Abdominis post se trahant. Inter *Causas præcatarticas* recensere oportet Aëris humidum continuum in vitæ genere usum, crapulam quotidianam, cibos frequentes copioso principio aqueo turgentes, vitam sedentariam, somnum prolixum, præprimis meridianum.

In principio Morbus vix potest cognosci, quando Tumor in Abdomine tum nec sensibilis, nec ullâ fere ratione molestus est. Etenim incipiens glandularum Obstructio incommoda tanta non parit, ut ullis signis sese manifestent. Solet tamen sæpè tumor extremorum pedum, sub vesperam magis quàm manè visibilis, in corpore aliàs ad Cachexiam inclinate principium esse Hydropis, dum progressu temporis non solum ille tumor stabilis evadit, sed & paulatim versus genua ascendit, ac interea simul in ipso Abdomine accrescit.

Urina

Urina primitus satis naturalis, in progressu verò Morbi tincta magis, atque lixivialis emingitur, saliumque in corpore fixorum cum $\frac{1}{2}$ earum incoctione copiam, non secus atque obstructions glandulosarum partium arguit. Interim Urina heic semper iusto parciore secernitur, & profluit. Respiratio libera est, si nullæ in Pectoris glandulis obstructions, nullæque feri extravasati in cavitatem thoracis effusiones contigerunt. Appetitus quandoque laudabilis existit, plerunque tamen imminutus vel planè ablati. Sitis ut plurimum urget, sed quo plus sunt potæ plus sitiuntur aquæ. Tumor partium læsarum augetur quotidie, usque dum tandem ipsa crura non tantum splendida ac velut oleo oblinita videantur, sed & aliquando rubicunda, aut maculis saltem dolentibus rubris, grandibus, ceu Gangrænæ, sequuturique Sphaceli exordiis hinc atque illinc afficiantur. Hæc tamen symptomata non in omnibus Hydropicis ante mortem conspiciuntur, sed sæpè ipsa mors eadem antevertit. Sunt etiam, quibus pustulæ in cruribus nimium tumidis erumpunt, quæ si aperiantur aut rumpantur, sponte humorem fundunt ferofum acrem, ita quidem ut nonnunquam à continuato tali fluxu omnes aquæ totius hydropici corporis profluant, sicque Tumor omnis dispareat, sed simul ipsa vita cum aquis effluat, quando spiritibus sic dissipatis, atque in fibras omnes diffundi haud amplius sufficientibus, circulatio sanguinis imbecil-

lior singulis horis redditur, tandemque prorsus cessat. Partes superiores, Facies nimirum, Pectus, atque Brachia plerunque in hoc morbo valdè emaciantur; quanquam sub finem morbi sæpè etiam Brachia ac Facies oedematoso tumore prehenduntur. Aliàs paulo ante Morbi insultum, & in ipso morbo Facies admodum pallida, imò totum corpus præternaturaliter albicans redditur. Conqueruntur Ægri in hoc statu cachectico sæpè de lassitudine, quantumvis cæterà benè ingerant atque egerant. Atque talis profectò color pallidus cum aliquali oedematosâ intumescentiâ in corpore cachectico certum ferè præsagium esse solet Hydropis sequuturi, nisi maturè præcaveamus. Quandoque Pudenda aut Scrotum simul valdè intumescunt, aquisque stagnantibus aut extravasatis replentur.

Quoad *Prognosin*, hic Affectus præcaveri facilius, quàm curari potest; etenim si glandulæ pertinaciter fuerint obstructæ, si Urinæ sint paucæ, lixiviales, ac tinctæ; si appetitus valdè prostratus; si sitis magna, vires debiles, nulla ad sudandum inclinatio; si non obstante remediorum usu Tumor in Abdomine & Cruribus augeatur indies; signum esse solet Morbi non nisi per mortem finituri. Quando autem Respiratio est libera, Urinæ utcunque profluunt, atque coctionis signum monstrant; si appetitus bonus, somnus tranquillus, transpiratio corporis laudabilis, & quandoque sudor adest, tum spes

Prognosis.

K k k k 3 afful-

affulget futuræ sanitatis. Verùm in Senibus, aut illis, qui laudabili Diætæ indulgere nesciunt, Hydrops post aliquod tempus rediens, vel apoplecticus Insultus accedens Homines è medio tollit. In Hydrope autem subinde Crura pustulas tandem acquirunt, è quibus ruptis Aquæ profluunt continuè, tandem verò accidentibus rubicundis ac lividis striis, ceu Gangrænæ & Sphaceli indicis, moriuntur Ægri. Febricula per totum ferè morbi decursum adest lenta.

Curatio.

Quoad Curationem in principio & progressu hujus Morbi sæpius est purgandum, & quidem, nisi Febris admodum obstet, hydrotico vel hydragogo satis potenti, quemadmodum sunt Jalappæ radix ad 3℔. vel amplius, cum Sale Genistæ, Ononidis vel polychresto, aut Cremore saltem Tartari exhibita. Quin Magisterium Jalappæ ad octo pluraque grana in Spirit. Anisi, Feniculi aut Juniperi solutum atq; Syrup. Capillorum Veneris edulcoratum singulis sex vel octo diebus propinari poterit. Præstans quoque est Syrupus de Spinâ cervinâ, cochleatim per vices exhibitus, & per pluras dies continuatus; Succus item Ireos nostratis ad aliquot uncias aliquoties haustus. Imò Pilulæ Hydropicæ Bontii ad 3℔. cum Mercurio dulci pluries assumptæ non minorem effectum habent. Commendant quoque Infusum Hellebor. nigr. Gratiolæ, Radic. Cyclamin. & Asari cum Radic. Gentianæ cruciatæ, Vincetox. Ononid. Rub. Tinctur. Aristol. rotund. ver. Herbar.

Anserin. Veron. Théè &c. Formulæ possunt esse variæ, v. gr.

℞. Mass. Pilul. hydrop. Bont.

℥rears. Qu. ana 3℔

Resin. Jalapp. 3℔.

Cinnab. $\frac{1}{2}$ n. opt. 3j.

Essent. Trifol. fibr. q. s.

M. f. Pilulæ num. XLVIII. Consperj.

pulv. Liquir. d. ad scat. Dosis num. 12.

quotidie mane cum Aqu. flor. Sambuc.

Vel ℞. Magist. Jalapp. aut Scammon.

gr. ix.

Nucl. Persicor. 3ij.

Invicem probè contusis affunde

Aqu. Plantag.

Ononid. ana 3j.

M. f. Emulsio, cui adde

Syrup. Capill. ♀ r. 3iij.

Julep. rosac. 3j.

Misc. d. ad Vitr. Sumatur pro dosi, repetatur aliquoties.

Vel ℞. Radic. Jalapp. 3℔.

Salis Juniper. vel Onon. 3℔.

M. f. Pulv. subt. detur pro dosi aliquoties, si opus videbitur, iterandâ.

Vel ℞. Mass. Pilular. de Ammoniac.

gr. xv.

Extract. Hellebor. nigr. gr. vj.

Mercur. dulc. opt. 3℔.

Ol. Tereb. q. s.

M. f. Pilul. num. 15. Sumantur pro dosi matutinâ, repetendâ pluries, si è re esse judicabitur.

Vel ℞. Mass. Pilul. Emanuel. gr. xv.

Extract. Trochisc. alband. gr. j.

vel Esulæ gr. iij.

Essent. Succin. q. s.

M. f. Pilulæ num. xij. Dentur pro dosi.

Vel ℞. Mercur. dulc. optim. gr. xxv.

Magist. Jalapp. gr. viij. vel ix.

Crem.

Crem. Fri gr. vj.

Ol. stillat. Fœnic. gutt. ij.

M. f. Pulv. subtil. d. ad ch. pro dosi matut.

Vel R̃. Spirit. Ceras. nigr. ʒij.

Anis. ʒj.

Juniper. ʒʒ.

Magist. Jalapp. vel

Scaṃon. gr. viij. vel ix.

Solutis leni igne adde

Syrup. Violar. purp. vel

de Nymph. vel

Julep. rosat. ʒiij.

Detur ad Vit. pro dosi.

Vel R̃. Salis polychrest. ʒʒ.

*Mercur. corallat. Helmont.
gr. vij.*

M. f. Pulv. subt. detur pro dosi mat.

Vel R̃. Oxymel. hellebor. Gesner.

Syrup. de Rhamn. Cathart.

Aqu. Alkekeng. ana ʒj.

M. d. ad Vit. Sumatur mane ac vesper. Cochleare plenum.

Vel R̃. Radic. Gentian. cruciat.

Aristol. rot. ver.

Eryng. vel Fœnic. vel

Rubiæ ana ʒʒ.

Herb. Betonic. Mij.

Flor. Genist. Mj.

Bacc. Alkek.

Juniper.

Semin. Petros. vel

Nasturt. vel

Raphan.

Fœnic. ana ʒij.

Fol. Sen. opt. mund. ʒj.

Radic. Helleb. nigr. vel

Hermodestyl.

Rhab. el. ana ʒʒ.

Spic. Indic. ʒiij.

Salis Tartar. ʒj.

*Incisis, contusis, & in nodulo ligatis
affunde Vini albi veter. ʒiij.*

Aqu. fervent. ʒij.

*Quotidie mane exhauriatur Cyathus
unciarum sex.*

*Vel R̃. Succ. Ireos nostratis recenter
express. ac filtrati ʒij. plus
minus.*

Spirit. Cochlear. vel

Tinctur. ʒ n. ʒj.

*M. d. ad Vit. Sumatur pro dosi ma-
ne aliquoties pro re natâ repetenda.*

*Sunt, qui Ovum gallinaceum ape-
riunt, albumen effluere permittunt,
ejusque loco dein Succum Ireos in-
fundunt, cum Vitello probè ligneâ
spatulâ permiscent, tantillum in Ci-
neribus calidis calefaciunt, & ita ex-
hauriunt, aliquoties repetendo, ac
per tres pluresve horas desuper jeju-
nando. Potest & Sal polychrestum
aliquoties ad ʒij. cum Decocto radice
Urticæ, Virgæ aur. & Ononid. ex-
hiberi.*

Vel R̃. Radic. Ebul.

Asar.

Vincetox.

Gratiol. ana ʒij.

Herb. Heder. terr.

Fragar.

Pimpinell. ana Mj.

Bacc. Heder. arb.

Laur. ana ʒij.

Semin. Anis.

Dauc. ana ʒʒ.

Petros. ʒij.

Cinam. elect. ʒiij.

Salis Junip. ʒj.

Agaric.

Agaric. trochisc.

Radic. Helleb. nigr.

Rhab. elect. ana ʒß.

Limat. Chalyb. in nod. lig. ʒvj.

Incisis, contus. & in nodulo ligatis affunde

Vini alb. Veter. ℥iiiss.

Aqu. fontan. Calent. ℥ij.

Stent per noctem in loco tepido, postmodum quotidie mane Cyathus unciarum quatuor exhauriatur.

Purgato autem sic pluries corpore, intercalanda sunt Remedia non solum viscidam pituitam resolventia, sed & insimul per Glandulas renales, aut cutaneas præcipitantia. Atque huic scopo satisfacere creduntur *Decoctum Granor. Coffee tostor. frequentissime potum*: *Decoctum item Radicum* superius jam commendatarum cum *Herbis* insuper *Agrimonia, Matrisylvæ, Virgæ aureæ, Hederæ terrestris, Ononid. Bacc. Juniper. Alkekeng. Cynosbat. Semin. Milii solis, Dauci cretic. Nasturtii, Foenicul. Petroselin. Paludapii.* Imò *Radix Sigill. Salomon. Virg. aureæ, vel Semina Paludapii s. Apii selini, Nasturtii, aut Thlaspios* ad ʒj sæpius assumpta cum Jusculo mira interdum præstare visa sunt. Aliquando *drachma una Salis Genistæ, Polychresti, Absynthii, Ononidis, Virgæ aureæ* cum Jusculo sumpta effectu laudando non caruit. *Elixir proprietatis sine acido* etiam ad ʒj. frequenter sumtum cum *Decocto* aliquo superius nominato, aut *Decocto saltem lignorum* exiccante atque diaphoretico utile nonnullis fuit. Inprimis autem pro *specificis* habentur *martialia*, v. gr.

Diaph. ʒ tial. Crocus ʒ t. aperit. Mars cum ʒre ppt. Vitriolum Martis, sæpius ad gr. xv. exhibita, cum Cancrorum telis vel lapidibus ppt. Quin *Conchæ* aut *Cochleæ* unâ cum suis testis exustæ, ac in pulverem redactæ ad ʒij. vel ʒj. specificè *Hydropicos* curare dicuntur. Juvant nonnunquam & *Spiritus Terebinth. ad ʒß. Tinctura Salis Tri, Spirit. aperit. Penoti, Essent. Succini, Tinctura Martis aperitiv. ʒ n. Corallor. cum Nitr. Tinctura traumatica, ad ʒß.* non rarò propinata.

Quòd si ex usu talium remediorum *Cutis* reddatur ad sudandum apta, imò sudores jam prodire incipiant, tunc aliquoties *Ægri Laconico* immittantur, in quo cum sudor largiter excutitur, signum est futuræ salutis haud contemnendum; præprimis si *Tumor Abdominis & Pedum* inde minuat. Rarum est exemplum *Fœminæ* plus quam sexagenario-majoris, quam anno 1698. ex *Ictero flavo* *Hydropicam* redditam post plures sudores, *Tumorem* utcunque minuentes, *Balnei mineralis Schauenburgensis*, in viciniâ nostrâ scaturientis, ope & usu per mensem continuato ab *Ascite* prorsus liberatam, & integræ sanitati restitutam non sine stupore vidimus; postquam ante usum *Balnei* per aliquot menses *antihydricis* remediis sine alio, quàm sudoris successu, usa fuerit, *Urinâ* semper eâdem, i. e. *lixivioso* - nonnihil turbidâ, ac sæpius adhuc *ictericâ* existente. Ab eo autem *reconvalescentiæ* termino adhuc per decem annos commodè & benè vixit,

vixit, donec tandem ex Febri hec-
tîcâ, & Marasmo senili supremum diem
obierit.

Si Formulas desideres ejusmodi
incidentium, aperientium, deobstru-
entium atque diureticorum reme-
diorum, qualia quidem in hoc mor-
bo, ubi Glandulæ & Vasculorum
extremitates mucilaginoso vel gela-
tinoso-viscidâ lymphâ infarctæ sunt,
requiruntur, en varias, quas subinde
apud Hydropicos cum successu haud
pœnitendo usurpavimus, & adhuc
occasione datâ in usum trahere sole-
mus; v.g. si nulla ad est Febris insignis,

℞. Radic. Aristol. rot. ver.
Gentian. cruciat.
Eryng.
Carlin. ana ℥℞.
Herb. Beton.
Marrub. alb.
Trifol. fibr. ana Mj.
Bacc. Juniper.
Semin. Fœnic. ana ℥iij.
Salis Juniper. ℥℞.

Incisis, contusis atq; in nodulo liga-
tis affunde Vini alb. veter. ℥iij.

Aqu. fontan. calent. ℥℞.

Hinc mane ac vesperi horâ ante pa-
stum exhaustiatur calix unciarum qua-
tuor.

Vel ℞. Radic. Pimpinell.
Fœnic. ana ℥vj.
Rusc.
Rhab. Monach.
Ebul. ana ℥℞.
Baccar. Alkekeng. ℥iij.
Semin. Nasturt.
Anis. ana ℥vj.

Incisa & contusa usurpentur ut
supra.

Vel ℞. Radic. Apii, Asparag. ana ℥℞.
Rubiæ, Rusc.

Bryon. Asar. ana ℥ij.

Herb. Meliss. Scolopendr. aa. Mj.

Anserin. Agrimon. aa. M℞.

Bacc. Juniper.

Semin. Apii, Urtic.

Thlasp. ana ℥ij.

Limat. Chalyb. in nod. ligat. ℥℞.

Incis. & contus. accommodentur ac
usurpentur ut supra.

Vel ℞. Radic. Ononid.

Scrophular. ana ℥℞.

Cortic. median. Sambuc.

Tamar. ana ℥iij.

Herb. Meliss.

Card. bened. ana Mj.

Summit. Cent. min.

Virg. aur.

Absynth. ana M℞.

Semin. Napi, Raphan.

Urtic. ana ℥℞.

Salis Fabar. ℥j.

Spic. Indic. ℥℞.

Incisa & contusa usurpentur ut
supra.

Vel ℞. Radic. Calam. arom. Liquirit.
ana ℥iij.

Cichor. vel Taraxac.

Ireos nostrat. ana ℥vj.

Herb. Nasturt. aquat. cum tot.

Siderit. arvens.

Calaminth. ana Mj.

Semin. Anis. Fœnic.

Cumin. Dauc. ana ℥℞.

Ficuum pingu. par. vj.

Incis. & contus. d. ad Nodul. ex Sin-
done rubrâ. Affunde Vini alb. vet. ℥iij.

LIII

Aqu.

Aqu. font. ℥ij.

Coque per horam integram ferè ad medias ; Colatur. d. ad Vitr. De hoc Vino dein m. ac vesper. cyathus propinetur unciarum trium vel quatuor.

Vel R̄. Radic. Bardan.

Card. bened.

Saxifrag. alb. ana ʒß.

Bacc. Juniper. ʒij.

Semin. Nasturt.

Petroselin.

Milii Solis ana ʒiij.

Herbar. Heder. terr. Mij.

Incis. & contusa accommodentur, & asurpentur ut supra cum levi coctione, vel infundantur in liquorem convenientem, ac ita bibantur.

Solent alii Baccas Alkekengi, Cynosbat. & Juniperi, Herbas Absynth. Abroton. Plantag. aquat. Trisol. fibrin. Samicul. Pyrol. Alchymill. Virgæ aureæ, Fragariæ, Anserinæ, Pilosellæ, Bellidis minoris, Pentaphylli, Radices Urtic. Carlin. Filic. Sarsaparill. Chin. &c. in Vino albo veteri coquere, deque hoc postea Decocto quotidie mane cyathum unciarum quatuor exhaurire.

Vel R̄. Herbar. Scab. Heder. terr.

Flor. Rosar. Damasc.

Sambuc. ana part. æqu.

Incisa pone in Cucurbitam vitr. Affunde Fæces Vini, ut superemineant ; stent per 14. dies. Destilla hinc per Alembicum vitreum, ac de Liquore destillato quotidie cochleare plenum exhibe, horâ ante pastum, superbibendo Decoctum Granor. Coffee tost.

Vel R̄. Herbar. rec. Nasturt. aquat.

Beccabung. Cheref.

*Apii Macedon. sive
selin.*

*Plantag. latifol. vel
aquat. aa.*

Mij.

Cochlear. vel

Trisol. fibr. Mij.

Incide, contunde, succum exprime, & filtra per chartam emporetic. vel in Ollâ terreâ probè testâ pone per bihorium in Clibanum, vel Cineres calentes, postea succum clarum decanta & usui asserva, de quo postea mane ac vesperi duæ uncia cum vel sine Saccharo per duas vel tres hebdomadas propinentur, intercalando hebdomadatim purgans aliquod supra præscriptum.

Subinde Plantæ tales cum Sero Lactis caprilli coquuntur, colatusque Liquor bibendus traditur, quotidie iterandus per spatium aliquot hebdomadarum. Vel Juscula iisdem alterata similiter hauriuntur ; videlicet aliquot ejusmodi Plantarum antiscorbuticarum manipulis mane ac vesperi recenter concisis Jusculum carnis aliudve affunditur, hinc relinquitur donec non amplius ferveat, colatum dein hauritur.

*Vel R̄. Radic. Dulcamar. cum Ligno &
Fol. Mj.*

Taraxac. ʒiß.

Incisis affunde Aquæ fontan. ℥viij. Tege probè, coque per quadrantem horæ plus minus, & de colato decocto mane quidem haustum calentem trihorio ante prandium, vesperi autem bihorio ante cenam & cubitum ituro frigidum pro-

propina ; unde *Æger* quantum possibile sudabit ; in Potu etiam ordinario *Vini albi* vel *Cerevisiæ optim. defæcat.* immersas continuè habebit *Herbas siccas Fragariæ, Matrisylvæ* atque *Pentaphylli.*

Multis profuit *Vinum*, cui *Cineres Fabarum, Absynth. Calaminth. Ononid. Juniperi, Centaur. min. Genist. Agrimon. Anserin. Menthæ sylvestr. Urticæ &c.* immersi fuerunt, filtratum, & ad uncias quatuor m. ac v. potum. Hujus *Vini* loco ipsum *Sal lixiviale* talium Plantarum ad 3ß. vel 3j. aliquoties cum Vehiculo conveniente exhibetur.

Vel R̄. *Cochlear. combust. & subtiliss. pulveris. 3ij.*

Radic. Vincetoxic.

Hepatis canin. vel lupin. ppt. ana 3j.

Cinam. opt.

Macis. ana 3ß.

Zingiber. ʒj.

Sacch. alb. 3iß.

Misc. f. Pulv. subt. d. ad scat. Dosis 3j. m. ac v.

Vel R̄. *Ocul. ʒ. ppt. 3ij.*

Diaph. mart. vel

Chalyb. ʒre ppt.

Radic. Ononid.

Bryon.

Fol. Veron.

Semin. Genist.

Nasturt.

Anis. ana 3j.

Sacch. ad pondus omn.

M. f. Pulv. subt. d. ad scat. Dosis mane ac vesperi 3j.

Subinde *Succus foliorum Sambuci, Ulmaræ, ac Verbenæ* cum *Melle* coquitur, deque hoc *Succo* per aliquot dies, *Lunâ* decrescente quotidie *uncia una* vel altera exhibetur.

Præprimis autem commendantur quoque *Tincturæ*, v. gr. ʒ niii, *Corall. Martis aperit. Zwelf. Martis cœrulea Etner. Spirit. Oli phil. Glauber. Essentia Pini, Trifol. fibr. Sal. volatil. oleos. Sylv. Spirit. Salis armoniac. urinos. anisatus aut fœniculatus. Tinctura Martis belleborata Wedel. aut similes alii Liquores, ad ʒj. pro dosi, mane ac vesp. cum Aqu. flor. Sambuc.*

Quod si *Febris* adfuerit lenta major cum appetitu prostrato, aut valdè imminuto, siti, urinâ lixiviosâ, tumore pedum oedematoso splendente, respirandi difficultate, anxietate frequenti pectoris, tum verò purgantis loco non nisi *Panacæa solutiva alcalina* per plures dies quotidie semel aut bis ad 3j. vel 3iß. cum *Emulsione Amygdal. dulc. dilutiore* exhibebitur; quæ enim resinosa acria purgantia sunt, internas glandulas magis inflammant, & sic Morbi magnitudinem intendunt potius quàm minuunt, *Panacæa* verò illa sine omnibus torminibus per alvum & urinam blandè evacuat. Ejus proin usu præmisso, & subinde etiam reiterato, *Succi Plantarum antiscorbuticarum & aperitivarum* aliquamdiu in usum trahi possunt, ex *Apio communi & Macedonico, Fœniculo, Cherefolio, Cardamine, Plantagine, Urticâ, Fragariâ, Nasturtio qualicunq̃, Beccabungâ, Trifol. fibrin. Ulmar. Hederâ terrestr.*

Cochlear. Piperitide, Eupatorio cannab. & similibus expressi ac filtrati, atque duarum vel trium unciarum dosi propinati. Pulveres etiam profunt diaphoretico-diuretici, quales sunt v. gr. seqq.

Rx. ʒ n. diaphor.

Ocul. ʒ. ppt.

Specif. stom. Poter.

Radic. Taraxac.

Ononid.

Vincetox. ana ʒj.

Salis Juniper.

Fabar.

Nitr. ʒlat. ana ʒʒ.

M. f. Pulv. subtil. in 15. dos. æqu. divid. ad chart. Mane ac vesp. capiatur dosis.

Vel Rx. Roob Sambuc.

Ebul. ana ʒʒ.

Cochlearum cum testis calcinat. & subtiliss. pulverisat. vel Milleped. ppt.

Ocul. ʒ. ppt. ana ʒj.

Summit. Virg. ʒrea subtiliss. pulveris. ʒij.

Syrup. aperit. Minder. q. s.

Misc. f. Electuar. d. ad Pyxid. Dosis singulis trihoris magnitudo Nucistæ.

Fieri quoque Decocta possunt, & diligenter propinari, v. gr.

Rx. Radic. Ulmar. Vincetox. ana ʒʒ.

Scrophular. Saxifrag.

ana ʒiij.

Herb. Anserin. Scabios.

Summit. Virg. aureæ ana Mj.

Flor. Genist. Mʒ.

Semin. Urtic. Thlasp.

Anis. ana ʒij.

Incis. & contus. coqu. in Aqu. fontan. ʒvj. & Vin. alb. vet. ʒbj Colatura dein Albumin. Ovor. clarific. detur ad Vitr. Dosis m. ac v. uncia quatuor.

Ex Cineribus Plantarum supra dictarum etiam Lixivium cum affusâ Aquâ fontanâ calente, & postmodum filtratâ fit, hujusque Lixivii aliquot unciaë mane ac vesp. per aliquod tempus propinantur, cum fructu sæpius, nisi malum valdè radicalum sit.

Extus ad tumorem Pedum, aut Scroti, nisi splendens admodum fuerit, discutiendum Fomentationes institui possunt, quem in finem Folia Sambuci, Ebuli, Nucum, Solani, Hederæ arbor. ac terrestr. Artemis. Juniperi, Pini, Salicis, Pyrorum, Cerasor. ac Prunorum in Aquâ & Lixivio coquantur, hoc postea Decoctum lagenæ immittitur, indeque Vapor per tabulam sive asserem perforatum ad corpus pedesque admittitur tamdiu, quamdiu Æger sine molestiâ tolerare potest. Vel Æger quotidie Laconicum, aut Scamnum sudatorium ingreditur, & per horulæ spatium in eo leniter sudare conetur. Vel Lixivio communi incoquantur sequentia:

Rx. Radic. Vincetox. Sigill. Salom. ana ʒj.

Scrophular.

Eryng. ana ʒʒ.

Fol. Card. bened.

Anserin.

Sideritid. arvens.

Chamædr.

Verben. ana Mj.

Salis

Salis Fri ʒj.

Bacc. Laur. Alkek. Junip. aa. ʒʒ.

Incisa & contus. coque in

Lixivii communis ℥vj. vel viij.

In Colaturâ calefactâ sæpè lintea immerguntur, eaq; expressa integris Cruribus applicantur.

Vel R. Radic. Dulcamar. Bryon.

Caryophyllat. ana ʒj.

Rasur. Lign. Juniper.

Fagin. ana ʒvj.

Herb. Artemis.

Marrub. alb.

Urtic. urent.

Persicariæ ana Mj.

Salis Fri ʒʒ.

Incis. & contus. coque in Aqu. Calcis viv. ℥viiij. ad quartæ partis consumptionem, in colaturâ dein Lintea immersa calidè applicantur sæpissimè.

Vel R. Lixiv. Ciner. Sarmentor. Vit.

ʒxx.

Olei è Lathyrid. Fernel. ʒiiij.

Misce & agita tamdiu, donec in lacteum Liquorem Mixtura ista fuerit redacta; cujus dein usus est, lintea ei calenti immergere, exprimere, & Cruribus frequenter applicare, usque dum sudor copiosè per guttulas è poris cutaneis extillare notabitur.

Alii Saccum lineum mollem Furfure & Pulvere flor. Sambuci implent, hinc Vino albo ad aliquot ebullitiones incoquunt, dein exprimunt, & toti Abdomini admovent, postquam alteram Sacci partem Pulvere Seminis Cumini adsperserunt. Vel Gemmar. Juniperi, viridibus atque perfectis baccis instructar. Manipulos duos coquunt in Aquâ, indeque emergentem vapo-

porem, sæpius si feret Æger, ad corpus admittunt pro sudore eliciendo. Vel ex Farinâ secalinâ & Furfure Pannes coquunt, eos dein adhuc calentes per medium secant, vaporem in fellâ perforatâ ad corpus & pedes admittunt, aliquoties hoc opus peragendo, si benè tulerit, indeque levamen ac diminutionem Tumoris persenserit Ægrotans. Possunt & Herb. Absynth. Abroton. Aneth. Centaur. min. Sambuc. Ebuli, Rubi sylvest. Solani Heder. arbor. Geran. robert. Persicar. Folia Pini, Sabin. Nucum jugland. Juniper. &c. Lixivio Sarmentorum Vitis incoqui, & Vapor inde exhalans ad partes tumentes admitti.

Quando membra Ægrotantis talia non ferunt, ac inde metuenda est Inflammatio periculosa cum variis symptomatibus; tum vel Herbarum recentes Geranii Robert. Persicar. Folia Lappæ, Solani, Verbasci, Tabaci, Rubi sylvest. Sambuci, Ebuli, &c. flaccida nonnihil super calentem focum reddita, Cruribus, ac ipsi quoque Abdomini frequenter adplicantur: vel dictarum modò Herbarum, similibusve aliarum siccatarum Pulvis subinde inspergitur prunis, sive ardentibus carbonibus, fumoque hinc emergente lintea imbuta calidè tumentibus partibus applicantur.

Quod si splendeant, & quasi oleaginoso humore obducta sint Crura, tum certè melius, vel tutius non reperitur medicamen ad Gangrænam præcavendam, vel etiam dissipandam, quàm Farina secalina aut triticea, probè siccata, pro lubitu Cretæ

albæ, *Bolo communi*, & *Pulveri radic. Liquir.* permiscenda, atque *Cruribus* bis de die adspargenda. Quando *Pustulæ* efflorescunt, rupturam sui & feri profluvium minantes, tunc nihilominus pergendum in usu *Pulveris*.

Ubi autem *Pustulæ* hinc inde majores effloruerunt, ac hæ tandem ruptæ serum fundant, sicque *Pedes* sero stillantes evadant, tum plerunque cum ipsis *Aquis Anima* prodit, & *Hominem* exanimem post se relinquit. Aut antequam *Aquæ* omnes effluxerunt, striæ vel maculæ rubicundo-lividæ in *Cruribus* enascuntur, tanquam certa *Gangrænæ*, *Sphaceli*que præsentis, ac brevibus post diebus subsequuturæ mortis indicia. Ad manantia autem *Crurum* loca vix melius deprehendi remedium, quàm *Unguentum album camphoratum*, vel etiam *Farinam triticeam cum Cretâ albâ pulverisatâ* & *Oleo Lilior. albor.* vel *rosaceo* permistam, & inunctam.

Symptomatibus aliis urgentibus occurrendum, quemadmodum sub titulis peculiaribus talium Affectuum indigitatum reperietur. Præcaveri *Hydrops* sæpè potest, si *Fonticulus* unus aut alter in brachio aut pede excitetur. In *Diætâ* ea sunt concedenda, quæ eupepta sunt, & laudabilem chylum exhibent. A potu excessivo semper abstinendum. *Alvus* quotidie respondere debet. *Somno* non nimis indulgendum. *Potus Coffée* frequentissimè bibi potest.

HYDROPS ANASARCA, s. LEVCOPHLEGMATIA, est Tumor oedematosus totius corporis cum pallore, & lassitudine conjunctus, originem trahens à sero viscido in cutaneis glandulis atque tubulis copiosè stagnante, Cutimque sic nonnihil attollente ac intumefaciente.

Usque adeo ut pro Parte affectâ maximè habere debeamus totam Cutis peripheriam: quanquam & in partibus internis glandulosis aliqualis obstructio contingere queat.

Producitur autem morbus, quandoque sanguis Ægri valdè cachecticus, sive Cacochymiâ seroso-pituitosâ inquinatus, occasione qualicunque nactâ in tubulis cutaneis, per quos partim transpirare, partim circulare deberet, quoad lymphaticas suas particulas in Glandulis Cutis miliaribus secerni consuetas, obhærescit. Nimirum vel ipsum Serum sanguinis copiosum, crassius atque nonnihil viscidum, ob intercurrentes aliquod acidum austeriusculum, reddi hâcque ratione in Glandulis cutaneis stagnare potest. Vel etiam Cutis ipsa cum suis poris atque tubulis à frigore Aëris externi simul ita constringi & angustari valet, ut serum illud copiosum, utut non ita crassum, penetrare tamen cum omnibus suis moleculis nequeat, sed transmissis tenuioribus, spissiores ibidem relinquere necesse habeat. Ad collectionem copiosi talis Seris ea contribuunt, quæcunque in Cachexiâ superius in-

digitata

Hydro
anasar
ca.

Part
affectâ

Morbi

digitata fuerunt. Hoc solum addendum; Viduas atque Virgines non menstruatas probè, vel etiam Pueros belluones, & horæis Fructibus nimium indulgentes, huic morbo valde obnoxios existere.

Cognoscitur facillè ex pallido Tumore universæ Cutis corporis. Tumor hic licet oedematofus sit, non tamen ingens adeo est, ut insigniter admodum naturalem magnitudinem partium excedat. Vocare solent hinc Germani *ein Verblunſenheit*. Color autem floridus atque naturalis per totam Cutis circumferentiam mutatur in pallidum, vel albicantem.

Affectus non periculosus, si in externis solum partibus, cuteque hospitetur; si verò internas simul glandulas, easque tenaciter occupaverit, tum periculum est, ne in *Ascitem* atque *Tympanitem* convertatur. Quin & vidimus, eidem post observatum deterius vitæ regimen, *Apoplexiam* ipsam lethalem successisse.

In Curatione Corpus ante omnia *Pilulis hydropicis Bontii cum Mercurio dulci* aliquoties est purgandum; vel *Vinum medicatum purgans ex diureticis & amaris* est propinandum. Verb. grat. pro Puero decem vel duodecim annorum:

℞. *Mass. Pilul. hydrop. Bont. 3j.*
Mercur. dulc. opt. ʒij.
Resinæ Jalapp. ʒß. ad gr. xv.
Ol. stillat. Lavend. q. s.

M. f. *Pilulæ num. 60. Inaur. d. ad scat. Dosis quotidie mane 6. 7. vel 8. cum vehiculo convenienti. Adultus*

autem decem vel duodecim illarum capere potest:

Vel ℞. *Extract. panchymag. Croll.*
Mass. Pilul. marocost. ana ʒij.
Magist. Scammon. ʒj.
Essent. Myrrh. q. s.

M. f. *Pilulæ num. 60. Inaur. d. ad scat. Dosis pro Puero 5. 6. vel 7. Pro Adulto decem.*

Vel ℞. *Radic. Jalapp. ʒj.*
Crem. Fri vel
Salis essent. Card. bened.
Mercur. dulc. opt. ana gr. vj.
Scammon. ʒrat. gr. ij. vel iij.
M. f. Pulv. subt. d. ad ch. pro dosi mane sumendâ ab Adulto.

In complexionibus delicatis *Ptisana laxativa* concedere possumus, non sine fructu operantem, si per aliquot dies mane assumatur, aut etiam vesperi; sequentem verò in modum concinnari potest:

℞. *Fol. Senn. opt. mund. ʒij.*
Passular. minor. ʒiß.
Semin. Coriandr.
Fenic. ana ʒij.
Crem. Fri ʒß.

Incis. & contus. coque in Aquæ fontan. Libris tribus p. c. ad tertiæ partis consumptionem. In Colaturâ dissolve
Mannæ calabrinæ ʒx.

Clarifica cum Albumine ovor. & adde
Aquæ Cinamom. ʒj.

Detur ad Vitr. Dosis quotidie mane uncia duæ plus minus in Pueris, uncia quatuor autem in Adultis.

Vel *Vinum medicatum purgans ordinari poterit, v. gr.*

℞. *Radic.*

℞. *Radic. Vincetox.*

Eryng.

Calam. arom. ana ʒß.

Herb. Agrimon.

Anserin.

Summit. Cent. min. ana Mj.

Flor. Calend. Genist. ana Mß.

Fol. Senæ opt. mund. ʒj.

Agaric. troch.

Rhab. elect. ana ʒij.

Semin. Anis.

Spic. Indic. ana ʒij.

Salis Juniper. ʒj.

Incisis & in nodulo ligatis affunde Vini albi veteris ℥iij. & Aqu. fontan. ℥iij. p. c. Hinc quotidie mane uncia quatuor plus minus hauriantur ab Adulto.

Subinde *Panacæam solutivam alcalinam* per plures dies cum *Diaphoret. martial.* exhibui ; vel ejus loco quotidie mane *Syrupum macrobium* ad ʒß. vel ʒvj. dedi.

Dein Serum sanguinis copiosum & crassum partim attenuandum, partim per vias Urinæ ac Sudoris præcipitandum venit. Attenuabitur exhibitione frequenti *Decocti Radic. Herbarum & Seminum* contra *Ascitem* commendati. Vel solum *decoctum Granorum Coffee tostor.* aut *Infusum Fol. Thé* quotidie ter quaterve per plures hebdomadas potum optimè confert ; quibus tamen intercalare debemus partim solutionem *Succolatæ* in *Aquâ* vel etiam *Lacte* tenuiore factam ac potam : partim *Pulveres Oculor. ʒ. ppt. Diaph. ʒial.* vel *ʒvial. Spodii ppt. Radic. Sigill. Salomon. Ir. flor. Irid. nostr. Taraxacon.*

Aron. Summit. Virg. aureæ, Sal. polychrest. Fabar. Juniper. Ononid. Tamaric. Milleped. ppt. Cinam. acut. Cubabar. Cardamom. Semin. Napi, Paludapii, Petrosel. Fœnicul. Dauc. Milii Solis &c. Quæ quidem vel per se sub *Pulverum* aut *Tragematum* formâ, vel cum permistione *Extract.* *Aristoloch. Vincetox. Centaur. min. Gentian. cruciat. Absynth. Ononid.* sub formâ *pilularum* diu usurpari possunt. Conducunt tamen etiam alterantia singula in *Hydrope Ascite* laudata. *A Venæsectione* abstinendum. *Laconica & Sudatoria* sicca non contemnenda. In *Dietâ Cibi* magis sicci, iiq̃ue principio sulphureo-balsamico turgentes magis quàm aqueo in usum vocandi ; contra ab omnibus acidis, falsis, fumo induratis, dyspeptis est abstinendum. Aër frigidus-humidus, tristitia gravis, ira fortis, quies & somnus nimii sunt fugiendi.

HYDROPS PECTORIS *Hydr. Pect.* s. **THORACIS**, est extravasatio & collectio humoris seroso-falsi in cavitate thoracis alterutrâ vel utraque, cum respirandi difficultate per vices ingravescente, aliisque symptomatibus conjuncta, atque à rupturâ vasculorum lymphaticorum, vel eorundem erosione oriunda.

Pectoris hinc cavitas heic vitiata *Par. affect.* est quatenus ab admissâ feri plus minus aquosi quantitate angustatur. In specie tamen Glandulæ qualescunque Thoracis, indeque emergentes tubuli lymphatici læduntur.

Etenim extravasantur humores *Causa illi*

ferosi, quodocunque Vasa lymphatica in Pectore aperiuntur, sive dein hæc apertio per *ρήξις*, *ruptionem*, sive per *διάβρωσις*, *erosionem*, facta fuerit. Rumpuntur vasa *nunc* per vim iis ab externâ quadam causâ illatam, in Vulneribus, Contusionibus, Tussi violentâ, vociferatione nimîâ, aut simili quadam re: *nunc* per nimiam distensionem, ab extraordinariâ quadâ Lymphæ transeuntis copiâ factam; quando videlicet serum massæ sanguineæ in Glandulis secretum statim inviscatur, incrassatur, atque in Tubulis earum excretoriis subsistit, sicque Glandulas in Tubercula plus minus dura attollit, unde accumulatum, quod de novo semper ex arterioso sanguine accedit, serum vascula tandem nimis distendendo rumpit, & in Thoracis cavum effluit. Ut adeo genesis hujus Morbi cum *genesi* Ascitis prorsus conveniat. Obnoxii hinc sunt eidem, qui Pectore obeso sunt præditi, qui Baccho & Cereri strenuè litant, qui in aurâ nebulosâ sive humido-frigidâ diu vel habitant, vel peregrinantur, qui denique gelidis liquorum haustibus frequenter delectantur.

Cognoscitur hujus Morbi præsentia ex respirandi difficultate & præcordiorum anxietate per vices, præprimis sub vesperam, ingravescente, tussiculâ sicca, lassitudine membrorum, somno inquieto, appetitu paulatim imminuto, urinâ parcius prodeunte, ut plurimum crudâ & nonnihil lixiviosâ; denique & Aquarum in pectoris cavitate flu-

uantium murmuribus, sicubi de latere in latus Æger decumbens sese provolvat. Quod si dextrâ cavitate Thoracis collectum est serum, tum benè respirabit Æger, ubi in dextro latere decumbit; sinistro autem lateri incumbens, ob aquas pulmonem nimis prementes, pejus respirabit, atque pectoris angustiam adquiret. Si verò in sinistrâ cavitate accumulatae sunt Aquæ, tum Æger sinistro lateri melius incumbet atque dormiet. In utraque tandem cavitate collectæ Aquæ id producant, ut Æger non nisi supinè decumbens spiritum commodè ducere queat. Porro id notandum, quod serum sinistram pectoris cavitatem occupans Ductum thoracicum premat, sicque promptum chyli & lymphæ adscensum vel transitum impediendo, occasionem facilem præbeat expansioni præternaturali lymphicorum tubulorum in pedibus existentium, adeoque & oedematoso horum Tumori. In dextrâ verò cavitate hærentes Aquæ, cum ductum illum premere nequeant, hætenus adeo citò & maturè crurum Tumorem minimè producant. Si magna feri copia in Pectore hæreat, tum illud, cui inest, latus subinde tumidum comparebit, opposito latere depressiore manente.

In principio hic Affectus non adeo facile cognoscitur, neque Medenti cognoscendus offertur, antequam notabilia symptomata & molestias Homini inferat. Tacitè nimirum gliscit hoc malum, radicesque paulatim firmas sine Ægrotantis incommodo

M m m m

agit;

agit ; etiamſi enim forſan interdum aliqualem respirandi difficultatem perſentiat , non curat tamen eam , quia lenis adhuc eſt , per intervalla accedens & diu non durans. Quando autem vires eundo majores paulatim adquiſivit hic Morbus , tum frequentius demum pectoris anxietate , & ſpirandi difficultate , per incertas periodos redeunte , ac plus minus diu durante , ſeſe cognoscendum præbet. Augetur hoc tempore ſenſim cauſa illius , niſi efficaci medicamine radicem extirpaveris. Ingraveſcunt quotidie magis ac magis ſymptomata , respirandi nimirum difficultas & anxietas , quæ , dum falſedo Aquarum extravasatarum nervos ſubinde pneumonicos aut diaphragmaticos magis criſpat , vellicat , atque ſpasmodicè aliquandiu contrahit , convulſiva & periodica evadit ; hincque temporis ſucceſſu , auctâ ſeri in pectore copiâ , major uſque & uſque reddita Dyſorexiam , Febriculam lentam , Sitim aliqualem , carnis Conſumptionem , noctes graves , faciei pallorem , tandem & Hydropem quoque Aſcitem poſt ſe trahit.

Pregno-
ſa.

Morbus proin in principio ſui adhuc curabilis , in augmento & progreſſu difficilis , in ſtatu tandem ſuo , ubi jam heſtica Febris ſeſe junxit , planè immedicabilis & lethalis exiſtit. Diurnus tamen , atque per annos interdum integros in Homine gliſcens , antequam corporis funeſtam cum lentâ Febrî maciem inducat. Conſumptio hæc corporis paulatina quoque eſt , & ad plures ſeſe menſes

plerunque extendit , quibus certè miſeram Æger vitam inter frequentes Anxietates graviffimas transigere cogitur. Tandem Aſcites quoque Hydrops ut plurimum jungitur , antequam mors , tantæ finem impoſitura miſeriæ , appropinquet.

Curatio proin in principio requirit medicamina aperientia , deobſtruentia , purgantia , incidentia , reſolventia , quibus videlicet ſerum craſſum attenuari , viſcidum ac lentum incidi , falſum & acre edulcorari , ac ita Glandularum obſtructiones reſolvi , ſtagnantesque jam Aquæ quâ datâ portâ commodiore eliminari queant. In hunc finem commendare debemus *Ptiſanam è Mannâ laxativam* , aliave purgantia ſub præcedente proximè Titulo ordinata.

Purgante præmiſſo , ac ſubinde iterato , ſtatim Fonticulus in Brachio aut Pede excitandus eſt , & quidem eo in latere , in quo hætere Aquas notabimus. Deinceps verò quotidie mane per longum tempus ſequens exhibebitur non ſine ſucceſſu :

Rj. Syrupi macrobii ℥vj.
Oxymelit. bellebor. Geſn. ℥ij.
Tinctur. ʒ n. ʒj.

M.d. ad Vitæ. Doſis coëhleare plenum.
Mane ac velperi dein modò *Infuſum ſol. Thée* , modò *Decoctum Granor. Coffee toſtor. cum 25. vel 30. guttis Tinct. Salis Fri vel Mart. aperit. vel ʒ nii* propinari poteſt. Vel *Succi Plantarum antiſcorbuticarum filtrati* , aut *Deſtillatum hippenteror.* ad ℥ij. vel iij. commendabitur. Aliquando ſequens

quens Infusum conducit m. ac vesp.
per aliquot hebdomadas datum :

℞. Milleped. vivor. contus. num.
20. ad 30.

Croc. oriental. ver. gr. vj.

Radic. Helen. incis. ʒij.

Sacch. cand. alb. ʒiʒ.

Mixtis affunde Vini albi veteris ʒiiij.
stent per biberium in loco tepido, colatus
postea liquor potetur.

Vel ℞. Radic. Helen.

Vincetox.

Bryon.

Asar.

Cucum. ana ʒiiij.

Herb. Veron. Marrub. alb.
ana Mj.

Hed. terr.

Hyssop. ana Mʒ.

Baccar. Juniper.

Laur.

Semin. Anis.

Fenic. ana ʒij.

Croc. oriental. ver.

Cortic. Winteran. ana ʒj.

Limat. mart. in nodulo ligat. ʒʒ.

Incisis, & in nodulo ex Sindon. rubr.
ligatis affunde Vini albi veter. ℥iiijʒ.

Aqu. Gramin. Hed. terr. aa ℥ʒ.

Fenicul. ʒiiij.

Stent per noctem in Cineribus cali-
dis, postmodum m. ac vesp. ʒiiij. vel
ʒiiij. hauriantur.

Sub Pulveris formâ sequens con-
ducit :

℞. ʒ nii diaph.

Ocul. ʒ. ppt.

Diaph. ʒvial.

Milleped. ppt. ana ʒj.

Salis volat. Viper. vel C. C. pur.

Cinnab. ʒ n. corr. ana ʒʒ.

Misc. f. Pulv. subt. div. in 10. dos.
æqu. ad ch. Man. ac vesp. capiatur do-
sis cum Aquâ Veronicæ, flor. Sambuc.
Nasturt. aquat. aut Infuso fol. Thée &
Betonic.

Vel ℞. Dent. Hippopot. ppt.

Corall. alb. ppt. ana ʒiʒ.

Radic. Ireos flor.

Helen. Liquir.

Semin. Nasturt. Urtic.

Thlasp. Fenic. ana ʒj.

Salis volat. Succin. aut

Fuligin. ʒij.

Croci orient. ver. ʒj.

M. f. Pulv. subtil. divid. in 12. dos.
æqu. ad ch. m. ac v. sumendas.

Vel Salia lixivialia Plantarum, v.
gr. Onon. Juniperi, Fabar. Absynth.
ad ʒʒ. quotidie mane ac vesp. cum
Jusculo dabuntur. Imò singula Sale
lixiviali condientur. Profunt quo-
que ea alterantia singula, quæ in Cu-
ratione Hydropis Ascitis laudata su-
perius fuerunt.

In Paroxysmo Anxietatum ma-
gnarum sequens non rarò levamen
insigne attulit :

℞. Ol. Amygd. dulc. rec. expr. ʒiʒ.

Axung. canis rec. ʒiiij.

Spermat. Cet. rec. ʒiʒ.

Essent. Croc.

Spir. Sal. arm. anis. ana ʒʒ.

Syrup. de Hyssop. vel Heder.
terr. ʒx.

Misc. d. ad Fictile, ac singulis bibe-
riis cochleare plenum capiatur.

Vel Sperma Ceti rec. in Jusculo
qualicumque solutum aliquoties ex-
hibeatur.

Si redeat frequenter Paroxysmus, & quidem cum metu convulsionis, anodyna dari possunt, v. gr.

℞. Spir. Sal. arm. anis. vel fœnic. 3iβ.
Essent. Opii liquid. 3β.

M. d. ad Vitr. Singulis sex horis 20.
aut plures guttæ capiantur cum Julepo
ex Aquâ Veronicæ & Syrupo Bellid. min.
vel Capill. ♀ r.

℞. Mass. Pilul. de Styrac. gr. iv.
Theriac. cœlest. gr. iij.
Balsam. Peruv. q. s.

M. f. Pilulæ num. 7. sumantur noctu
horâ somni.

Quandoque Clysmata emollientia & detergentia injiciuntur. Si his nihil proficiamus medicamentis, tum Paracenthesis thoracis inter sextam & septimam costam debito modo instituenda est, atque sic exitus Aquis procurandus; quod sine omni periculo fieri potest, si non diu nimis expectaveris. Sed scire debes quonam in latere instituenda sit. Si Æger tali Operationi resistit, & Affectus immedicabilis evasit, tum Cura tantum palliativa est observanda, atque Symptomata mitiganda, quemadmodum sub titulis eorum demonstratur. Diæta tandem conveniens præscribenda.

Hydrops
tympanites.

HYDROPS TYMPANITES
est Tumor Abdominis valdè tensus dolorosus ac retinens, sonitum ferè instar Tympani edens, ac ortum à Membranis Intestinalisque flatu distentis, simulque interdum Lymphâ acri extravasatâ, & in cavum Abdominis effusâ trahens. Etenim Tym-

panitem vix absque Ascitis conjunctione evenire posse credimus, quam non semper crura pedesque simul intumescant, nisi circa finem & paulo ante mortem.

Genesis s. productio hujus Morbi Causa obscura adhuc est, ac difficilis indaginis: quantum tamen conjecturâ assequimur, necesse est, ut tubuli membranacei tam Intestinalium, quàm Abdominis integumentorum à succo quodam acri, acido atque austero vellicati crispentur, ac spasmodicè nonnihil constringantur, unde Spiritus animales, de Aëreâ naturâ maximè participantes, copiosius influant, atque hinc in transitu ulterioresque progressu impediti subsistant, sicque partes illas flatuosè distendant. Experimentiâ quoque didicimus, eos, qui Cholerici, & ad spasmos proclives existunt, qui flatus ventris admodum retinent cohibentve, qui vitæ sedentariæ, ac lucubrationibus nocturnis valdè indulgent, qui Baccho Cererique non male litant, qui Cibis salis, acidis, ac flatulentis quotidie delectantur: quæ denique Foeminæ menstruum fluxum non sine torminibus ac flatuosis expansionibus ventris, quanquam brevi iterum disparentibus, patiuntur, in huncce Affectum facile incidere.

Quoad Diagnosin, tumor Abdominis heic est renitens, valdè tensus, Diagnos. acerboque lancinante, urente, & scindente dolore per vices sæpè excrucians, simulque pectoris anxietatem, & inquietudines post se trahens.

Tumor

Tumor iste non sine Febri continuâ intra paucas ut plurimum horas gignitur, & magnopere tensum statim Abdomen efficit, ita quidem ut, si cubi digito pulsaveris, sonum ferè instar tympani edat. Somnus propter continuos dolores rarus, exiguusque est, appetitus verò nullus, fitis varia, plerunquè justo major. Urina parcius excernitur, eaquè semper lixiviosa valdè existit, nonnunquam etiam acris & ardens. Pulsus deprehenditur justo celerior, parvus, debilis, planequè hecticus. Alvus nunc segnis, nunc respondens, sed plerunquè sine flatibus simul prodeuntibus; sicubi autem hi quandoque prodeant, tunc insigne Ægris levamen conciliant. Pedes nisi ante morbi insultum tumuerint, in principio ejusdem omni Tumore carent; illo autem per aliquot hebdomadas jam graviter affligente, demum intumescere sed absque dolore incipiunt; hinc paulatim simul Abdomen oedematoso ulterius tumore, circa lumbos præprimis conspiciendo, afficitur; qui quidem tamdiu increscit intra ac extra corpus, donec Æger amissis omnibus viribus naturæ debitum exolverit. Tensio ventris sæpè Venter adeo comprimit, ut multum retinere nequeat, sed illud sæpè per vomitum respuere cogatur.

Prognosis Affectum hunc non solum valdè periculosum, sed plerunquè incurabilem facit, paucissimi enim ac rarissimi sunt, qui illius vehementiam naturæ bonitate eludere, adque pristinam sanitatem revertere

potuerunt. Neque morbus adeo diuturnus est, atque alia species Hydropis, quin continui dolores atque inquietudines unâ cum astitâ, haud multarum septimanarum intervallo, Hominem penitus emaciant, excitataque internarum partium Gangrænâ ac Sphacelo, viventium consortio eripiunt.

In *Curatione* crispationes membranarum spasmodicæ sunt demulcendæ, flatus discutiendi, urina promovenda. Sed hoc opus hic labor; ut nesciat plerunquè Medicus, quid agere, præscribereque, quid linquere velit. *Purgantia* heic certè nociva, *Venæsectiones* inutiles, *diaphoretica*, *diuretica* atque *antispasmodica* valdè debilia; plus enim hoc, si ullum, valet Arte malum. Nihilominus tamen Ægri animus venit erigendus, & quantum possibile, etiam remediorum ope refocillandus. Quem in finem *Clysmata carminativa-emollientia* sæpius sunt injicienda, cavendo ne quid aëris simul subintret. Componentur autem illa ex *Aquâ fontanâ*, vel *Urina humanâ*, cui incoctæ sint *Radices Angelic. Vincetoxic. Imperator. Petasitid. Chelidon. major. Herb. Nasturt. Malv. Parietar. Meliss. Menth. Puleg. Ocym. Calaminth. Matricar. Origan. Sabin. Beccabung. Cochlear. Semina Fæn. græc. Dauc. Anis. Fœnic. Carvi, Paludapii, Bacc. Juniper. Laur. Flor. Chamomill. Melilot. Salv. Rorismar. Lil. convall. Decocto autem colato dein infundi debet *Melanthosatum, rosatum, rutaceum, Ele-**

Curatio.

Etuar.

Electuar. è Bacc. Lauri, cum tantillo Salis polychresti.

Extus toti Abdomini *Cataplasma* imponi poterit ex *Roob Ebuli, Sambuci ac Juniperi cum Sale prunellæ, Radicibus Allii, Cepar. Sigilli Salomonis, Herbisq; recentibus Verbenæ, Aristolochiæ, Ocymi, Rutæ, Agrimonie, Anserinæ, Pimpinellæ, Ulmarie, Fol. Sabinæ, Meliss. Salviæ, Scordii, invicem contusis, & calidiusculis redditis. Forsan *Emplastrum de Meliloto ac de Baccis Laur.* simul conducet impositum.*

Intus concedi possunt præter duodecim, vel plures etiam doses *Panacææ solutiv. alcalin.* mane videlicet ac vesperi ad ʒj. exhibendæ, *Spirit. Salis armoniac. quomodocunque oleosus redditus, Tinctur. Castor. cum Spirit. Salis ammon. parat. Spirit. volat. C. C. Viperar. Lumbricor. terrestr. Essent. Croc. Elix. propr. s. acid. Tinctur. ʒ n. nec non Tinctur. Martis belaborata Wedelii cum Aqu. Cinnam.* Quibus adde *Diaph. ʒ ial. ʒ vial. Lunare, ☉ are. Bezoard. miner. Lapid. Bezoard. occidental. Cinnab. nativ. vel ʒ n. correct. Unicornu marin. ppt. Cry stall. alb. ppt. Ægagropilam ppt. Lumbr. terr. ppt. Semen Rut. Nast. Pæon. Anis. Fenic. Dauc. Carv. pulverisat. Radic. Sigill. Salomon. ppt. Aurum fulminans &c.* sub formâ pulverum.

Symptomatibus urgentibus simul est occurrendum, neque heic formidanda *anodyna & opiata* aliis permiscenda. Pro potu ordinario inserviat *Decoctum Scabios. Meliss. Hordei, Ulmar. Agrimon. Rasur. C. C.*

Passular. min. Juscula subinde *nasturcinis Herbis* alterata concedantur. Imò *destillatum equinum ad ʒiij. cum Tincturæ Castor. gutt. xv. vel xx.* sæpius assumtum prodesse potest.

HYDROPS VTERI, & OVARIII MVLIEBRIS, est Tumor præternaturalis sive Uteri, sive Muliebris Ovarii, oriundus à sero aquoso plus minus falso, intra cavitatem tunicasve dictarum partium extravasato & collecto.

Itaque partim ipsius Uteri cavitas, partim illiusdem non secus ac Ovarii tunicæ heic afficiuntur. Rari sunt hi morbi, sed tamen subinde notati à Practicis. Datur autem alia quoque species *Hydrops uterini*, ubi serosæ aquæ intra proprias tunicas collectæ, sensimque magis auctæ nunc unam nunc plures *Hydatides* sive *Vesicas aquosas* componunt. Talis *Hydrops* eapropter audit *vesicalis*, alii etiam *Molam aquosam*, de quâ sub Molæ titulo, nuncupant, quod subventanea, corruptaque Ovula ei occasionem præbeant. Ejusmodi *Hydatides*, Ovulave tumentia aquosaque liquore turgida in Ovariis non raro deteguntur per exenterationes cadaverum.

Causa proxima est Sero è vasculis lymphaticis, quæ per tunicas affectarum partium naturaliter discurrunt, ruptis extravasatio, & cum ulterius progredi nequeat, coacervatio, quæ proin fieri nequit sine tunicarum dictarum distensione. Distenduntur autem hæ ad amplitudinem sæpè

sæpè stupendam ac nihilominus simul præternaturaliter ita increassantur, ut triplo etiam crassiores evadant, idque propter plures particulas gelatinosopituitosas intra poros suæ substantiæ admissas. Sic ante decennium in exenteratione Mulieris Hydrope Ovarii sinistri defunctæ non sine maximâ admiratione conspeximus, illud Ovarium ratione substantiæ solidioris ad magnitudinem dimidii alicujus capitis increvisse, ac præterea simul intra tunicas suas maximè increassatas ultra 15. libras feri limpidi flavescentis continuisse. Ante biennium aperuimus quoque Cadaver alius Matronæ, cui abdomen spatio septemdecim annorum paulatim ad stupendam amplitudinem excreverat sine ullo Crurum tumore; heic verò integumenta Abdominis tympani instar validissimè extensa, dum incidere-remus, maximè tenuia & unâ tum musculis summè emaciata, Ovarii autem dextri tunicas valdè crassas, atque in stupendam amplitudinem expansas, sedecim propemodum mensuris aquæ fœculentæ, tenuis tamen, repletasprehendimus, quibus effusis, Ovarium sive Testiculus, quoque ad pugni magnitudinem & molem increvisse, Scirrhumque varii coloris exhibuisse notatus est.

Gignitur autem Hydrops talis à causis *antecedentibus* eo modo, quo Hydrops Ascites in aliis Abdominis partibus. Hoc tamen notandum, quod Virgines cachecticæ, aliæque Fœminæ caco-chymicæ, sicubi fuerint imprægnatæ, facile simul cum aucto in

Matrice Fœtu Hydropem uterinum adquirant. Suppressio hinc menstrui fluxus, læsio qualiscunque glandularum Ovarii, Uteri que in Cachecticis aut Caco-chymicis, ansam huic Morbo facilem præbere possunt.

Quoad *Diagnosin*, Hydrops Uteri non rarò ipsam mentitur imprægnationem; ab hac tamen distinguitur, quòd Hydrops iste æqualiter juxta amplitudinem Uteri extendatur, secus atque fit in statu prægnante; quòd præcesserit Cachexia, & dispositio hydropica; quòd fortè menstruus sanguis ab aliquo tempore nimis fuerit pallidus; quòd ultra decimum mensem ab amisso fluxu illo Tumor subsistat, cum macie quidem superiorum pectoris partium, pedum verò oedematosâ intumescentiâ; quòd symptomata in Hydrope uterino paulatim augeantur & ingravescant, cum è contrario minuantur, si vera est imprægnatio. Præterea Mammæ, si Hydrops adest, molles sunt, vel molliter tumidæ, si prægnans Fœmina, duriusculæ magis evadunt ac tumidæ. In Hydrope Ovarii Tumor Abdominis magis in latere affecto, quàm in opposito deprehenditur, quin si v. gr. sinistrum Ovarium hydropicum fuerit, crus etiam sinistrum, ob pressuram Trunci lymphatici ejusque cruralis rami, & hinc refluxum lymphæ nonnihil impeditum, intumescet. Sed in Uteri solius Hydrope à principio nullum crus tumidum apparebit. In utroque autem Hydrope, sicubi Abdominis cavitas nimium fuerit impleta, maciesque

Diagnos.

ciēsque jam manifesta cum hectica Febri apparuerit, tunc pedes simul intumescere incipiunt, quotidieque magis augeri pergunt. Ubi verò Uteri Hydrops imprægnationi jungitur, res difficulter admodum cognoscetur, Fœtu existente debili, sed si ille vivax fuerit, tum ex illiusdem motu atque calcitracione partim, partim quoq; ex aliis cōmunibus graviditatis signis cognoscetur. In hoc autem casu, æquè ac in simplici Uteri Ovariique Hydrope plerunque etiam Pudenda oedematoso Tumore expanduntur, difficilemque admodum Urinæ, aliàs etiam justo parcioris, excretionem reddunt. In principio & progressu Morbi appetitus satis constat, neque Febris ulla hectica adhuc molestias parit: hinc est, quòd Mulierculæ talem Affectum sæpè per plures annos circumferre possint, citra magnum incommodum. Ubi verò tandem confluyente aquarum copiâ augetur Hydrops, tunc etiam Febris lenta gliscere, atque paulatim Miseras ad mortem deducere incipit; symptomatibus nimirum sensim accedentibus, quibus Ascitici aliàs obnoxii esse solent. Distinguitur dein *Hydrops Uteri* à *Molâ* per solum huius pondus: nec non ab *Inflatione*, Uteri pondere & sonitu, cum dolore tensivo; ab *Ascite*, etiam, quòd in hoc ipsius Abdominis integumenta molli simul tumore afflicta sint.

In Prognosi Hydrops Ovarii summè periculosus, imò incurabilis est dicendus. *Uteri* autem *Hydrops* sæpiusculè sanatur, præprimis si nulla

glandularum internarum corruptio, sideratio, vel scirrhusa intumescencia adfuerit. Sæpè Hydrops Uteri Fœtum simul præsentem vel enecat prorsus, vel debilem valdè reddit, minusque vividum ac vegetum.

Curatio Hydropsis Uteri vel Ovarii instituitur ad eum prorsus modum, quo *Ascitis* curationem suscipi debere diximus. Nimirum *purgandum* corpus probè; *diuretica*, inprimis *martialia*, intus exhibenda. Extus verò in Uterum *Aqua calcis* cum incoctione *plantarum diureticarum* siphonis ope injicienda calidiuscule. Vel *Pessaria* purgantia ex *Melle rosaceo*, cum *Colocynthide* &c intrudenda. *Vomitorium* etiam exhibitum subinde prodest; non secus atque *sternutatoria*, & *Clysmata alvina*. Tandem miscenda quoque sunt fortia *emmenagoga* ex *Sabinâ* aliisque, ni Fœtus præsens obstiterit. *Sabina* autem pulverisata simul pessaria ingredi potest. Imò Fœtus sive Vapor ex decocto *aperientium* & *diureticorum* admissus sæpè prodest, aquasque educit. Sunt quoque Fœminæ, quæ *lateritium lapidem* igniunt, ejusque *Vino* conspersi vaporem calentem ad Pudenda admittunt sæpius. *Dieta* quemadmodum in *Ascite* institui ac ab *Ægro* tante diligenter observari deber.

HYDROPS CAPITIS, sive HYDROCEPHALVS est Tumor capitis, ejusque præcipuè partis, quâ cranium comprehenditur, oedematofus, à Lymphâ ibidem stagnante, vel etiam extravasatâ, ac super membra-

membranas effusâ exortus. Afficitur ergo heic Capitis pars superior, nunc supra nunc infra Cranium.

Gignitur morbus, quodocunque Lympha viscida lenta in tubulis lymphaticis integumentorum capitis stagnat, vel etiam ex iisdem nimîâ expansione ruptis inter membranas colligitur, ita quidem copiosè, ut ad sensum externum occurrat, manifesteque videri possit, nisi ipsi humeres serosi subter Cranium collecti fuerint, quoniam tunc morbus non ita in Visûs sensum incurrit. Ut autem Lympha talis in parte affectâ colligi stagnareque possit, necesse est, ut materia ejusdem ex primis digestionum viis sub formâ Chyli crudioris & aquoso-pituitosi sanguini subministretur: requiritur etiam, ut Lympha illa Sale acido-fixo, minus tamen acri sit prædita; requiritur porro, ut tubuli Capitis lymphatici è poris quidem Glandularum ejusmodi humorem admittant, sed tamen propter angustiam suam, atque irregularem dicti modò humoris particularum figuram, tenacitatem, atque spissitudinem indebitam non transmittant, verùm intra sese retineant; usque adeo ut accedentibus novis jugiter particulis lympha magis ac magis cumuletur, sicque plurima vascula nimis distendendo partem in Tumorem attollat. Idem contingere solet, sicubi lymphatica quædam rumpantur vascula; qui enim ex illis dein effluit humor, non potest non auctâ sui quantitate membranas ab invicem disternere, sicque Tumorem efficere. Sed non rarò heic simul præternaturalis quæ-

dam angustia, & æctispante quodam sale austero permeant. Sive ab externis injuriis frigidi aëris, rerumque aliarum exorta, stagnationi Lymphæ, subsequenti Hydrocephalo ansam præbere valet. Obnoxii sunt huic morbo plerunque Pueri, quibus serum sanguinis admodum viscidum, lentum, ac ad motum valde ineptum contigit, proindeque intra tubulos tunicarum Capitis facile consistere potest: vel quibus Caput à violento partu nimis compressum aut intortum est. Pro diverso autem stagnationis feri loco triplicem Auctores faciunt Morbi differentiam, quarum *prima* est, quando serum inter Cutim & Pericranium accumulatur: *secunda*, quando illud colligitur inter Pericranium & Cranium: & *tertia*, quando colligitur inter Meningem duram & Cranium ipsum, ita ut suturæ Cranii hinc divellantur.

Cognoscitur *prima* Morbi species *Diagnos.* ex Tumore capillatam capitis partem *sis.* undique æqualiter occupante, & extus facile comparente, eoque molli, indolente, in quo vestigia impressorum digitorum facile & aliquandiu manent, non secus ac in pedibus œdematosi. *Secunda* species cognoscitur ex Tumore simili, sed magis tamen renitente, & ob pericranium distensum magnopere dolente, cum lentæ simul Febris junctæ symptomatibus. *Tertiæ* speciei signa sunt Tumor capitis manifestus, sed ubi extus cutis firma nec ita crassa, cranium superjacens deprehenditur; in loco futurarum autem cranium divul-

sum notatur, non sine dolore plus minus gravi, & obtuso, cum perpetuâ ferè somnolentiâ, & oculorum illacrymatione. Communia omnibus signa sunt cachecticus s. pallidus lividusve totius corporis, maximè autem Faciei color, lassitudo, sensuum torpor aliqualis, somnolentia frequens, appetitus imminutus, urinæ ut plurimum parciore, & nunc lixiviosæ, nunc crudæ crassæque; macies corporis lenta.

Prognosis.

In Prognosi hic Affectus, qualitercumque contigerit, periculosus est censendus, imò lethalis simpliciter ille, qui subter cranium existit, utpote apoplectico plerunque somno Hominem interimens. Secunda etiam species ob nimium dolorem distenti Pericranii convulsiones post se facile trahit mortiferas. Qui autem extra Pericranium Cutis membranas, glandulas atque poros occupavit, sanitatem faciliorem promittit.

Curatio.

In Curatione ad id imprimis est attendendum, ut sericopia imminuatur, & quicquid hinc inde stagnavit, incidentibus ac volatilisantibus corrigatur. Quibus indicationibus si quis satisfacere cupiat, primo omnium ad blennam in primis viis hærentem exterminandam Syrupum quendam laxantem exhibebit, vel aliud purgans lene cum Mercurio dulci sexies sublimato. Profunt in hunc finem Syrup. flor. Persic. Syrup. de Cichor. cum Rhab. Syr. de Spinâ Cervin. Vel Infus. Fol. Senn. cum Rhab. Semin. Dauc. ac Fœnicul. Addendo Syrupum quendam antiscorbuticum sive sce-

letyrbicum. Trochisci Hermetici quoque non contemnendi: imò Radix Jalapp. Scammon. $\frac{1}{2}$ rat. cum $\frac{1}{2}$ n. diaph. Ocul. $\overline{\text{ss}}$. Sale Genist. & Mercur. dulc. apprimè conducunt. Pro Puerò decem annorum v. gr.

Rx. Syrup. Ros. solut. comp. cum R. A. S. \mathfrak{z} ss.

Aqu. Gramin. Urtic. ana. \mathfrak{z} ss.

Cinam. bugloss. \mathfrak{z} j.

Elect. è Succ. Rosar. \mathfrak{z} ij. ad \mathfrak{z} j.

M. f. Potio detur ad Vitrum pro dosi matutinâ.

Vel Rx. Diacydon. lucid. \mathfrak{z} ij. ad \mathfrak{z} iiij.

Aqu. Ononid.

Scabios. ana. q. s.

M. f. Potiuncula, d. ad Vit. pro dosi.

Vel Rx. Syrup. flor. Persic.

de Cich. cum Rhab. ana. \mathfrak{z} vj.

Conf. Hamech. \mathfrak{z} j.

Aqu. Plantag. \mathfrak{z} vj.

Fœnic. \mathfrak{z} ij.

M. f. Potio d. ad Vit. pro dosi mane jejuno Stomacho propinandâ.

Vel Rx. Radic. Scorzon. Carlin. ana. \mathfrak{z} ij.

Rhab. elect. \mathfrak{z} j.

Fol. Senn. opt. mund. \mathfrak{z} ij.

Semin. Fœnic. Dauc.

Cinam. el. ana. \mathfrak{z} ij.

Crem. $\overline{\text{ss}}$ ri vel

\ominus is essential. Card. bened. \mathfrak{z} ss.

Incisis, contus. atque in nodulo ligatis affunde Aqu. fontan. vel Gramin. q. s. Stent per noctem in loco calido, sequenti mane bulliant parum, hinc Colaturæ \mathfrak{z} ij. adde

Syrup. sceletyrbic.

flor. Persic. ana. \mathfrak{z} iiij.

M. f.

M. f. Potio pro dosi matutinâ.

Qui Pulverum formam præferunt, sequentes vel similes assumere poterunt decem vel duodecim annorum Pueri:

℞. Radic. Jalapp.

Mercur. dulc. sexies sublim.
ana. ℥℞.

Scammon. ℥rat.

Crem. Friana. gr. iij.

M. f. Pulv. subt. detur pro dosi.

Vel ℞. Panacææ solutiv. alcalin. ℥℞.
ad 3vj.

Scammon. ℥rat. gr. vj.

M. f. Pulv. subt. div. in 6. dos. æqu. ad ch. quotidie mane dosis cum tenui Amygdalarum dulcium Emulsione capiatur.

Vel ℞. Radic. Jalapp.

Crem. Fri. ana. ℥℞.

Cinnab. $\frac{1}{2}$ n. rectific. gr. iij.

Diagrydii gr. ij.

Ol. stillat. Fœnic. gutt. j.

M. f. Pulv. subt. d. ad ch. capiatur unâ dosi.

Vel ℞. $\frac{1}{2}$ n. diaph. vel

Bezoard. min.

Ebor. s. ign. ppt. ana. gr. vj.

Rad. Jalapp. ℥℞.

Crem. Fri. gr. iij.

Scamm. ℥r. gr. ij. vel iij.

M. f. Pulv. subt. detur pro dosi.

Forma Emulsionis subinde placet.

℞. Resinæ Jalapp. vel

Scammon. gr. v.

Contusis cum duabus vel tribus Amygdalis dulcibus excorticatis, vel Nucleis Persicorum affunde

Aquæ flor. Acac.

Sambuc. ana. ℥℞.

F. Emulsio, cui adde

Syrup. Capill. veneris ℥ij.
vel si rubram Potiunculam malis

Syrup. fl. Papar. rh. aut
Tunic. ℥ij.

Detur ad Vitrum pro Dosi.

Vel ℞. Magist. Jalapp. aut

Scammon. gr. iv. ad vj.

Spirit. Anis. vel Anth. ℥℞.
ad ℥ij.

Solutis leni igne adde

Julep. rosac. vel Syrup. fl.
Tunic. ℥j.

Detur ad Vitrum pro Dosi.

Morsulorum formula aliquando commodior est pro Pueris, adeoque præscribi potest v. gr. sequ.

℞. Pulv. radic. Jalapp. ℥ij.

Crem. Fri.

$\frac{1}{2}$ n. diaphor. ana. ℥℞.

Cinam. elect.

Conf. Alk. inc. ana. gr. vj.

Resin. Scammon. ℥j.

Sacchar. albiss. Aqu. Ros. solut. ℥j.

M. f. Confectio in Morsulis conspergendis, dum effunduntur, Succo oleoso Cortic. Citri. Dosis est à ℥j. ad ℥iiij. vel 3i℞.

Qui minore vel majore, quàm duodecim annorum sunt ætate, apud eos dosis talium purgantium augeri aut minui poterit.

Præmissis autem laxante, m. ac v. imò & noctu Pulvis aliquis resolvens ac diaphoretico-diureticus præberi debet, compositus v. g. ex Radicib. Ireos florent. Sigill. Salomon. Aronis, Chelidonia major. Aristol. rot. ver. Cinnamon. Cubeb. Semin. Fœnicul. Dauc.

Cretic. Diaph. \mathfrak{J} ial. vel \mathfrak{Z} vial. \mathfrak{g} n.
diaph. Unicorn. marin. ppt. Rasur. E-
bor. Ocul. \mathfrak{D} . ppt. Sale volat. oleos.
quocunque, Sale Ononid. Genist. &c.
cum Sacch. cand. alb. Formulæ esse
possunt seqq.

\mathfrak{R} Radic. Ireos florent.

Chelidon. maj. ana. \mathfrak{z} j.

Ebor. f. ign. par.

Ocul. \mathfrak{D} . ppt. ana. \mathfrak{z} ij.

Semin. Milii Sol. \mathfrak{D} iiij.

\ominus is Ononid. vel

Artemis. \mathfrak{z} j.

Sacch. cand. alb. \mathfrak{z} ij.

M. f. Pulvis subt. d. ad ch. Dosis \mathfrak{z} ß.
vel \mathfrak{D} ij. mane ac vesperi horâ unâ ante
pastum.

Vel \mathfrak{R} . Rad. Vincetox. Cichor. ana. \mathfrak{D} iiij.

Sigill. Salom. \mathfrak{D} ij.

Cyper. Galang. ana. \mathfrak{D} j.

Semin. Fœnic. Dauc. ana. \mathfrak{z} j.

Diaph. \mathfrak{J} ial. vel \mathfrak{Z} vial. \mathfrak{D} ij.

C. C. phil. ppt. \mathfrak{z} ij.

Sacchar. ros. \mathfrak{z} ij.

M. f. Pulv. subt. d. ad Scat. Dos. \mathfrak{z} j.
man. ac vesper.

Vel \mathfrak{R} . \mathfrak{g} n. diaph.

Unic. mar. ppt. ana. \mathfrak{z} iiß.

Cochlearum cum Testis calcin.

Chelar. \mathfrak{D} . ppt. ana. \mathfrak{z} iß.

Semin. Thlasph.

Nasturt.

Anis.

\ominus is volat. Succin. ana. \mathfrak{z} j.

Sacch. cand. alb. \mathfrak{z} iß.

M. f. Pulv. subt. d. ad Scatul. Dosis
 \mathfrak{D} ij. ad \mathfrak{z} j. m. ac v. cum Aquâ flor. Sam-
buc. aut. Saxifragiæ.

Vel \mathfrak{R} . Tinct. \mathfrak{g} nii.

\mathfrak{J} tis aperit. ana. \mathfrak{z} ij.

M. detur ad Vitr. Dosis m. ac v. \mathfrak{z} o.
guttæ cum Decocto Gran. Coffee tostor.

Vel \mathfrak{R} . Salis vol. oleos. aut

Spir. Salis armon. anis. \mathfrak{z} iiij.

Detur ad Vitr. Dosis \mathfrak{z} o. ad \mathfrak{z} o. gutt.
m. ac vesp. cum Aquâ Gramin.

Vel \mathfrak{R} . Tinctur. \mathfrak{J} tis belleborat. We-
del vel Cœruleæ Ettner. \mathfrak{z} ß.

Detur ad Vitr. Dosis \mathfrak{z} o. ad \mathfrak{z} 5. gutt.
m. ac v. cam Aqu. Ononid. Fragor. aut
Nasturt.

Vel \mathfrak{R} . Spirit. \ominus is \mathfrak{F} ri volat. vel

C. C. succin. \mathfrak{z} iiij.

M. Detur ad Vitr. Dosis ut supra.

Vel \mathfrak{R} . Aqu. Nasturt. Petroselin.
fl. Sambuc. Fragor. ana.
 \mathfrak{t} ß. ij.

Roob Juniper. Samb. ana. \mathfrak{z} iiij.

Tinctur. \mathfrak{F} ri. \mathfrak{z} ß.

Misc. detur ad Vitr. singulis trihori-
is vel quadrihoriis haustus unciarum
duarum aut trium propinetur.

Vel \mathfrak{R} . Radic. Onon. Virg. aureæ, vel
Saxifrag. Urtic. Ebul.
Taraxac. ana. \mathfrak{z} iiij.

Herb. Anserin.

Hepat. nob.

Chamædr.

Flor. Calendul.

Genist. ana. \mathfrak{M} ß.

Baccar. Juniper.

Alkekengi ana. \mathfrak{z} ij.

Cortic. Lign. Guajac.

Rasur. Lign. Sassafr. ana. \mathfrak{z} ß.

Semin. Fœnic. \mathfrak{z} iß.

Incis. & contus. coque parum in A-
quæ font. q. s. Colaturæ \mathfrak{t} ß. vj. vel viij.
dentur ad Ampullas vitreas, sensim
hauriendæ.

Vel \mathfrak{R} . Panac. solut. alcalin. \mathfrak{z} iß.

Pul-

Pulverifat. à divid. in 12. partes æqual. ad ch. man. ac vesp. capiatur dosis.

Post singulos quindecim dies laxans repetatur, ita ut, quod interea temporis ex illo fero stagnante resolutum erit, ac in Massam sanguineam resusceptum, per alvum depurgetur. Loco pulverum profunt subinde Liquores volatil. ac diuretici, quales sunt Liqu. C. C. succinatus, Spirit. Salis armon. anisat. Tinctura St. aperit. Spirit. Θ is Ψ ri volatilis, ac similia, quorum portio cum Aquis destillatis ac Syrupo conveniente, aperiente nimirum, diluta per cochlearia m. ac v. propinari poterit.

Externæ fasciæ ac vittæ, quibus caput Pueri involvitur, pulvere aliquo fumali accenso suffumigetur, parato ex Mastiche, Succino, Floribus Sambuc. Herb. Menth. Meliss. Solan. Semin. Aneth. Petroselin. Carv. Rasur. Lign. juniperin. &c.

R \mathfrak{x} . Radic. Cyper. ʒiʒ.

Angel. ʒij.

Ras. Lign. Junip.

Fol. Menth.

Meliss.

Puleg.

Artemis. ana. Mj.

Flor. Chamom.

Sambuc. ana. Mʒ.

Storac. calam. ʒʒ.

Benzoin. ʒj.

Mast. el. ʒj.

Thur. ʒʒ.

M. f. Pulvis groß. d. ad Scatulum.

Si serum sit stagnans extra Cranium, Vesicatoria Nuchæ applicata re-

liquis palmam præripiunt. Quum autem aqua inter Meninges & Cranium collecta est, Setaceum cum fructu statim in Cervicæ applicabitur. Si tandem Aquæ hæreant inter Meninges & Cerebri substantiam, malum est prorsus immedicabile.

Aliàs Capiti quoque Spiritus vini camphoratus, quartâ parte Aqu. Sca bios. & Aqu. Calc. vivæ dilutus, calidè cum linteis sæpè applicatur. His verò nil proficientibus Cantherium bregmati inurunt. Sunt qui Sectionem vel Incisionem tentant, sed cum per ejusmodi operationem malum vel deterius reddatur, vel rarò admodum curetur, tutius omnino intermittitur. Fortè Emplastrum de Ranis-Vigon. cum Mercur. vel Emplastrum de Cicutâ, de Betonicâ, diachalciteos, de Baccis Lauri, &c. cum Calce vivâ pulverisatâ, & simil. mixtum ac impositum præstat.

In Diatâ aër frigido-humidus est vitandus, si frigeant aliàs membra exteriora. Cibi boni ac laudabilis succi, eupepti, concedendi. A quiete somnoque nimis sibi cavendum. Errhina medicamina naribus m. ac v. diligenter attrahenda, v. gr.

R \mathfrak{x} . Folior. Betonic. Salv.

Meliss. Majoran. ana. Mʒ.

Semin. Fœnic. Dauc.

Nigell. ana. ʒʒ.

Incisa coqu. in s. q. Aquæ fontan. Colaturæ T \mathfrak{b} . I. adde Succ. è foliis Betæ recenter expressi ac filtrati ʒiiij.

Detur ad Vitrum, ac sæpè aliquid naribus attrahendum offeratur.

Alvus quotidie sit aperta , sive naturâ , sive arte per *Suppositoria* , *Clysmata* , aut laxantes cibos. Animi pathemata fugienda. *Laconica* per aliquot dies visitari tandem possunt , non sine successu Sudoris.

Hypercatharsis.

HYPERCATHARSIS, SVPERPVRGATIO, est vehemens admodum creberque Alvi fluxus , ut plurimum cum sanguine mistus , ab erosione fibrarum & glandularum intestinalium per assumptum Purgans nimis forte oriundus.

Causa.

Malo huic obnoxii sunt illi maxime , qui vel tenerâ fibrarum stomachicarum texturâ gaudentes , vel utcunque firmiore præditi , catharticum nimis vehemens assumerunt , quemadmodum v. g. sunt *Purgantia* admodum *acria* & *resinosa* , *Scammonii* vel *Jalappæ resina* , *Colocynthidis* vel *Trochiscorum Albandali Extractum* , *Helleborus niger* vel *albus* , *Turbith* , *Hermodactyli radix* , *Tabulæ* vel *Trochisci sibiati* , & similia grandiore dosi exhibita , quæque adeo non tantum vi suâ salino-detergente mucum Ventriculi & Intestinorum abradunt , sed & resinosis particulis sese affigendo fibrillis glandulosis aliisve , tandem vascula corrodunt , sicque unâ cum sero copioso simul extravasatum sanguinem exhibent , idque non sine frequentibus & acerbis Ventris torminibus , aut etiam Tenesmo alvi. Cumque talia corpuscula salino-purgantia , simul massam humoralem subingressa , laticem serosum fundunt , atque hic deinceps per irritatas

Intestinorum glandulas copiosius effluit , tum serum quoque exhibet largius per alvum fluens.

Cognoscitur malum per se , verum notandum , quod Hypercatharsis sæpè fiat cum Inflammatione tunicarum intestinalium , adeoque cum Febre continuâ , siti , anorexiâ , inquietudine , vigiliis , similibusque aliis symptomatibus ; quodque eapropter non rarò Gangræna & Sphacelus Intestinorum lethalis subsequi possit , perinde ac si Venenum sumtum fuisset. Quid enim aliud vehementia purgantia , largiore dosi data , sunt quam verissima corrosiva , adeoque Venena.

In primis Superpurgatio *funesta* est dicenda , si supradictis symptomatibus simul accedat sudor frigidus frontem , nasum , imò membra externaprehendens , cum magnâ lassitudine.

In Curatione hujus Mali statim ea remedia sunt exhibenda , quæ spicula purgantis assumpti eluere , absorbere , ac destruere , Inflammationemque Intestinorum dissipare valent. Itaque vel *Oleum Olivarum optimum* , aut *Amygd. dulc. rec. expr.* ad plures statim uncias propinandum ; vel *Lactis vaccini* athleticus mox haustus concedendus venit ; vel *Emulsionem* statim his Indicationibus satisfaciientem præscribere oportet , v. g.

Rx. Amygd. dulc. rec. excort. ʒj.

Semin. 4. frigid. maj. ana. ʒiiij.

Card. bened. ʒiij.

Decoct. Hordei ʒxiv.

Aqu. Brunell. ʒviiij.

F. l. a.

F. l. a. Emulsio, cui adde
Syrup. Capill. ♀ r. ℥iv.
Unic. fossil. ℥℞.

M. d. ad Vit. singulis trihoriis ℥iij.
bibantur.

Vel R̄. Amygd. dulc. rec. exc. ℥j.
Semin. Cucum. ℥℞.
Aqu. Plantag.
Malv.
Succis. ana. ℥iiij.

F. l. a. Emulsio, cui adde Julep. Ros-
sac. ℥j. Detur ad Vitrum, & aliquot dosi-
bus spatium 12. horarum capiatur.

Antequam verò talis Emulsio pa-
rata sit, Theriacæ vel Mithridat. vel
Elect. diasc. Fracastor. ℥j. statim exhi-
bebitur deglutienda Adulto vel prius
cum Aqu. Plantag. miscenda. Præ-
scribi etiam poterit sequens Opiata :

R̄. Conserv. Ros. rubr. ℥l. ℥vj.
Flor. Tunic.
Fumar. ana. ℥℞.

Conditur. Nuc. Indic.

Corall. rubr. ppt.

Bol. Arm. ppt.

‡ n. diaph. ana. ℥j.

Laud. opiat. gr. vj.

Syrup. Capill. ♀ r. q. s.

M. f. Elect. d. ad Oll. Sumatur sin-
gulis bihoriis magnitudo nucistæ.

Si respuat Ager Opiatam, seq. Pulveris
dosibus bis vel ter quotidie dabitur.

R̄. Unic. fossil. ℥i℞.

‡ n. diaph.

Terr. sigill. ana. ℥℞.

Corall. rubr. ppt.

Lapid. Hæm. ppt. ana. gr. xv.

Laud. opiat. gr. iij.

Sacch. cand. alb. ℥j.

M. f. Pulv. subt. in 6. dos. æqu. div.
ad ch. Singulis sex horis dosis exhibebi-
tur cum Emulsione.

Si quis Pilulas desideret, præscribi
possunt seqq. Adulto :

R̄. Extract. Torment.

Theriac. cælest. ana. gr. iv.

Cum Essent. Myrrh. f. l. a. Pil. no. vij.
Dentur pro dosi, semel quotidie repeten-
dâ, usque dum Hypercatharsis cessa-
verit.

Extus Emplastr. de Crustâ panis,
vel Stomachicum Norimbergense regio-
ni Ventriculi, imò & circa Umbili-
cum imponatur : vel seqq. Cata-
plasma applicetur :

R̄. Pomum Cydon. in frusta sectum.
Crustam Panis tostam ac pul-
veris.

Coque invicem in Vino rubro ad
consistentiam Cremoris, adde hinc,

Pulv. Nuc. mosch. ℥i℞.

Mastich.

Myrrh. ana. ℥j.

Cinnamom. ℥ij.

Garyophyll. arom. ℥j.

Ferment. Panis. ℥j.

Misce cum Vino rubro ad Consisten-
tiam Cataplasmatidis & calidè applica,
per vices iterandum.

Potest & Abdomen Oleo Anethi,
Absynth. Cydon. Myrrh. Mastich Myr-
tin. Chamomill. Nucist. expr. Oleo dest.
Macis, Fœnic. Carvi, Cumin, &c. in-
terdum calidè inungi.

Versetur interim Ager in Lecto,
aërem qualemcunque frigidum vitet.
Ab acidis, salitis nimius abstineat. Jus-
cula farinacea, hordeacea, &c. sæpè as-
umat, imò Lac bubulum, Saccharo
non-

nonihil edulcoratum affatim cum fructu hauritur statim post assumti medicaminis vires nimias ; vel *Oleum Olivarum*, aut *Amygd. dulc.* ad plutes uncias deglutiri solet. Pro potu ordinario bibat *Decoctum Radic. Bistort. C. Cerv.* vel *Eboris usti*, *Lign. Sassa-phr. Herb. Sanic. Agrimon. Pyrol.* cum *Decocto* etiam hoc *Folior. Thée* infusum subinde bibatur. Si Febris nulla adsit, tum *Vino rubro veteri* immerge *frustum Panis tostum*, misce simul pul-

verisatam Nucem moschatam cum *Saccharo* ; & cochleatim exhibe. Ab irâ & terrore cavendum.

HYPOCHONDRIACA PASSIO vel **AFFECTIO**, vid. *Affectio hypochondriaca*.

HYPOPYON, vid. *Corneæ Abscessus*.

HYPOSPAGMA, vid. *Sugillatio*.

HYSTERICA PASSIO, vid. *Matricis suffocatio*.

F I N I S
PARTIS PRIORIS
THEATR I
PRAXEOS MEDICÆ.







